

Altera pars.

De usitatissimis medicaminibus homoeopathicis.

Venena binis crucibus, remedia minus venenosa, sed ipsa quoque a ceteris seponenda singulis crucibus notata sunt. (Tabulae B et C in Pharmacopoea renovata absunt.)

Substantiae ipsae, triturationes, solutiones, dilutiones D1—D3 † caute, †† cautissime servantur.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Abelmoschus	Hibiscus Abelmoschus L. Fam. nat.: Malvaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. (= Quantitas medi- camenti meri) $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Abies canadensis	Tsuga canadensis Carrière Fam. nat.: Pinaceae	Cortex recens et novelli ramuli cum frondibus. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Abies nigra	Picea nigra Link Fam. nat.: Pinaceae	Resina insiccata ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Abrotanum	Artemisia Abrotanum L. Fam. nat.: Compositae	Folia recentia collecta mensibus Julio et Augusto. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Absinthium	Artemisia Absinthium L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Acalypha indica	Acalypha indica L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Tota planta recens. Ad ess. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Acanthus mollis	Acanthus mollis L. Fam. nat.: Acanthaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Acer Negundo	Acer Negundo L. Fam. nat.: Aceraceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Achillea Eupatorium	Achillea filipendulina Lamarck Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Acidum aceticum Aceti acidum	Pondus specificum summum 1,064 Continet minimum 96% CH_3COOH Pondus moleculare 60,03	Ad dilutionem sec. § 5a. Dilutio D 1 in lagoena epistomio vitreo prae- clusa veneat. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Acidum benzoicum Benzoës acidum	Acidum benzoicum sublimatum. $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{COOH}$ Pondus moleculare 122,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Acidum boricum Boracis acidum	H_3BO_3 61,84 Pondus moleculare	Ad triturationem sec. § 7 et ad solut. sec. § 6b c. Spir. v. 45 %. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Acidum carbolicum † Carboli acidum	Acidum carbolicum crystallisatum, Phenolum, $\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{OH}$ Pondus moleculare 94,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45 %. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 1 et D 2 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis ve- neant.
Acidum chromicum † Chromi acidum	Acidum chromicum anhydricum, Chromium trioxydatum, CrO_3 Pondus moleculare 100,01	Ad triturationem sec. § 7; idque quod substantia originalis vehe- menter diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 — D 6 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dil. semper recens parentur. Dilutiones D 1 et D 2 in lagoenis epistomio vitrae praeclusis ve- neant.
Acidum citricum Citri acidum	$\text{C}_3\text{H}_4(\text{OH}) \cdot (\text{COOH})_3 + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 210,08	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Acidum formicicum	Pondus specificum 1,061—1,064 Continet 24—25% HCOOH Pondus moleculare 46,02	Ad parationem dilutionis D 1 pars Acidi formicici 25% cum 1,5 parti- bus Aquae misceatur. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dilutio D 1 in lagoena epistomio vitreo praeclusa veneat.
Acidum gallicum Galli acidum	Acidum gallicum crystallisatum, Acidum benzoicum trioxydatum $\text{C}_6\text{H}_2(\text{OH})_3 \cdot \text{COOH}$ (1, 2, 3, 5) + H_2O Pondus moleculare 188,06	Ad triturationem sec. § 7 et ad solut. sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Acidum hydrochloricum (Acidum muriaticum) †	Pondus specificum 1,126—1,127 Continet 25% HCl Pondus moleculare 36,47	Ad parationem dilutionis D 1 1 pars Acidi hydrochlorici cum 1,5 parti- bus Aquae misceatur. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. — Dilutio D 1 in lagoena epistomio vitreo praeclusa veneat.
Acidum hydrocyanicum †† Hydrocyani acidum	Continet 2% HCN Pondus moleculare 27,02	Acidum hydrocyanicum, conti- nens substantiae 2%, si mixtum erit cum aequis partibus Aquae, efficit dilutionem D 2. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dilutio D 2 in lagoena epistomio vitreo praeclusa veneat.
Acidum hydrofluoricum †† Fluoris acidum	Continet 40% HF Pondus moleculare 20,01	Ad parationem dilutionis D 2 2,5 partes Acidi hydrofluorici cum 97,5 partibus Aquae misceantur. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 2—D 6 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Acidum hydrofluoricum eiusque dilutiones in cylindris e Gutta Percha confectis veneant.
Acidum lacticum Lactis acidum	Pondus specificum 1,210—1,220 $\text{CH}_3 \cdot \text{CH}(\text{OH}) \cdot \text{COOH}$ Pondus moleculare 90,05 Continet acidi totius circa 90%, acidi liberi ca. 72% ad rationem Acidi lactici	Ad dilutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ 1,1 pars acid. lact. 90% + 8,9 Aqua D 2 cum Aqua Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Acidum nitricum † Nitri acidum	Pondus specificum 1,149—1,152 Continet 24,8—25,2% HNO_3 Pondus moleculare 63,02	Ad parationem dilutionis D 1 1 pars Acidi nitrici 25% cum 1,5 partibus Aquae misceatur. Q. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutiones D 1 et D 2 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis ve- neant.
Acidum oxalicum † Oxalii acidum	Acidum oxalicum cristallisatum. $\text{COOH} + 2 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 126,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Acidum phosphoricum Phosphori acidum	Pondus specificum 1,153—1,156 Continet fere 25% H_3PO_4 Pondus moleculare 98,06	Ad parationem dilutionis D1 1 pars Acidi phosphorici 25% cum 1,5 partibus Aquae misceatur. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Acidum picrinicum † Picronitri acidum	Trinitrophenolum, $C_6H_2(OH) \cdot (NO_2)_3$ (1, 2, 4, 6) Pondus moleculare 229,05	Ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$.
Acidum salicylicum Salicyli acidum	Acidum oxybenzoicum (-ortho) $C_6H_4(OH) \cdot COOH$ Pondus moleculare 138,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Acidum succinicum Succini acidum	$C_2H_4 \cdot (COOH)_2$ Pondus moleculare 118,07	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Acidum sulfuricum † Sulfuris acidum	Pondus specificum 1,836—1,841 Continet 94—98% H_2SO_4 Pondus moleculare 98,09	Ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 1 et D 2 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis ve- neant.
Acidum tannicum Tanni acidum	Continet Acidum tannicum, quod efficitur e plantarum variabilium cellulis	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Acidum tartaricum Tartari acidum	Acidum tartaricum cristallisatum. $C_2H_2(OH)_2 \cdot (COOH)_2$ Pondus moleculare 150,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Acidum telluricum † Telluri acidum	$H_2TeO_4 + 2 H_2O$ Pondus moleculare 229,55	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Aconitum †	Aconitum Napellus L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta tota agrestis recens col- lecta, cum florere inciperet. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aconitum Anthora †	Aconitum Anthora L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aconitum Cammarum †	Aconitum Cammarum L. Aconitum Stoerkianum Reichen- bach Fam. nat.: Ranunculaceae	Tubera recentia cum radicibus adhaerentibus. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aconitum ferox †	Aconitum ferox Wallroth Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Aconitum japonicum †	Aconitum japonicum Thunberg Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aconitum Lycoctonum †	Aconitum Lycoctonum L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens collecta, cum planta floresceret. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aconitum Napellus e ra- dice †	Aconitum Napellus L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Tubera recentia cum radicibus adhaerentibus. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Actaea	Actaea spicata Michaux Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma recens cum radicibus ad- haerentibus collectum mense Maio, antequam planta floruit. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Adiantum aureum	Polytrichum commune L. Fam. nat.: Polytrichaceae (Musci)	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Adiantum capillus Ve- neris	Adiantum capillus Veneris L. Fam. nat.: Polypodiaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Adonidinum ††	Glycosidum Adonidis vernalis L.	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Adonis aestivalis †	Adonis aestivalis L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Adonis vernalis †	Adonis vernalis L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aegopodium Podagraria	Aegopodium Podagraria L. Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aesculinum	Glycosidum e cortice Aesculi Hippocastani paratum	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Aesculus	Aesculus Hippocastanum L. Fam. nat.: Hippocastanaceae	Semina recentia cute nudata. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aesculus glabra	Aesculus glabra Willdenow Fam. nat.: Hippocastanaceae	Semina recentia cute nudata. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aesculus Hippocastanum e floribus	Aesculus Hippocastanum L. Fam. nat.: Hippocastanaceae	Flores recentes. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Aethiops antimonialis †	Mixtum compositum ex Anti- monio sulfurato nigro (Sb_2S_3), ex Hydrargyro sulfurato nigro (HgS), ex Hydrargyro subtiliter dispen- sato et e Sulfure	Aequae partes Hydrargyri sul- furati nigri et Stibii sulfurati nigri laevigati penitus triturentur. Ad triturationem sec. § 7
Aethiops mineralis †	Hydrargyrum sulfuratum nigrum, quod continet aliquid Hydrargyri subtiliter dispensati Sulfurisque	Aequae partes Hydrargyri de- purati et Sulfuris depurati medio- criter calefactae in mortario por- cellaneo triturentur, dum omnes mixturae partes colorem nigrum induerint atque Hydrargyri glo- buli lente optica non iam dignosci poterunt. Ad triturationem sec. § 7
Aethusa †	Aethusa Cynapium L. Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Agaricus †	Agaricus muscarius Persoon Fam. nat.: Agaricaceae	Pars superterrena fungi recentis. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Agaricus emeticus †	Russula emetica Fries Fam. nat.: Agaricaceae	Fungus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Agaricus phalloides †	Amanita phalloides Phoebe. Fam. nat.: Agaricaceae	Fungus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Agave americana	Agave americana L. Fam. nat.: Amaryllidaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Agnus castus	Vitex Agnus castus L. Fam. nat.: Verbenaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Agraphis nutans	Scilla nutans Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Agrostemma Githago †	Agrostemma Githago L. Fam. nat.: Caryophyllaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ailanthus glandulosa	Ailanthus glandulosa Desfontaines Fam. nat.: Simarubaceae	Germinum et florum et corticis recentis partes. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ajuga reptans	Ajuga reptans L. Fam. nat.: Labiatae	Tota planta recens, cum florere inciperet. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aletris farinosa	Aletris farinosa L. Fam. nat.: Liliaceae	Bulbus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Alisma Plantago	Alisma Plantago L. Fam. nat.: Alismataceae	Radix tuberosa recens. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Allium sativum	Allium sativum L. Fam. nat.: Liliaceae	Bulbi recentes, collecti mensibus Junio, Julio, Augusto. — Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Alnus serrulata sive rubra	Alnus serrulata Willdenow Fam. nat.: Betulaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aloe	Sucus ¹⁾ inspissatus expressus e variis Aloes generibus, quae inve- niuntur agrestia et culta in diver- sis regionibus Africae, praecipue in Kaplando, meridionali eius con- tinentis parte; imprimis sunt me- dicamentosae: Aloe ferox Miller, Aloe succotrina Lamarck et Aloe Marlothii, Berger Fam. nat.: Liliaceae	Ad triturationem sec. § 7 et ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Aloe socotrina	Aloe Perryi Baker Fam. nat.: Liliaceae	Sucus inspissatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Aloinum †	Substantia agens: $C_{20}H_{18}O_9 + 3 H_2O$ e Barbados Aloe et Curaçao Aloe parata. Pondus moleculare 456,17	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Alsine media	Stellaria media Villars Fam. nat.: Caryophyllaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Alstonia constricta	Alstonia constricta F. v. Müller Fam. nat.: Apocynaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Althaea	Althaea officinalis L. Fam. nat.: Malvaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Alumen	Alumen cristallisatum, Alumi- nium-Kalium sulfuricum, $KAl(SO_4)_2 + 12 H_2O$ Pondus moleculare 474,40	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 1 pars D 1, H ₂ O 7 partes, Spir. v. 90% 2 partes; ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Alumina	Alumina percandefacta, Al ₂ O ₃ Pondus moleculare 101,94	Ad triturationem sec. § 7

¹⁾ ‚Sucus‘ scripsimus, non ‚succus‘; item ‚baca‘, non ‚bacca‘, quod has formas pro
melioribus putandas esse constat.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Aluminium	Aluminium metallicum, Al Pondus atom. 26,97	Ad triturationem sec. § 7
Ambra	Substantia, quae secreta est ex intestinis Physeteris macroce- phali, quae Cetacea invenitur in Oceano Atlantico, Indico, Pacifico Fam. nat.: Physeteridae	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Ambrosia artemisiaefolia	Ambrosia artemisiaefolia Besser Fam. nat.: Compositae	Capitula florum recentia et ger- mina novella. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ammoniacum	Gummi resina ex Doremate Am- moniaci D. Don, Umbelliferae, quae invenitur in arenosis Persiae finitimisque regionibus	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Ammonium aceticum	$\text{CH}_3 \cdot \text{COONH}_4$ Pondus moleculare 77,06	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars ponderata Am- monii acetici, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Ammonium benzoicum	$\text{C}_6\text{H}_5 \cdot \text{COONH}_4$ Pondus moleculare 139,1	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars ponderata Am- monii benzoici, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Ammonium bromatum	Ammonium hydrobromicum cri- stallisatum, NH_4Br Pondus moleculare 97,96	Ad triturationem sec. § 7, sed quod diffuit a dilutione D 2 atque ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ammonium carbonicum	Compositum e $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{NH}_2\text{COONH}_4$ relatione vice variabili	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars ponderata Am- monii carbonici, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dilutiones semper recens parentur.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Ammonium causticum	Pondus specificum 0,960 in 15° continet 10% NH_3	Ammonium causticum est dilu- tio D 1. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dilutiones D 1 et D 2 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis vene- ant. Dilutiones semper recens pa- rentur. Ne veneat nisi liquidum.
Ammonium jodatum †	Ammonium hydrojodicum NH_4J Pondus moleculare 144,96	Ad triturationem sec. § 7, idque quod diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ammonium muriaticum	Ammonium hydrochloricum NH_4Cl Pondus moleculare 53,50	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Ammonii hydrochlorici, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Ammonium phosphori- cum	$(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ Pondus moleculare 132,13	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ammonium picrinicum †	$\text{C}_6\text{H}_2(\text{ONH}_4) \cdot (\text{NO}_2)_3$ Pondus moleculare 246,08	Ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ne veneat nisi liquidum.
Ammonium valerianicum	Compositum variabile est	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ammonium vanadinicum †	NH_4VO_3 Pondus moleculare 117,04	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Ampelopsis quinquefolia	Ampelopsis quinquefolia Michaux Fam. nat.: Vitaceae	Partes aequales germinum recen- tium et corticis. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Amygdalae amarae †	Amygdalus communis L. var. amara Hayne Fam. nat.: Rosaceae	Semina matura cute nudata. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Amygdalus Persica e cor- tice	Prunus Persica Siebold et Zuccarini Fam. nat.: Rosaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
<i>Amylium nitrosum</i> †	$C_6H_{11} \cdot ONO$ Pondus moleculare 117,096	Ad dilutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ne veneat nisi liquidum
<i>Amyris gileadensis</i>	Balsamum, effluens e trunco ramisque Balsamodendri gileadensis Kth. — Haec arbor, quae ex familia Burseracearum est, invenitur in Arabia, Syria, Aegypto, Abessinia	Ad triturationem sec. § 8 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
<i>Anacardium</i> †	Semecarpus Anacardium L. Fam. nat.: Anacardiaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
<i>Anacardium occidentale</i> †	Anacardium occidentale L. Fam. nat.: Anacardiaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
<i>Anagallis arvensis</i>	Anagallis arvensis L. Fam. nat.: Primulaceae	Planta recens florida. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
<i>Anagyris foetida</i>	Anagyris foetida L. Fam. nat.: Papilionaceae	Herba recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Anatherum muricatum</i>	Andropogon squarrosus L. Fam. nat.: Gramineae	Rhizoma siccatum cum radicibus adhaerentibus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
<i>Andira inermis</i>	Andira inermis H.B.K. Fam. nat.: Papilionaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
<i>Anemone nemorosa</i> †	Anemone nemorosa L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens collecta cum flos nondum apertus esset. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Angelica Archangelica</i>	Archangelica officinalis Hoffmann Fam. nat.: Umbelliferae	Radix siccata plantae agrestis. Ad tinct. sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Angelica atropurpurea	Angelica atropurpurea L. Fam. nat.: Umbelliferae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Angophora lanceolata	Angophora lanceolata Cavanilles Fam. nat.: Myrtaceae	Sucus inspissatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Angustura	Galipea officinalis Hancock Fam. nat.: Rutaceae	Cortex ramorum siccatus. Ad tinct. sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Angustura spuria †	Strychnos Nux vomica L. Fam. nat.: Loganiaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Anhalonium Lewinii †	Anhalonium Lewinii Hennings Fam. nat.: Cactaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Anilinum purum †	Amidobenzolum $C_6H_5 \cdot NH_2$ Pondus moleculare 93,064	Ad solutionem sec § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Anisum	Pimpinella Anisum L. Fam. nat.: Umbelliferae	Fructus maturi. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Anisum stellatum	Illicium verum Hooker Fam. nat.: Magnoliaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Antennaria margaritacea	Anaphalis margaritacea Bentham et Hooker Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Anthoxanthum odoratum	Anthoxanthum odoratum L. Fam. nat.: Gramineae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Anthracokali	Mixtura composita e Kalio cau- stico fuso et Carbone minerali	Ad triturationem sec. § 7
Antifebrinum †	Acetanilidum, $C_6H_5 \cdot NH \cdot CO \cdot CH_3$ Pondus moleculare 135,08	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Antimonium arsenico- sum ††	Compositum e partibus aequalibus $Sb_2O_5 + As_2O_3$	Ad triturationem sec. § 7.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Antimonium crudum	Antimonium sulfuratum nigrum, Sb_2S_3 Pondus moleculare 339,8 Reperitur in Hungaria	Ad triturationem sec. § 7 (Ad rationem subst. orig. 100 % continentis)
Antimonium sulfuratum aurantiacum	Antimonium sulfuratum rubrum, Sb_2S_5 Pondus moleculare 404,0	Ad triturationem sec. § 7 (Ad rationem subst. orig. 100 % continentis)
Antipyrinum †	Pyrazolonum phenyldimethyli- cum, $\text{C}_{11}\text{H}_{12}\text{N}_2\text{O}$ Pondus moleculare 188,12	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Aphis chenopodii glauci	Aphis chenopodii glauci Fam. nat.: Aphidinae	Insectum contritum ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Apiolum †	Camphora Petroselini $\text{C}_{15}\text{H}_{14}\text{O}_4$ Pondus moleculare 222,14	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Apis mellifica †	Apis mellifica Fam. nat.: Hymenopterae	Apes vivae illatae in ampullam quassando irritentur atque pon- dere duplici Spir. v. 60% addito necentur. Tum apes in mortario porcellaneo conterantur, et iterum 8 partibus Spir. v. 60% additis per 14 dies ter in die quassando seponantur. Tinctura sine com- pressionem filtretur. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Apisinum †	Venenum, quod invenitur in stimulo et in membrana venenum continente Apis mellificae, quae est in Europa, Asia, America sep- tentrionali atque media. Fam. nat.: Hymenopterae	Ad triturationem sec. § 8, sub- stantia ipsa ad D 2
Apium graveolens	Apium graveolens L. Fam. nat.: Umbelliferae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Apocynum †	Apocynum cannabinum L. Fam. nat.: Apocynaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Apocynum androsaemi- folium †	Apocynum androsaemifolium L. Fam. nat.: Apocynaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Apomorphinum hydro- chloricum †	$\text{C}_{17}\text{H}_{17}\text{O}_2\text{N} \cdot \text{HCl} + \frac{3}{4} \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 317,1	Ad triturationem sec. § 7. Tritu- rationes semper recens parentur.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Aqua silicata	Continet acidum silicicum-hydri- cum, recens praecipitatum, H_2SiO_3 Pondus moleculare 78,076	Gelatum madidum plane elutum diutius perquassetur in ampulla tantum Aquae destillatae conti- nente, ut una pars nondum so- luta sit, quo modo solutio saturata H_2SiO_3 in Aqua dest. exstabit.
Aquilegia	Aquilegia vulgaris L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aralia racemosa	Aralia racemosa L. Fam. nat.: Araliaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aranea avicularis †	Avicularia avicularia L. Fam. nat.: Avicularidae	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Aranea Diadema †	Araneus diadematus Cl. Fam. nat.: Argiopidae	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Araroba	Andira Araroba Aquiar Continet Chrysarobinum, $C_{15}H_{12}O_3$	Resina ligni ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Arbutinum	Glycosidum e foliis Arctostaphyli Uvae ursi Sprengel paratum, $C_{12}H_{16}O_7 + H_2O$ Pondus moleculare 272,13	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Arctium Lappa	Lappa minor DC., Lappa major Gaertn. et Lappa tomentosa Lam. Fam. nat.: Compositae	Radices recentes plantarum anni- cularum. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Argentum	Argentum metallic., Ag Pondus atom. 107,88	Ad triturationem sec. § 7
Argentum colloidal	Ag	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$ Dil. D 3—D 4 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutiones semper recentes pa- rentur
Argentum nitricum †	$AgNO_3$ Pondus moleculare 169,89	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 1—D 4 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutiones in lagoena epistomio vi- treo praeclusa veneant. Dilutiones et trit. semper recens parentur.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Aristolochia Clematitis	Aristolochia Clematitis L. Fam. nat.: Aristolochiaceae	Herba recens florida. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Aristolochia Milhomens	Aristolochia cymbifera Martius et Bentham Fam. nat.: Aristolochiaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Aristolochia rotunda	Aristolochia rotunda L. Fam. nat.: Aristolochiaceae	Rhizoma siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Armoracia	Cochlearia Armoracia L. Fam. nat.: Cruciferae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Arnica	Arnica montana L. Fam. nat.: Compositae	Rhizoma caute siccatum et pul- veratum cum radicibus. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Arnica ad usum exter- num	Arnica montana L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. 1 pars pon- derata massae contritae subigatur cum Spir. v. 90%, qui est duplici pondere suci, quem 1 pars massae continet, et cum Spir. v. 60%, qui est eodem pondere; deinde ad essentiam sec. § 3
Arsenicum album ††	Acidum arsenicosum anhydricum, Arsenicum trioxyd., As_2O_3 Pondus moleculare 197,92	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars ponderata Acidi arsenicosi coquendo c. 90 partibus Aquae solvatur; fil- tratum cum Aqua ad 90 partes ponderatas compleatur; deinde liquori refrigerato 10 partes pon- deratae Spir. v. 90% addantur. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Arsenum jodatum †† Arsenicum jodatum	Arsenum trijod., AsJ_3 Pondus moleculare 455,72	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$ Dilutiones D 1—D 3 et trit. D 1—D 2 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis veneant.
Arsenum metallicum ††	Arsenum griseum elementare, As Pondus atom. 74,96	Ad triturationem sec. § 7

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
<i>Artemisia vulgaris</i>	<i>Artemisia vulgaris</i> L. Fam. nat.: Compositae	Rhizoma recens mense Novembri effossum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Arum Dracontium</i> †	<i>Arisaema Dracontium</i> Schott Fam. nat.: Araceae	Rhizoma recens collectum, ante- quam planta floruit aut post- quam fructus maturuerunt. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Arum Dracunculus</i> †	<i>Dracunculus vulgaris</i> Schott Fam. nat.: Araceae	Rhizoma recens collectum, ante- quam folia se evolverunt. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Arum italicum</i> †	<i>Arum italicum</i> Mill. Fam. nat.: Araceae	Rhizoma recens collectum, ante- quam folia se evolverunt. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Arum maculatum</i> †	<i>Arum maculatum</i> L. Fam. nat.: Araceae	Rhizoma recens collectum, ante- quam folia se evolverunt. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Arum triphyllum</i> †	<i>Arisaema atrorubens</i> Aiton Fam. nat.: Araceae	Rhizoma recens collectum, ante- quam folia se evolverunt. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Arundo mauritanica</i>	<i>Arundo Pliniana</i> Turra Fam. nat.: Gramineae	Germina recentia rhizomatis. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
<i>Asa foetida</i>	Resina gummi, quod emanat e variis Umbelliferis e genere nat.: Ferulae. Praecipue <i>Ferula Nar- thex</i> Boissier et <i>Ferula Scorodosma</i> Bentham Hae inveniuntur in Persia et in Persiae regionibus vicinis.	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
<i>Asarum</i>	<i>Asarum europaeum</i> L. Fam. nat.: Aristolochiaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Asarum canadense</i>	<i>Asarum canadense</i> L. Fam. nat.: Aristolochiaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Asclepias curassavica</i> †	<i>Asclepias curassavica</i> L. Fam. nat.: Asclepiadaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
<i>Asclepias incarnata</i> †	<i>Asclepias incarnata</i> L. Fam. nat.: Asclepiadaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Asclepias syriaca</i> †	<i>Asclepias Cornuti</i> Decaisne Fam. nat.: Asclepiadaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Asclepias tuberosa</i> †	<i>Asclepias tuberosa</i> L. Fam. nat.: Asclepiadaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Asimina triloba</i>	<i>Asimina triloba</i> Dun. Fam. nat.: Anonaceae	Semina matura. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
<i>Asparagus officinalis</i>	<i>Asparagus officinalis</i> L. Fam. nat.: Liliaceae	Germina recentia. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
<i>Asperula odorata</i>	<i>Asperula odorata</i> L. Fam. nat.: Rubiaceae	Herba recens collecta, brevi ante- quam florere coepit. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Aspirinum</i>	Acidum acetylosalicylicum, $C_6H_4O \cdot CO \cdot CH_3 \cdot COOH$ Pondus moleculare 180,06	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
<i>Asterias rubens</i>	<i>Asteriacanthion rubens</i> L. Fam. nat.: Echinodermata	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
<i>Atropinum sulfuricum</i> ††	$(C_{17}H_{23}NO_3)_2 \cdot H_2SO_4 + H_2O$ Pondus moleculare 694,5	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
<i>Aurantii cortex</i>	<i>Citrus vulgaris</i> Risso Fam. nat.: Rutaceae	Cortex fructuum recens. Ad essen- tiam sec. § 3. — Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
<i>Auripigmentum</i> ††	Arsenum sulfuratum citrinum, As_2S_3 Pondus moleculare 246,13	Ad triturationem sec. § 7.
<i>Aurum</i>	Pulvis aureus metallicus, Au Pondus atom. 197,2	Ad triturationem sec. § 7

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Aurum chloratum † Aurum muriaticum	Aurum chloratum flavum, Aurum chloratum-acidum hydro- genii chloratum, $\text{HAuCl}_4 + 4\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 412,1	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 1—D 4 cum Aqua, ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dilutiones priores in lagoenis epis- tomio vitreo praeclusis veneant.
Aurum-Natrium chlora- tum † Aurum muriaticum natronatum	$\text{NaAuCl}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 398,07	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 5a. Dilutiones D 1—D 4 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutiones priores in lagoenis epistomio praeclusis veneant.
Aurum colloidalē	Au	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 1—D 4 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutiones semper recens parentur.
Avena sativa	Avena sativa L. Fam. nat.: Gramineae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Azadirachta indica	Melia Azadirachta L. Fam. nat.: Meliaceae	Cortex interior recens. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Badiaga	Spongilla fluviatilis Fam. nat.: Spongillidae (Coelen- terata)	Ad tincturam sec. § 4c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ballota lanata	Leonurus lanatus Sprengel Fam. nat.: Labiatae	Herba siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Balsamum Copaivae	Balsamum, effluens e truncis vari- orum generum Copaiferae: Copai- fera Jacquinii Desfontaines, Co- paifera Langsdorfii Desfontaines, Copaifera guyanensis Desfontai- nes et Copaifera coriacea Martius, postquam cortex truncorum vel terebrata vel incisa est. Fam. nat.: Caesalpinaceae	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Balsamum peruvianum	Balsamum e cortice truncorum inciso et caute candefacto, quod praebeat Myroxylon balsamum (L) Harms, var. Pereirae (Royle) Baillon. Fam. nat.: Papilionaceae	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Baptisia †	Baptisia tinctoria, Richard Brown Fam. nat.: Papilionaceae	Rhizoma recens cum cortice. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Baryum aceticum † Baryta acetica	$\text{Ba}(\text{C}_2\text{H}_3\text{O}_2)_2 + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 273,43	Ad triturationem sec. § 7. Tritu- rationes semper recens parentur. Dilutiones priores liquidae, cum facile dilabantur.
Baryum carbonicum † Baryta carbonica	BaCO_3 Pondus moleculare 197,37	Ad triturationem sec. § 7
Baryum chloratum † Baryta muriatica	$\text{BaCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 244,35	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 1—D 3 c. Aqua, ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Baryum jodatum † Baryta jodata	$\text{BaJ}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 427,27	Ad triturationem sec. 7, idque quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 1—D 3 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis ser- ventur
Basilicum	Ocimum Basilicum L. Fam. nat.: Labiatae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Belladonna †	Atropa Belladonna L. Fam. nat.: Solanaceae	Planta recens collecta, cum florere inciperet. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Belladonna e fructibus immaturis †	Atropa Belladonna L. Fam. nat.: Solanaceae	* Bacae immaturae. Ad essent. sec. § 1 Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Belladonna e fructibus maturis †	Atropa Belladonna L. Fam. nat.: Solanaceae	Bacae maturae. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Belladonna e radice †	Atropa Belladonna L. Fam. nat.: Solanaceae	Radix recens autumnno collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Belladonna e seminibus †	Atropa Belladonna L. Fam. nat. Solanaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Bellis perennis	Bellis perennis L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Benzoës resina	Resina quam praebent <i>Styrax tonkinense</i> Craib et <i>Styrax benzoides</i> Craib, quae <i>Styracaceae</i> arboreae praecipue in terra Siamensi, praeterea in insulis Java, Borneo, Sumatra nascuntur	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Berberinum	Berberinum, e cortice radices <i>Berberidis vulgaris</i> vel e rhizomate <i>Hydrastis canad.</i> paratum, quod est compositum: $C_{20}H_{19}NO_4OH$ (Compositio Gadameri), Derivatium Isochinolini Pondus moleculare 353,16	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Berberis	<i>Berberis vulgaris</i> L. Fam. nat.: Berberidaceae	Cortex radices siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Berberis Aquifolium	<i>Mahonia Aquifolium</i> Nuttall Fam. nat.: Berberidaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Betonica	<i>Stachys Betonica</i> Benthām Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Betula alba	<i>Betula verrucosa</i> Ehrhart Fam. nat.: Betulaceae	Sucus vere collectus cortice novellarum validarumque betularum terebrato. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Bignonia Catalpa	<i>Catalpa bignonioides</i> Walther Fam. nat.: Bignoniaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Bismutum colloidalē	Bi	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. semper recens parentur. Dil. D 3 et D 4 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Bismutum metallicum	Bi Pondus atom. 209,0	Ad triturationem sec. § 7
Bismutum subnitricum	Bismutum subnitricum fere compositum: $BiONO_3 + H_2O$	Ad triturationem sec. § 7
Blatta americana	<i>Periplaneta americana</i> L. Fam. nat.: Blattidae	Animal vivum contritum ad tinct. sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Blatta orientalis	Blatta orientalis L. Fam. nat.: Blattidae	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Boldo	Peumus Boldus Molina Fam. nat.: Monimiaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Boletus laricis †	Polyporus officinalis Fries Fam. nat.: Polyporaceae	Fungus siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%, Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Boletus satanas †	Boletus satanas Lenz Fam. nat.: Polyporaceae	Fungus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Boletus suaveolens	Polyporus suaveolens Schumacher Fam. nat.: Polyporaceae	Fungus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Bombyx chrysorrhoea	Euproctis chrysorrhoea L. Fam. nat.: Lepidoptera	Eruca viva contrita. Ad tinctu- ram sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Bombyx Mori	Squamae alarum Bombycis Mori L. Fam. nat.: Lepidoptera	Mense Augusto papiliones bom- bycis ova gignunt; quae ut colli- gantur, papiliones a conservato- ribus in receptacula lignea con- feruntur. In his receptaculis alis continuo agitatis pulvis subfla- vus secernitur, qui colligatur. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Borax	$\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7 + 10 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 381,44	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Boracis, 89 partes Aquae, 10 p. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Borrigo officinalis	Borrigo officinalis L. Fam. nat.: Borriginaceae	Folia recentia. — Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Bounafa	Ferula glauca L. Fam. nat.: Umbelliferae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Bovista	Lycoperdon Bovista Persoon Fam. nat.: Lycoperdaceae	Sporae fungi maturi. — Ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Brachyglottis repens	Brachyglottis repens Forskål Fam. nat.: Compositae	Folia floresque recentes. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Brassica oleracea	Brassica oleracea L. Fam. nat.: Cruciferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Bromoformium †	Tribrommethanum, CHBr_3 Pondus moleculare 252,768	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ne veneat nisi liquidum
Bromum †	Bromum, Br Pondus atom. 79,92	1,2 g (= 0,4 ccm) Bromi in 100 g Aquae solvantur. Huius solu- tionis 20 g c. 1 g Kalii jodati mis- ceantur Jodumque expulsum ad- hibito Liquore Natrii thiosul- furici volumetrico $\frac{1}{10}$ normal et Solutione Amyli pro indicatore exploretur. Quo facto tanta quan- titate Aquae affusa diluatur, at 10 partibus solutionis 1 pars Bromi contineatur (1 ccm Liqu. Natr. thios. vol. = 0,007992 Brom.). Hac solutione dilutio D 2 efficitur. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 et D 4 cum Aqua, ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dil. D 2 et D 3 in lagoenis episto- mio vitreo praeclusis veneant. Ne veneat nisi liquidum.
Brucinum nitricum ††	Alcaloideum paratum e semine Strychni nucis vomicae, $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{O}_4 + 4 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 466,324 Brucinnitrat: $\text{C}_{25}\text{H}_{26}\text{N}_2\text{B}_4 \cdot \text{HNO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 493,308	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Bryonia †	Bryonia alba L. et dioica Jacquin Fam. nat.: Cucurbitaceae	Rhizoma recens crassum rapaeque simile effossum, antequam planta florere coepit. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Bucco	Barosma betulinum Bartling, Ba- rosma crenulatum Kunze Fam. nat.: Rutaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Bufo †	Bufo vulgaris Laurier Fam. nat.: Amphibiae Venenum effusum e glandulis sub- cutaneis bufonis, qui invenitur in Europa, Asia septentrionali, Japona	Animal vivum in tabulam corti- ceam impositum 4 acubus amplis membranam pedum natatorio- rum perfodientibus affigatur. Quo facto ubi polis inductoris lente tergum animalis perstrinxer- is, statim venenum ex glandulis tergi expelletur. Venenum cultello corneo destric- tum sec. § 8 conteratur.
Buxus sempervirens †	Buxus sempervirens L. Fam. nat.: Buxaceae	Germina novella recentia cum foliis. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cactus	Cereus grandiflorus Miller Fam. nat.: Cactaceae	Caules et flores recentes mense Julio collecti. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cadmium sulfuricum †	$3 \text{ CdSO}_4 + 8 \text{ H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 769,6	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et D 3 c. Aqua, ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Cainca	Chiococca racemosa L. Chiococca densifolia Mart. Chiococca anguifuga Mart. Fam. nat.: Rubiaceae	Cortex radices siccatus. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Calabar †	Physostigma venenosum Balfour Fam. nat.: Papilionaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Caladium Seguinum †	Dieffenbachia Seguine Schott Fam. nat.: Araceae	Rhizoma recens, caules, folia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Calamus aromaticus	Acorus Calamus L. Fam. nat.: Araceae	Rhizoma delibratum siccatum. Ad tinct. sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Calcium aceticum Calcareo acetica	$\text{Ca}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 176,13	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Calcium aceticum solu- tum Hahnemanni Calcarea acetica soluta Hahnemanni		In patina porcellanica Acidum aceticum dilutum niveis interio- ribus partibus testarum ostre- ariarum ad subtilem pulverem redactis saturetur et liquor ad Acidum carbonicum plane ex- pellendum calefiat. Refrigeratus, ubi aqua infundenda pondus spec. 1,1 effectum erit, filtretur. Ad triturationem sec. § 7.
Calcium arsenicosum †† Calcarea arsenicosa	$\text{Ca}_3(\text{AsO}_3)_2$ Pondus moleculare 366,1	
Calcium bromatum Calcarea bromata	$\text{CaBr}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 308,0	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Calcium carbonicum Calcarea carbonica Hahnemanni	Partes interiores niveae erutae ex testis Ostreae edulis Fam. nat.: Acephala	Ad triturationem sec. § 7
Calcium causticum Se- gini Calcarea caustica Segini	Calcium oxydatum hydricum, $\text{Ca}(\text{OH})_2$ Pondus moleculare 74,09	1 pars ponderata Calcii oxydati (CaO) 5 partibus ponderatis Aquae destillatae in vitro antea calefacto superfusis epistomio bene claudatur et usque ad refri- gerationem seponatur. Tum cal- caria in subtilem pulverem di- lapsa bene conquassetur et 5 partes ponderatae Spiritus vini acris addantur. Nonnullis diebus post, quibus mixtura saepe con- quassanda est, liquor limpidus in parvas lagoonas infusus ita serve- tur, ut aer prohibeatur. Haec est dil. D 4. Qu. m. m. $\frac{1}{10000}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Calcium chloratum Calcarea muriatica	Calcium chloratum crystallisatum $\text{CaCl}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 219,09	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Calcium fluoratum Calcarea fluorica	Calcium fluoratum crystallisatum naturale, Fluoritum, CaF_2 Pondus moleculare 78,07	Ad triturationem sec. § 7
Calcium hypophosphoro- sum Calcarea hypophospho- rosa	$\text{Ca}(\text{H}_2\text{PO}_2)_2$ Pondus moleculare 170,18	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Calcium jodatum † Calcareia jodata	$\text{CaJ}_2 + 8 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 438,04	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Calcium phosphoricum Calcareia phosphorica	Calcium phosphoricum praecipita- tum, praecipue compositum: $\text{CaHPO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 172,15	Ad triturationem sec. § 7
Calcium sulfuricum Calcareia sulfurica	Calcium sulfuricum praecipita- tum, $\text{CaSO}_4 + 2 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 172,17	Ad triturationem sec. § 7
Calendula	Calendula officinalis L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Calla aethiopica †	Zantedeschia aethiopica Sprengel Fam. nat.: Araceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Caltha palustris	Caltha palustris L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Camphora	Camphora e ligno Cinnamomi Camphorae L. sublimatione com- parata et purgata, $\text{C}_{10}\text{H}_{16}\text{O}$ Pondus moleculare 152,13 Fam. nat.: Lauraceae	Ad triturationem sec. § 7 et ad solution. sec. § 6a c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Camphora monobromata	$\text{C}_{10}\text{H}_{15}\text{BrO}$ Pondus moleculare 231,04	Ad triturationem sec. § 7 et ad solution. sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cancer fluviatilis	Potamobius Astacus L. Fam. nat.: Astacidae, Decapoda	Cancer recens vivus contundatur, 2 partibus ponderatis Spir. v. per- fundatur, per 8 dies cotidie bis quassando maceretur. Quo facto tinctura superior pellucida filtrata sec. § 3 diluatur. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Canchalagua	Erythraea chilensis Persoon Fam. nat.: Gentianaceae	Herba siccata collecta, cum flore- ret. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Canna glauca	Canna glauca L. Fam. nat.: Cannaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Cannabis	<i>Cannabis sativa</i> L. Fam. nat.: Moraceae	Summae partes cauliculorum re- centes cum floribus foliisque plan- tarum et marium et feminarum. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cannabis indica †	<i>Cannabis sativa</i> L. var. <i>indica</i> Fam. nat.: Moraceae	Summae partes herbae planta- rum feminarum siccatae, quae 'Haschisch' vocantur. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Cantharis †	<i>Lytta vesicatoria</i> L. Fam. nat.: Meloidae (Coleoptera)	Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Capsicum	<i>Capsicum annuum</i> L. Fam. nat.: Solanaceae	Fructus maturi siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Carbo animalis	Carbo e corio taurino paratus per- candefactus	Ad triturationem sec. § 7
Carbo vegetabilis	Carbo e ligno fagi silvaticae vel betulae paratus satis candefactus	Ad triturationem sec. § 7
Carboneum sulfuratum †	CS ₂ Pondus moleculare 76,14	Ad solutionem sec. § 6a cum Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ne veneat nisi liquidum
Carduus benedictus	<i>Cnicus benedictus</i> Gaertner Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Carduus marianus	<i>Silybum marianum</i> Gaertner Fam. nat.: Compositae	Semina siccata matura. Ad tinc- turam parandam 1 pars ponderata seminum maturorum non contu- sorum 1 parte ponderata Aquae et 1 parte ponderata Spir. v. 90% perfundatur, deinde per 8 dies macerata defundatur et filtratur. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$. Dilutiones c. Spir. v. 45% pa- rentur.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Carica Papaya	Carica Papaya L. Fam. nat.: Caricaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Carya alba	Carya alba Nuttall Fam. nat.: Juglandaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cascara amarga	Picramnia antidesma Swartz Fam. nat.: Simarubaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cascara sagrada	Rhamnus Purshiana DC. Fam. nat.: Rhamnaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cascarilla	Croton Eluteria Bennett Fam. nat.: Euphorbiaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Castanea vesca	Castanea vesca Gaertner Fam. nat.: Cupuliferae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Castor equi	Tuber pullus siccatus, qui est in parte interiore pedum equi (Equus caballus. Fam. nat.: Perissodactyla). Medium inter articulum et tibiam facillimeque resolvi potest	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Castoreum sibiricum	Secretum, quod invenitur in glandulis abdominalibus, quae dicuntur bursae castoreae, casto- ris maris feminaeque. (Castor fiber L. Fam. nat.: Glires) Homoeopathia non adhibet Ca- storeum nisi Castoris sibirici	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Catechu	Acacia Catechu Willdenow et Acacia Suma Kurz Fam. nat.: Mimosaceae	Extractum ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Caulophyllum thalictroi- des	Leontice thalictroides L. Fam. nat.: Berberidaceae	Rhizoma recens cum radicibus adhaerentibus. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Causticum Hahnemanni	Aliquid calcariae recens ustae per sexagesimam horae partem in Aquam destillatam, deinde in patellam siccam imponatur, ubi in pulverem redigatur. 4 partes huius pulveris cum 4 partibus Kalii sulfurici antea liquefacti, postea refrigerati, deinde in pulverem redacti, et in 4 partibus Aquae ferventis soluti, in patina porcellanica calefacta misceantur et ita agitentur, ut massa spissa evadat. Haec mixtura in retorta apta paulatim tamdiu destilletur, dum sicca erit. Hoc modo efficiuntur tres fere partes ponderatae. Destillatum cum totidem partibus ponderatis Spiritus vini 90% mixtum filtretur	Diluatur sec. § 1 c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Ceanothus americanus	Ceanothus americanus L. Fam. nat.: Rhamnaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cedron †	Simaba Cedron Planchon Fam. nat.: Simarubaceae	Semina matura siccata. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Cepa	Allium Cepa L. Fam. nat.: Liliaceae	Bulbus ovalis, qui efficitur ex follorum vaginis et ex orbiculato trunco brevi. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cerasus virginiana	Prunus virginiana L. Fam. nat.: Rosaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cerata		Cerata plerumque ex substantiis tincturisque originalibus vel triturationibus ita parantur, ut ad 1 partem addantur 9 partes Olei Arachidis ad 7 partes ponderatas cum 3 partibus Cerae flavae. Oleum Arachidis et Ceram flavam secundum praecepta in Pharmacopoea Germanica data paratam esse oportet.
Cereus Bonplandii	Cereus Bonplandii Parm. Fam. nat.: Cactaceae	Caules floresque recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Cereus serpentinus	Cereus serpentinus DC. Fam. nat.: Cactaceae	Caules recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cerium oxalicum †	$\text{Ce}_2(\text{C}_2\text{O}_4)_3 + 9 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 706,55	Ad triturationem sec. § 7
Cetonia aurata	Cetonia aurata L. Fam. nat.: Scarabaeidae (Coleoptera)	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cetraria islandica	Cetraria islandica Ach. Fam. nat.: Parmeliaceae	Lichen siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Chaerophyllum †	Chaerophyllum temulum L. Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Chamaedrys	Teucrium Chamaedrys L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chamomilla	Matricaria Chamomilla L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida collecta, cum floreret. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chamomilla romana	Anthemis nobilis L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens collecta, cum flo- rere inciperet. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cheiranthus Cheiri	Cheiranthus Cheiri L. Fam. nat.: Cruciferae	Planta recens collecta, antequam floruit. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chelidonium †	Chelidonium majus L. Fam. nat.: Papaveraceae	Radix recens collecta, antequam planta floruit. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chelone glabra	Chelone glabra L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chenopodium ambrosioi- des	Chenopodium ambrosioides L. Fam. nat.: Chenopodiaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chenopodium anthelmin- thicum	Chenopodium ambrosioides L. var. anthelminthicum L. Fam. nat.: Chenopodiaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chenopodium Botrys	Chenopodium Botrys L. Fam. nat.: Chenopodiaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Chenopodium olidum	Chenopodium Vulvaria L. Fam. nat.: Chenopodiaceae	Planta tota recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Chimaphila umbellata	Chimaphila umbellata Nuttall Fam. nat.: Pteridaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
China	Cinchona succirubra Pavon Fam. nat.: Rubiaceae	Cortex siccatus ramorum no- vellorum vel vetustiorum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
China fusca	Cinchona micrantha Ruiz et Pa- von Fam. nat.: Rubiaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Chininum arsenicum ††	$2 (C_{20}H_{24}N_2O_2)_3AsO_4 + 8 H_2O$ Pondus moleculare 934,5	Ad triturationem sec. § 7.
Chininum arsenicosum ††	$3 (C_{20}H_{24}N_2O_2)_3AsO_3 + 4 H_2O$ Pondus moleculare 1170,7	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Chininum muriaticum	$C_{20}H_{24}N_2O_2, HCl + 2 H_2O$ Pondus moleculare 396,7.	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Chininum purum	Alcaloideum e cortice Chinae pa- ratum Pondus moleculare 378,25	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Chininum salicylicum	$C_{20}H_{24}N_2O_2, C_7H_6O_3 + H_2O$ Pondus moleculare 342,224	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Chininum sulfuricum	Chininum sulfuricum neutrale, $(C_{20}H_{24}N_2O_2)_2, H_2SO_4 + 8 H_2O$ Pondus moleculare 890,6	Ad triturationem sec. § 7. et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Chinoidinum	Mixtum compositum ex amorphis Alcaloideis corticis Chinae	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Chinolinum tartaricum	$(C_9H_7N)_3, (C_4H_6O_6)_4$ Pondus moleculare 709,27	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Chionanthus virginica	Chionanthus virginica L. Fam. nat.: Oleaceae	Radice cortex recens. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Chirata indica	Swertia Chirata Buchenau-Ham. Fam. nat.: Gentianaceae	Herba siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Chloralum hydratum †	2-Trichloroethandiolum, $\text{CCl}_3\text{CH}(\text{OH})_2$ Pondus moleculare 165,40	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Chloroformium †	Trichlormethanum, CHCl_3 Pondus moleculare 119,39	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ne veneat nisi liquidum.
Chlorum †	Cl, solutum in Aqua dest. Pondus atom. 70,92	Dilutio D 3 efficitur 25 partibus Aquae chloratae et 75 partibus Aquae destillatae mixtis. Dil. D 4 et D 5 c. Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutiones semper recens parentur Dil. D 3 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis veneat. Ne veneat nisi liquidum.
Cholesterinum	Sterinum, $\text{C}_{27}\text{H}_{45}\text{OH} + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 304,38	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 99%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Chromium oxydatum †	Cr_2O_3 Pondus moleculare 152,02	Ad triturationem sec. § 7
Cichorium	Cichorium Intybus L. Fam. nat.: Compositae	Radix recens. Ad essentiam sec. § 3 Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cicuta virosa †	Cicuta virosa L. Fam. nat.: Umbelliferae	Rhizoma recens cum radicibus ad- haerentibus, antequam floruit, collectum. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cimex lectularius	Cimex lectularius L. Fam. nat.: Cimicidae (Hemipteroidea)	Animal vivum contritum. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cimicifuga †	Cimicifuga racemosa (L.) Nuttall Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma recens cum radicibus ad- haerentibus. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Cina	Artemisia Cina Berg Fam. nat.: Compositae	Capitula florum siccata brevi, antequam floruerunt, collecta. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Cinchoninum	Chinchoninum sulfuricum (C ₁₉ H ₂₂ N ₂ O) ₂ , H ₂ SO ₄ + 2 H ₂ O Pondus moleculare 722,5	Ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90% et ad trit. sec. § 7 Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Cineraria maritima	Cineraria maritima L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens, antequam floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cinnabaris	Hydrargyrum sulfuratum rubrum, HgS Pondus moleculare 232,7	Ad triturationem sec. § 7
Cinnamomum	Cinnamomum ceylanicum Nees Fam. nat.: Lauraceae	Cortex interior siccatus. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cistus canadensis	Helianthemum canadense Micheli Fam. nat.: Cistaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Citrus vulgaris	Citrus medica L. Fam. nat.: Rutaceae	Putamen recens fructuum matu- rorum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Clematis †	Clematis recta L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens, cum planta florere inciperet. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Clematis Vitalba †	Clematis Vitalba L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cobaltum metallicum	Co Pondus atom. 58,97	Ad triturationem sec. § 7
Coca †	Erythroxylon Coca Lamarck Fam. nat.: Erythroxylaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cocainum hydrochlori- cum †	C ₁₇ H ₂₁ NO ₄ , HCl = HCl · N(CH ₃)C ₇ H ₁₀ $\begin{matrix} \text{O} \cdot \text{CO} \cdot \text{C}_6\text{H}_5 \\ \text{CO} \cdot \text{OCH}_3 \end{matrix}$ Pondus moleculare 339,6	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Coccinella septempuncta	Coccinella septempunctata L. Fam. nat.: Coleoptera	Animalia mense Julio collecta viva contrita ad tincturam mace- ratione c. Spir. v. 90% parandam, sed 1:100. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Cocculus †	Anamirta Cocculus Wight et Arnolt Fam. nat.: Menispermaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Coccus cacti	Dactylopius coccus Costa Fam. nat.: Hemiptera	Animalia feminina siccata. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cochlearia officinalis	Cochlearia officinalis L. Fam. nat.: Cruciferae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Codeinum †	Codeinum = Opii Alcaloideum, $C_{18}H_{21}NO_3 + H_2O$ Pondus moleculare 317,19	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Codeinum muriaticum †	Codeinum hydrochloricum $C_{18}H_{21}NO_3HCl + 2 H_2O$ Pondus moleculare 371,68	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Codeinum phosphoricum †	$C_{18}H_{21}NO_3, H_3PO_4 + 2 H_2O =$ $C_{17}H_{17}NO(OH)(OHC_3), H_3PO_4$ $+ 1\frac{1}{2} H_2O$ Pondus moleculare 433,3	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45% parentur.
Coffea	Coffea arabica L. Fam. nat.: Rubiaceae	Semina siccata non tosta. Ad tincturam c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Coffeinum †	(Trimethylxanthinum) Coffeinum $C_8H_{10}N_4O_2 + H_2O$ vel $CH_3 \cdot N \cdot CO$ $\begin{array}{c} OC \cdot C \cdot N \cdot CH_3 + H_2O. \\ \quad \quad \quad \parallel \\ CH_3N \quad C \cdot N \quad CH. \end{array}$ 1-3-7 Trimethylum-2-6-Dioxy- purinum Pondus moleculare 212,1	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Colchicinum ††	$C_{22}H_{25}NO_6 + \frac{1}{2}CHCl_3$, e semini- bus maturis Colchici autumnalis L. Fam. nat.: Liliaceae Pondus moleculare 458,9	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Colchicum †	Colchicum autumnale L. Fam. nat.: Liliaceae	Bulbi recentes vere collecti. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Colchicum e seminibus †	Colchicum autumnale L. Fam. nat.: Liliaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Collinsonia canadensis	Collinsonia canadensis L. Fam. nat.: Labiatae	Rhizoma recens vere collectum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Colocynthinum ††	Glycosidum paratum e fructibus Citrulli Colocynthis Schr. Fam. nat.: Cucurbitaceae $C_{56}H_{84}O_{23}$ Pondus moleculare 1124,67	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Colocynthis †	Citrullus Colocynthis Schrad. Fam. nat.: Cucurbitaceae	Fructus putamine et granis nu- dati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Columbo	Jatrorrhiza palmata Miers Fam. nat.: Menispermaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Comocladia dentata	Comocladia dentata Jacquin Fam. nat.: Anacardiaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Condurango	Marsdenia Condurango Reichen- bach fil. Fam. nat.: Asclepiadaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Coniinum ††	Alcaloideum e Conio maculato L. paratum. α -Propylpiperidinum, $C_8H_{17}N$ Pondus moleculare 127,18	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Coniinum hydrochlori- cum †† Coniinum muriaticum	$C_8H_{17}N \cdot HCl$ Pondus moleculare 163,65	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Conium †	Conium maculatum L. Fam. nat.: Umbelliferae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Convallaria majalis †	Convallaria majalis L. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Convolvulus arvensis	Convolvulus arvensis L. Fam. nat.: Convolvulaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Convolvulus duartinus	Ipomoea bona nox L. Fam. nat.: Convolvulaceae	Flores recentes. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Coriaria myrtifolia †	Coriaria myrtifolia L. Fam. nat.: Coriariaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Coriaria ruscifolia †	Coriaria ruscifolia L. Fam. nat.: Coriariaceae	Bacae siccatae. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cornus alternifolia	Cornus alternifolia L. Fam. nat.: Cornaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cornus circinata	Cornus circinata L'Héritier Fam. nat.: Cornaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cornus florida	Cornus florida L. Fam. nat.: Cornaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cornus sericea	Cornus sericea L'Héritier Fam. nat.: Cornaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Corydalis formosa	Dicentra canadensis Wahlb. Fam. nat.: Fumariaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Costus dulcis	Canella alba Murray Fam. nat.: Canellaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Coto	Cortex mercabilis Coto Planta originalis ignota est	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cotoinum verum †	Corticis Coto substantia agens $C_{14}H_{12}O_4$ Pondus moleculare 244,1	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cotyledon Umbilicus	Umbilicus pendulinus DC. Fam. nat.: Crassulaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Crabro vespa †	Vespa crabro L. et Vespa vul- garis L. Fam. nat.: Vespidae (Hymenoptera)	Animalia viva contrita. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Crataegus	Crataegus Oxyacantha L. Fam. nat.: Rosaceae	Fructus maturi recentes. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Crocus	Crocus sativus L. Fam. nat.: Iridaceae	Stigmata siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Crotalus ††	Venenum, quod inest in maxillae superioris glandulis Crotali durissi L., qui est in America septen- trionali. Fam. nat.: Crotalinae (Ophidia)	Ad triturationem sec. § 8.
Crotalus Cacsavella ††	Venenum, quod inest in maxillae glandulis Crotali horridi Daud, qui est in America meridionali. Fam. nat.: Crotalinae (Ophidia)	Ad triturationem sec. § 8.
Croton Tiglium †	Croton Tiglium L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Cubeba	Piper Cubeba L. Fam. nat.: Piperaceae	Fructus immaturi siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cucurbita Pepo	Cucurbita Pepo L. Fam. nat.: Cucurbitaceae	Semina recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cumarinum	$C_6H_4 \begin{pmatrix} O - CO \\ CH = CH \end{pmatrix}$ Pondus moleculare 146,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cuphea viscosissima	Cuphea viscosissima Jacquin Fam. nat.: Lythraceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cupressus sempervirens	Cupressus sempervirens L. Fam. nat.: Coniferae	Fructus et folia recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cuprum	Cuprum metallicum, Cu Pondus atom. 63,57	Ad triturationem sec. § 7
Cuprum aceticum †	Cuprum aceticum neutrale, $Cu(C_2H_3O_2)_2 + H_2O$. Pondus moleculare 199,68	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Cuprum arsenicosum ††	Cuprum arsenicosum praecipita- tum, CuHAsO_3 Pondus moleculare 187,48	Ad triturationem sec. § 7.
Cuprum carbonicum †	Cuprum carbonicum, $\text{CuCO}_3 \cdot \text{Cu}$ (OH) ₂ Pondus moleculare 221,15	Ad triturationem sec. § 7.
Cuprum sulfuricum †	Cuprum sulfuricum, $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 249,72	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Curare ††	Curare, qui est sucus inspissatus e cortice variorum generum Strychni effectus, quo veneno Indiani sagittas inficiunt	Ad triturationem sec. § 7. Ne veneatur nisi tritutum, cum dilu- tiones brevi tempore vim amit- tere dicantur.
Cuscuta europaea	Cuscuta europaea L. Fam. nat.: Convolvulaceae	Planta recens florida: Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cyclamen †	Cyclamen europaeum L. Fam. nat.: Primulaceae	Rhizoma recens bulbosum au- tumno cum radicibus adhaeren- tibus collectum. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cynara Scolymus	Cynara Scolymus L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cynoglossum	Cynoglossum officinale L. Fam. nat.: Boraginaceae	Radix recens autumnio collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Cynosbatus	Tumores qui in Rosae caninae ramis punctionibus Rhoditae ro- sae efficiuntur	Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cyprinus barbus	Barbus fluviatilis Agassiz Fam. nat.: Cyprinidae	Ova mense Maio collecta. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Cypripedium pubescens	Cypripedium pubescens Richard Brown Fam. nat.: Orchidaceae	Rhizoma recens autumnio collec- tum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Cytisus Laburnum †	Cytisus Laburnum L. Fam. nat.: Papilionaceae	Folia floresque recentes aequis portionibus. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Damiana	Turnera aphrodisiaca Ward Fam. nat.: Turneraceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Daphne indica †	Daphne indica L. Fam. nat.: Thymelaeaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Daphne Laureola †	Daphne Laureola L. Fam. nat.: Thymelaeaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Datura arborea †	Datura arborea L. Fam. nat.: Solanaceae	Flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Datura Metel †	Datura Metel L. Fam. nat.: Solanaceae	Semina siccata. Tinctura sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Delphinium Consolida	Delphinium Consolida L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Dictamnus albus	Dictamnus albus L. Fam. nat.: Rutaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Dictamnus albus e radice	Dictamnus albus L. Fam. nat.: Rutaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Digitalinum ††	Digitalinum cristallisatum Glykosidum paratum e herba Digitalis purpureae	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Digitalis †	Digitalis purpurea L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Folia recentia collecta, antequam planta floruit. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Digitalis lutea †	Digitalis lutea L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Digitoxinum ††	Digitoxinum cristallisatum, C ₃₄ H ₅₄ O ₁₁ (sec. Kiliani) oder C ₄₄ H ₇₀ O ₁₄ (Cloetta)	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Dinitrobenzolum (Meta-) †	C ₆ H ₄ (NO ₂) ₂ (1, 3) Pondus moleculare 168,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Dioscorea villosa †	Dioscorea villosa L. Fam. nat.: Dioscoreaceae	Rhizoma recens mense Septembri collectum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Diosma foetida	Diosma foetidissima Sprengel Fam. nat.: Rutaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Dipsacus silvestris	Dipsacus silvestris Miller Fam. nat.: Dipsacaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Dirca palustris	Dirca palustris L. Fam. nat.: Thymelaeaceae	Cortex ramorum interior recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Dolichos pruriens †	Dolichos pruriens L. Fam. nat.: Papilionaceae	Pili folliculorum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Doryphora decemlineata	Doryphora (Leptinotarsa) decem- lineata Say. Fam. nat.: Chrysomelidae (Coleoptera)	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Dracontium foetidum	Symplocarpus foetidus Nuttall Fam. nat.: Araceae	Planta recens, cum florere in- ciperet, collecta. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Drosera	Drosera rotundifolia L. Fam. nat.: Droseraceae	Tota planta recens, cum florere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Duboisia †	Duboisia myoporoides Richard Brown Fam. nat.: Solanaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Duboisinum ††	Alcaloideum e foliis Duboisiae myoporoidis Richard Brown, $C_{17}H_{23}NO_3$ Pondus moleculare 289,19	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Dulcamara †	Solanum Dulcamara L. Fam. nat.: Solanaceae	Germina recentia cum foliis col- lecta, antequam planta floruit. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Dulongia acuminata	Phyllonoma ruscifolia Willdenow Fam. nat.: Saxifragaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Echinacea angustifolia	Echinacea angustifolia DC. Fam. nat.: Compositae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Elaeagnus	Elaeagnus angustifolia L. Fam. nat.: Elaeagnaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Elaeis guinensis	Elaeis guinensis Jacquin Fam. nat.: Palmae.	Fructus maturi recentes. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Elaps corallinus ††	Venenum, quod inest in maxillae glandulis Elapis corallini, qui est in America meridionali. Wied. Fam. nat.: Elapinae (Ophidia)	Ad triturationem sec. § 8.
Elaterium †	Ecballium Elaterium Richard Fam. nat.: Cucurbitaceae	Fructus paene maturi. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Emetinum †	Alcaloidea mixta e radice Urag- ogae Ipecacuanhae Baillon	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ephedra vulgaris	Ephedra vulgaris Richard Fam. nat.: Gnetaceae	Folia ramulique recentes. Essen- tia sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Epigaea repens	Epigaea repens L. Fam. nat.: Ericaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Epilobium palustre	Epilobium palustre L. Fam. nat.: Onagraceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Epiphegus virginianus	Epiphegus americanus Nuttall Fam. nat.: Orobanchaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Equisetum arvense	Equisetum arvense L. Fam. nat.: Equisetaceae	Planta recens aestate exeunte cum caulibus sterilibus collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Equisetum hiemale	Equisetum hiemale L. Fam. nat.: Equisetaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Equisetum limosum	Equisetum limosum L. Fam. nat.: Equisetaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Erechthites hieracifolia	Erechthites praealta Rafin Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ergotinum †	Ergotinum, quod sec. praecepta Pharmacopoeae Germanicae ex Secali cornuto extractum est	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Ergotini, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Ceterae dil. c. Spir. v. 45 %

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Erica	Calluna vulgaris Salisbury Fam. nat.: Ericaceae	Ramuli recentes floridi. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Erigeron acer	Erigeron acer L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Erigeron canadensis	Erigeron canadensis L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eriodictyon californi- cum	Eriodictyon glutinosum Benth Fam. nat.: Hydrophyllaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Erodium cicutarium	Erodium cicutarium L'Heritier Fam. nat.: Geraniaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ervum Ervilia	Ervum Ervilia L. Fam. nat.: Papilionaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Eryngium aquaticum	Eryngium aquaticum L. Fam. nat.: Umbelliferae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eryngium maritimum	Eryngium maritimum L. Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Erysimum officinale	Sisymbrium officinale Scopoli Fam. nat.: Cruciferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Erythronium america- num	Erythronium americanum Ker. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eucalyptus	Eucalyptus globulus Labillardiere Fam. nat.: Myrtaceae	Folia siccata ramulorum veterio- rum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Eugenia Jambosa	Jambosa vulgaris DC. Fam. nat.: Myrtaceae	Semina recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eupatorium aromaticum	Eupatorium aromaticum L. Fam. nat.: Compositae	Radix recens autumnno collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eupatorium cannabinum	Eupatorium cannabinum L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eupatorium odoratum	Eupatorium odoratum L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae formā medicamenti continetur
Eupatorium perfoliatum	Eupatorium perfoliatum L. Fam. nat.: Compositae	Tota planta recens, cum florere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eupatorium purpureum	Eupatorium purpureum L. Fam. nat.: Compositae	Rhizoma recens autumnō collec- tum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia amygdaloides †	Euphorbia amygdaloides L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia corollata †	Euphorbia corollata L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia Cyparissias †	Euphorbia Cyparissias L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia Esula †	Euphorbia Esula L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia helioscopia †	Euphorbia helioscopia L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia hypericifolia †	Euphorbia hypericifolia L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia Lathyris †	Euphorbia Lathyris L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Euphorbia pilulifera †	Euphorbia pilulifera L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia splendens †	Euphorbia splendens Boj. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbia villosa †	Euphorbia procera M. v. Bieber- stein Fam. nat.: Euphorbiaceae	Rhizoma recens. Ad essent. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Euphorbium †	Sucus lacteus induratus Euphor- biae resiniferae Berg Fam. nat.: Euphorbiaceae	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Euphrasia	Euphrasia officinalis L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Eupionum	Gummi elasticum destillatum C_4H_8 Pondus moleculare 56,064	Ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Evonymus atropurpurea	Evonymus atropurpurea L. Fam. nat.: Celastraceae	Cortex recens ramulorum et radi- cum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Evonymus europaea	Evonymus europaea L. Fam. nat.: Celastraceae	Fructus maturi recentes. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Fagopyrum	Fagopyrum esculentum Moench Fam. nat.: Polygonaceae	Planta recens, cum maturescere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Farfara	Tussilago Farfara L. Fam. nat.: Compositae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Fel Tauri	Fel e vesica felea tauri collectum Fam. nat.: Cavicornia	Ad triturationem sec. § 8, sed 1 : 100, et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45% Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Ferrum aceticum	Ferrum aceticum solubile ita fere compositum: $Fe \begin{smallmatrix} OH \\ (CH_3COO)_2 \end{smallmatrix}$ Pondus moleculare 190,898	Ad triturationem sec. § 7 (Ad rationem subst. orig. 100% continentis)
Ferrum arsenicosum ††	Ferrum arsenicosum ita fere com- positum: $4 Fe_2O_3, As_2O_3 \cdot 5 H_2O$	Ad triturationem sec. § 7.
Ferrum carbonicum	Ferrum carbonicum, $FeCO_3$ Pondus moleculare 115,84	Ferro carbonico saccharato cum aequali portione Sacchari lactis mixto trituratione D 1 efficitur, quam sec. § 7 triturare pergas.
Ferrum citricum oxyda- tum	Ferrum citricum $C_3H_4(OH)(COO)_3Fe + 3 H_2O$ Pondus moleculare 298,96	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 0,1 pars ponderati Ferri citrici, 8,9 partes ponderatae Aquae fer- ventis, 1 pars ponderata Spir. v. 90% Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Ferrum jodatum †	Ferrum jodatum, FeJ_2 Pondus moleculare 309,68	3 partes Ferri pulverati 10 par- tibus Aquae perfundantur et con- quassando 8 partes Jodi in por- tiones aequales divisae addantur. Solutio filtrata in patella ferrea polita celeritur tandiu evapore- tur, dum gutta desumpta refri- gescens riguerit. Massa refri- gerata (10 partes) cum 90 par- tibus Sacchari lactis misceatur. Hac mixtura trit. D 1 efficitur, quam sec. § 7 triturare pergās.
Ferrum lacticum	Ferrum lacticum, $(\text{CH}_3 \cdot \text{CHOH} \cdot \text{COO})_2\text{Fe} + 3 \text{H}_2\text{O}$ oder $(\text{C}_3\text{H}_5\text{O}_3)_2\text{Fe} + 3 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 287,97	Ad triturationem sec. § 7
Ferrum metallicum	Ferrum reductum Pondus atom. 55,84	Ad triturationem sec. § 7 (Ad rationem subst. orig. 100% continentis)
Ferrum phosphoricum	Ferrum phosphoricum, $\text{FePO}_4 + 4 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 229,9	Ad triturationem sec. § 7
Ferrum picrinicum †	$(\text{C}_6\text{H}_2(\text{NO}_2)_3\text{O})_2\text{Fe}, 5 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 738,08	Ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Aqua, D 4 c. Spir. v. 20%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Ne veneat nisi dilutum.
Ferrum pomatum	Extractum Ferri pomati	Ad solutionem: 1 pars ponderata Extr. Ferri po- mati, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Ferrum sesquichloratum Ferrum muriaticum	Liquor Ferri sesquichlorati, qui continet 10% Ferri	Ad triturationem D 2 parandam 3 partes Liquoris ferri sesquichlor. et 97 partes Sacch. lactis trituren- tur, quam sec. § 7 triturare per- gas. Ad solutionem: 3 partes Liquor ferri sesquichlorati, 7 partes Aquae. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutio D 2 cum Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45% Dil. D 1 et D 2 in lagoenis epi- stomio vitreo praeclusis veneant.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Ferrum sulfuricum	Ferrum sulfuricum siccum	Ad triturationem sec. § 7. Quod facile dissolvitur, priores dilu- tiones ne liquidae parentur.
Ficus religiosa †	Ficus religiosa L. Fam. nat.: Moraceae	Ramuli foliaque recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Filix †	Aspidium Filix mas Swartz Fam. nat.: Polypodiaceae	Rhizoma recens mensibus Julio et Augusto effossum sine flabellis et fibris. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Foeniculum	Foeniculum vulgare Miller Fam. nat.: Umbelliferae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Foenum graecum	Trigonella Foenum graecum L. Fam. nat.: Papilionaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Formica rufa	Formica rufa L. Fam. nat.: Formicidae (Hymenoptera)	Animalia viva contrita ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Fragaria vesca	Fragaria vesca L. Fam. nat.: Rosaceae	Fructus maturi recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Franciscea uniflora †	Brunfelsia Hopeana Benthham Fam. nat.: Solanaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Frangula	Rhamnus Frangula L. Fam. nat.: Rhamnaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Frankenia grandifolia	Frankenia grandifol. Chamisso et Schlechtendal Fam. nat.: Frankeniaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Frasera carolinensis	Frasera carolinensis Walther Fam. nat.: Gentianaceae	Radix recens, quae colligatur bima mensibus Octobri et No- vembri vel trima mensibus Martio et Aprili. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Fraxinus americana	Fraxinus americana L. Fam. nat.: Oleaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Fraxinus excelsior	Fraxinus excelsior L. Fam. nat.: Oleaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Fucus vesiculosus	Fucus vesiculosus L. Fam. nat.: Fucaceae (Phaeophyceae)	Fucus vesiculosus siccatus, con- chis adhaerentibus et algis alienis liberatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Fumaria officinalis	Fumaria officinalis L. Fam. nat.: Fumariaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Galanga	Alpinia officinarum Hance Fam. nat.: Zingiberaceae	Rhizoma siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Galbanum	Genera Ferulae, praecipue Ferula galbaniflua Boissier et Buhse Fam. nat.: Umbelliferae	Resina gummi. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Galeopsis	Galeopsis ochroleuca Lamarck Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Galium album	Galium Mollugo L. Fam. nat.: Rubiaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Galium Aparine	Galium Aparine L. Fam. nat.: Rubiaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Galium verum	Galium verum L. Fam. nat.: Rubiaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Gallae turcicae	Tumores in Quercus infectoriae Oliv. foliis punctationibus variorum generum Cynipidis effecti, quae Gallae dicuntur. Fam. nat.: Cupuliferae	Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Gaultheria procumbens	Gaultheria procumbens L. Fam. nat.: Ericaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Gelsemium †	Gelsemium sempervirens Aiton Fam. nat.: Loganiaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Genista tinctoria	Genista tinctoria L. Fam. nat.: Papilionaceae	Partes aequales germinum recen- tium, foliorum, florum. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Dr. Schwabe, Pharmacopoea.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Gentiana Amarella	Gentiana Amarella L. Fam. nat.: Gentianaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Gentiana cruciata	Gentiana cruciata L. Fam. nat.: Gentianaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Gentiana lutea	Gentiana lutea L. Fam. nat.: Gentianaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Gentiana quinqueflora	Gentiana quinqueflora Hill. Fam. nat.: Gentianaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Geranium maculatum	Geranium maculatum L. Fam. nat.: Geraniaceae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Geranium odoratissimum	Pelargonium odoratissimum Soland. Fam. nat.: Geraniaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Geranium Robertianum	Geranium Robertianum L. Fam. nat.: Geraniaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Geum rivale	Geum rivale L. Fam. nat.: Rosaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Geum urbanum	Geum urbanum L. Fam. nat.: Rosaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ginseng	Aralia quinquefolia Decne et Planchon Fam. nat.: Araliaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Glechoma hederacea	Glechoma hederacea L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Glonoinum †† Nitroglycerinum	Trinitroglycerinum $C_3H_5(NO_3)_3$ Pondus moleculare 227,06	Ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Ne veneat nisi dilutum
Glycyrrhiza glabra	Glycyrrhiza glabra L. Fam. nat.: Papilionaceae	Radix delibrata siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Gnaphalium arenarium	Helichrysum arenarium Moench. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Gnaphalium polycephalum	Gnaphalium polycephalum Michaux. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Gossypium herbaceum	Gossypium herbaceum L. Fam. nat.: Malvaceae	Radix cortex interior. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Granatum	Punica Granatum L. Fam. nat.: Punicaceae	Cortex trunci et radices. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Graphites	Graphites naturalis	Ad triturationem sec. § 7
Gratiola †	Gratiola officinalis L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Herba recens, antequam floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Grindelia robusta	Grindelia robusta Nuttall Fam. nat.: Compositae	Herba siccata, cum floreret, collecta. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Grindelia squarrosa	Grindelia squarrosa Dunal Fam. nat.: Compositae	Herba siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Guaco	Mikania Guaco H. B. K. Fam. nat.: Compositae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Guajacum	Guajacum officinale L. et Gua- jacum sanctum L. Fam. nat.: Zygophyllaceae	Resina ligni ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% pa- randam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Guarana	Paullinia sorbilis Martius Fam. nat.: Sapindaceae	Semina matura, quae iam in patria contrita et in pastae for- mam redacta sunt. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Guarea trichiloides	Guarea trichiloides L. Fam. nat.: Meliaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Gutti †	Garcinia Hanburyi Hooker fil. Fam. nat.: Guttiferae	Resina gummi ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Gymnocladus canadensis	Gymnocladus canadensis Lamarck Fam. nat.: Caesalpiniaceae	Medulla recens, quae est in fructi- bus. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Haematoxylon campe- chianum	Haematoxylon campechianum L. Fam. nat.: Caesalpiniaceae	Lignum trunci ramorumque sic- catum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Hamamelis	Hamamelis virginica L. Fam. nat.: Hamamelidaceae	Cortex recens ramorum et radi- cum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hamamelis-Extrakt (Ex- tractum Hamamelidis)	Hamamelis virginica L. Fam. nat.: Hamamelidaceae	Rami recentes floridi, mensibus Novembri, Decembri, Januario collecti. 100 partes ponderatae ramorum 7,5 partibus Spir. v. perfundantur et, ubi 24 horas sepositae erunt, vapore Aquae immisso 47 partes ponderatae de- stillati abstrahantur. Hoc destil- latum liquidissimum, quod Haze- line vocatur, difundendum non est, sed, ut est, ad usum internum et externum adhibeatur.
Hedeoma pulegioides	Hedeoma pulegioides Persoon Fam. nat.: Labiatae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hedera helix	Hedera helix L. Fam. nat.: Araliaceae	Germina recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Helianthemum vulgare	Helianthemum vulgare Gaertner Fam. nat.: Cistaceae	Planta siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Helianthus annuus	Helianthus annuus L. Fam. nat.: Compositae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Heliotropium	Heliotropium peruvianum L. Fam. nat.: Boraginaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$.
Helix pomatia	Helix pomatia L. Fam. nat.: Pulmonata (Gastropoda)	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Helleborus †	Helleborus niger L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma siccatum cum radicibus adhaerentibus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Helleborus foetidus †	Helleborus foetidus L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Helleborus orientalis †	Helleborus orientalis L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Helleborus viridis †	Helleborus viridis L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma siccatum. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Helminthochorton	Alsidium Helminthochortos Kützing Fam. nat.: Rhodamelaceae	Alga siccata. Ad tinct. sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Helonias dioica †	Chamaelirium carolinianum Willdenow Fam. nat.: Liliaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hepar sulfuris	Hepar sulfuris calcar. Hahnemanni	Ad triturationem sec. § 7.
Hepar sulfuris kalinum	Kalium sulfuratum	Ad triturationem sec. § 7, idque, quod facile diffluit, a triturat. D 2
Hepatica triloba	Hepatica nobilis Schreber Fam. nat.: Ranunculaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Heracleum Sphondylium	Heracleum Sphondylium L. Fam. nat.: Umbelliferae	Herba recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Herniaria glabra	Herniaria glabra L. Fam. nat.: Caryophyllaceae	Planta recens mense Julio col- lecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hieracium Pilosella	Hieracium Pilosella L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essentiam § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Hieracium umbellatum	Hieracium umbellatum L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Hoang-Nau †	<i>Strychnos malaccensis</i> Benth Fam. nat.: Loganiaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Hoitzia coccinea	<i>Loeselia coccinea</i> G. Don. Fam. nat.: Polemoniaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Hura brasiliensis † Assacu	<i>Hura brasiliensis</i> Willdenow Fam. nat.: Euphorbiaceae	Sucus lacteus recens. Sucus et Spir. v. 90% aa. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$ Dilutiones sec. § 1 parentur.
Hydrangea arborescens	<i>Hydrangea arborescens</i> L. Fam. nat.: Saxifragaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hydrastinum hydro- chloricum † Hydrastinum muriati- cum	$C_{21}H_{21}NO_6 \cdot HCl$ Pondus moleculare 419,65	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Hydrastis †	<i>Hydrastis canadensis</i> L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Rhizoma siccatum cum radicibus adhaerentibus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Hydrocotyle asiatica †	<i>Hydrocotyle asiatica</i> L. Fam. nat.: Umbelliferae	Planta siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Hydrophyllum virgini- cum	<i>Hydrophyllum virginicum</i> L. Fam. nat.: Hydrophyllaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hydropiper	<i>Polygonum Hydropiper</i> L. Fam. nat.: Polygonaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Hyoscinum ††	Alcaloideum e variis generibus Solanacearum, $C_{17}H_{23}NO_3$ Pondus moleculare 389,19	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Hyoscyaminum ††	Alcaloideum Hyoscyami nigri L. Fam. nat.: Solanaceae $C_{17}H_{23}NO_3$ Pondus moleculare 289,19	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Hyoscyaminum hydro- bromicum ††	$C_{17}H_{23}NO_3 \cdot HBr$ Pondus moleculare 370,12	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Hyoscyamus †	<i>Hyoscyamus niger</i> L. Fam. nat.: Solanaceae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 1 Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Hyoscyamus Scopolia †	Scopolia carniolica Jacqin Fam. nat.: Solanaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Hypericum	Hypericum perforatum L. Fam. nat.: Hypericaceae	Tota planta recens florida col- lecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Hypericum pulchrum	Hypericum pulchrum L. Fam. nat.: Hypericaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Jaborandi †	Pilocarpus Jaborandi Holmes et Pilocarpus pennatifolius Lemaire Fam. nat.: Rutaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Jacaranda Caroba	Jacaranda procera Sprengel Fam. nat.: Bignoniaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Jalapa †	Exogonium Purga (Wenderoth) Bentham. (Ipomoea Purga Hayne) Fam. nat.: Convolvulaceae	Tubera siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Jatropha curcas †	Jatropha Curcas L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Jatropha gossypifolia †	Jatropha gossypifolia L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Iberis amara	Iberis amara L. Fam. nat.: Cruciferae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ichthyolum	Ammonium sulfoichthyolicum $C_{28}H_{36}S_3O_6(NH_4)_2 - x H_2O$	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Jequirity †	Abrus precatorius L. Fam. nat.: Papilionaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Ignatia †	Strychnos Ignatii Berg (Ignatia amara L.) Fam. nat.: Loganiaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ilex Aquifolium	Ilex Aquifolium L. Fam. nat.: Aquifoliaceae	Folia recentia mense Junio col- lecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Imperatoria Ostruthium	Imperatoria Ostruthium L. Fam. nat.: Umbelliferae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Indigo	Pigmentum caeruleum, quod effi- citur fermentatione suci Indigo- ferae Anil L. et aliorum generum Papilionacearum (Indigoferae tro- picae). Continet $C_{16}H_{10}N_2O_2$ Pondus moleculare 262,1	Ad triturationem sec. § 7
Inula Helenium	Inula Helenium L. Fam. nat.: Compositae	Radix recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Jodoformium †	Trijodmethanum CHJ_3 Pondus moleculare 393,77	Ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Jodum †	Jodum J Pondus atom. 126,92	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D1 et D2 in lagoonis epi- stomio vitreo praeclusis veneant.
Ipecacuanha †	Uragoga Ipecacuanha Baillon (Cephaelis Ipecacuanha Willd.) Fam. nat.: Rubiaceae	Radix caute siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Iris	Iris versicolor L. Fam. nat.: Iridaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Iris florentina	Iris florentina L. Fam. nat.: Iridaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Iris foetidissima	Iris foetidissima L. Fam. nat.: Iridaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Iris germanica	Iris germanica L. Fam. nat.: Iridaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Iris Pseudacorus	Iris Pseudacorus L. Fam. nat.: Iridaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Juglans	Juglans regia L. Fam. nat.: Juglandaceae	Aequales partes corticis fructuum viridis recentis et foliorum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Juglans cinerea	Juglans cinerea L. Fam. nat.: Juglandaceae	Cortex interior recens ramorum et trunci et radices mensibus Maio et Junio collectus. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Juncus effusus	Juncus effusus L. Fam. nat.: Juncaceae	Rhizoma recens vere collectum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Juncus pilosus	Luzula pilosa Willdenow Fam. nat.: Juncaceae	Radix recens vere collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Juniperus communis	Juniperus communis L. Fam. nat.: Pinaceae	Bacae recentes maturae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Juniperus virginiana †	Juniperus virginiana L. Fam. nat.: Pinaceae	Sumitates recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Justicia Adhatoda	Adhatoda Vasica Nees Fam. nat.: Acanthaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Kalium aceticum	CH_3COOK Pondus moleculare 108,12	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium arsenicosum ††	Fere compositum: $\text{KAsO}_2, \text{HAsO}_2 + \text{H}_2\text{O}$	Ad solutionem: 1 pars Kalii arsenicosi, 89 partes Aquae, 10 partes Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Kalium bichromicum †	$\text{K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$ Pondus moleculare 294,22	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2—D 4 c. Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Kalium bioxalicum †	COOH $\text{COOK} + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 146,12	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Kalium bromatum	KBr. Pondus moleculare 119,02	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Kalii bromati, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutio D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Kalium carbonicum	K ₂ CO ₃ Pondus moleculare 138,20	Ad triturationem sec. § 7 id- que, quod facile diffluit, a tri- turatione D 2 et ad solutionem: 1 pars Kalii carb., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium causticum †	KOH Pondus moleculare 56,11	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium chloratum Kalium muriaticum	KCl Pondus moleculare 74,56	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Kalii chlorat., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Kalium chloricum	KClO ₃ Pondus moleculare 122,56	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile fulminando dissilit, a trituratione D 2 et ad solutionem: 1 pars Kalii chlorici, 89 partes Aquae, 10 partes Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Kalium chromicum †	K ₂ CrO ₄ Pondus moleculare 194,21	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium cyanatum ††	KCN Pondus moleculare 65,11	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem: 1 pars Kalii cyanat., 89 partes Aquae, 10 partes Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%. Dilutiones semper recens parentur.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Kalium jodatum †	KJ Pondus moleculare 166,02	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium nitricum	KNO ₃ Pondus moleculare 101,11	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Kalii nitr., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Kalium phosphoricum	KH ₂ PO ₄ Pondus moleculare 136,16	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a tritura- tione 2 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium sulfuricum	K ₂ SO ₄ Pondus moleculare 174,27	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kalium tartaricum	2 $\begin{Bmatrix} \text{CH(OH)COOK} \\ \text{CH(OH)COOK} \end{Bmatrix} + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 470,48	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Kalmia	Kalmia latifolia L. Fam. nat.: Ericaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Kamala	Glandulae et pili fasciculati fus- ci, qui fructibus Malloti philip- pinensis (Lamarck) Müller Argo- viensis adhaerent, quae Euphor- biacea in Africa orientali, Arabia, India orientali exstat. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Kino	Pterocarpus Marsupium Roxb. Fam. nat.: Papilionaceae	Sucus inspissatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Kola	Cola vera K. Schumann et Cola Ballayi Cornu Fam. nat.: Sterculiaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Koso	Hagenia abyssinica Willdenow (Brayera anthelminthica Kunth.) Fam. nat.: Rosaceae	Flores feminae siccati. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Kreosotum †	Kreosotum faginum, quo prae- cipue continentur: $C_6H_4(OCH_3)(OH)$ et $C_6H_3(CH_3)(OCH_3)(OH)$	Ad triturationem sec. § 8 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90% Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lac caninum	Canis familiaris Fam. nat.: Carnivora	Lac recens. Lac et Spir. v. 90% aa. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$. Dilutiones sec. § 1 parentur
Lac defloratum	Bos taurus L. Fam. nat.: Ruminantia	Lac defloratum. Lac et Spir. v. 90% aa. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$. Dilutiones sec. § 1 parentur.
Lacerta agilis	Lacerta agilis L. Fam. nat.: Lacertidae	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90% Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lachesis ††	Lachesis muta L. Fam. nat.: Crotalinae (Ophidia)	Venenum, quod inest in maxillae glandulis. Ad triturationem sec. § 8
Lachnanthes tinctoria	Lachnanthes tinctoria Ell. Fam. nat.: Haemodoraceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lactuca †	Lactuca virosa L. Fam. nat.: Compositae	Tota planta recens, cum florere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Lactuca sativa	Lactuca sativa L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Lamium album	Lamium album L. Fam. nat.: Labiatae	Folia et flores recentes. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Lapathum acutum	Rumex obtusifolius L. Fam. nat.: Polygonaceae	Radix recens autumnno collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lathyrus sativus	Lathyrus sativus L. Fam. nat.: Papilionaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60% Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Latrodectus mactans †	Latrodectus mactans Fam. nat.: Araneida	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90% Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Laurocerasus †	Prunus Laurocerasus L. Fam. nat.: Rosaceae	Folia recentia mense Augusto collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Laurus nobilis	Laurus nobilis L. Fam. nat.: Lauraceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lavandula	Lavandula Spica L. Fam. nat.: Labiatae	Flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lecithinum	Ovolecithinum	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Ledum	Ledum palustre L. Fam. nat.: Ericaceae	Germina novella siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lemna minor	Lemna minor L. Fam. nat.: Lemnaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Leonurus Cardiaca	Leonurus Cardiaca L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lepidium bonariense	Lepidium bonariense L. Fam. nat.: Cruciferae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Leptandra	Leptandra virginica Nuttall Fam. nat.: Scrophulariaceae	Radices recentes bimae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Levisticum officinale	Levisticum officinale Koch Fam. nat.: Umbelliferae	Rhizoma recens autumnno cum radicibus adhaerentibus collec- tum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Liatris odoratissima	Liatris odoratissima Willdenow Fam. nat.: Compositae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Liatris spicata	Liatris spicata Willdenow Fam. nat.: Compositae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lilium album	Lilium candidum L. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Lilium tigrinum	Lilium tigrinum L. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Limax ater	Arion empiricorum Fér. Fam. nat.: Pulmonata (Gastero- poda)	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Linaria	Linaria vulgaris Miller Fam. nat.: Scrophulariaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri. quae forma medicamenti continetur
Linum catharticum †	Linum catharticum L. Fam. nat.: Linaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Linum usitatissimum	Linum usitatissimum L. Fam. nat.: Linaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Liriodendron tulipifera	Liriodendron tulipifera L. Fam. nat.: Magnoliaceae	Cortex recens ramulorum novel- lorum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lithium carbonicum	Li_2CO_3 Pondus moleculare 73,88	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Lithium chloratum Lithium muriaticum	LiCl Pondus moleculare 42,40	Ad triturationem sec. § 7, idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lithium jodatum †	LiJ Pondus moleculare 133,86	Ad triturationem sec. § 7, idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lithium salicylicum	$\text{C}_6\text{H}_4 \begin{cases} \text{OH} \\ \text{COOLi} \end{cases}$ Pondus moleculare 144,0	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Loasa tricolor †	Loasa tricolor Lindley Fam. nat.: Loasaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lobelia cardinalis †	Lobelia cardinalis L. Fam. nat.: Campanulaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lobelia inflata †	Lobelia inflata L. Fam. nat.: Campanulaceae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lobelia syphilitica †	Lobelia syphilitica L. Fam. nat.: Campanulaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lolium temulentum †	Lolium temulentum L. Fam. nat.: Gramineae	Fructus maturi siccati. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lonicera Caprifolium	Lonicera Caprifolium L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Loranthus europaeus	Loranthus europaeus Jacquin Fam. nat.: Loranthaceae	Aequales partes bacarum et fo- liorum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lupulinum	Squamae glandularum deter- gendo et decutiendo avulsae maxime a fructibus Humuli Lu- puli L., quae Moracea in Europa et Asia nascens in America septentrionali frequenter colitur.	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lupulus	Humulus Lupulus L. Fam. nat.: Moraceae	Strobuli recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lycium Berberis †	Lycium barbarum L. Fam. nat.: Solanaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Lycopodium	Lycopodium clavatum L. Fam. nat.: Lycopodiaceae	Sporae. — Sporae in massam pulti similem contritae ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Lycopodium Selago	Lycopodium Selago L. Fam. nat.: Lycopodiaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lycopus europaeus	Lycopus europaeus L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lycopus virginicus	Lycopus virginicus L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Lysimachia Nummularia	Lysimachia Nummularia L. Fam. nat.: Primulaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Lythrum Salicaria	Lythrum Salicaria L. Fam. nat.: Lythraceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Madar	Calotropis gigantea Aiton Fam. nat.: Asclepiadaceae	Cortex radices siccatus mensibus Aprili et Maio collectus. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Magnesium carbonicum Magnesia carbonica	Magn. carb., ita fere compositum: (MgCO ₃) ₃ , Mg (OH) ₂ + 3 H ₂ O oder (MgCO ₃) ₄ ·Mg(OH) ₂ + 4H ₂ O	Ad triturationem sec. § 7

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Magnesium chloratum Magnesia muriatica	$\text{MgCl}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 203,34	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Magnesium phosphori- cum Magnesia phosphorica	$\text{MgHPO}_4 + 3 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 246,48	Ad triturationem sec. § 7
Magnesium sulfuricum Magnesia sulfurica	$\text{MgSO}_4, 7\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 246,50	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Magnolia glauca	Magnolia glauca L. Fam. nat.: Magnoliaceae	Flores recentes ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Majorana	Origanum Majorana L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Malva silvestris	Malva silvestris L. et Malva neglecta Wallroth Fam. nat.: Malvaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Mammea americana Manaca = Brunsfelsia Hopeana	Mammea americana L. Fam. nat.: Guttiferae	Resina. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Mancinella †	Hippomane Mancinella L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Aequales partes recentium folio- rum et corticis et fructuum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Mandragora †	Mandragora officinarum L. Fam. nat.: Solanaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Manganum aceticum	$\text{Mn}(\text{CH}_3\text{COO})_2 + 4 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 245,04	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Mangan acet., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Manganum carbonicum	MnCO_3 Pondus moleculare 114,93	Ad triturationem sec. § 7
Manganum sulfuricum	$\text{MnSO}_4 + 5 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 241,08	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Manihot †	Manihot utilisima Pohl Fam. nat.: Euphorbiaceae	Sucus lacteus radicum recen- tium. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Maranta arundinacea	Maranta arundinacea L. Fam. nat.: Marantaceae	Rhizoma siccatum. — Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Marchantia polymorpha	Marchantia polymorpha L. Fam. nat.: Marchantiaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Marrubium album	Marrubium album L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Marum verum	Teucrium Marum L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens collecta, antequam floruit. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Maté	Ilex paraguayensis St. Hilair Fam. nat.: Aquifoliaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Matico	Piper angustifolium Ruiz et Pa- von = Piper elongatum Vahl Fam. nat.: Piperaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Medusa	Aurelia aurita L. Fam. nat.: Ulmaridae (Coelen- terata)	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Melaleuca hypericifolia	Melaleuca hypericifolia Smith Fam. nat.: Myrtaceae	Ramuli recentes floridi. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Melastoma Ackermanni	Melastoma Ackermanni Mure Fam. nat.: Melastomataceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Melilotus officinalis	Melilotus officinalis Desrousseaux et Melilotus altissimus Thuillier Fam. nat.: Papilionaceae	Folia et flores recentes. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Melissa	Melissa officinalis L. Fam. nat.: Labiatae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Meloe majalis	Meloë proscarabaeus L. Fam. nat.: Meloidae (Coleoptera).	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Melolontha vulgaris	Melolontha vulgaris L. Fam. nat.: Scarabaeidae (Coleoptera)	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Menispermum canadense	Menispermum canadense L. Fam. nat.: Menispermaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Mentha piperita	Mentha piperita Smith Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Mentha Pulegium	Mentha Pulegium L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Mentzelia hispida	Mentzelia hispida Willdenow Fam. nat.: Loasaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Menyanthes	Menyanthes trifoliata L. Fam. nat.: Gentianaceae	Tota planta recens, cum florere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Mephitis putorius	Mephitis mephitis Schreber Fam. nat.: Mustelinae (Carnivora)	Sucus collectus ex animalis ani glandulis ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Mercurialis	Mercurialis perennis L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Tota planta recens, cum florere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Mercurialis annua	Mercurialis annua L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Mercurius aceticus †† Hydrargyrum aceticum oxydulatum	Hg(CH ₃ COO) Pondus moleculare 259,6	Ad triturationem sec. § 7.
Mercurius auratus †	Merc. aurat. compositus ex auro metallico et hydrargyro metallico puro	1 pars Auri metallici puri et 2 partes Hydrargyri metallici puri in mortario porcellaneo calefacto vehementer conterantur, dum massa peraequalis effecta erit. Hac paulatim cum Saccharo lactis ad pulverem aequalem subtilissimum conterenda, ut massa tota 30 par- tium sit, trituratione D 1 efficitur.
Mercurius bijodatus ruber †† Hydrargyrum bijodatum rubrum	HgJ ₂ Pondus moleculare 454,4	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Merc. bijodat. 999 partes Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{1000}$. Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Mercurius cyanatus †† Hydrargyrum cyanatum	Hg(CN) ₂ Pondus moleculare 252,6	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Mercurius dulcis † Hydrargyrum chloratum mite, Calomel	Hg_2Cl_2 Pondus moleculare 472,1	Ad triturationem sec. § 7. Tritu- rationes semper recens parentur.
Mercurius iodatus flavus †† Hydrargyrum iodatum flavum	Hg_2J_2 Pondus moleculare 655,0	Ad triturationem sec. § 7.
Mercurius nitrosus †† Hydrargyrum nitricum oxydulatum	$Hg(NO_3) + H_2O$ Pondus moleculare 280,6	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a tritura- tione D 2
Mercurius praecipitatus ruber †† Hydrargyrum oxydatum rubrum	HgO Pondus moleculare 216,6	Ad triturationem sec. § 7.
Mercurius solubilis Hah- nemanni †† Hydrargyrum oxydula- tum nigrum	Merc. solub. H. continet praeci- pue: $NH_2 Hg_2NO_3$, cui varie ad- mixtum est Hydrargyrum metal- licum et Hydrargyrum oxydula- tum, Hg_2O	Ad triturationem sec. § 7.
Mercurius sublimatus corrosivus †† Hydrargyrum bichlora- tum corrosivum	$HgCl_2$ Pondus moleculare 271,5.	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Mercurius sulfuricus †† Hydrargyrum sulfuri- cum basicum	Mercurius sulfuricus flavus, $HgSO_4 + 2 HgO$	Ad triturationem sec. § 7.
Mercurius vivus † Hydrargyrum vivum	Hydrargyrum, Hg Pondus atom. 200,6	Ad triturationem sec. § 7.
Methonica gloriosa	Gloriosa superba L. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Meum athamanticum	Meum athamanticum Jacquin Fam. nat.: Umbelliferae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Mezereum †	Daphne Mezereum L. Fam. nat.: Thymelaeaceae	Ramulorum cortex recens, ante- quam planta floruit, collectus. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Millefolium	Achillea Millefolium L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Millepedes	Oniscus Asellus L. Fam. nat.: Oniscidae (Crustaceae)	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Mimosa humilis	Mimosa humilis Willdenow Fam. nat.: Mimosaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Mitchella repens	Mitchella repens L. Fam. nat.: Rubiaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Momordica Balsamina	Momordica Balsamina L. Fam. nat.: Cucurbitaceae	Fructus maturi. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Monarda didyma	Monarda didyma L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Monesia	Pradosia lactescens Radelk. Fam. nat.: Sapotaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Monotropa uniflora †	Monotropa uniflora L. Fam. nat.: Pirolaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Morphinum hydrochlori- cum † Morphium muriaticum	$C_{17}H_{19}O_3N \cdot HCl + 3H_2O$ Pondus moleculare 375,7	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Moschus	Secretum propriarum glandula- rum Cast. Moschati mascul. (Mo- schus moschiferus L. Fam. nat.: Cervidae), qui est in montibus Asiae centralis, a Tibeto usque ad Sibiriam	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 30% parandam, sed 1 : 100. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$ Ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Muira Puama	Liriosma ovata Miers Fam. nat.: Oleaceae	Lignum siccatum et cortex radi- cum. — Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Murex purpureus	Varia Muricis genera Fam. nat.: Gastropoda	Sucus recens glandulae pur- pureae. Ad triturationem sec. § 8
Musa sapientum	Musa sapientum L. Fam. nat.: Musaceae	Flores siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Mutisia viciaefolia	Mutisia viciaefolia Canarille Fam. nat.: Compositae	Flores recentes. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Myosotis arvensis	Myosotis arvensis Reichenbach Fam. nat.: Boraginaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Myosurus minimus †	Myosurus minimus L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Myrica cerifera	Myrica cerifera L. Fam. nat.: Myricaceae	Cortex radialis recens. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Myristica sebifera	Myristica sebifera Swartz Fam. nat.: Myristicaceae	Sucus ruber recens ex cortice laeso. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Myrrha	Genera Commiphora praecipue Commiphora molmol Engler Fam. nat.: Burseraceae	Resina gummi. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%.
Myrtillus	Vaccinium Myrtillus L. Fam. nat.: Ericaceae	Bacae recentes maturae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Myrtus communis	Myrtus communis L. Fam. nat.: Myrtaceae	Ramuli recentes floridi. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Myrtus Pimenta	Pimenta officinalis Lindley Fam. nat.: Myrtaceae	Bacae siccatae nondum maturae. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Nabalus albus	Prenanthes alba L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Nabalus Serpentaria	Prenanthes Serpentaria Pursh Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Naja tripudians ††	Venenum, quod inest in maxillae glandulis venenosis Naeae tripu- diantis Merr., quae est in India orientali et in China Fam. nat.: Elapinae (Ophidia)	Ad triturationem sec. § 8 ad so- lutionem sec. § 5b c. Glycerino. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 2—D 6 c. Glycerino, ceterae dilutiones c. Spir. v. 45%
Naphthalinum	$C_{10}H_8$ Pondus moleculare 128,1	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Ne veneat nisi liquidum aut tri- turatum.
Narcissus pseudonarcis- sus	Narcissus Pseudo-Narcissus L. Fam. nat.: Amaryllidaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Nasturtium	Nasturtium officinale Robert Brown Fam. nat.: Cruciferae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Natrium aceticum	CH_3COONa , $3\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 136,07	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Natr. acetic., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Natrium arsenicosum ††	NaAsO_2 Pondus moleculare 129,96	Ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Natrium benzoicum	$\text{C}_6\text{H}_5\text{COONa}$ Pondus moleculare 144,04	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Natr. benz., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Natrium bromatum	NaBr Pondus moleculare 102,92	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Natrium carbonicum	Natrium carbonicum siccatum, $\langle \text{Na}_2\text{CO}_3 + x\text{H}_2\text{O} \rangle$	Ad triturationem sec. § 7 (Ad rationem subst. orig. 100% con- tinentis) et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Natrium chloratum Natrium muriaticum	NaCl Pondus moleculare 58,46	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Natr. chlorat., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Natrium choleinicum	Sales Natrii et Kalii acidi tauro- choli et glykocholi	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Natrium jodatum †	NaJ Pondus moleculare 149,92	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffuit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Natrium nitricum	NaNO_3 Pondus moleculare 85,01	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Natr. nitric., 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Natrium phosphoricum	$\text{Na}_2\text{HPO}_4 + 12\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 358,24	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et ceterae c. Spir. v. 45%
Natrium salicylicum †	$\text{C}_6\text{H}_4 \left\{ \begin{array}{l} \text{OH} \\ \text{COONa} \end{array} \right\} (1,2)$ Pondus moleculare 160,04	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Natrium silicicum	Na_2SiO_3 Pondus moleculare 122,06	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffuit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dilutiones D 2 et D 3 c. Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Natrium sulfuricum	Natrium sulfuricum siccum, $\text{Na}_2\text{SO}_4 + x\text{H}_2\text{O}$	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Niccolum metallicum	Ni, Pondus atom. 58,68	Ad triturationem sec. § 7
Nicotinum ††	Alcaloideum e generibus Nicotianae $\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{N}_2$ Pondus moleculare 162,13	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Nigella damascena	Nigella damascena L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Nigella sativa	Nigella sativa L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Nuphar luteum	Nuphar luteum Smith Fam. nat.: Nymphaeaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Nux moschata	Myristica fragrans Houttuyn Fam. nat.: Myristicaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Nux vomica †	<i>Strychnos nux vomica</i> L. Fam. nat.: Loganiaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Nyctanthes Arbor tristis	<i>Nyctanthes Arbor tristis</i> L. Fam. nat.: Oleaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Nymphaea odorata	<i>Nymphaea odorata</i> Aiton Fam. nat.: Nymphaeaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ocimum canum	<i>Ocimum canum</i> Sims Fam. nat.: Labiatae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Q. m. m. $\frac{1}{3}$
Oenanthe crocata †	<i>Oenanthe crocata</i> L. Fam. nat.: Umbelliferae	Rhizoma recens cum radicibus adhaerentibus, cum planta florere inciperet, collectum. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Oenothera biennis	<i>Oenothera biennis</i> L. Fam. nat.: Onagraceae	Planta recens, cum florere in- ciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Oleander †	<i>Nerium Oleander</i> L. Fam. nat.: Apocynaceae	Folia recentia, antequam planta floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Oleum animale aethere- um	Destillatione ex Oleo animali foetido effectum	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Oleum Cajeputi	Oleum aethereum, quod Aquae vaporatione destillatur e foliis et germinibus recentibus praecipue <i>Melaleuca Leucadendri</i> L., quae Myrtacea in insulis, quibus Sunda nomen est, exsistit	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Ne veneat nisi liquidum aut tri- turatum.
Oleum Jecoris Aselli	<i>Oleum Jecoris Gadi morrhuae</i> L., <i>Gadus calarias</i> L. et <i>Gadus aegle- finus</i> L. Fam. nat.: Teleostei	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 99%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 99%, D 4 c. Spir. v. 90%, D 5 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Oleum Santali	Oleum aethereum e ligno Santali albi L. Fam. nat.: Santalaceae	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 99%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$ Dil. D 2 c. Spir. v. 99%, D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Oleum Sinapis nigrae †	Oleum aethereum e seminibus Brassicae nigrae Koch Fam. nat.: Cruciferae	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Ne veneat nisi liquidum aut tri- turatum.
Oleum Succini	Oleum destillatione Succini sicca paratum	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Oleum terebinthinae	Oleum aethereum e resina vario- rum Pini generum effectum	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Ne veneat nisi liquidum aut tri- turatum.
Ononis spinosa	Ononis spinosa L. Fam. nat.: Papilionaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Onopordon Acanthium	Onopordon Acanthium L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Onosmodium virginicum	Onosmodium virginicum DC. Fam. nat.: Borraginaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Opium †	Sucus lacteus Papaveris som- niferi L., qui in Asia minore capsulis fructuum immaturorum insectis effectus et aëre exsicca- tus est. Fam. nat.: Papaveraceae	Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 35% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Opoponax	Opoponax Chirionium Koch Fam. nat.: Umbelliferae	Gummi-resina ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Opuntia vulgaris	Opuntia vulgaris Miller Fam. nat.: Cactaceae	Caules et flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Oreoselinum	Peucedanum Oreoselinum Moench Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens, antequam floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Origanum creticum	Origanum vulgare L. var. Ori- ganum creticum L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Origanum vulgare	Origanum vulgare L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ornithogalum umbella- tum	Ornithogalum umbellatum L. Fam. nat.: Liliaceae	Bulbus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ornithogalum umbella- tum e foliis	Ornithogalum umbellatum L. Fam. nat.: Liliaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ostrya virginica	Ostrya virginica Willdenow Fam. nat.: Betulaceae	Lignum trunci et ramulorum siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ottonia Anisum	Piper Jaborandi Vellozo Fam. nat.: Piperaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Oxalis Acetosella †	Oxalis Acetosella L. Fam. nat.: Oxalidaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Oxydendron arboreum	Andromeda arborea L. Fam. nat.: Ericaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Padus avium	Prunus avium L. Fam. nat.: Rosaceae	Folia recentia, cum planta flore- ret, collecta. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Paeonia officinalis	Paeonia officinalis Retzius Fam. nat.: Ranunculaceae	Radix recens vere collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pambotano	Calliandra Houstoni Benthani Fam. nat.: Mimosaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Panna †	<i>Aspidium athamanticum</i> Kunze Fam. nat.: Polypodiaceae	Rhizoma siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Papaver dubium	<i>Papaver dubium</i> L. Fam. nat.: Papaveraceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pareira brava	<i>Chondodendron tomentosum</i> Ruiz et Pavon Fam. nat.: Menispermaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Paris quadrifolia †	<i>Paris quadrifolia</i> L. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens, cum fructus maturerent, collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Passiflora incarnata	<i>Passiflora incarnata</i> L. Fam. nat.: Passifloraceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pastinaca sativa	<i>Pastinaca sativa</i> L. Fam. nat.: Umbelliferae	Radix bima recens plantae cultae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Patchouly	<i>Pogostemon Patchouly</i> Pelletier Fam. nat.: Labiatae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Penghawar Yambi	<i>Cibotium Baromez</i> Kunze et <i>C. Djambianum</i> Hooker Fam. nat.: Cyatheaceae	Saetae paleales. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Penthorum sedoides	<i>Penthorum sedoides</i> L. Fam. nat.: Crassulaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pepsinum	Enzymum e membrana mucosa stomachi suum vel ovium vel vitulorum	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem: 1 pars Pepsini, 8 partes Aquae, 1 pars Spir. v. 90%. Dil. D 2 et ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Petasites	<i>Petasites officinalis</i> Moench Fam. nat.: Compositae	Planta recens mense Aprili collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Petiveria tetrandra	Petiveria tetrandra Gomez Fam. nat.: Phytolaccaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Petroleum	Pro Petroleo Italiano, quo prius utebamur, adhibetur Galicicum vel Transsylvanicum vel Rumanicum. Id imprimis continet: Carbida e Methani ordine, carbida aromati- tica et aromatica hydrata, quan- titates minores bituminum oxy- genatorum aliasque substantias. 1 pars cum 2 partibus Spir. v. 90% in infundibulo perquassetur et liquor infimus limpidus, ubi plane limpidatus erit, secernatur, quo facto Petroleum purum restabit.	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Ne veneat nisi liquidum aut tri- turatum.
Petroselinum	Petroselinum sativum Hoffmann Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens, cum florere in- ciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Petroselinum e seminibus	Vide Petroselinum	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Peucedanum	Peucedanum officinale L. Fam. nat.: Umbelliferae	Radix recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Phaseolus nanus	Phaseolus vulgaris L., var. nanus L. Fam. nat.: Papilionaceae	Planta recens florida collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Phaseolus vulgaris e tota planta	Phaseolus vulgaris L. Fam. nat.: Papilionaceae	Tota planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Phellandrium	Oenanthe aquatica Lamarck Fam. nat.: Umbelliferae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Philadelphus coronarius	Philadelphus coronarius L. Fam. nat.: Saxifragaceae	Flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Phosphorus ††	Phosphorus flavus, P Pondus atom. 31,04	1 pars Phosphori puri in lagoenam expensam inferatur, quae 1000 partes Spir. v. 90% ad calorem 50—60° redacti continet. Phos- phoro liquefacto lagoena perquas- setur, dum Phosphorus omnis so- lutus erit. Liquoris refrigerati toto pondere iterum examinato filtretur et si opus erit, tantum Spir. v. 90% addatur, ut liquor 1000 partium fiat. Haec solutio est dilutio D 3. Qu. m. m. $\frac{1}{1000}$. Dil. D 4 c. Spir. v. 90%, D 5 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Dilutio D 3 in lagoenis epistomio vitreo praecclusis veneat. Dilutio- nes semper recens parentur. Ne veneant nisi liquidum.
Physalis Alkekengi	Physalis Alkekengi L. Fam. nat.: Solanaceae	Bacae maturae recentes. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Phytolacca †	Phytolacca decandra L. Fam. nat.: Phytolaccaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Phytolacca e bacis †	Phytolacca decandra L. Fam. nat.: Phytolaccaceae	Bacae maturae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pichi-Pichi †	Fabiana imbricata Ruiz et Pavon Fam. nat.: Solanaceae	Tenues ramuli foliati siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Pichurim	Nectandra Puchury major et minor Nees et Martius Fam. nat.: Lauraceae	Cotyledones siccatae. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Pilocarpinum hydrochlo- ricum †	$C_{11}H_{16}N_2O_2HCl$ Pondus moleculare 244,6	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Pimpinella alba	Pimpinella Saxifraga L. et Pimpinella magna L. Fam. nat.: Umbelliferae	Radix recens mense Maio collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pinus abies	Abies excelsa Poiret Fam. nat.: Pinaceae	Germina recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Pinus Lambertiana	Pinus Lambertiana Douglas Fam. nat.: Pinaceae	Germina recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pinus silvestris	Pinus silvestris L. Fam. nat.: Pinaceae	Germina recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Piper methysticum	Piper methysticum Forster Fam. nat.: Piperaceae	Rhizoma recens cum radicibus adhaerentibus. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Piper nigrum	Piper nigrum L. Fam. nat.: Piperaceae	Fructus immaturi siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Pirola rotundifolia	Pirola rotundifolia L. Fam. nat.: Pirolaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pirola uniflora	Pirola uniflora L. Fam. nat.: Pirolaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Piscidia Erythrina	Piscidia Erythrina L. Fam. nat.: Papilionaceae	Cortex radices recens collectus, cum planta florere inciperet, foliis nondum apparentibus. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pix liquida	Pix liquida destillatione e ligno variorum Pinacearum generum effecta	Ad triturationem sec. § 8 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Plantago lanceolata	Plantago lanceolata L. Fam. nat.: Plantaginaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Plantago major	Plantago major L. Fam. nat.: Plantaginaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Plantago media	Plantago media L. Fam. nat.: Plantaginaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Plantago ovata	Plantago ovata Forskål Fam. nat.: Plantaginaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Platanus occidentalis	Platanus occidentalis L. Fam. nat.: Platanaceae	Cortex recens ramulorum novello- rum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Platinum chloratum † Platina muriatica	$H_2PtCl_6, 6H_2O$ Pondus moleculare 518,1	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2, et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2—D 4 c. Aqua, ceterae dil. c. Spir. v. 45%. Triturationes et dilutiones usque ad dil. D 3 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis veneant.
Platinum colloidal	Pt	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$. Dil. semper recens parentur.
Platinum bijodatum †	PtJ_2 Pondus moleculare 449,0	Ad triturationem sec. § 7
Platinum metallicum	Pt Pondus atom. 195,2	Ad triturationem sec. § 7
Platinum-Natrium chlo- raturum † Platinum muriaticum natronatum	$Na_2PtCl_6 + 4H_2O$ Pondus moleculare 526,064	Ad triturationem sec. § 7, idque quod facile diffluit, a trit. D 2 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Plectranthus fruticosus	Plectranthus fruticosus L'Héritier Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Plumbago europaea	Plumbago europaea L. Fam. nat.: Plumbaginaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Plumbago littoralis	Plumbago littoralis L. Fam. nat.: Plumbaginaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Plumbum aceticum †	$Pb(C_2H_3O_2)_2 + 3H_2O$. Pondus moleculare 379,3	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Plumbum metallicum †	Pb Pondus atom. 207,2	Ad triturationem sec. § 7
Plumeria †	Plumeria acutifolia Poir. Fam. nat.: Apocynaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Podophyllum †	Resina rhizomatis Podophylli peltati L., quae Berberidacea in America septentrionali existit	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Podophyllum †	Podophyllum peltatum Willdenow Fam. nat.: Berberidaceae	Rhizoma recens cum radicibus adhaerentibus collectum exeunte mense Octobri vel ineunte mense Novembri, postquam fructus per- maturuerunt. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Polemonium caeruleum	Polemonium caeruleum L. Fam. nat.: Polemoniaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Polygala amara	Polygala amara L. Fam. nat.: Polygalaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Polygonum amphibium	Polygonum amphibium L. Fam. nat.: Polygonaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Polygonum aviculare	Polygonum aviculare L. Fam. nat.: Polygonaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Polygonum maritimum	Polygonum maritimum L. Fam. nat.: Polygonaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Polyporus pinicola	Polyporus pinicola Fries Fam. nat.: Polyporaceae	Fungus recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Populus candicans	Populus balsamifera L. var. Populus candicans Aiton Fam. nat.: Salicaceae	Gemmae recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Populus tremuloides	Populus tremuloides Michaux Fam. nat.: Salicaceae	Aequales partes corticis interioris recentis ramulorum novellorum et foliorum. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Portulaca	Portulaca oleracea L. Fam. nat.: Portulacaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Potamogeton natans	Potamogeton natans L. Fam. nat.: Potamogetonaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Potentilla anserina	Potentilla anserina L. Fam. nat.: Rosaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Potentilla aurea	Potentilla aurea L. Fam. nat.: Rosaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Potentilla erecta	Potentilla recta L. Fam. nat.: Rosaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Potentilla reptans	Potentilla reptans L. Fam. nat.: Rosaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Primula veris	Primula officinalis Jacquin Fam. nat.: Primulaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Prinos verticillatus	Ilex verticillata A. Gray Fam. nat.: Aquifoliaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Prunella vulgaris	Prunella vulgaris L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Prunus domestica	Prunus domestica L. Fam. nat.: Rosaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Prunus Mahaleb	Prunus Mahaleb L. Fam. nat.: Rosaceae	Cortex recens ramulorum no- vellorum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Prunus Padus e cortice	Prunus Padus L. Fam. nat.: Rosaceae	Cortex recens ramulorum no- vellorum collectus, cum planta floreret. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Prunus Padus e foliis	Prunus Padus L. Fam. nat.: Rosaceae	Folia recentia, cum planta floreret, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Prunus spinosa	Prunus spinosa L. Fam. nat.: Rosaceae	Flores recentes se pendentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Psoralea bituminosa	Psoralea bituminosa L. Fam. nat.: Papilionaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Ptelea trifoliata	Ptelea trifoliata L. Fam. nat.: Rutaceae	Partes aequales foliorum recen- tium et corticis novelli, postquam fructus maturuerunt, sed ante- quam folia flaccuerunt. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pulmonaria vulgaris	Pulmonaria officinalis L. Fam. nat.: Boraginaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Pulsatilla †	Pulsatilla pratensis Miller Fam. nat.: Ranunculaceae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Dr. Schwabe, Pharmacopoea.

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Pulsatilla Nuttaliana †	Pulsatilla Nuttaliana Sprengel Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Pyrethrum	Anacyclus officinarum Hayne Fam. nat.: Compositae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Pyrethrum roseum e flo- ribus	Chrysanthemum roseum Weber et Mohr Fam. nat.: Compositae	Flores siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Quassia amara	Quassia amara L. et Picrasma excelsa Lindley Fam. nat.: Simarubaceae	Lignum siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Quebracho	Aspidosperma Quebracho Schlechtendal Fam. nat.: Apocynaceae	Cortex siccatus trunci et ramo- rum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Quercus e cortice	Quercus Robur L. Fam. nat.: Cupuliferae	Cortex recens ramulorum novel- lorum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Quercus e glandibus	Vide Quercus e cortice	Fructus siccati cum cortice. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Quillaya	Quillaya Saponaria Molina Fam. nat.: Rosaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Radium bromatum	Ra Br ₂ Pondus moleculare 385,84	Ad solut. $\frac{1}{1000000}$ c. Aqua. Ceterae dil. c. Spirit. v. 45%.
Ranunculus acer †	Ranunculus acer L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens mensibus Maio et Junio vel Octobri collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ranunculus bulbosus †	Ranunculus bulbosus L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Planta recens florida mense Junio collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ranunculus Ficaria †	Ficaria verna Hudson Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ranunculus Flammula †	Ranunculus Flammula L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens mense Octobri col- lecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ranunculus glacialis †	Ranunculus glacialis L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Ranunculus repens †	Ranunculus repens L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens mense Octobri col- lecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ranunculus sceleratus †	Ranunculus sceleratus L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Herba recens mense Octobri col- lecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Raphanistrum arvense	Raphanus Raphanistrum L. Fam. nat.: Cruciferae	Planta recens, antequam floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Raphanus sativus var. niger	Raphanus sativus L. var. niger D. C. Fam. nat.: Cruciferae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ratanhia	Krameria triandra Ruiz et Pavon Fam. nat.: Caesalpiniaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Rhamnus cathartica	Rhamnus cathartica L. Fam. nat.: Rhamnaceae	Fructus recentes maturi. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Rheum	Rheum palmatum L., var. tanguticum Maximowicz Fam. nat.: Polygonaceae	Rhizoma usque ad Cambium de- corticatum. 10 partes ponderatae radicis Rhei pulveratae cum 2,5 partibus ponderatis Kalii carbonici et 2,5 partibus ponderatis Aquae ad spissam pultem subigantur atque tanta copia Spir. v. 60% percolentur, ut tota copia 100 partium sit. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Rheum e rhizomate rec.	Vide Rheum L.	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rhododendron	Rhododendron chrysanthum Pallas Fam. nat.: Ericaceae	Rami siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Rhododendron ferrugine- um	Rhododendron ferrugineum L. Fam. nat.: Ericaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Rhus aromatica †	Rhus aromatica Aiton Fam. nat.: Anacardiaceae	Cortex radicis recens. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Rhus glabra †	Rhus glabra L. Fam. nat.: Anacardiaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rhus radicans †	Rhus Toxicodendron Michaux Var. radicans L. Fam. nat.: Anacardiaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rhus Toxicodendron †	Rhus Toxicodendron Michaux Fam. nat.: Anacardiaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Rhus venenata †	Rhus venenata DC. Fam. nat.: Anacardiaceae	Partes aequales corticis recentis et foliorum recentium. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rhus Vernix †	Rhus Vernix Thunberg Fam. nat.: Anacardiaceae	Partes aequales corticis recentis et foliorum recentium. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Ricinus communis †	Ricinus communis L. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$. Dil. D 2 et D 3 c. Spir. v. 90%, D 4 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Robinia Pseudacacia	Robinia Pseudacacia L. Fam. nat.: Papilionaceae	Cortex recens ramulorum novello- rum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rosa	Rosa centifolia L. Fam. nat.: Rosaceae	Folia florum recentia. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rosa canina	Rosa canina L. Fam. nat.: Rosaceae	Folia florum recentia. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rosmarinus officinalis	Rosmarinus officinalis L. Fam. nat.: Labiatae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Rubia tinctorum	Rubia tinctorum L. Fam. nat.: Rubiaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Rudbeckia hirta	Rudbeckia hirta L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Rumex	Rumex crispus L. Fam. nat.: Polygonaceae	Radix recens vere collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Rumex Acetosa	Rumex Acetosa L. Fam. nat.: Polygonaceae	Radix recens mense Junio col- lecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Rumex Patientia	Rumex Patientia L. Fam. nat.: Polygonaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Ruta	Ruta graveolens L. Fam. nat.: Rutaceae	Herba recens, antequam floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sabadilla †	Schoenocaulon officinale (Schlechtendal) Asa Gray, (Sabadilla officinarum Brandt) Fam. nat.: Liliaceae	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sabal serrulatum	Sabal serrulatum Schulthes Fam. nat.: Palmae	Bacae recentes maturae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sabattia angularis	Sabattia angularis Pursh Fam. nat.: Gentianaceae	Planta florida siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sabina †	Juniperus Sabina L. Fam. nat.: Pinaceae	Sumitates recentes cum foliis. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sagittaria sagittifolia	Sagittaria sagittifolia L. Fam. nat.: Alismataceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Salamandra maculata †	Secretum e glandulis cutis Sala- mandrae maculatae Laurier Fam. nat.: Salamandridae	Ad triturationem sec. § 8
Salix alba	Salix alba L. Fam. nat.: Salicaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Salix nigra	Salix nigra Marshall Fam. nat.: Salicaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Salix purpurea	Salix purpurea L. Fam. nat.: Salicaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Salvia officinalis	Salvia officinalis L. Fam. nat.: Labiatae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Sambucus canadensis	Sambucus canadensis L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Partes aequales foliorum recen- tium et florum. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sambucus Ebulus	Sambucus Ebulus L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Bacae recentes maturae. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Sambucus e cortice	Sambucus nigra L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Cortex recens interior ramulorum novellorum. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Sambucus e floribus	Vide Sambucus e cortice	Flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sambucus nigra	Vide Sambucus e floribus	Partes aequales foliorum et flo- rum recentium. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sanguinaria	Sanguinaria canadensis L. Fam. nat.: Papaveraceae	Rhizoma siccatum cum radicibus adhaerentibus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sanguinarinum nitricum †	Nitricum alkaloideum mixtum e radice Sanguinariae canad. L.	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Sanguisorba officinalis	Sanguisorba officinalis L. Fam. nat.: Rosaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sanicula europaea	Sanicula europaea L. Fam. nat.: Umbelliferae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Santalum album	Santalum album L. Fam. nat.: Santalaceae	Lignum siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Santoninum †	$C_{15}H_{18}O_3$ Pondus moleculare 246,1	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Saponaria	Saponaria officinalis L. Fam. nat.: Caryophyllaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sarracenia purpurea	Sarracenia purpurea L. Fam. nat.: Sarraceniaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Sarsaparilla	<i>Smilax saluberrima</i> Gilg, <i>S. medica</i> Schlecht. et Cham., <i>S. officinalis</i> H. B. Kth. etc. Fam. nat.: Liliaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sassafras	<i>Sassafras officinalis</i> Fr. Nees Fam. nat.: Lauraceae	Cortex radices siccatus. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Saururus cernuus	<i>Saururus cernuus</i> L. Fam. nat.: Saururaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Saxifraga	<i>Saxifraga granulata</i> L. Fam. nat.: Saxifragaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Scabiosa arvensis	<i>Knautia arvensis</i> Coulter Fam. nat.: Dipsacaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Scabiosa Succisa	<i>Succisa pratensis</i> Moench Fam. nat.: Dipsacaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Scammonium †	<i>Convolvulus Scammonia</i> L. Fam. nat.: Convolvulaceae	Sucus lacteus inspissatus ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Scilla †	<i>Urginea maritima</i> Baker Fam. nat.: Liliaceae	Bulbus recens ruber. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Scolopendrium	<i>Scolopendrium vulgare</i> Smith Fam. nat.: Polypodiaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Scopolaminum hydro- bromicum ††	$C_{17}H_{21}NO_4$, HBr + $3H_2O$ Pondus moleculare 438,2	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Scordium	<i>Teucrium Scordium</i> L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Scorpio europaeus †	<i>Euscorpius italicus</i> Herbst Fam. nat.: Scorpionida (Arachnoidea)	Animal vivum contritum ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Scrophularia nodosa	<i>Scrophularia nodosa</i> L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Planta recens, antequam floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Scutellaria lateriflora	<i>Scutellaria lateriflora</i> L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Secale cereale	Secale cereale L. Fam. nat.: Gramineae	Spicae florum recentes. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Secale cornutum †	Claviceps purpurea Tulasne Fam. nat.: Pyrenomycetae	Sclerotium siccatum. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sedum acre	Sedum acre L. Fam. nat.: Crassulaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Sedum repens	Sedum alpestre Villars Fam. nat.: Crassulaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sedum Telephium	Sedum purpureum Link Fam. nat.: Crassulaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Selenium	Se Pondus atom. 79,2	Ad triturationem sec. § 7
Selinum carvifolium	Peucedanum Chabraei Gaudin Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sempervivum tectorum	Sempervivum tectorum L. Fam. nat.: Crassulaceae	Folia recentia, antequam planta floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Senecio aureus	Senecio aureus L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens, florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Senecio gracilis	Senecio gracilis Pursh Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Senecio Jacobaea	Senecio Jacobaea L. Fam. nat.: Compositae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Senega	Polygala Senega L. Fam. nat.: Polygalaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Senna	Cassia angustifolia Vahl Fam. nat.: Caesalpinaceae	Folia siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sepia	Sepia pura, quae continetur bursa tinctoria Sepiae officinalis L., quae est in mari Mediterraneo et Germanico, atque in Oceano At- lantico Fam. nat.: Cephalopodae	Ad triturationem sec. § 7

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Serpentaria	Aristolochia Serpentaria L. Fam. nat.: Aristolochiaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Serpyllum	Thymus Serpyllum L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Silicea	Compositio chemica haec fere est: H_2SiO_3	Ad triturationem sec. § 7 (Ad rationem subst. orig. 100% continentis)
Silphion †	Thapsia Silphium Visiani Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Silphium laciniatum	Silphium laciniatum L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Simaruba	Simaruba amara Aublet et glauca DC. Fam. nat.: Simarubaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sinapis alba	Sinapis alba L. Fam. nat.: Cruciferae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sinapis nigra †	Brassica nigra Koch Fam. nat.: Cruciferae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Solanum Arrebenta †	Solanum aculeatissimum Jacquin Fam. nat.: Solanaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Solanum carolinense †	Solanum carolinense L. Fam. nat.: Solanaceae	Bacae recentes maturae. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Solanum Lycopersicum	Solanum Lycopersicum L. Fam. nat.: Solanaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Solanum mammosum †	Solanum mammosum L. Fam. nat.: Solanaceae	Bacae recentes maturae. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Solanum nigrum †	Solanum nigrum L. Fam. nat.: Solanaceae	Tota planta recens florida. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Solanum Pseudocapsi- cum	Solanum Pseudocapsicum L. Fam. nat.: Solanaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Solanum tuberosum aegrotans †	Partes aegrotantes, quae efficiuntur fungis variis bulborum Solani tuberosi L. Fam. nat.: Solanaceae	Fuscae partes aegrotantes recentes. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Solanum villosum †	Solanum villosum Lamarck Fam. nat.: Solanaceae	Planta recens florida. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Solidago Virga aurea	Solidago Virga aurea L. Fam. nat.: Compositae	Flores recentes. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Sophora japonica	Sophora japonica L. Fam. nat.: Leguminosae	Semina matura siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Spartium scoparium	Sarothamnus scoparius Wimmer Fam. nat.: Leguminosae	Flores recentes. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Spigelia †	Spigelia Anthelmia L. Fam. nat.: Loganiaceae	Herba siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Spigelia marylandica †	Spigelia marylandica L. Fam. nat.: Loganiaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Spilanthes oleracea	Spilanthes oleracea Jacquin Fam. nat.: Compositae	Herba florida siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Spiraea Ulmaria	Filipendula Ulmaria Maximowicz (Spiraea Ulmaria L.). Fam. nat.: Rosaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Spiranthes autumnalis	Spiranthes autumnalis Richard Fam. nat.: Orchidaceae	Planta recens florida. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Spiritus nitrico-aethereus	Spiritus Aetheris nitrosi cum parva copia Aldehydi et Aetheris acetici	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Spongia	Euspongia officinalis L. Fam. nat.: Spongiidae (Coelenterata)	Spongia tosta. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Stachys recta	Stachys recta L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Stannum	Sn Pondus atom. 119	Ad triturationem sec. § 7
Stannum chloratum †	$\text{SnCl}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$	Ad triturationem sec. § 7, idque, quod facile diffluit, a tritura- tione D 2
Staphisagria †	Delphinium Staphisagria L. Fam. nat.: Ranunculaceae	Semina caute siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sticta	Lobaria pulmonaria Hoffmann Aceris saccharini Wangenheim Fam. nat.: Parmeliaceae	Lichen recens a cortice arboreo adhaerente optime liberatus. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Stigmata maydis	Zea Mays L. Fam. nat.: Gramineae	Stigmata maydis recentia. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Stillingia silvatica	Stillingia silvatica (L.) Müll. Arg. Fam. nat.: Euphorbiaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Stramonium †	Datura Stramonium L. Fam. nat.: Solanaceae	Herba recens, cum florere in- ciperet, collecta. — Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Stramonium e seminibus †	Vide Stramonium	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Strontium bromatum †	$\text{SrBr}_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 355,54	Ad triturationem sec. § 7, idque, quod facile diffluit, ad trit. D 2 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Strontium carbonicum	SrCO_3 Pondus moleculare 147,6	Ad triturationem sec. § 7
Strophanthus †	Strophanthus gratus Franchet Fam. nat.: Apocynaceae	Semina siccata aristis liberata. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Strychninum ferri-citri- cum ††	—	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Strychninum nitricum ††	$C_{21}H_{22}N_2O_2 + HNO_3$ Pondus moleculare 397,2	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Stryphnodendron	Stryphnodendron Barbatimao Martius Fam. nat.: Mimosaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Sulfur	S Pondus atom. 32,07	Ad triturationem sec. § 7. Ad solutionem parandam 5 partes ponderatae Sulfuris in 1000 par- tibus Spir. v. 90% ad refrigerato- rem refluxum per longius tempus coquantur, deinde solutio refrige- rata duplici copia ponderata Spir. v. 90% diluatur. Haec est quarta dilutio decimalis. Qu. m. m. $\frac{1}{10000}$ Dil. D 5 c. Spir. v. 90%, D 6 c. Spir. v. 60%, ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Sulfur iodatum †	Sulfur et Jodum ita compositum vel mixtum, ut formula chemica circiter: S_2J_2 sit.	Ad triturationem sec. § 7. Tri- turationes D 1 et D 2 in lagoenis epistomio vitreo praeclusis ve- neant.
Sumbulus moschatus	Euryangium Sumbul Kaufmann Fam. nat.: Umbelliferae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Symphoricarpus racemo- sus	Symphoricarpus racemosus Michaux Fam. nat.: Caprifoliaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Symphytum	Symphytum officinale L. Fam. nat.: Borraginaceae	Radix recens, antequam planta floruit, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Symphytum ad usum externum	Symphytum officinale L. Fam. nat.: Borraginaceae	1 pars ponderata massae contritae cum Spir. v. 90% duplici pondere suci, qui massa continetur, et cum eadem copia ponderata Spir. v. 60% subacta ita tractetur, ut ad essentias parandas § 3 prae- ceptum est.
Syringa vulgaris	Syringa vulgaris L. Fam. nat.: Oleaceae	Flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — • Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Syzygium Jambolanum	<i>Eugenia Jambolana</i> Lamarck (<i>Syzygium Jambolanum</i> DC.) Fam. nat.: Myrtaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Syzygium Jambolanum e cortice	Vide <i>Syzygium Jambolanum</i>	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Tabacum †	<i>Nicotiana Tabacum</i> L. Fam. nat.: Solanaceae	Folia Tabaci Havannae non fer- mentata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Tabacum e seminibus †	Vide <i>Tabacum</i>	Semina matura siccata. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Tamarindus	<i>Tamarindus indica</i> L. Fam. nat.: Caesalpiniaceae	Pulpa Tamarindorum depurata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Tamarix	<i>Myricaria germanica</i> Desvaux Fam. nat.: Tamaricaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Tamus communis †	<i>Tamus communis</i> L. Fam. nat.: Dioscoreaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Tanacetum vulgare	<i>Tanacetum vulgare</i> L. Fam. nat.: Compositae	Partes aequales foliorum et flo- rum recentium. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Tarantula †	<i>Tarentula fasciiventris</i> Dufour Fam. nat.: Arachnoidea	<i>Tarentula viva</i> contrita ad tinc- turam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 60% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Taraxacum	<i>Taraxacum officinale</i> Weber Fam. nat.: Compositae	Tota planta recens, cum florere inciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Tartarus natronatus	$(\text{CHOH} \cdot \text{COO})_2\text{KNa} + 4\text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 282,20	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Tartarus stibiatus †	$(\text{C}_4\text{H}_4\text{O}_6(\text{SbO})\text{K})_2 + \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 667,8	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Taxus baccata †	Taxus baccata L. Fam. nat.: Coniferae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Terebinthina Chios	Resina Terebinthinae Chios Pistacia Terebinthus Scopoli Fam. nat.: Anacardiaceae	Ad solutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Teucrium creticum	Teucrium creticum L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Teucrium Scorodonia	Teucrium Scorodonia L. Fam. nat.: Labiatae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Thallium aceticum †	$\text{TI}(\text{CH}_3\text{COO})$ Pondus moleculare 263,42	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Thallium sulfuricum †	TI_2SO_4 Pondus moleculare 300,47	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5b. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Thapsia †	Resina trunci et radicis Thapsiae garganicae L. Fam. nat.: Umbelliferae	Ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Thea chinensis	Camellia Thea Link Fam. nat.: Camelliaceae	Frondes siccatae cum foliis et floribus novellis. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Theobromino-Natrium salicylicum †	Diuretinum	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Theridion curassavicum †	Theridium curassavicum Fam. nat.: Arachnoidea	Animal vivum contritum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Thlaspi Bursa pastoris	Capsella Bursa pastoris Moench. Fam. nat.: Cruciferae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Thuja	Thuja occidentalis L. Fam. nat.: Coniferae	Rami recentes, cum florere in- ciperent, cum foliis collecti. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Thymolum	$\text{C}_{10}\text{H}_{14}\text{O}$ Pondus moleculare 150,1	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Thymus vulgaris	Thymus vulgaris L. Fam. nat.: Labiatae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Tilia europaea	Tilia ulmifolia Scopoli (T. cordata Mill.) et platyphyllos Scopoli Fam. nat.: Tiliaceae	Flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Tonca	Dipterix odorata Willdenow Fam. nat.: Papilionaceae	Semina siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Tormentilla	Potentilla Tormentilla Scopoli Fam. nat.: Rosaceae	Rhizoma recens vere collectum. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Tradescantia diuretica	Tradescantia diuretica Martius Fam. nat.: Commelinaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Trifolium arvense	Trifolium arvense L. Fam. nat.: Papilionaceae	Planta recens mense Julio collecta. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Trifolium repens	Trifolium repens L. Fam. nat.: Papilionaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Trillium pendulum	Trillium erectum L. Fam. nat.: Liliaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Triosteum perfoliatum	Triosteum perfoliatum L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Triticum repens	Triticum repens L. Fam. nat.: Gramineae	Rhizoma recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Tuberculinum Koch †	Bacillae tuberculosae praeparatae	Ad triturationem sec. § 8 et ad solutionem sec. § 5b c. Glyc. parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$ Dilutiones D 2—D 6 c. Glyc., ceterae dil. c. Spir. v. 45%
Typha latifolia	Typha latifolia L. Fam. nat.: Typhaceae	Rhizoma recens. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Ulmus campestris	Ulmus campestris L. Fam. nat.: Ulmaceae	Cortex interior recens ramulorum novellorum. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Upas Tieuté †	Strychnos Tieuté Leschen Fam. nat.: Loganiaceae	Cortex radices siccatus. Ad tinc- turam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Uranium nitricum ††	$(\text{UO}_2)(\text{NO}_3)_2 + 6 \text{H}_2\text{O}$ Pondus moleculare 502,3	Ad triturationem sec. § 7 idque, quod facile diffluit, a trituratione D 2 et ad solutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Urea nitrica	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2\text{HNO}_3$ Pondus moleculare 124,29	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Urea pura	$\text{CO}(\text{NH}_2)_2$ Pondus moleculare 60,05	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6a c. Spir. v. 45%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Urtica	Urtica urens L. Fam. nat.: Urticaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Urtica ad usum externum	Vide Urtica urens	Planta recens florida. 1 pars pon- derata massae contritae c. Spir. v. 90% duplici pondere suci, qui massa continetur, et cum eadem copia ponderata Spir. v. 60% sub- acta ita tractetur, ut ad essentias parandas § 3 praeceptum est.
Urtica dioica	Urtica dioica L. Fam. nat.: Urticaceae	Herba recens. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Ustilago Maydis	Ustilago Maydis DC. Fam. nat.: Ustilaginaceae	Sporae fungi. Ad tincturam sec. § 4 maceratione c. Spir. v. 90% parandam. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Uva ursi	Arctostaphylos Uva ursi Sprengel Fam. nat.: Ericaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Valeriana	Valeriana officinalis L. Fam. nat.: Valerianaceae	Radix siccata. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Vanilla	Vanilla planifolia Andrews Fam. nat.: Orchidaceae	Fructus siccati. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Veratrum †	Veratrum album L. Fam. nat.: Liliaceae	Rhizoma caute siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Veratrum viride †	Veratrum viride Aiton Fam. nat.: Liliaceae	Rhizoma cum radicibus adhaeren- tibus siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Verbascum	Verbascum thapsiforme Schrader et Verbascum phlomoides L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Herba recens, cum florere in- ciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Verbascum ad usum ex- ternum	Vide Verbascum	Herba recens, cum florere in- ciperet, collecta. 1 pars ponde- rata massae contritae c. Spir. v. 90% duplici pondere suci, qui massa continetur, et cum eadem copia ponderata Spir. v. 60% subacta ita tractetur, ut ad essen- tias parandas § 3 praeceptum est.
Verbena hastata	Verbena hastata L. Fam. nat.: Verbenaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Verbena officinalis	Verbena officinalis L. Fam. nat.: Verbenaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Verbena urticaefolia	Verbena urticaefolia L. Fam. nat.: Verbenaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Veronica	Veronica officinalis L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Veronica Beccabunga	Veronica Beccabunga L. Fam. nat.: Scrophulariaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Viburnum odoratissimum	Viburnum odoratissimum Ker-Gawl. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Folia recentia et flores recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Viburnum Opulus	Viburnum Opulus L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Cortex recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Viburnum prunifolium	Viburnum prunifolium L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Fructus recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Vicia Faba	Vicia Faba L. Fam. nat.: Papilionaceae	Planta recens, quae defloruit. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Vinca minor	Vinca minor L. Fam. nat.: Apocynaceae	Planta recens, cum florere in- ciperet, collecta. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Vincetoxicum †	Vincetoxicum officinale Moench Fam. nat.: Asclepiadaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Viola odorata	Viola odorata L. Fam. nat.: Violaceae	Planta recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Viola tricolor	Viola tricolor L. Fam. nat.: Violaceae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Vipera Berus ††	Vipera Berus L. Fam. nat.: Viperinae (Ophidia)	Venenum, quod inest in maxillae glandulis. Ad triturationem sec. § 8
Vipera Redii ††	Vipera Aspis L. Fam. nat.: Viperinae (Ophidia)	Venenum, quod inest in maxillae glandulis. Ad triturationem sec. § 8
Viscum album	Viscum album L. Fam. nat.: Loranthaceae	Partes aequales bacarum et fo- liorum recentium. Ad essentiam sec. § 2. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Vitis vinifera	Vitis vinifera L. Fam. nat.: Vitaceae	Folia recentia. Ad essent. sec. § 1. Qu. m. m. $\frac{1}{2}$
Wyethia helenoides	Wyethia helenoides Nuttall Fam. nat.: Compositae	Radix recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Xanthium spinosum	Xanthium spinosum L. Fam. nat.: Compositae	Herba recens florida. Ad essen- tiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Xanthoxylon fraxineum	Zanthoxylum americanum Miller Fam. nat.: Rutaceae	Cortex siccatus. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 60%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$

Nomen medicamenti	Planta originalis. — Origo. — Compositio chemica	Partes adhibitae. — Paratio medica- menti. — Quantitas medicamenti meri, quae forma medicamenti continetur
Xylosteum	Lonicera Xylosteum L. Fam. nat.: Caprifoliaceae	Bacae maturae recentes. Ad essentiam sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Yucca filamentosa	Yucca filamentosa L. Fam. nat.: Liliaceae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$
Zincum cyanatum ††	$\text{Zn}(\text{CN})_2$ Pondus moleculare 117,40	Ad triturationem sec. § 7.
Zincum metallicum	Zn Pondus atom. 65,38	Ad triturationem sec. § 7.
Zincum sulfuricum †	$\text{ZnSO}_4 + 7\text{H}_2\text{O}$. Pondus moleculare 287,56	Ad triturationem sec. § 7 et ad solutionem sec. § 5a. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Zincum valerianicum †	$\text{Zn}(\text{C}_5\text{H}_9\text{O}_2)_2 + 2\text{H}_2\text{O}$. Pondus moleculare 303,56	Ad triturationem sec. § 7 et ad so- lutionem sec. § 6b c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{100}$
Zingiber	Zingiber officinale Roscoe Fam. nat.: Zingiberaceae	Rhizoma subere amoto siccatum. Ad tincturam sec. § 4 c. Spir. v. 90%. Qu. m. m. $\frac{1}{10}$
Zizia aurea	Thaspium aureum Nuttall Fam. nat.: Umbelliferae	Planta recens. Ad essent. sec. § 3. Qu. m. m. $\frac{1}{3}$