

sunt, ut secundum Hahnemanni praecepta cum liquido vehiculo (Aqua, Spiritu vini) coniunctae ad maiores subtilitatis gradus adduci possint.

In liquidis dilutionibus, quae ex triturationibus parandae sunt, haec pondera adhibere oportet:

Ad 1 partem ponderatam tertiae dilutionis centesimalis vel sextae decimalis in 80 partibus ponderatis Aquae destillatae solutam 20 partes ponderatae Spiritus vini 90% addantur et vasculum, cuius duae partes expletae sint, decies conquassetur. Ita dilutio quarta centesimalis vel octava decimalis efficitur. Dilutio continuetur hoc modo:

a) Secundum scalam centesimalem 1 pars ponderata quartae dilutionis centesimalis 99 partibus Spiritus vini 45% mixta conquassetur, qua re quinta dilutio centesimalis efficitur. Ceterae dilutiones singulis partibus ponderatis priorum dilutionum et 99 partibus ponderatis Spiritus vini 45% mixtis parentur.

b) Secundum scalam decimalem 1 pars ponderata octavae dilutionis decimalis 9 partibus ponderatis Spiritus vini 45% mixta ad nonam dilutionem efficiendam conquassetur; etiam maiores dilutiones Spiritu vini 45% adhibito ratione usitata parentur.

D. De nominibus.

In homoeopathia nomina a ceteris diversa adhiberi solent, quae cum in omnibus enchiridiis et operibus, quae de hac arte sunt, adhibeantur, in hoc quoque libro pro norma accepta sunt.

Ubicunque una species generis plantarum in arte medica adhibetur, medicamen id nomen solum fert, quod is dedit, qui examinavit: nomen generis vel speciei: ut pro Aconito Napello nihil nisi Aconitum, pro Atropa Belladonna nihil nisi Belladonna. Si postea eiusdem generis alia planta examinetur, ut Aconitum Lycotum, ea signetur addito cognomine: Lycot., cum Aconitum semper pro Aconito Napello intellegendum sit.

Eadem ratione usi sumus in nonnullis substantiis anorganicis et praeparatis chemicis, quibus his temporibus alia nomina data sunt. Ea de causa, quam commemoravi, priora nomina retinenda erant.

Iuxta nomina substantiarum principalium in titulo haec adscribentur:

1. Ad mineralia, chemicalia, cetera: 0;
2. Ad tincturas Principales et essentias: Ø.

Dilutiones liquidae significantur per: dil., triturationes per: trit., globuli per: glob., tabulettae per: tabl. Praeterea in omnium dilutionum titulo apponitur, num secundum scalam decimalem vel centesimalem paratae sint, et aut D aut C numero praepositur; ut:

Bismuthum trit. D 2 = *Bismuthi* secunda trituratio decimalis;

Belladonna dil. C 5 = *Atropae Belladonnae* quinta dilutio centesimalis (liquida).

In ordinationibus et mandatis medicorum saepe fit, ut gradus dilutionis solo numero indicetur neque addatur, utrum scala centesimalis an decimalis desideretur. Quod si acciderit, semper, ut supra pag. 14 diximus, secundum scalam centesimalem, quippe quam Hahnemann instituerit, dispensandum est. Nonnulli medici, ut gradum dilutionis indicent, numeris Romanis utuntur. Haec significatio ipsa quoque ab Hahnemanno inventa est:

3. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in milione	partium medicaminis continet =	I.
6. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in billione	partium medicaminis continet =	II.
9. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in trillione	partium medicaminis continet =	III.
12. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in quadrillione	partium medicaminis continet =	IV.
15. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in quintillione	partium medicaminis continet =	V.
18. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in sextillione	partium medicaminis continet =	VI.
21. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in septillione	partium medicaminis continet =	VII.
24. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in octillione	partium medicaminis continet =	VIII.
27. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in nontillione	partium medicaminis continet =	IX.
30. dilutio, quae 1 partem medicamenti meri in decillione	partium medicaminis continet =	X.

Sed hac significatione facile errores existunt, praesertim si eiusmodi ordinatio a pharmacopoeo paratur, cui, quo modo medicus ordinet, notum non est.

Sunt, qui numeris fractis decimalibus ad scalam decimalem et centesimalem significandam utantur (ut $0,2 = 2.$ Dec., $0,02 = 2.$ Centes.), etsi id quoque, postquam ratio grammatum instituta est, pharmacopoeum in errorem inducere potest.

NB. Commodissimum vero est, quod nuper, maxime in Britannia, in consuetudinem venit, dilutiones centesimales simplici numero, dilutiones decimales apposita littera x significare (ut Aconit. $3 = 3.$ dilutio centesimalis, Aconit. $3x = 3.$ dilutio decimalis).

E. De rationibus generalibus medicamenta homoeopathica examinandi.

Iam breviter doceamus, quo modo medicamenta homoeopathica examinanda sint, qua in re simplices actiones et chemicas et physicas omnibus notas esse confidimus.

A. Rationes medicamenta liquida examinandi.

1. Pondus specificum.

Pondus specificum aut Libra a Mohr-Westphal constructa aut pycnometro exploretur, idque calore $17,5^{\circ}$ C effecto.

Si pondus specificum alio calore exploratum erit, in liquoribus spirituosus correctura, quae ad ea, quae volumus, perficienda satis accurata est, ita fiat, ut, si calor maior $17,5^{\circ}$ fuit, pro unoquoque gradu 0,0007 addantur, sin autem calor minor fuit, pro unoquoque gradu 0,0007 subtrahantur.

Qui essentias accurate secundum praecepta in singulis paragraphis data paraverit, pondera specifica tincturarum principalium haec fere esse cognoscet:

secundum § 1	0,944
secundum § 2	0,944
secundum § 3	0,905

2. Quantitas Spiritus vini meri.

Quantitas Spiritus vini obiter ex pondere specifico tincturarum principalium vel solutionum spirituosarum vel dilutionum cognosci potest. Ad eam accuratius explorandam 50 ccm eius praeparati, quod examinandum est, cucurbitae destillatoriae infundantur atque additis 100 ccm Aquae et 50 ccm Natrii chlorati vel Natrii sulfurici (ne liquor ebulliat, si coquetur) 100 ccm destillando abstrahantur. Liquoris destillando effecti pondere specifico explorato ex tabula alcoholis quantitates indicante quantitas Spiritus vini meri constitui potest.