


A P O L L I N I S

FRANCISCI ALEXANDRI

V E R C E L L E N S I S

M E D I C I,

*Radii Septimus Condita, vel Sacchara,
aut Conseruas decernit.*



ONDITVM: hoc est sapidum, iucundumque linguae, melle, aut saccharo dulcoratum, ad diuturniorem tutelam, & gustus gratiam, simulque vt recentibus proximum videatur, varijs modis vsurpatum est: vt quaedam integra, melle, aut saccharo excoquantur, ad cuius intima vsque, eadem penetrare scilicet possint, vel acu expuncta, aut in frusta prius secta, & intus purgata: quaedam etiam puluerata, in grumos exiguos saccharo coacta, alia absque coctura, eodem permixta. Condiuntur vero plantarum nunc fructus, nunc radices, surculi, atque flores, de quibus ordine dicendum est: condiendi nempe vox recentibus in angustum cogitur.

Chepula myrobalani sic condiuntur: recentes, & humidae si harum est potestas, quotlibet accipiendae sunt, vel saltem arte, & industria humectatae, quae stylo passim compuncto, coquantur ex aqua, igne lento, donec tenerescant, his in asserem misis, aqua exprimentur, deinde, biduo hydromellite mergantur, deinde igne lento clementer coquantur, vase vitreo recondantur, ac melle cui incocta fuerint mergantur. Dantur post sex menses.

Arte sic humectantur, infunde his aquam plurimam, insola dies octo, deinde separatim obrue arena humida, quarto quoque die nouanda, aqua saepe superfusa, donec tumescant, & humectentur: idque vel in dolio, aut alio vase magno fiat, vel in fossa quadam subterranea, magna, et loco humido: idem fit ex *Auic. lib. 5. tract. 7.*

Stomachum, & ventriculum firmant, appetentiam inuiant, coctionem promouent, rationalem animae partem vegetam reddunt, & sensuicam, qua propter visum quoque clariorem, & vsu crebro iuuentutem diu tuentur.

Empellica: aqua effusa soli exponenda, donec tenerescant, & humectentur, tunc expressa, vt priores, biduo hydromellite macerentur, post igne leni coquantur, cocta ubi refrigerint, mellis albi quarta parte adiecta, reconduntur: sunt qui praeterea condiant aromatibus, cinnamomo, agallocho, cardamomo, croco, moscho, gallia, & similibus.

Ventriculum roborant, eius substantiam, & facultatem contrahendo, & intemperiem humidam corrigendo.

Haec duae species, quia sunt amplae, condiri commode possunt, vt etiam citrea, ob id condita ad nos asportantur, raro bellerica, & nigra, & nisi incondita, chepulae itaque, empellica, & citrea, vel recentes, vel vetustae, mangonio condita, quum è longinquis afferantur, maxima animaduersione prius ad intima vsque excutienda sunt, aqua tepida à melligine exuta, an cariosae sint, lignosae, aut verius lapidi, siccitate, et duritie persimiles, quales plurimae in emporijs visuntur, accurate indagandae. Tanti .n. fiunt, & saepe maioris quam pro merito, ob raritatem, sumptum, & quia à distantibus locis euectae existimantur. ita nempe communiter fit, ut in hortis nostris collecta, omnium linguae non sapiant, nec ipsae bene concoquantur, nisi ab Indis, aut Antipodibus afferantur: quod si non recentes praesertim, sed post humectationem condita sint, & dentibus non exquisite commansa deglutiantur, suae substantiae duritie, & siccitate, ventriculum potius laedunt, quia difficulter coquantur, & coctioni aduersantur, magisquam astrictione roborando prosint. Chepulae quia ex Aegypto condita ad nos afferuntur, quum cassiam, aut verius ceratiam siliquam oleant, è quarum melligine illas asseruare consueuerunt Indi, atque Aegyptij, ideo aqua madesactae, saccharo rursus condiri à nostratibus consueuere.

Cydonia ampla, nulla putredine vitata, depellata, intus purgata, in frusta idonea secta, coque in iulepo multum aquoso, postridie in iulepo alio propemodum perfecte cocto, percoque aromatiza moscho, nase nitreo reponere, eo iulepo cui incocta sint superdato. sunt qui ex melle coquunt: alij ex supa, aut vino ex *Auic. lib. 5. tract. 7.* alij praeterea cōdiunt aromatibus: alij aliter. hodie quadripartita, intus, & foris purgata, saccharo cōdiuntur.

Fluorem alui, vomitumque sistunt, ventriculum roborant, ob id coctionem iuuant.

Celu

Gelu cotoneorum, vulgo gelatina.

Recipe cotonea quadrifariam secta, cortice, & seminibus purgata, tantisper coque ex aqua, donec tabescant, postea setaceo, vel lintheo raro trans mitte, sine compressione, deinde cum saccharo percoque, ad cerati consistentiam pari amborum portione aliis sacchari clarefacti dimidio. si uero quod restat uolentius transactum, saccharo, uel melle, ad emplastri quasi compagem percoquatur, cydoniatu uile constituit: primu uero res est perlucida, pulcherrima, & gustu gratissima.

Diacydonium vulgare.

Fit ut prius, tam crasso, quam claro simul excreto, cum saccharo ut prius percocto.

Alium sistit ante epulas sumptum, post uero comprimendo soluit, & vapores caput petere vetat, ideo fluxu, & vomitum diuersimode compescit.

Diacydonium ex succo cydoniorum, alijs compositum.

Recipe succi cotoneorum, & mellis despumati, añ. libr. iij. aceti puri, libr. ij. coque igne lento semper despumando, ad mellis crassitiem, tunc insperge peris longi, zingiberis, cinnamomi, añ. vnc. i. caryophyll. ligni aloes, añ. vnc. med. moschi, scrup. i. fit interdum sine aromatibus pro uaria utentium necessitate, fit & cum saccharo: alii aliter parant, ut ex Alexandro, Diamelon duplex, lib. 7. cap. 8.

Appetentiam languentem excitat, ventriculum, & hepar roborat, coctionem iuuat, & retentricem.

Non multum variat à Galeni compositione, 6. de tuenda sa. cap. 15. unde hæc quibusdam additis, ut etiam ponderibus immutatis, transumpta videtur, veluti etiam plures Auicennæ traditiones, 5. can. D. 3. Fen 13. ut alia quoque ex Mes.

Pyra condienda sunt ut cotonea. Cor, & stomachum tuentur.

Poma condita ut supra. Cor firmant, syncopem, & cordis palpitationem sedant.

Poma condita cum aromat. officinis electarium, sine conditum de pomis aromaticum.

Recipe carniū pomorum dulcium, & redolentium, intus & foris purgatorum, & in frusta incisorum, libr. vi. sacchari, libr. v. aquæ ros. libr. ii. ligni aloes, drach. v. santalorum, citrearum, drach. iii. caryophyll. vnc. med. cinnamomi, drach. iii. & med. ambari, drach. ii. moschi, scrup. i. eodem modo condiuntur poma acida, parua, & aromatica.

Cordis, & ventriculi imbecillitatem firmat.

Conditum ex amarinis, vulgo diamarenatum.

Recipe amarinas acidodulces, leuiter excoque aqua simplici, ut cortices cum nucleis remaneant, eidem aquæ par saccharum adicito, liqua, & agita ad electarii concrementum, uasculis reponere. sunt qui amarinas saccharo clarefacto condiant. nec desunt qui gelu ex iisdem parent: alii aliter succo amarinarum saccharum clarificantes, eo amarinas excoctas excipientes.

Perfica, ut cydonia condiuntur. Ventriculum calidum, & cor firmant, sitim sedant, oris foetorem emendant.

Conditum ex persicis aromaticum off. electarium.

Recipe persicorum propemodum maturorum, intus, & foris purgatorum, & succi persicorum aliorum, añ. libr. iii. tere persica in medullæ consistentiam, coque cum syrupo, ut in condito ex cydoniis dictum est: ubi coctum erit, superasperge ligni aloes, santalorum citrearum, añ. drach. ii. cinnamomi, cubebe, macis añ. vnc. med. moschi, scrup. med.

Ventriculi ardore mitigando ipsu roborat, sitim exstinguit, ablatis videlicet aromatib⁹, tetrū oris halitū emēdar.

Radius Septimus

Conditum ex fructibus, off. electarium, vel syrupus.

R Ecipe carniū cydoniorum, pyrorum austerorum, & malorum acidorum, aceri, omphacij, in quo rhu vigintiquatuor horis infusum fuerit, an. libr. i. carniū sorborum immaturorum, unc. v. sacchari, libr. quatuor, coque ad mellis crassitiem, percoctis adde succi oxyacanthæ, vnc. ii. antispodij, seminis, oxalidis, an. vnc. i. vase vitreo reponē.

Datur à drach. ij. ad tres, cum frigida, aut succo citrij, & ribes, vel alio eiusdem naturæ.

Stomachum, omniaque intestina roborat; ideo omnem fluorem compescit, eorum intemperiem calidam corrigit, appetentiam inuitat.

Prepositus scribit sacchari, lib. iij. oxyacanthæ, vnc. iij. antispodij, seminis oxalidis, an. vnc. ij. Quidam hoc modo parant. rhu per diem naturalem aceto macerant, saccharū omphacio dissolunt, addunt acetum, ac fructuum carnes coquunt ad concrementum, adiungunt succum oxyacanthæ, & pulueres antispodij, ac oxalidis: coctum ubi fuerit recondunt.

Conditum ex prunis.

R Ecipe carniū prunorum nigrorum, oblongorum, mediorum, subdulcium, elixatorum in aqua, cui portulaca fuerit incocta, libr. ij. sacchari albi libr. i. aquæ violarum libr. ij. coque igne lento ad crassitudinem, reconde vase vitreo.

Ventriculi ardorem, & inde natam sitim extinguit, febres mitigat, aluum soluit.

Conditum ex sorbis.

R Ecipe carnis sorborum propemodum maturorū, coctorum in aqua, cui prius rosæ, & cortices granatorum incoctæ fuerint, libr. iij. mellis aut sacchari, libr. ii. & med. coque ad crassitudinem, & reconde vase. Da vnc. i.

Ventriculum roborat, immodicam purgationem sistit.

Idem ex mespilis, & his similibus fieri potest, ex cornis autem, quibusdam confectio cornalina dicitur, ex eorum liquore, & saccharo coctis, & coagulatis, gratissimi gustus dysentericis, & mulieribus mensium profusione affectis utilissima.

Citra, vel Aurentia condita.

R Ecipe cort. aurantiorum, tum magnorum quam uola manus capere potest, carne purgati, lixiuo claro mergantur dies nouem, mutato ad diem quintū, post merge aqua clara, donec amaritudine deposita dulcescant, tunc vase mundo aqua fontis plurima coquantur, donec tenerescant, aquosa deinde substantia ab his expressa, in vase lapideo mergantur, vigintiquatuor horis iulepo sufficienti, ex saccharo albo, & aqua tripla constante, post coquantur igne lento ad penidiorum consistentiam, extracti ex hoc iulepo cortices, vase vitreo reponantur, superfuso singulis uicissim uelut incrustandis iulepo ros. ad mediocrem ceu sacchari candefacti crassitiem cocto. sunt qui ambaro, & moscho aromatizant. Datur post mensem.

Ventriculum, corque roborant, coctionem iuuant, oris halitum commendant.

Condita citria, aut cydonia, idem quod superius pollent: duas citriorum condituras deducit etiam Mes. ac Auicenna, lib. 5. Traçt. 7. aromata addit, quæ & cotoneis indi possunt, videlicet cardamomi maioris, & minoris an. aur. i. caryophyll. cinnamomi, an. aur. med. moschi sextam, & medium sextæ drachmæ vnius.

Conditum buglosi aromaticum.

R Ecipe buglosi, menthæ siccæ, florum ros. cort. aut foliorum citrij, an. vnc. iij. ocimi caryophyllati, vnc. i. trium generum cydoniorum, trium generum pomorum, an. vnc. i. & med. serici crudi incisi, nucis moschatæ, zedoariæ, galangæ, ben.

beni. utriusque, fantali citrei, croci, an. drach.i. & med. ligni aloes, drach.ii. vini & aquæ, an. libr. vi. mellis, libr. viii. aromatizetur moschi, scrup. i. galliæ, drach. ii. quidam legunt croci, an. unc. i. & med.

Efficax, & expertum ad cordis tremorem, stomachi imbecillitatem, deiectam appetentiam, coctionem imbecillam, & formæ corruptionem.

Secacul conditum.

R Ecipe secacul radices amplas, albas, teneras, à cortice cineritio, & ligno interno purgatas, in frusta pollicaris crassitudinis sectæ, vno caryophyllo humectatæ, & particula zingiberis humectati, vt mox in zingibere condito dicam; farctæ intus, unde lignosa portio exempta est, coquantur in æquali pondere sacchari, & duplo melle: uel melle solo, sed triplo, coctis addatur pondus aromatum iustum. paulo aliter parat Auicenna, lib. 5. Tract. 7.

Datur ab vnc. i. ad duas: mox etiam à cibo, & ante cibum, vel dormituris largiore etiam mensura.

Renes calefacit, venerem excitat, flatus tamen ventriculi dissipat.

S Ecacul: eryngium esse, Syluius, ac alij plerique, puerse inquam commenti sunt, vt cap. de secacul demonstratum est: eiusque loco eryngij radices vsurparunt, quum cynosorchis, Serapiadis, aut vtriusque satyrij, verius eidem vsui conueniant, & eodem modo condiri possint, & ad venerem promiores reddant.

Radix pastinacæ idem potest quod secacul, & similiter conditur.

Acorus, vt secacul conditur: at quia recens desideratur, arte vt in myrobalanis dictum est, humectari potest. legitima enim intelligenda, ne sumptu non necessario ledantur, ægri myropolijs vsitatam acorum suscipientes, neruorum affectibus confert, quin & singulis eius partibus, duæ secacul boni adduntur.

Zingiberis recentis, si haberi potest, sin minus arte humectati, pars vna, coquitur vt secacul, cum mellis partibus tribus, & sacchari parte vna. Sunt qui zingiberis humectati, & secacul, portionem æqualem simul condiant, sitque delicatius. quidam præterea condiunt aromatibus, alij aliter: humectandum autem zingiber album, purum, recens, aqua affusa primum, deinde arena obrutum, vt in cepulis myrobalanis dictum est, cen quoque ex Auicenna, hac quippe ratione, gelida biduo macerati fructus radicesque sicciore intumeſcunt, recentibusque similes redduntur.

Intemperiem ventriculi frigidam, & humidam sanat, & ab ea tardam, & deprauatam coctionem, quæ cibos in acidam cruditatem corrumpit, viscerum lubricitatem corrigit, flatus dissipat, alimenti in hepar, & corpus reliquum distributionem celerat, calidis natura aut morbo, æstiuus potissimum temporibus noxium est.

Condiuntur præter hæc radices iridis, helenij, pæoniæ, lactucarum buglosi, brassicæ, polygonati. Sunt & alia condita, vt nuces myristicæ, cum maci integræ, iuglandes tenellæ, vna, cerasa, amarina, ex quibus vulgare Diamarinatum, oxyacantha, caryophylli, piper in racemis ex India, caro citrij, auentia integra, limonia parua integra, quæ sæpe pro chepulis conditis venduntur, tametsi vnico duntaxat nucleo præditæ sint, & lignoso: limonia autem multis seminibus. Sunt & alia multa, & flores conditi, conseruas, vel sacchara vocant, vt infra, Auicenna quoque pruna, napos, amygdalas, ligna balsami, & multa condita exponit, lib. 5. Tract. 7.

Saccharum ros.

R Ecipe folia ros. albarum, uel rubrarum, nondum perfectarum, in umbra siccentur, donec ipsorum humiditas excrementosa resoluatur, teruntur tunc in mortario lapideo, additur sacchari albi triplum, reponuntur uase uitreo, aut uitreato, pergamina operculato, mensibus tribus insolantur, indies sæpe agitantur, soli auferuntur seruantur. Sunt qui rosas omnino imperfectas condiunt, vt valentius astringant. sunt item qui rosas non terunt, sed forcipibus incisas, cum saccharo manibus curiose confricant, post insolant. hodie ex rubris exunguatis, non siccat, duplo saccharo conditis, mox reponitur citra insolatum, vase ad summum non repleto, ut feruenti sit locus, nec exiliat. sunt qui succo ros. rubrarum, ad iustam crassitiem saccharum excipiant, ex Manardo, in placentulas, variisque fi-

V 4 guris

Radius Quartus

guris coactos, foli opertos exponant. Myrepsus ex duplo saccharo parat, 40. diebus insolat. Alii ex rosis rubris recentibus, exunguatis, in pila contritis, & in triplo sacchari cocti adhuc calentis proiectis, omnibus mixtis, aliquantulum coquendo, spuma interim detracta calidum reponitur.

Ventriculum, & cor, & reliqua viscera firmat, ipforumque intemperiem humidam emendat.

CONSERVA VIOLARVM, sive saccharum violarum.

Fit ut rosarum, nisi quod viola diuturniori expansione, & insolatu egent: alij contra putant, quod earum vis facile resoluitur, ob id multo minus siccandas, ut capite de violis discussum est: eius tamen caudicula, viridique pediculo purganda sunt. Hodie ex succo, & saccharo, bucellas parant in tenues defluxiones, usu, & odore pergratas: vel singulis libr. florum sacchari libr. ij. vel libr. ij. & med. si flores sicciores videantur, ne nimio saccharo violarum virtus hebetetur.

Conserua buglosi, alijs saccharum buglossatum.

Fit ut violarum, Cor ipsum roborat, eiusque tremorem, & syncopem sanat, violaceum autem bilis incendiū, fitimque extinguit, aluum subducit.

Multis diabuglossatum, ut etiam diaboraginatū dicitur, ex floribus triualis boraginis, quae & manicos, & melancholicos iuuant.

Conserua rosmarini, fit ut rosarum.

Cor, ventriculum, cerebrum roborat, flatus pellit.

Fit & conserua foliorum cichorii recentium; ad partium nutritiarum intemperiem calidam, & obstructions.

Fit quoque ex floribus saluiae, quibusdam foliis additis, diasaluiatū vocat, ad frigidos affectus cerebri, & neruorum.

Fit etiam ex floribus geniste, ut floribus capparorum nondum apertis, aceto, & sale seruatis, ad renum, & lienis obstructions, magno successu, in prima videlicet mensa, nec ingrato sapore.

Seruantur & hoc modo flores fumariae, laenidulae, sampuci, melissophylli, menthae, nymphaeae, herbae paralys, cardui benedicti, liliorum conuallium, euphrasiae, sambuci, hyssopi, oxalidis, betonicae, scabiosae, quorum exemplo alia quoque recondi possunt, ad singulas sacchari, aut mellis libras, florum unc. iij. permixtis quod si florum maior addatur copia, valentior quidem fiet, at ingratiore.

Mel ros. foliatum, aliàs cum folijs, vel non colatum, & colatum.

Recipe foliorum ros. ut dictum est in umbra siccatorum, uel nondum explicitarum, partes ii. in mellis despumati partibus sex, coquantur clementer quantum oportet.

Nunc sit ex tritis rosarum folijs recentibus: id vero postea igne liquatum, lintheoque percolatum, mel colatum vocatur. Anicema lib. 5. tract. 7. ex rosis exunguatis, confricatis, ac dissolutis, addit mellis spumati pondus confectioni idoneum, insolat diebus 40. mane, & vesperi mouendo, eodem modo parat mel violaceum, ac ros. Sunt qui succi ros. rubrarum, libr. i. accipiunt, cum libr. x. mellis spumati coquant, addunt ros. exunguarum libr. iij. ad succi consumptionem. Aetius Tetrab. 2. serm. i. cap. 135. parat ex succi ros. partibus tribus, mellis, parte vna.

Mel ros. alterum, quibusdam non colatum.

Recipe succi ros. & mellis, partes aequales, coque. sunt qui foliorum, & succi, añ. partem vnam, & med. mellis partes tres accipiunt.

Coquant in partibus nutritoriis pituitam, tergentque, coctionem suo modico calore iuuant.

Est & Dioscoridis rhodomel, lib. 5. cap. 24. indeterminato pondere. at rhodomalum Pauli, ex succo cotoneorum fit, ut etiam ex Aetio, Tetrab. & serm. 4. cap. 119. at in rhodostacti. Paulus, lib. 7. cap. 15. succi ros. sextarios duos, mellis sextario incoquit.

Mel

Mel ros. solutiuum.

R Ecipe infusionis ros. nouies peracta, mellis despumati parem mensuram, in syrupi consistentiam coque. sunt qui ad cuiusque libr. succi ros. vnc. i. addant, alii accipiunt infusionis ros. libr. x. mellis despumati, libr. v. coquunt ad modum syrup. ros.

Mel ros. solutiuum Alexandri.

R Ecipe succi ros. unc. xl. mellis, unc. xx. coque ad concrementū, adice diacrydij, unc. iiii. mastiches, unc. med. uel mellis, & succi ros. an. libr. i. piperis, drac. i. zingiberis, drach. ii. scammonii, unc. i. alios mellis ros. solutiui modos, vide ex Myrepso, tractatu proprio, ex Aegineta lib. 7. cap. 5. Alexander tamen lib. & cap. 7. ut etiam lib. 12. cap. 6. & 8. aliquantulum uariat pondere, & simplicibus, ut etiam Aetius, Tetrab. 1. serm. 3. cap. 74.

Mel violaceum.

R Ecipe mellis despumati, libr. x. succi uiolarum, libr. i. igni admoucantur, quū efferuescere incœperint, adde uiolarum, libr. iiii. coque ad succi cōsumptionem, continenter agitato, postea ad usus reconde. uel accipe mellis purissimi despumati, libr. x. uiolarum, libr. v. ferueant aliquantulū, postea colo transfusa, ad debitā percoquātur compagē. Idem est modus mellis ros. ultimo ante alterū scripti.

Absterget, refrigerat, lubricat, vsu in clysteribus frequenti.

Mel myrtinum.

R Ecipe mellis despumati, libr. ii. succi myrtillorum, libr. i. coque ad succi consumptionem, percola sic fieri potest.

Mel passarum.

R Ecipe passarum unc. iiii. ex aquæ, libr. i. coque ad aquæ consumptionem, valenter exprime cui expresso, adde mellis despumati duplum, percoque quantum opus est, vase uitreo reponere: alij mel non addunt ex Fuchsio.

Mel anacardinum.

R Ecipe anacardos recentes, tere, in aqua percoque, donec melliginē quandam in rubro fuscā remittant, eam aquæ innatantem auferto, & reponito.

Penidia, etiam hordeata.

R Ecipe sacchari albi, libr. ii. infunde aquæ fontis, libr. ii. uel hordei, si hordeatas maccis, quales diaphœnico immiscuntur, coque, & coquendo asperge amyli, unc. i. ad duriusculum concrementum, & quoad fila inter digitos ducat, & manus non inquinet, affundendo paulatim oleum amygdalarum dul. tunc subige in marmore, eodem oleo illito: uel si saccharum prædensum est, ad eius quantilibet, libr. mellis, unc. i. adice, deinde in clauo longo, curuo, tanquam funem aliquem nunc trahe, nunc rumpe, nunc duplica, quoad omnino albescat, ut sit diutius tractabilis, forcipibus diuide earum modum uide ex Albucasi.

Manus christi, etiam cum margaritis, alias perlata.

R Ecipe sacchari clarefacti, libr. i. aquæ, aut succi ros. uiolarum, buglossi, libr. med. coque ad iustam crassitiem: vel adde pul. margaritarum, vnc. med. aliis, vnc. i. super marmore aqua ros. & saccharo asperso, effingantur orbiculi, qui nomen aquæ retineant, aut uiolarum, uel buglossi præscriptæ, his coralliorum rubr.

drach

Radius Septimus Conseruas

drach. med. santal. scrup. med. addi possunt. vt pharmaca, uel deorum manus dicta ex Gal. 6. de comp. med. secundum locos, cap. 3. tale nomen fortasse nata sunt.

In ardentibus sitim sedant, & cor tuentur.

Saccharea placenta: alijs māa panis, siue marci panis, vt marciaton unguentum, a Marci cognomento.

R Ecipe amygdalarum dulcium, delibratarum, libr. med. arte contusis, adde sacchari puluerati, libr. i. diu inuicem subige, asperge aqua ros. aut violarum vt aptius coeant, extensis crustam superdato ex saccharo, in quo parum tragacanthi dissolutum sit, & ex oui albo claresfacto, vt vitri modo perluceat: sæpe ex feminibus communibus, pineis, pistaceis, caporum, perdicum, aut phasianorum pulpa, eadem arte parari potest, vt quæ pasta regalis vulgo dicitur, ex regiis Mes. electariis transumpta.

Semina condita, siue confecta, vt etiam cortices.

Amigdalatum dulcium, cucurbitæ, melonis, coriandri, pistaciorum, pineorum, anisi, sæniculi, seminis sancti (granellam vocant) papaueris, prunorum, & cerasorum, Barbaris machaleb, quod tamen aliud est Serapioni. aliaque non pauca, vt aurantium cortices, minutatim secti, cinnamomi, &c. quæ si magna sint semina, videlicet interdum depellata, si parua, qualia tulit natura, saccharo ad syrupi consistentiam cocto, his manu subinde motis, succussis, confricatis, paululum cochleari affuso incrustantur, & cen teñorio quodam, & ductili tunicarum facilitate, modo corticis erasitie, modo cutis tenuitate vestiuntur, succussa continuo pelui, minora scilicet, manibusque versata, postremo saccharo paulo crudiore, vt leues & polita sint facie.

Finis Radij Septimi.

POLLINIS