

I. IBERIS, SIVE LEPI-
dium.II. LEPIDIUM, PIPE-
ritis.

RANUNCULUS I.



majoribus tamen, robustius, in cacumine spicatis, tenuibus ac albicantibus. Radice alba acerrimi gustus, perinde ac folia, qua dentibus attrita os universum accendunt. Seritur in hortis ac etiam quibusdam in locis sponte nascitur. Excalfacit & siccatur vehementer, ac ea omnia potest qua Lepidium primum: ceterum longe valentius operatur. Quod de Normia. *pidior Graci, Lepidium quoque Latini vocant: Mauritanii, Seit aragi, Hausaub, Asceiteragi, seu Scubaregi: Itali, Lepidio: Germani, Gauchblum und Wildertrief: Galli, Passerage sauvage, & Nasitort sauvage: Hispani, Nasturtio montesino. Lepidium Paulo Aegineta, & Plinio: posterioribus Gracis de alior: Itali, Piperite & Peperella: Galli Passerage, sive Pozuree: Germanis, Psiffertaut.*

I. Iberis folio Nasturtii C.B. Iberidis figura bis à Matthiolo posita, primum quidem ad calcem libri primi, dein hoc loco: verum cum diversas icones habeat, aliam inter minores, qualis est ea quam I. 1. invenies: aliam foliis Nasturtii inter majores icones, idcirco talem in hunc locum rejecimus. II. Lepidium latifolium, quod *λεπιδας* seu squammas & maculas faciei delectat. C.B. Piperitis, Brunf. Dod. gal. Lon. Lepidium sive Piperitis Trag. Matt. Cam. Lepidium Aeginetæ & Plinii, Matt. in icon. Lug. Lepidium majus, Cor. in Dios. Lepidium sive Hiberis major, Cord. hist. Lepidium magnum, Fuch. icon. Lepidium Plinii, Cam. Dod. fol. Lepidium Aeginetæ, Gef. hort. Tab. Raphanus sylvestris officinarum, Lobelo.

RANUNCULUS.
CAP. CLXXI.

Complura Ranunculi genera, vis tamen omnibus una acris, & vehementer exulcerans. Nam unum coriandri foliis constat, latioribus, subalbidis, pinguibus, flore luteo, interdum purpureo: caule gracili, cubitum alto: radice alba, exigua, amaraq; multis capillamentis, hellebori modo, fibrata: nascitur in limitibus humidis. † Alterum lanuginosius, longiori caule, pluribus foliorum incisuris, plurimum

Qq

a Meum
† Ori. 23.
in Sar-
culotus.

6 Cat. in Sardinia proveniens, quam acerrimum, quod sylvestre apium appellant. Tertium minimum, odore
 gravi, flore aureo. Quartum huic simile, flore lacteo. Folia, flores & cauliculi recentes illitu exulcerant,
 & crustas non sine dolore gignunt: quare ungues scabros extricant, scabiem eximunt, stigmata delent:
 formicantes verrucas, & penfiles, alopeciasque paulisper illita tollunt. Tepente decocta perniones fo-
 ventur. Sicca radix tritaque, sternutamenta ciet, naribus admota: dentium dolorem appensa levat, ip-
 sos tamen frangit.

RANUNCVLVS II.



RANUNCVLVS III.



RANUNCVL IV.

RANUNCVL IV. FLORE PLENO.



Ranunculum



Ranunculum, qui Græcis βαλφάγρον dicitur, vulgus herbariorum in Italia, & alibi etiam Pedem corvi, & Pedem galli, Ranunculi con-
quamvis perperam, vocant, ut superius quoque in coronopi mentione diximus. Planta est vulgo nota, pluribus tamen, sideratio.
& diversis generibus distincta. TERTIUS minoribus provenit foliis, floribus melius: sed tota planta gravem spirat odo-
rem. QUARTUS non est absimilis tertio, folia tamen magis divisa sunt: florem edit lactei candoris: radices numerosas fi-
brofasq. Et quamvis quatuor tantum generum meminerit Dioscorides, unum genus est, quod nobis QUINTO loco assi-
gnabitur, quod quidem folia mittit secundo ferè similia [atq. etiam hirtiora] sed cui inter complures quibus nititur, Ranun-
[ellebori modo] radices albas, tuberosa quadam pendeat, veluti ex funiculo, radix nuci juglandis magnitudine, rapi culus
modo albicans, acris tamen & exulcerans, qua per hyemem, arescentibus jam foliis, utuntur quidam, ubi exulcerandi sit quintus.
opus. Nascentur locis incultis & secus itinera. Excalfacit & siccit ordine quarto, ulcerat, extrahit, incidit, digerit. Radix re-
censens & admodum, vesicas excitat: quare Isebiadici utiliter illinitur. SEXTUS folia mittit Anemonis primi similia &
caules cabbales, striatos, flores in summitate magnos, aureo colore: radices numerosas, fibrosasq. Nascentur in riguis, & hu-
meis locis. Ceteris minus est acris, quare minus excalfacit & siccit. Illud porro genus lanuginosius, vel, ut Plinius ait, so-
liosius, copiosissimum in Sardinia nascentis pluribus foliorum incisuris, altiore caule, acerrimo gustu, pleriq. ideo Apium risus
nominant, quod quibusdam memoria proditum sit, eos tanquam praelatitia ridentes interire, qui ipsum comederint. Sed
rem se aliter habere crediderim, & alius potius asseculandum esse. Siquidem Pausanias auctor est, herbam hanc, si edulio
fuerit, vescentibus nervos contrahere, ritumq. ora diducere, ita ut qui mortem appetunt, velut ridentium facie intereant.
Quod & Salustius confirmat, qui huius venenatæ herbe meminit, sic inquit: In Sardinia quadam herba nascitur, quæ
Sardoa dicitur, agresti apio similis. Hac ora hominum & ritus dolore contrahit, & quasi ridentes interimit. Ideoq. Dio-
scorides libro 6. Sardoniam ranunculi genus esse testatur, quæ vescentibus mentem adimat, & quadam nervorum disten-
sione debiscere in ritus ora cogat, ita ut imaginem ridentium præbeat: ob id Sardonius risus in adagium cecit. Ceterum
quàm magno in errore versentur, qui existimant Ranunculum esse Coronopum, superius in Coronopi commentatione la-
tius explicavimus. Ranunculi meminit Gal. lib. 6. simpl. medic. ubi ita scriptum reliquit: Battachium, id est, Ranunculus,
quatuor habet speciatim differentias. Omnia verò vehementer acrem facultatem possident, adeo ut cum dolore exulce-
rent. Hac itaq. ratione, si moderate utare, psoras & lepras excoriant, & ungues leprosos divellunt, & stigmata discutunt
& acrochordonas, & myrmecias detrahunt. Quin & alopecias juvant, paucotempore admodum: nam si diutius inhereant,
non excoriantur solum ipsa cutis, sed & in crustam uritur. Atq. igitur hæc omnia caulium & foliorum sunt opera, si impo-
nas virentia. Porro radix arescens sternutatorum est medicamentum similiter aliis omnibus quæ valenter desiccant. Sed
& dentium dolores juvat, ut & si angat eos valenti scilicet exiccatione: & ut semel dicam, calida & sicca valde est tum
radix, tum universa adeo herba. βαλφάγρον ita Græcis, Latinis verò Ranunculus appellatur: Italis, Ranunculo, & Pie cor-
vino: Germanis, Hancensfuß: Hispanis, Hierva belida: Gallis, Bacins. At Ranunculus quintus, Italis, Pie di Gallo: Germa-
nis, Drüßwurq: Gallis, Pie pou.

Ranunculus, quod limitibus humidis, opacisq. marginibus ranarum more lætetur: aut quia inter ejus
frutices ranæ frequenter inveniuntur. Huius quadraginta quatuor species Phytopynax exhibet. I. Ranun-
culus palustris rotundifolius, lævis. C. B. Apium aquaticum, Trag. Apiastrum, Cor. in Diosc. Ranunculus
primus, Matth. Ges. hor. Lac. Cast. Lugd. Ranunculus tertius, Lon. Ranunculus aquaticus Fuch. in icon.
Ranunculus palustris, Dod. Gal. Cord. hist. Lugd. Tab. Th. Ranunculus palustris rotundiore folio, Lob.
Ranunculus palustris folio Apij Cam. II. Ranunculus palustris lanuginosus C. B. Ranunculus secundus,
Matth. Lugd. Ranunculi altera species, Sardinia Herba, Cord. hist. Ranunculus lanuginosus alter. Cæsi

Qq 2 differt

Ranun-
culi con-
sideratio.
Ranun-
culus
quintus.

Quorum-
dam et-
ror.
Ranun-
culi viret
ex Gal.

Nomina.

differt à primo quod lanuginosus sit. IV. Ranunculus montanus albus simplici flore. C.B. Ranunculus quartus, Matth. Lacu. Gef. hor. Ranunculus albus major, Gef. hor. Ranunculus albus flore simplici, Lob. Aconitum batrachoides, adverb. & Lob. icon. Ranunculus flore albo, Dodon. fol. Ranunculus albus, Tab. Ranunculus montanus albus & Ranunculus externus quartus, Lugd. Ranunculus montanus tertius, Cæf. ranunculus leucanthemos folio Aconiti, Cam. In hortis habetur flore pleno. V. Ranunculus bulbosus radice rotunda. C.B. Crus galli & Coronopus parvus, Brunf. Ranunculus exiguus & sceleratissimus, Trag. Ranunculus quintus, Lac. Matth. Lug. Batrachion Apuleii, Dod. gal. Ranunculus minor, Fuch. Cord. hist. Tab. Ranunculus bulbosus. Lob. Thal. Ranunculus tuberosus, Dod. fol. Lugd. qui duas habet figuras: Ranunculus lanuginosus primus, Cæf. Ranunculus flammula dictus, Verticillum Apuleii, Gef. hor. Ranunculus radice bulbosa flore simplici, Camer. In sylvestribus enim flore est simplici, in hortis translatus, non modò flores multiplicat, sed ex uno & alterum promit. Reperitur etiam locis arenosis & saxosis ita parvus, ut vix trium unciarum sit. VI. Ranunculus montanus globoso flore. C.B. Ranunculus sextus, Matth. Lugd. Aconitum tertium eidem, Anemone montana quædam, Gef. hort. Trollius flos, Gef. in fracto. Clus. Panno. Ranunculus montanus alpinus glomeratus, Lob. Ranunculus flore globoso, Dod. fol. Lugd. qui duas habet icones. Ranunculus montanus alter, Cæf. Ranunculus globosus sive montanus, Cam. Ranunculus alpinus luteus Tabernæmontano.

Ανέμων.

ANEMONE.

CAP. CLXXII.

Duo Anemones genera, unum sylvestre, alterum in cultis nascens. Cujus multæ species: una phœniceum florem profert: altera candicantem, aut lacteum, aut purpureum. Harum folia coriandro similia a cæterum scissa tenuius in terram inclinantur: caules lanuginosi, tenues, in quibus flores, ut papaveris, & in medio capitula nigra, aut cærulea: radix oleæ magnitudine, aut amplius paulò grandescit, ac veluti geniculis quibusdam cingitur. Sylvestri amplitudo prorsus major, latioraq; folia, & duriora: oblongius caput, flore puniceo: tenuibus, & multis radicum capillamentis. Acrior est, quæ nigra habet folia. Vis utriusq; acris: ea de causa succus naribus infusus purgat caput. Commanducata radix pituitam trahit: decocta in passo, & illita, medetur oculorum inflammationibus: cicatrices eorundem, & hebetudines emendat: sordida ulcera abstergit. Folia & caules, si cum ptisana decocti edantur, copiam lactis præbent: menstrua eiunt, vellere appolita: illita quoq; lepras eximunt. Sunt qui errore ducti argemonem nominari eupatorium putent: quoniam à sylvestri Anemone, argemonem, & papaver, quod rhœada appellant (de quo inter papaveris genera referemus) & propter colorum cognationem in floribus distinguere non possunt. Verum papaver, & argemone colore minus saturato spectantur, & utraq; tardius floret. Quinetiam argemone croceum succum, gustu admodum acrem, reddit: rhœas verò candidiorem & acrem. Insuper anemoni, & rhœadi capitula sylvestris papaveris similia insunt, sed in anemone superne crassiusculum, in rhœade subangustius. Anemones genera succum remittunt, nec calyces habent, sed quasi asparagi cacumen. In arvis illa sæpius enascuntur.

a Meum, & Ca. de-
pietatis
ex di. 1. c.
tenentori-
bus inci-
suris ad
terram.
b Omnia
exem. u-
nico ver-
bo. i. xxi
et d. i. c.
pluribus.
c Omnia
exem. d. i.
et d. i. c.
pluribus.
d. i. c.
pluribus.
e. i. c.
pluribus.
f. i. c.
pluribus.
g. i. c.
pluribus.
h. i. c.
pluribus.
i. c.
pluribus.
j. c.
pluribus.
k. c.
pluribus.
l. c.
pluribus.
m. c.
pluribus.
n. c.
pluribus.
o. c.
pluribus.
p. c.
pluribus.
q. c.
pluribus.
r. c.
pluribus.
s. c.
pluribus.
t. c.
pluribus.
u. c.
pluribus.
v. c.
pluribus.
w. c.
pluribus.
x. c.
pluribus.
y. c.
pluribus.
z. c.
pluribus.

ANEMONE. I.



ANEMONE. II.



Anemo-
nis consi. **A** Nemonis nos quinq; observavimus genera: Primum folio provenit coriandro simili, sed frequentioribus incisuris, caulib.
lanuginosis, tenuibus striatis, in quib. tenuiora per intervalla sunt folia: floribus sylvestris papaveris magnitudine senis
et iucum

ANEMONE III.

ANEMONE IV.



ANEMONE V.



circum distinctis foliis purpurascens, capitulo umbilicote-
nus emergente nigro colore, nigrisq. capillamentis stipato, per-
inde ac in papavere. Radix illi oleae magnitudine, subrotunda,
fibrataq., & sapore acris (oritur in arvis & aliis cultis locis.) Secundum.
SECVNDVM foliis assurgit majoribus, & frequentius laci-
niatis, cynosioni Aconiti modo, caulibus alteri similibus, sed ali-
quanto crassioribus, inanibus, & in rectum spectantibus, quibus
flores insunt, in summitate dilutiores purpura nitescens, capi-
tulo circumquaq. comato, perinde ac alterum. Radicem habet
breve, rapunculi fere figura, fibris adnatis multis: acris etiam
gustu. Nascentur locis cultis, & praesertim in arvis. Nihil suis in Tertiis.
facultatibus à priore differt. TERTIVM foliis crescit Ra-
nunculo primo amulis, caulibus tenuibus, sesquipalmaribus,
rotundis, in quorum cacumine flores exeunt albi, quing. tan-
tum foliis distincti, rosarum magnitudine, & nonnunquam
tenui quadam purpura respersi, inferiore praesertim sede: radi-
cem habet si ratam ac tenuem: nascuntur in collibus. Tota
planta ceteris mitior est quare minus exarscit & siccatur. Ha-
bentur quoque Anemonis genera alia duo, quorum hic quoque
imagines damus, foliis laciniatis, & floribus in altero purpureis, Quartum
in altero aureis. QUARTA, folia profert frequenter laciniata, & quin-
taum.
caulem ramosum, flores in summitate purpureos, radicem glo-
bosam & parvam, fibris numerosis stipatam, provenit cultis locis.
QUINTA, parum differt à quarta, minoribus tamen est foliis,
tenuioribusq.: floribus aureis, radice parva, saba magnitudine.
Oritur cultis locis & in arvis. Omnia genera Mayo mense flo-
rent. Non desunt tamen, qui credant, Anemonem: & sylvestre
papaver idem esse: sin minus, saltem ejusdem esse generis. Sed ii,
mea quidem sententia, falluntur, & prorsus aberrant à Dio-
scoridis proposito. Quandoquidem si hoc idem sensisset Dioscori-
des, alterum ab altero diversis capitibus non distinxisset, neq.,
ut legitur in hujus capituli calce, differre Anemonem à sylvestri
papavere tradidisset. Tamen si existimet Brasavolus, Dioscoridis Anemonem id omnino esse sylvestris papaveris genus, quod Brasavoli
flore prodit ceteris rubentior: minimè advertens, quod si hujus cauliculi frangantur, statim lac ipsum distillant. Quin error.

papavere tradidisset. Tamen si existimet Brasavolus, Dioscoridis Anemonem id omnino esse sylvestris papaveris genus, quod
flore prodit ceteris rubentior: minimè advertens, quod si hujus cauliculi frangantur, statim lac ipsum distillant. Quin
nec illud quidem animadvertisse videtur, quod hoc longa consuetudine radice, non autem oliva modo rotunda: capitulumq. ferat
papave-

Fuch. la-
pſus.* III. PULSA. RUBRA.
IX. PUL. LUTEA. *Pulſatilla
hiſtoria.Pulſatilla
vires
Matth.Ruell. la-
pſus.

Notains.

reant, quid Ruellius per Herbam venti intelligere voluerit. Meminit Anemones Gal. lib. 6. simpl. medic. ubi ita scribit: Anemones omnes acrem, extergendi, attrahendi, & ora vasorum referendi facultatem obtinent. Itaque radix commansa pituitam evocat: & succus ex naribus purgat, & oculorum cicatrices extenuat. Insuper sordida ulcerum anemones expurgant. & lepras detrahunt, mensesque, apposita eliciunt, & lac trahunt. Ut Græcis ἀνέμων, ita Latinis pariter & Italis, Anemone vocatur: Arabibus, Jackaik alnahamen, seu Sakik anbeamen seu Mamira: Galli Passesleur: Pulsatilla, Italis Pulsatilla. Germanis Ruchenschell oder Hockenfraut.

papaveris, non asparagorum cacuminibus simile. Fuchsius præterea in eo libello, in quo tantum stirpium imagines expressit, Anemones purpurea loco, illam depingit herbam, qua plerisque PULSATILLA cognominatur, et si nullam, quantum equidem sentio, habeat cum Anemone cognationem: illa namque, cum primum erumpit, folia mittit incana & admodum hirsuta, minutimque laciniata, qua sapore sunt perquam acri, adeo ut non minus exulcerent, quam ranunculus, & flammula vulgo dicta. Flos, qui in stella modum, similiter hirsutus, inente vere debescit, antequam folia erumpant, nigricanti splendet purpurea: è cuius medio quidam aurei flosculi emicant, eos admodum amulantes, qui rosis innascuntur: in quorum umbilico floccus quidam purpureus visitur, sericinum referens opus. Exteriori vero parte in ipsius cauli rotundi, tenuis atque, incani cacumine, circa floris basim, villosus alter circumquaque, se pandit floccus, colore cinereo, sericino stamini mollitia ac lavore minime cedens. Semen capilloso, incanoque, capitulo, juglandis ferè magnitudine, continetur. Radix illi subest pedali longitudine, exesa, nigri chamaeleonis modo: cui sapor quidem subdulcis, non autem acris, veluti solius, & caulibus. Provenit locus incultis, aridis, & saxosis. Folia caules, & flores cum acerimo sint gustu, excalfaciunt & siccant ordine quarto: incidunt, attenuant, attrahunt, digerunt, expurgant & ulcerant. Radix vero cum subdulcis sit non longè aberit à temperatis. Sunt qui hanc miris laudibus efferrant contra pestilentiam & ad hausta venena, itemque, contra omnium venenosorum tum morsus, tum idem: quamobrem in antidotis additur. Scribit Ruellius Anemonem in Gallia copiosam nasci, eamque, esse plantam, quam herbarii Herbam venti vocant: verum si herba venti Helxine fuerit, vel Solidago minor, ut Simon Januensis interpretatur, aberrasse Ruellium manifestè deprehenditur: sin aliter, quid dicam nescio, cum me omnino lateat.

Anemo-

I. ANAGALLIS MAS.

II. ANAGALLIS FOEMINA.

V. SUCCISA, SIVE MOR-
sus diaboli.Opinio
supersti-
tiosa.Succisa
vires.

Nomina.



fortasse rem gratam facturum, si his nostris commentariis
ipsam quoque inseram, hic locus visus est, ubi commodè de ea
aliquid dicam. Morsus igitur diaboli herba est locus incultis
proveniens, saltibus, ac etiam interdum pratis, & dumetis.
Foliis constat plantagini angustifolia, quam vulgò lanceo-
lam vocant, similibus, levioribus tamen, & quæ circa caules
qui ad binum cubitorum longitudinem assurgunt, exeant
breviora, angustiora, leniterque per ambitum laciniata. Flo-
ret æstate, scabiose vocata modo. Multifidas habet radices,
nigricantes, ellebori modo succisas, & circumvivas: unde
superstitiosum nomen invenit. Siquidem scripserunt non-
nulli superstitionibus dediti, quos credulum vulgus sequitur,
cacodæmonia tanta efficacia radicem invadere hominibus,
atque hac de causa, ubi succreverit, statim eam undiquaque
dentibus succidere, circumrodere: tanta est hominum su-
perstitio. Herba hæc si viridis cruda, tritaque, carbunculis pe-
stiferis imponatur, præsentaneo remedio (ut ajunt) eos sanat
aut si vinum in quo decocta fuerit, bibatur. Radix per se
estur, aut ejus decocti vinum utiliter bibitur, non modò ad
uteri dolores mulcendos: sed etiam ad pestilentem auram
arcendam. Gustu admodum amara est: ex quo perspicuum
esse potest eam esse calidam & siccam facultatis. Siccata pulve-
rem præbent plerique, ad alvi teneas necandas, ac eadem su-
gillita illitu emendant. Herba, quæ ἀνὰ γὰρ, Græcè, Ana-
gallis quoque, Latine vocatur: Italicè, Anagallide: Germani-
cè, Gauch heyl: Hispanicè, Muruges: Gallicè, Morgelline:
& Mouron. Succisa officinis, Morsus diaboli: Italis, Morso
di diavolo: Germanis, Teuffels abbiß.

Anagallidem dividimus in arvensem & aquati-
cam: arvensis phænicea est, cærulea, lutea: aquaticæ
etiam aliquot differentie occurrunt. I. Anagallis
phæniceo flore C.B. & Cam. Anagallis mas, Brunf.
Lob. Anagallis punicea, Cæs. Anagallis, Cord. in Diosc. Gef. hor. Anagallis terrestris mas, Thal. Anagal-
lis phænicea, Tab. Corcorus Theophrasti, Anguil. II. Anagallis cæruleo flore C.B. & Cam. Anagallis
fœmina.

Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Matt. Lac. (cui & Corallium Pauli) Lon. Cast. Lug. Anagallis phænicea mas,
Lob. Anagallis punicea, Cæs. Anagallis, Cord. in Diosc. Gef. hor. Anagallis terrestris mas, Thal. Anagal-
lis phænicea, Tab. Corcorus Theophrasti, Anguil. II. Anagallis cæruleo flore C.B. & Cam. Anagallis
fœmina.

aut dolentibus, cum oleo medetur. Nigræ hederæ succus, aut e poti corymbi, corpus infirmant, mentemque turbant largius sumpti. Acini quinq; triti, calfactiq; in punici mali cortice cum rosaceo, si instillentur à contraria aure, dolorem dentium mitigant. Denigrant capillum illiti corymbi. Folia in vino decocta illinuntur omnium ulcerum generi, etiam si cacoëthe sint: vitia cutis in facie, & ambusta sanant, uti antea diximus, decocta. Movent menses triti, & subditi corymbi: iidem poti, post purgationes seminarum, drachmæ pondere, concipiendi spem adimunt. Pediculus foliorum melle irrigatus, ac vulvæ inditus, menstrua, & partus extrahit. Instillatus succus putrida tedia narium, graveolentiaq; emendat, & sanitati restituit. Lachryma hederæ psilothrum est: illitu pediculos enecat. Succus radicum in aceto potus, contra phalangia prodest.

I. HEDERA ARBOREA.

II. HEDERA HELIX.



Hederæ
confide-
ratio, &
genera.

Hedera, cujus hic tria tantum summa genera fecit Dioscorides, et si plures ejus in specie differentias esse testetur, planta est vulgaris notitia. Verum si quis Hedera plura genera nosse desiderat, non fortasse Plinio contentus, licet de ipsis abundè differenter lib. 16. cap. 34. legat Theophr. lib. 3. cap. 18. de plant. historia, ubi hedera sigillatim species diligentissime persequitur, & de iis copiosissime pertractat: vel potius ipsum audiat, nam hæc, quæ sequuntur, ipsi ad verbum accepta referimus, qui loco citato sic habet: Hedera quoq; multigena est: quædam enim humi repens, quædam se in excelsum attollens: & excelsarum genera plura, sed trina summa patescunt, candida, nigra, tertiâq; helix, id est clavicula. Horum item species plures: quippe alia fructu tantum candida, alia etiam foliis: rursus fructum tantum candidum ferentium, alia majusculum, densum, & velut in globum circumactum fructum profert, quam corymbiam quidam vocant, Athenienses a-
Helix. charnicam rigam eam appellant: alia minorem sparsiolemq; modo nigra. Habet nigra differentias sed non hunc in modum conspicuas. Sed helix differentiis maximis discernitur: et enim foliis plurimum distat, cum parvitate, tum quod angulata, concinnioraq; sint: cum hedera rotundiora, simplicioraq; habeat. Distant etiam internodiorum longitudine, atq; etiam sterilitate, quoniam fructum quædam non ferant: quod non in hedera transfigurentur, ut quidam volunt: at verò si omnes hederescant, ut aliis placet, atatis certe, dispositioniq; non generis erit discrimen, quemadmodum pyri ad pyrastrum. Tamen ejus quoq; folium multum ab hedera distat: verum id rarum, & in paucis evincit, ut vetustate permute-
Helicis tur, cum in populo alba, & crotone. Ergo helicis plura genera sed quæ conspectiora, summaq; occurrant, tria sunt. Herba-
 plura ge-
 nera. cea, quæ plurima est: secunda candida: tertia versicolor, quam Thraciam quidam appellant. Et harum quæq; distare vide-
 tur, quippe herbacea quædam folio tenuiori, oblongiori, atq; etiam densiori: quædam minus hæc omnia habens. Et in ver-
 scoloris genere, alia folio ampliori, alia minori, macularumq; habitu diversa: pari modo & magnitudine, coloreq; distant. 60
 Auctu perfacilis herbacea, inq; plurimum venit. Manifestam esse quæ hederescat, affirmant, non tantum foliis, quæ majo-
 ra, latioraq; habet, verum etiam germinibus: protinus enim erecta gerit, non inflexa gracilitate, & longitudine. Herbacea
 verò crassiora, brevioraq;. Ac hedera, ut semen proferre incipit, germen sublime, rectumq; edit. Est quidem universa hede-
 ra radice numerosa, densa, flexuosa, & crassa, surculosa, nec nimis alta, sed præcipue nigra, & inter candidas, quæ asperima,
 immitissimaq; habetur, quamobrem ejus amplexus arbores omnes infestat, omnes enim necat, & exiccat, ablato alimento.
 Crassatur hæc majorem in modum, atq; arborescit intantum, ut per se ipsa hedera arbor fiat. Attamen ex majore parte
 semper super aliud vitam degere solet, atq; (ut ita dixerim) amplexicaulis est, ita pro sua natura vel quiddam ejusmodi
 illico gerit. Nam è germinibus radículas asidue inter folia mittit, quibus arboribus, murisq; obrepit, quasi de industria à
 natura

natura exhibitis: atq; ita humorem auferens, exhauriensq; arefacit. Et si inferius succidatur, nihilominus vivere, dura-
re q; potest. Habet vel aliud discrimen non mediocre in fructu: nam alius dulcis, alius vehementer amarus, tam in candida,
quam in nigra. Indicium, quod alium aves mandunt, alium minimè attingunt: hederæ ita se habet. Hactenus Theophra-
stus de hederæ generibus. Ceterum tamen si tot Hederæ genera Theophrasto describantur, duæ tamen Hederæ sunt nobis
præcipue, nempe major, & minor. MAIOR itaq; quam arboream vocamus, non solum in sylvis excelsas arbores scandit, Major,
strangulatq; suo arcto brachiorum complexu sed etiam antiqua ædificia, urbium mania sepulchraq; adeo occupat, ut an-
dem ea omnia diruat, & unâ cum eis collabatur. Eadem in primis folio provenit pyri modo, oblongo, quod tamen tractu
temporis triquetrum efficitur. Id quoq; leve, crassumq; est, & longo nixum pediculo, sapore misto, nam & acridius, &
amaritudinē, & acerbis atis est particeps. Florere incipit ad finem Autumni, floribus muscosis, colore pallido, e quibus hye-
me racemosi eduntur corymbi, baccis ligustrinis grandiores, quæ ante maturitatem virescunt, & deinde nigrum colorem
contrahunt, mense Ianuario. MINOR sterilis est, Helix vocata. Hæc raro arborescunt, sed aut humi repit, aut saxa, Minor
macerias, sepes, & aggeres occupat folio semper triquetro, ac maculoso: sarmentis albicantibus, lignosis, fructu nullo ne-
que flore: utraq; perpetua fronde virent. Serpentes gratissima est Hederæ, quod in ea hyeme delitescant, ejus sese calore so-
ventes. Foliorum succus ex vino austero potus lienosus sanat. Decoquantur ex oleo, & aceto septem hederæ folia, totidemq;
osium persicorum nuclei, à cortice delibrati, terunturq; deinde, & temporibus, & fronti illinuntur, contra capitis dolores,
à cerebro provenientes. Qui scrobiculas cauterio paratas gerunt in curibus, aliisve corporis partibus (fontanellas vulgò
vocant) folia hederæ superponunt, magna sanè utilitate, non solum quod illuc fluentem humorem alliciant, extrahantq;
sed quod etiam roborent. Mulieres confutis hederæ foliis pileos parant, & papulosi infantium capitibus imponunt, sic enim
curant illos, virus extrahentes. Lachryma, quæ ex caudice distillat, illita lendes, & pediculos necat. Minor potest ea omnia,
quæ major, sed inefficacior tamen est. Est & herba, quam vulgus HEDERAM TERRESTREM vocat.

Minor.

Hederæ
vires
Matthio-
lo.Hederæ
terrestres
mentio.

III. HEDERA TERRESTRIS.

*IV. HEDERA TERRESTRIS
montana.*

Hæc itaq; longo rept: in humo tenuis sese diffundit, quadratis funiculis, e quibus folia emergunt rotunda, crispæ, & per
ambitum serrata floribus subpæpæis, pusillis, in caulibus e foliorum exortu, Aprilis mense prodeuntibus. Radicibus niti-
tur tenuibus quæ e caulibus geniculis prodeunt, & eos humi reptantes connectunt. Nascentur in opacis, circa semitas, urbium
muros, & etiam in hortis. Amaro gustu tota planta est, ideoq; abstergere, attenuare, aperireq; facile poterit. Vulneratis vi-
sceribus auxiliari in potionibus pleriq; consent, id propria facultati ascribentes. Huic addere solent Rubiæ, & albi Di-
lami radices, quæ etiam Beronicam, Pilosellam, Primpinellam, Sanguisorbam, Pentaphyllum, Bisfortam, Stellariam, Equi-
setum, Virgam auream, Tormentillam & Brasicam rubram, & ex his omnibus in albo vino decoctis potiones parant, ad-
duntq; rhodomellis, quod sufficit, ad potum dulcedine conciliandum. Hujusce medicamenti, internè vulneratū exhibere
solent quotidie ternas uncias, magno quandoq; auxilio. Succus cum arugine mistus, instillatur utiliter cuniculosis ulce-
ribus. Fit e terrestri hederæ oleum, foliis recentibus in eo maceratis, drug, estate insolutis, admirabilis sanè facultatis ad
colicos affectus, & ceteros intestinorum cruciatus, cum potum, tum clymate infusum. Hederæ (ut auctor est Galenus li-
bro septimo simplicium medicamentorum) ex contrariis composita est facultatibus: habet enim quiddam adstrin-
gentis substantia, quam terrenam, & frigidam esse ostendimus: habetque etiam nonnihil acris, quam calidam
esse vel gustus comprobat. Nec deest tertia: aqueam namque substantiam quandam tepidam obtinet, certè si viri-
dis sit. Siquidem dum arefcit, hæc prima exhalat necesse est, manetque quæ terrea est, & frigida, adstringens, & ea
quæ calida,

Hed. ter-
rest. vi-
res.Oleum
e terre-
stri hede-
ræ.
Hederæ
faculta-
tes ex
Gal.

Nomina. *qua calida, & acris. Hedera, quae ita Latinis. Graecis uos nominatur: Mauritani, Cusius: Italia, Hedera seu Lella: Germani, Mauer / sive Ephenbaum / Ephen / sive Epich: Hispani, Edera, Era: Gallis, Lierre. Hedera minor, Graecis uos dicitur Italia, Hedera minore. Hedera terrestris, Graecis uos dicitur χερσαι: Italia, Hedera terrestris.*

† Non ab re quidem suspicandum est (ut doctissime adnotavit Marcellus) huic loco in Dioscoride mendum subesse, & quod non *ἰσχυρὰ*, hoc est, rubra, ut habent vulgati codices, legendum sit, sed *ἀσχυρὰ*, id est, concinniora. Nam praeter alias rationes, huic lectioni adstipulatur Theophrastus qui libro. 3. cap. 18. de plantarum historia, eo nomine hedera helici folia depingit.

Hedera triplex hic proponitur. I. Hedera arborea, Matth. Ges. hor. Lugd. Tab. Hedera. Brunf. Trag. Cord. in Diosc. Dod. fol. Cast. Cæf. Hedera nigra, Fuch. Dod. gal. Lac. Lon. Hedera corymbosa, Lob. Tab. 10 Hederae species secunda seu nigra, sive Dionylia, aut corymbifera, Thal. Hujus folia quò magis arborefcit eò magis rotundantur, exceptis iis, quæ in summo sunt, baccas nigras habet & luteas. II. Hedera major sterilis C.B. Hedera helix, Brunf. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Lugd. Cæf. Lon. Tab. Cam. Helix sive provoluta sterilis hedera, Lob. Hederae arborea sylvestre genus, Gesn. hor. Hederae species tertia helix vocata, Thal. Hedera minor, Cast. Hæc an diversa sit ab arborea, ambigit Theoph. Plinius concedit: alii non concedunt, cum fieri possit ut alicubi non arborefcant, ob imperfectionem, non speciei, sed individui. III. Hedera terrestris vulgaris, hæc Chamæcissus Diosc. fortè, si in descriptione pro *χαμηλὴ* legatur *χαμηλὴ*: apud Plinium Hedera se non attollens a terra. Elatine, Brunf. Hedera terrestris eidem, Matth. Cast. Dod. fol. Tab. Thal. Lug. cui & Malcocissus: Chamæcissus, Fuch. Dod. gal. Lon. Cam. Chamæclema, Cord. hist. Humilis hedera, Lob. Major est, est & minor elegantior cauliculis erectioribus, brevioribus, 20 ut & foliis, floribus magis cæruleis, quæ locis humidioribus circa arbores antiquas reperitur. IV. Hedera terrestris montana, quæ priore viticulos breviores habet, sed hirsutiores, foliis majoribus, floribus item, qui purpurascunt, quæ in montosis Thuringiæ provenit, & valentior ea, quæ in planis colligitur, ut D. Camerarius in suo Matthiolo monet, Hederae terrestris speciem montanam vocitans.

Χηλιδόνιον μέγα.

CHELIDONIUM MAJUS.

CAP. CLXXVI.

a Omnia
exempl.
ὑπόλευ-
γα. j. lub-
glauca.

CHELIDONIUM MAJUS, caule est gracili, cubitali, aut altiore, agnatis foliolis: foliis ranunculi, molliori-
bus tamen, & colore a cæsiis: flore violæ albæ, secundum singula folia prodeunte. In eo succus croci,
mordax, acris, & aliquantulum subamarus, graviter olens. Radix supernè singularis, infernè in multa 30

I. CHELIDONIUM MAJUS.

* II. CHELIDONIUM MAJUS
alterum. *



crocea capillamenta fibratur. Siliqua, seu corniculati papaveris, tenuis, in metæ figuram longa, in qua semen papaveris majus recluditur. Succus in æreo vase, cum melle pruni decoctus, oculis claritatem adfert. Foliis, caule, radice, succus exprimitur ineunte æstate & siccatus in umbra digeritur in pastillos. Radix cum aniso, & vino albo pota, medetur regio morbo, & ulcerib. quæ serpunt: imposita cum vino, aut manducata,

cata, dentium dolorem sedat. Hoc nomen sibi videtur vendicasse, quod adventu hirundinū exoritur, & discessu emarcescat. Sunt qui narrant, hirundines matres excæcatis pullis, ad mota herba, visū restituere.

Chelidonium, quod majus cognominatur, vulgò in Hetruria Celidonia dicitur. At imperiti, præsertim chymista, quæ multorum Aulitia est, quod Græci nominis vim ignorent, non Chelidonium, quod Latine nūc aliud, quam hirundinariam significat, sed Cæli donum appellant. Qua postea falsa nominis præstantia freti, ex hac herba quandam quintam essentiam fieri prædicant, non modo suis vanis alchymicis imaginationibus accommodatissimam: sed ad tuendam etiam hominum sanitatem, morbosq; quàm plurimos profligandos utilem. Provenit Chelidonium ubiq; in Italia propter sepes in scrobium ripis, secus vias inter rudera, & in adificiorum ruinis, seu parietinis. Sunt qui narrant (inquit Diosc. in hujusce capitis calce) hirundines matres excæcatis pullis ad mota herba visum restituere. Atqui Arist. lib. 4. de gen. anim. cap. 6. id quidem fieri naturaliter scribit his verbis: Aves etiam nonnullæ imperfectos, & cecos pariunt pullos, videlicet, quæ cum parva corpore sint, multos progenerant, ut cornix, pica, passer, hirundo. Quamobrem si quæ hirundinum novellarum adhuc oculos præpungat, rursus incolumes redduntur. Cum enim sunt non facti, non corrumpuntur. Itaq; denuo oriuntur, at pullulant. Et lib. 6. de hist. anim. Pullorum hirundinis, inquit, adhuc recentium oculi, si quis stimulo eos vexarit, renascuntur, & cernendi vim postea planè recipiunt. Herbam in calceis delatam, si nudis pedibus attingatur, ltericos sanare creditur: eadem mammis mulierum ad mota, mensium abundantiam sistit. Tusa herba unâ cum radice, & oleo chamamelino servata, & umbilico illita, tormina ventris, & uteri dolores tollit. Totius plantæ pulvis vulnera, ulceraq; sanat. Succus ad oculorum maculas, argemas, nubeculas, & cicatrices plurimum præstat, verum cum acerrimus sit, adhibendus non est, nisi is additis, quæ ejus acrimoniam retundunt, cujusmodi est Lac muliebre. Idem cavi dentibus inditus, eos si argit, & ejicit. Cadunt quoque verrucæ & arescunt, si frequenter eo illinantur. Sunt qui Chelidonium majus vocent herbam quam

Chelidonium majus
nomen
ris consi.
Vinitas
chymistarum.

III. AQUILINA.

* AQUILINA FLO. PLENO. *



aliqui AQUILINAM, alii Aquilegiam nominant: Ea in montibus provenit sylvestris locis & feritur in hortis. Planta est Aquilina fruticosa, folio Chelidonii majoris æmulo, sub albicante, per ambitum laciniato, coriandri ferè modo, caulescit mense Junio numerosa caulium sobole, gracili tamen, ac tenui. Flores in caulium cacuminibus emicant, in aliis purpurei, in quibusdam albi, & in nonnullis aurei, tanta est in floribus, colorandis natura delectatio. Ii in stellæ modum radiantur, quatuor fundentes inferiore parte cornicula concava, & sursum reflexa: E quibus capitula oblonga nascuntur, Melanthii æmula, in quibus pellucidum semen concluditur pullo colore. Semen (ut scribunt quidam rei herbariæ authores) drachmæ pondere potum ex Cretico vino, addito croci momento, lteritiam sanat: sed ægros in lecto subinde sudare oportet. Chelidonii majoris meminit Gal. lib. 8. simp. med. ubi hac scribit: Chelidonium majus extergenti admodum, & calida facultatis est. Sed & succus ejus ad acuendum visum commodus est, utiq; in quibus crassum quiddam in pupilla colligitur, digestionem, atq; digestionem indigens. Usi sunt quidam radice ejus ad morbum regium à jecoris obstructione proficiscentem, in vino albo eam potui exhibentes cum aniso. Pari modo mansa dentium doloribus confert. Id xix. d. v. p. x. Græci, quod Latini Chelidonium majus, vocant: Mauritanii, Kauroch, Chelidonium, Chelidomontoma, & Memiram: Itali, Celidonia maggiore: Germ. Echellwurz, & Echellkraut: Hisp. Celiduenba, & yervas de las golundrinbas: Galli, Chelidonie, & Esclere. Aquilina, sive Aquilegia: Itali, Aquileia, Celidonia maggiore, seu Celidonia salvatica: Germanis, Aelcy: Galli, Anholices.

Seminis
Aquilina
vires.
Chelido-
ni majo-
ris vires
ex Gal.
Nomina.

Chelidonium seu Hirundinaria, quod Hirundines eam monstrarint: vexatis pullorum oculis ea me-

R r

dentes

dentes. I. *Chelidonium majus*, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. Ges. hōr. Lac. Lob. Cast. Lugd. Cæs. Lon. Tab. *Chelidonia*, Brunf. II. Alterum hoc *Chelidonium majus*, quernis foliis est, quod foliis potissimum à priori distat, quæ si perpendas, tenera quercus folia dixeris, in hac enim argutius incisa sunt, supernè ex virore nigricantia, infernè pallida, levissimè, ut & caules, hirsuta: flos luteus, cuius folia dissecta sunt & veluti fimbriata, in reliquis priori similis. Ex horto Sprengeri pharmacopœi Heidelbergensis primùm habuimus, dein in horto Illustr. Ducis Wirtenbergici Montembelgardi legimus: quod si in parietinis feratur formam retinet, lætiore verò in solo aliquando degenerat. III. *Aquilegia* quasi *Aquilina* ob florum mucrones aduncos, instar unguium aquilinarum: censetur Pothon veterum, Costæo: Jafione Theoph. Cæs. Jovis flos Athenæi, Dalechampio: Isopyron Diosc. Columnæ. Dicitur *Aquilegia* Trag. Fuch. Dod. gal. Lon. Lug. (cui & *Columbina*) Cam. *Aquileia*, Dod. fol. Thal. *Aquilina*, Matth. Lob. (& *Chelidonia sylvestris*) Cast. (cui & *Chelidonia media*) Tab. Variat flos magnitudine, colore & foliorum numero: est simplex, est plenus: Cæruleus, candidus, flavus, incarnatus, ruber, varius ex cæruleo & purpureo: sic est candidus, nonnullis veluti lituris cæruleis aspersis. Interdum flore in verso albo, incarnato, candido cæruleo permixto: interdum in verso & degere virecente.

Χελιδόνιον μινός.

CHELIDONIUM MINUS.

CAP. CLXXVII.

Chelidonium minus, quod triticum sylvestre aliqui nuncuparunt, herbula pediculis ab radice pendens, sine caule: foliis hederæ, multò rotundioribus, & minoribus, teneris, & subpinguibus, radices habet ex eodem callo complures, pusillas, in granorum tritici modum acervatim congestas: quarum tres, aut quatuor in longitudinem exeunt. Juxta aquas, & lacus nascitur. Vis ei acris, & anemones modo summam cutem exulcerat: psoras, & scabros ungues eximit. Succus radicibus expressus ad purgandum caput, naribus infunditur. Decoctum ejus ex melle gargarizatum, magnificè id præstat: & omnia pectoris vitia extrahit.

CHELIDONIUM MINUS.

Chelidonium minus confideratio.

Scrophularia minor.

Chelidonium minus hoc an sit verum.



Planta, quam omnes ferè rei herbaria periti *Chelidonium minus* appellant, omnibus Italia loci, verno duntaxat tempore, frequens gignitur, uliginoso præsertim solo, & in scrobium fossarumq; marginibus, foliis hederæ minoribus, rotundioribus, teneris, ac subpinguibus humi accubantibus, sine caule: flore luteo, etsi ejus non meminertit Dioscorides, tenui pediculo appenso. Radicibus nititur compluribus, ex eodem callo prodeuntibus, pusillis, in granorum tritici modum acervatim congestis, quarum nonnulla tantum in longitudinem progrediuntur. Herba hac brevè deperditur tempore: quippe qua vere & nascatur, & arescat. Sunt qui hanc *Scrophulariam minorem* appetent, à radicum similitudine, ut quæ multis granorum tritici granulis, veluti strumis, quæ Græca imitatione *scrophula* vocatur, coaluisse videantur: quanquam alii ex hoc potius sic dictam putant, quod strumis, sive *scrophulis* (ut quidam asserunt) imposita medeatur. Noster eam in Hetruria vulgò vocari *Favoscello* putaverim, quod favarum modo folia subpinguia proferat. Nec ea aliunde sibi *Chelidonii* nomen vendicasse existimatur, auctore Theoph. libro 7. cap. 14. de plant. hist. quam quod hirundinum adveniens florem exciret, quemadmodum & *Chelidonium majus*. Verum an hac sit *Chelidonium minus*, cujus meminere Dioscorides & Gal. non parva videtur esse dubitatio: quod nullam prorsus nec foliis, nec radicibus præ se ferat acrimoniam, cum tamen acerrima, & mordax esse deberet, longèque magis quam *Chelidonium majus*: quandoquidem, Galeno teste, *Chelidonium minus* cutem exulcerat, & excalscit ordine quarto. Id quod satis manifestè ostendere posset, hanc non esse *Chelidonium minus*: nisi quis in hoc illud dixerit, quod de Aro scriptum reliquit Gal. libro 2. de alim. fac. Nam facile contingere potest quod quemadmodum *Arum Cyrenis* minimum medicamentosi, minimumq; acrimonia possidet, adeo ut in cibis vel rapis utilis

habeatur: in Italia verò ac minori Asia contra adeo acre, ut medicamentis duntaxat expetatur: ita & *Chelidonium minus*, quod in Italia nascitur minimum acrimonia sortiatur: quod verò in Græcia provenit, acre admodum sentiat. Siquidem excepta acrimonia tantum, nostri nihil prætere deesse videtur, quin legitimam *Chelidonium minus* dici queat. Ex quo facile adhaerens sum ut credam, quod quamvis in Italico desideretur acrimonia, non tamen id esse *Chelidonium minus* diffidendum est: tamen si inficiari non liceat, nostrum *Chelidonium minus*, quod omnino acrimonia sit expers, is morbis haudquaquam convenire posse, quibus illud conferre, quod in Græcia gignitur, tradiderunt Dioscorides & Galenus. Nam hac deficiente qualitate, necesse quidem est, ut & vires, quæ illam consequuntur, deficient, & pereant. Hinc igitur sit, ut non possim ego subscribere iudicio Fuchsi, qui in libro de comp. medic. quem auctum secundo excudit, *Chelidonium minus* censet alteram *Malacocysis* speciem. Quinimo ejus opinio mihi resellenda videtur, quod planta illa nullis ferè notis aliquam mollem hederam referat. Ea quidem foliis hederam quodammodo emulatur, sed quod magis attendendum erat, viticulas non profert, quibus humi repat: id quod hederæ cuique naturæ tributum est. Sed longè magis alius quidam nugator accusandus est, quippe qui eo dementia devenerit, ut contendere nobiscum non erubuerit, hanc plantam minus non esse *Chelidonium*, sed *Vergilii Amellum*. Verum nihil est quod magis homines deliros efficiat, quam ambitiosa temeritas. Minoris *Chelidonii* vires memoria prodidit Gal. libro 8. simplicium

Fuchsius arguitur.

Nugatoris cuiusdà opinio, explorata.

simplicium medicamentorum sic inquit: Chelidonium minus, cum acrim sit majore, celeriter illitum cutem exulcerat, unguisq; scabros eicit. Succus ejus per naves purgat, utpote admodum acer. Itaq; hac herba quarti ordinis fuerit absoluti jam, idq; tum in calfaciendo, tum in siccando. Herba hæc Græcis χηλιδόνιον minus dicitur: Latinis, Chelidonium minus: Nomina, Mauritanis, Memicen, & Chilodomon. Italis, Celidonia minore, & Favoscello: Germanis, Fetgwargen/Blatter Kraut/

I. GARYOPHYLLUS INDICUS

major.

Pfaffenhödlein/ & Meyentraut: Hispanis, Scrofularia menor: Gallis, Couillons de prestres, & petite Esclere.

Chelidonium minus nostrum, cum Dioscoridis per omnia convenit, excepta vi acri, an fortè ratione soli hoc contingat? Strumen Plinio lib. 25. cap. 13. Chelidonia rotundifolia C. B. Ficara & Scrophularia minor, Brunf. Chelidonium minus, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in hist. & Dioscor. (cui & Amellus Vergilij) Gef. hor. Lac. Lon. Cast. Tha. Lugd. Tab. Malacocissus minor, Fuch. in icon. Favagello vulgò, Cæsal. Testiculus Sacerdotis, Sylvatico. Hujus folia aliquando purpurea macula notantur: flore est simplici, rarius pleno.

Ο θωννα. OTHONNA.

CAP. CLXXVIII.

Othonnam aliqui majoris chelidoniæ succum esse ajunt: quidam glaucij: alij succum floribus corniculati papaveris expressum. Alij permistos cæruleæ anagallidis, hyoscyami, & papaveris succos esse contendunt. Alij Troglodyticæ cujusdam herbæ succum, quæ Othonna vocatur: nascique eam in eo Arabiæ tractu, qui ad Ægyptum spectat. Othonna foliis erucæ, a perforatis cribri modo, & veluti à tineæ derosis, squalore obsitis, paucis: flore croci, latifolio: quare quidam Anemones speciem esse putaverunt. Extractus succus oculorum medicamentis adjicitur, ubi expurgare est opus: mordet enim & abstergit omnem caliginem, quæ oculis offunditur. Tradunt humorem quendam ex herba emanare, qui elutos, semotis calculis, in pastillos ad eadem di-

Omnia ex πολλοις τε ητοιμασται, & παρὰ τὴν φύσιν, ὡς φησὶν οἱ ἰατροί. Φυλκισ, ὁ λυγρὸς φουκαί, multis foraminibus, veluti à vermibus perforata friabilia & pauca. Sed Cæsal. habet. ἐλγύχνη i. pauci succi.

II. GARYOPHYLLUS INDICUS minor.

* III. GARYOPHYLLUS INDICUS minor flore simplici.



R r 2

geritur.

geritur. Aliqui tamen affirmant, lapidem esse Ægyptium, in Thebaide nascentem, exigua magnitudine, æreo colore, gustu cum fervore quodam & adstrictione, mordaci.

Othonnam Dioscoridi fuisse incognitam, illud nobis manifesto argumento esse potest, quod nihil ex se de ea certi scribat, sed omnia alius accepta referat, ex quorum tantum opinione fama, hac de Othonna memoria prodidit. Quare mirari non licet, si nostra quoque, et ære Othonna minime cognoscatur. Non desunt tamen rei herbaria periti, qui eam plantam Othonnam esse censeant, quam Indicos Caryophyllos vocat vulgus: quibus ego quoque subscriberem, si hac planta eruce foliis cresceret, nisi paucis, cribri modo perforatis, & friabilibus. Verum cum foliosa sit planta, & non paucis foliis referta, quæ Tanacetum potius, quam Erucam referunt, eaq; cribri modo perforata, aut tanquam à vermibus erosa non sint, nec friabilia, non video sanè, cur in horum sententiam concedere queam. Nihil enim me movet ad probandam horum opinio-
nem floris color, & latifolia imago. alius reclamantibus notis, cum numerosa sint plantarum genera, quæ croceis, & latius proveniunt floribus. Ego quidem, si mihi decernendi facultas daretur, in Chrysanthemi genere hanc plantam reponerem, quod tamen alius, me peritoribus, decernendum relinquo. Caterum ut omnibus satisfactum esse intelligam, duas hujusce Indicae plantæ imagines hic addi curavi. Est itaq; hæc planta fruticosa, caulibus bicubitalibus, & quandoque majoribus, striatis, rectis, subtrufescentibus, è quibus multifida prodeunt folia, & numerosa, Tanacetum amula, sed majora, & magis divisa: radix illi est brevis, sed numerosa, nec altè descendens. Tria hujusce plantæ observavimus genera, floribus tantum differentia. Namq; genus est ceteris procerius, quod flores profert aureos, magnos, numerosis admodum stipatos foliis, odore minus quam in altero graveolenti. **ALIUD** floribus spectatur minoribus, bino, ternisq; eorundem ordine concinnatis, floribus in medio capillamentis ut in Rosa: hujus flores colore quidem & facie differunt, si enim ex aureo in purpureum colorem inclinant, subnigricantq; foliis crassiusculis, nitentibusq; aspectu admodum jucundo, adeo ut ex holoferico, quod Vellutum
vocalamus, à natura facti videantur, sed odore sunt gravi, & qui caput feriat. Postremum autem, quod prædictum est minus, nihil à præscripto differt, nisi quod non tam altè adolescit, & flores habet simplici tantum foliorum coronamento, sed ceterum minores. Cetera similia sunt. Prodeunt omnes è calyce oblongo, torosog; lychnidis coronaria ferè simili, longis pediculis nitentes. Semen inde fit oblongum, tenue, ac nigrum. Seruntur in hortu, videntur passim super fenestras in fictilibus & arcubus, spectaculi gratia. Excalscit & siccat, quo fit, ut ea quoque, in medicum usum trahi possit, ubi abstergere, & aperire sit opus, minor tamen valentius quam major. Hanc cum admisceat Paulus suis medicamentis, asserit quibusdam in locis majoris chelidoni succum esse, eorum fortasse opinionem secutus, qui ita scripserunt, ut refert Dioscorides. Ejus nomen Græcum *ὀθοννα*, Latinum item, & Italicum, Othonna. Caryophyllus Indicus, Italicus, Garofano Indiano.

Nomina.

Caryophyllos Indicos Matthioli, aliqui Othonnam Dioscoridis, & Plinii, alii Argemonem Diosc. alii Lycoperficum Gal. alii Caltham Plinii, quam gravis odoris dicit: alii Petilium florem ejusdem censent. Hi variant magnitudine, flore item simplici, rarius multiplici: colore rubri, crocei, mellei & albi. Tuncetum vel Africanum dicitur, eo quod primum hic flos in Germaniam fuerit illatus, quando Carolus V. Imperator, apud Tuncetum victoria potitus est. I. Tanacetum Africanum majus flore pleno. C. B. Caryophyllus Indicus major, Matth. Lugd. Caltha Africana fruticosa flore multiplici, Gefn. hort. Flos Africanus major, Dod. gal. & fol. Tab. Othonna major polyanthos. Lobel. Flos Indicus major flore pleno, Cam. Flos seu Caryophyllus Indicus. Cast. Flos Indiæ, Cæf. II. Tanacetum Africanum minus flore simplici. C. B. Caryophylli Indici, Trag. Tagetos Indica, Fuch. & Lugd. Flos Indianus seu Viola flammea, Fuch. in icon. Flos Africanus minor, Dod. gal. Flos Africanus, Dod. fol. Lob. Flos Indianus, Lonic. Caltha Africana minor flore simplici, Gefn. hort. Caryophyllus Indicus minor, Matth. Cast. Lugd. Othonna, Lac. Tanacetum Peruvianum, Cord. hist. & Rosæ Indiæ alii. Flos Indiæ alter minor, Cæfal. Flos Africanus minor flore simplici, Tab. Flos Indicus minor flore simplici, Cam. Sunt qui primum, Othonnam Dioscor. & Plinii: hoc verò Argemonem Dioscor. & Argemona Plinii statuunt. III. Tanacetum Africanum minus flore pleno. C. B. Matthioli una figura minorem utrumq; expressit. Hic dicitur flos Africanus minor multiflorus, Tab. Flos Indicus minor flore pleno, Camerario.

L. AURICULA MURIS.

a Meum, addit. λα-
πτα μικρά,
i. tenuia
parva.
b Meum
add. ὀφθα-
λμοῦ δὲ τοῦ
ἐκαστοῦ
ὀφθαλμοῦ
τῶν δὲ τῶν
ἐκαστοῦ.
i. in uni-
versum si-
milis est
scolopend-
rio, sed
levior, &
minor.
Auriculæ
muris cō-
sideratio.



Μυρὶς ὀττα. AURICULA MURIS.
CAP. CLXXIX.

Muris auricula, quam myosotida vocant, herba est caulibus pluribus ab una radice, aliquatenus ab imo rubentibus, & concavis: foliis angustis, oblongis, dorso acuto, elato, nigricantibus, per interval-
la assidue geminatis, atq; in mucronem desinentibus, & tenuibus cauliculis ex alarum sinu prodeuntibus: flosculo, ut anagallidis, ceruleo: radix digitali crassitudine, multis capillamentis fibrata. Radix illita egilop-
pia sanat. Sunt qui Alfinem, muris auriculā vocitant. Raperiuntur quidam Dioscoridis codices, qui hoc loco Alfinem habent, quæ libro quarto post helxinem describitur, quod & ipsa nonnullis Muris auricula appelleretur. Quæ forsitan nominis cognatione adducti, posteriorum quidam, ex quarto Dioscoridis volumine in hunc locum ipsam transulere, ubi sui generis,

generis, vel potius nominis alteram representavit Diosc. Sed quoniam ipsa Dioscor. scribendi series clarissime demonstrat, Alsinem statim post helxinem sequi debere, quod ei adeo similis sit, ut tradat Diosc. eandem fuisse cum helxine, nisi humilior esset, idcirco lib. 4. de ea nobis dicendum erit, quod inibi ejus legitimam sedem esse existimemus. Caterum hac, de qua hic mentio est, passim mense Maio floribus ornata visitur, nimirum in pratis, in campis, in hortis, secus vias, & ubiq; serè locorum.

II. ECHIUM SCORPIOIDES palustre.

Hujusce vires paucis perstrinxit Gal. lib. 7. simpl. med. sic inquit: Auricula muris desiccata ordine secundo: caterum nullam evidentem caliditatem possidet. Ea Græcè *αυρίκωρα* vocatur: Latine Auricula muris: Italice, Orecchia di topo: Germ. Waldr Mangolt mit blauen Blumen: Hispan. Oreja de raton yerva: Gallice, Oreille de ratte.

I. Auricula muris, Matth. Dod. gal. Lac. Cast. Lug. nisi sit Myosotis scorpioides (cujus figuram adjunximus) Lob. minus rectè expressa, quid sit ignoramus. II. Echiium SCORPIOIDES palustre, ex radice repente fibrosa, caules exsurgunt, aliquando reclinati, aliquando erecti, rotundi, leviter hirsuti, etiam glabri, sesquipalmares, etiam minores, & ad ripas aliquando bicubitales, qui in summo in duos tresve interdum ramulos, nudos, recurvos brachiantur: folia cingunt oblonga, subrotunda & pinguiuscula: summis ramulis flores insident ex quinque foliolis compositi, communiter dilute cærulei, aliquando candidi, quibus parvæ succedunt teche, pedicellis tenuissimis insidentes, quibus semen minutum albicans inclusum. Aquosis tantum locis nascitur: tota ætate floret, aliis ab radice cauliculis subinde enascentibus. Dicitur Cynoglossa minor, Brunf. Euphrasia cærulea, Trag. Tab. Echiium palustre Cord. Thal. Scorpioides cæruleum vel palustre, Gef. hor. Leontopodium Lon. & Lugd. Myosotis Scorpioides partim repens, partim erecta, Lobel. Heliotropium minus primum, Cæs. Hujus duæ species: altera palustris majore flore & penè glabra: altera in agris minore flore & hirsuta.

ISATIS. GLASTUM. CAP. CLXXX.

Sativum Glastum, quo infectores lanarum utuntur, folium habet plantagini simile, verum pin-

I. ISATIS DOMESTICA.

II. ISATIS SYLVESTRIS.



Rr 3

guius

guius, nigriusq;: cujus caulis duum cubitorum altitudinem excedit. Illita folia tumores omnes discutunt, cruenta vulnera glutinant, sanguinis profluvia sistunt: ignem sacrum, phagedænas, putrescentia ulcera, & quæ serpunt, sanant. Sylvestre glastum sativo simile est. Folia fert majora, lactucaceis proxima: caules tenuiores, multifidos, quadantenus rubentes: in quorum cacumine folliculi multi dependent, quandam linguarum effigiem referentes: in quibus semen flore tenui, luteo. Eadem, quæ & supra dicta, præstat: potu, & illiru lienosis auxiliatur.

Isatidis. **I**satis sativa, quam in Hetruria vulgò Guado appellamus, tingendis lanis, fullonibus & insectoribus maximè expetitur, quod lanarum insectus quibus cum admiscetur, firmet, & nunquam deperdi patiatur. Hujusce maximus habetur proventus in Umbria circa Noceram, ubi oppidum est Guadam: idè appellatum, quod ibi Isatis frequentissima seratur. Syl-
vestris nascitur in campestribus, incultis locis, & in pascuis. Glastum sylvestre, Plinio inter sylvestres lactucas recensetur libro 20. c. 7. quippe quod illi non sit absimile. Fit ex Isatide caruleus ille color pictoribus expetitus, quem Indicum vocant, de quo diffusus lib. 5. suo loco differemus. Meminit utriusq; Isatidis Gal. lib. 6. simpl. med. sic inquit: Isatis sativa, qua utuntur tinctorum, facultas est valenter exiccantis, nondum tamen mordentis: ost enim simul amara, atq; adstringens. At Isatis sylvestris manifeste jam acre quiddam tum gustu, tum actione præfert. Proinde quam sativa valentius desiccans, valentius etiam humida putredinibus obsistit. Planta Græcis ἰσάτις ἁγία, Latinis, Glastum sativum nominatur: Italis, Guado domestico. Quæ verò Græcis ἰσάτις ἁγία, Latinis, Glastum sylvestre, & Italis, Guado salvatico: Germanis, wild Weid: Gallis, Pastel sauvage appellatur. Utrumq; Glastum vocant Mauritanii. Dili, Dileg, Vesme, Chate, Chatis, seu Alchat, Adlen, aut Adblen, & Nil: Germani, Weid: Hispani, Pastel: Galli, Gueda, seu Pastel de Languedoc.

Isatis duplex: sativa, quæ Lactucæ quartum genus Plinio: Sylvestris, Lactucæ tertium genus eidem, cum enim animadvertisset Diosc. Isatidis sylvestris folia lactucacea dixisse, cum Lactucis miscuit. I. Isatis sativa, Trag. Fuch. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. (cui & Lureum Vitruvii) Ges. hor. Lac. Lon. Lugd. Isatis domestica, Matth. Cast. Glastum sativum, Lob. Cam. Glastum, Cæsalp. II. Isatis sylvestris, Trag. Matth. Fuch. Dod. gal. & fol. Lac. Lon. Ges. hor. Cast. Tab. Lugd. Isatis agrestis, Cord. in Diosc. Glastum five Isatis sylvestris, Lob. Cam. Habetur & Isatis Indica, Anil & Nil Garzia (ubi Clusius in notis addit cum Isatide convenire) à Costa, Cam. qui ex hoc Indicum in Ægypto fieri scribit.

Τηλέφιον.

TELEPHIUM.

CAP. CLXXXI.

† Meum
ἔνδι λανθάνον
i. angustis,
tenues.

Telephium herba portulacæ similis, & caule, & foliis: alas binas in singulis foliorum geniculis annectit: ramuli à radice + seni, septenive prodeunt, foliis referti cæruleis, crassis, lentis, carnosus: flore luteo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

I. FABARIA.

* II. TELEPHIUM PURPUREUM. *



teo, aut candido. Nascitur in cultis, & maximè inter vites tempore verno. Folia senis horis illita albam vitiliginem sanant: sed postea hordeacea farina illini debet. Perunctam ex aceto etiam in sole vitiliginem tollunt: sed ubi inaruerunt, absterguntur.

Quamquam