

calidam, digerentem, & exiccantem. Succus tum caulis, tum seminis, ut qua similis sint facultatis, nephriticos adjuvant. Radix pectoris excretionibus valenter conducit, minus quidem quam semen acris, non tamen minus amara. Trahit verò Nomina, etiam per nares sanguinem. Quod ὀφιοειδής Græci, Latini quoque, Crocodilium dicunt: Itali, Crocodilio,

ΔΕΥΤΕΡΑ.

DIPSACUS, SIVE LABRUM VENERIS.

CAP. XI.

I. LABRUM VENERIS.



Dipsacus aculeatarum generis est. Caulem habet altum, spinis horridum: foliis lactucae, spinosis, binis, genicula singula complectentibus, prælongis, ceu quasdam bullas intus & extra aculeatas, in dorsi medio habentibus, concavo alarum sinu, in quo imber, aut ros asservetur: unde dipsaci, quasi sitientis, nomen traxit. In cacumine caulis, singula furculis capitula insunt, oblonga, & echinata spinis: quæ arefacta, candida spectantur, dissectaq; medulla tenuis vermiculos ostendunt. Sanat rimas sedis fistulasq; si tusa, & decocta in vino radix, usq; dum sit crassitudo ceræ, immittatur. Medicamentum aërea pyxide recondendum. Ajunt fornicationibus, verrucisque pensilibus remedio esse. Vermiculi capitulorum in folliculo alligati, collo aut brachio appensi, produnt quartanis febribus remedio esse.

a Meum
 ἰσχυρὸν ἰ-
 ζήναι ὑπο-
 μήκας ἀ-
 κραιφύεις.
 i. similia
 crinaceo
 sublonga
 spinosa.

Dipsacus, quem Latini Labrum Veneris vocant, in Italia vulgaris est planta, in præcipue locis, ubi lanificia exercentur. Siquidem echinato ejus capitulo mangones rudem adhuc pannum pectunt, expolunt, detractisq; floccis concinnant. In Hetruria Dipsacum vulgò appellant Cardio da cardare, Forojulenses verò Garzo. Seritur is hodie in campis in compluribus Italie locis, præsertimq; in agro Bononiensi, singulari à cultoribus adhibita diligentia: quinetiam spontè nascitur nonnullis in regionibus. Sed & sylvestris quoq; sponte in campestribus, in agrorum, & scrobium aggeribus, in viis juxta sepes frequentissimus nascitur, nullis præsus repugnantibus notis, quas illi reddidit Dioscorides. Facie à priori parum admodum differt, sylvestris tamen est & spinis longè horridius: Echinata capitula setis quoque compluribus sca-

tent, aculeis non adeò firmis, atq; aduncis, ut in altero genere. Non differt suis omnibus in facultatibus ab altero. Invenitur

II. LABRUM VENERIS ALTERUM.



III. VIRGA PASTORIS.



Virga pa-
stori du-
plex.

Sylvatici
halluci-
natio.

Dipsaci
vires ex
G. leno
Nomina.

autumni tempore (ut experientia quemq. docere potest) in ejus capitulo jam exaresceto, medullitusq. dissecto vermiculus ille, quem collo adalligatum quartanis febribus remedio esse produnt, piscatoribus hanc affigendus maxime expetitur. Etsi Marcellus Diosc. interpres, & commentator, vermiculum hunc nunquam sibi compertum fuisse scribat. Dipsacus officina, & herbariorum vulgo Virga Pastoris major nominatur. Quippe minorem etiam illius amulam ostendunt: quanquam non adeo striato caule, ac spinis horrido constet, foliis item infirmioribus sit, & capitibus multo minoribus, ut quæ olivæ magnitudinem non excedant. Sunt autem hujus capitula tenuibus capillis referta, ita ut sericus viridi colore infectis floccis similia videantur. Provenit umbrosis & uliginosis locis. Non crediderim ego hanc plantam a veneris labro admodum distare, imbecillioris tamen esse facultatis haud negaverim. Ceterum animadvertendum est, neutrum Dipsaci genus, quod tum Serapioni, tum Avicenna describitur, esse Virgam pastoris. Quandoquidem is, quantum ex eorum scriptis colligere potui, Pastoris virga nil aliud esse putaverim, quam polygonum, cujus tam famine, quam maris historiam lib. 4. tradidit Dioscor. Quapropter illud mihi semper persuasum velim, quod non à Mauritani Dipsaco Virga pastoris nomen inditum sit, sed à Sylvatici sep. asiatico, qui suis potius pandectis, quam ceteris castigatissimis, & probatissimis scriptorum monumentis, fidem præstare consueverunt. Namq. Matthæus ille Sylvaticus pandectarum auctor, Dipsacum Virgam pastoris appellat: qui deinde in graviolem errorem lapsus, Dipsacum ipsum cum polygono turpiter confundit, utpote qui illud assequi non potuerit, quod Arabum Pastoris virga, esset Dioscoridis polygonum, non autem Dipsacus: qui quidem tantum à polygono differt, quantum lepores ab ursis. Dipsaci meminit Gal. lib. 6. simpl. med. his paucis: Dipsaci spinæ radix secundo ordine exiccatoria est, habetq. nonnihil absterforium. Planta quæ Græcis Ἀρσανός, Latinis, Labrum Veneris non inatur: Mauritani, Dipsacos: Itali, Cardo da panni, & Dissaco: Germanis, Kartendissel / Kartentrant / Zubenstrel / & Weberkarten: Hispanis, Cardencha, Cardo penteador: Gallis, Cardon à Carder, & Verge abergier: Bohemis, Striek: Polonis, Siczorki. Labrum veneris alterum iisdem appellatur nominibus, quibus primum appellari diximus. At Virga pastoris: Itali, Virga di pastore, & Dissaco minore.

Dipsacus nomen à contrario invenit, quoniam concavo alarum sinu, rorem vel imbrem recipiat, quo velut ad abigendas sitis injurias abutitur. Hic sativus est & sylvestris: est & folio in lacinias diviso: in quam clasiem referenda & Virga pastoris. I. Dipsacus sativus albo flore, C.B. Carduus fullonius sativus, Trag. Labrum Veneris, Matth. Cord. in Diosc. Cast. Cæf. Dipsacus albus, Fuch. Dipsacus sativus, Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Gef. hor. Dipsacus, Lug. Card. fullonum, Lob. Galedragon Xenocratis, Anguillare. II. Dipsacus sylv. purpureo flore, C.B. Carduus fullonum, Brunf. Carduus fullonis erraticus, Trag. Labrum Veneris alterum Matth. Labrum Veneris sylvest. Cast. Labrum Veneris, Cord. in Diosc. Lob. Labrum Veneris flosculis purpureis, Cæf. Dipsacus, Brunf. Lac. Lon. Tab. Dipsacus purpureus, Fuch. Dipsacus sylv. Dod. gal. & fol. Cord. in hist. Gef. hort. Thal. Dipsacus sativ. alter & Dipsacus sylv. major, Lugd. Molybdæna Plinii, Dalechampsio in Plin. III. Dipsacus sylv. minor, C.B. Cardui fullonii tertium genus, Trag. Virga pastoris, Matth. Lob. Cam. cui & Dipsacus fatuus: Dipsacus tertius, Dod. gal. & fol. cui & Galedragon Plinii. Dipsaci species minor, Gef. hor. Dipsacus sylvestris minor & Plumbago Plinii quibusdam, Lugd. Dipsacus minor, Thalyo.

Ἀρσανός λεονός.

SPINA ALBA.

CAP. XII.

Spina alba nascitur in montibus, & sylvis. Folia fert albi chamæleonis, angustiora, candidiora. aliquantum hispida, & aculeata: caulem supra bina cubita altum, pollicari, aut ampliore crassitudine

I. SPINA ALBA.



II. SPINA ALBA ALTERA.



albican-

albicantem, intus cavum: in cacumine capitulum inest spinosum, echini marini æmulum, sed minus, & oblongum: flores purpurei, in quibus semen, seu cnicum, sed rotundius. Hujus radix pota, celiacis, stomachicis, & iis, qui cruenta extusliunt, efficax est: urinam cit: tumoribus illinitur. Decocto ejus dentes in dolore collui prodest. Eporum semen convulsis infantibus, & à serpente demorsis auxiliatur. Gestatum pro amuleto serpentes abigere traditur.

- Spinam albam seplasiarii Arabas (ut plerumque solent) imitari. Bedeguar appellant. Sed non parva inter hos, & medicos <sup>Spinæ al-
bæ conf.</sup> Soritur contentio, quam in aculeatarum genere, quæ plurimas genuit natura, Spina alba legitime, notis omnibus ad-
stipulantibus, appellari possit. Verum etsi tantam litem transigere nequeant, interim tamen pro Spina alba alii alias her-
bas ostentant, & quisque suam veram existimat. Quandoquidem sunt eorum complures, qui sibi certò persuadent, Spinam
10 albam eam aculeatam herbam esse, quam aliqui Carduum benedictum vocant, alii verò vulgò herba Turca. Sunt alii, qui
Carlinam vocant, id est, album chameleonem, Spinam albam esse contendunt. Inter quos invenio Monachos qui in Me-
sue scripserunt, quorum sententiam, superius in chameleontis utriusque mentione, ut falsam reprobavimus. Sunt præ-
terea, qui Spinam albam esse velint echinatum Carduum illum, & spinis rigentem, qui Hetrusci in lacte cogendo coaguli
vicem explet. Non desunt insuper qui unam, vel alteram sylvestrem, ac spinis horrentem plantam, pro Spina alba nullo di-
scrimine accipiant. Quo fit, ut omnes in nullo veritatis lumine ducti, in hujusmodi tenebris oberrent. Errat, meo quidem ju-
dicio, hac in re Leonhardus Fuchsius: quippe qui ultimo suorum paradoxorum capite, Spinam albam eam aculeatam her-
bam appellat, quæ omnium in universum aculeatarum plantarum generum amplissimis constat foliis, latè humi se spar-
gentibus, ac crebris, albisque, seu lacteis tota confersa maculis. Unde apud quosdam Lactaria herba nomen adinvenit, etsi à
20 quàm plurimis, præsertim mulierculis, Carduus divæ Mariæ dicatur. Hallucinetur inquam, pace ejus dixerim, eo quòd
non animadvertit, hanc foliis albi chameleontis triplo, quadruploque, majoribus in campestris planitie nasci, ut nostra testa-
tur Hetruria, ubi passim ferè frequens nascitur, non autem in montibus, ac sylvis, ubi Spina alba Dioscoridi testimonio pro-
venit. Legitimam Spinam albam, cujus hic primo loco imaginem expressimus, misit ad me Patavio Jacobus Antonius Cor-
tus, rei plantariae admodum studiosus, quæ notis omnibus genuinam repræsentat. Siquidem foliis est albo chameleonti si-
milibus, angustioribus tamen, ac candidioribus, sub hirsutis, spinis rigentibus: caule verò bicutatili, pollicari, vel ampliore
crassitudine, sub albo, & inani: in cuius cacumine echinus sub albidus infidet, sed minor, & oblongior, purpureis intus flo-
ribus, & semine cnico simili. Huic plantæ descriptioni quæ etiam Dioscoridis est, adstipulantur frequentissime planta quæ
suis echinis, ac spinis rigentes, in excelsioribus Anania vallis montibus lariceis, abiegnis, & in piceis sylvis refertis, Julio
mense visuntur. Quapropter, ut quæ ad eos pertinent, recte agant seplasiarii, videant, sciantque, non in planitie, & convalli-
bus Spinam albam provenire, sed in montibus: quorum si quandoque, tum cacumina, tum sylvas adire non gravabuntur,
30 procul dubio non magno etiam labore ipsam nanciscuntur. Hac enim non modo seplasiarii maxime conducet, ut legiti-
mam Spinam albam suis comp. med. immisceant: verum & eorum errorem deprehendent (in hoc etiam Ruellius versatur)
qui sibi persuadent, Spinam albam illud esse cardui genus, quod à Tuscis, eo quòd (ut paulò antè diximus) coaguli vicem
præstet, vulgò vocatur Presura, quodque, nos Scolimum esse putamus. Est & ALTERA ACULEATA planta, cujus hic quoque
imago secundo loco visitur, quam quidam Spinam albam esse censent, sed plura in hac desiderantur. Error autem is fa-
cile deprehendetur, si illud adnotare voluerint, quòd aculeata hæc planta in hortis passim feratur, foliis albo chameleonti
longè majoribus: & capitula ferat, quæ marinum echinum non parum excedant. Commiscuit Mesues Spinam albam, ac
etiam Arabicam, quatum alteram suo idiomate Bedeguar, alteram verò Succbaa appellavit, syrupo de eupatorio vocato,
quem miris laudibus extulit ad diuturnas febres finiendas, ad eas præsertim, quibus naturalia viscera, nempe ventriculus
40 & jecur imbecillia sint reddita, & ubi à sua naturali temperie recesserint. Cujus tamen sententia non parum refragatur
Musa Ferrariensis: quippe qui longo sermone contendat, nec Arabicam, nec albam Spinam huic syrupo admiscendam esse,
quòd utraq, adstrictoria vi polleat, quæ (ut ipse ait) syrupo hujus intentione, admodum repugnat, cum ad diuturnas obstru-
ctiones tantum reserandas, semper hujus apud medicos fuerit usus. Quæ in re non solum ostendit Musa auctoris mentem
non percepisse, sed nec etiam in hoc (pace viri aliqui clarissimi dixerim) exactam curandorum morborum rationem cal-
luisse. Nam cum Mesues syrupum hunc composuisset ad illas curandas febres, quibus naturalia viscera imbecillia sunt red-
dita, optima componendi methode tam Spinam albam quàm Arabicam illi inseruit, utpote quæ adstrictoria vi, quæ polleat,
languida illa ac infirma membra, plurimum roborarent: quibus incommodus solent periti, ac docti medici iis medicamen-
tis occurrere, quæ odore fragrantia adstrictoria facultate commendantur. Hinc itaque, facile intelligi posse crediderim, quàm
absurda, explodendaque, sit hæc Musæ sententia. Quin nec illud consilium ejus seplasiarii accipiendum putaverim, quòd
50 spinæ albe, & Arabicæ loco, silicula radicem, ac sabinae folia huic syrupo substituere possint, & debeant, ut magis atque ma-
gnum vasa tum viscera laxet. Quippe quòd si tantum laxandi, ac reserandi facultate hoc medicamentum debuisset esse
præditum, non modo harum spinarum radicibus, cavere debebat, sed etiam rosis, lentiscina resina, Indica nardo, & malaba-
tho expoliari: cum tamen hæc omnia mature, diligenterque examinata, non sine methode, ut quæ robur his visceribus alla-
tura sint, ab ipso Mesue huic syrupo fuerint admista, ne scilicet natura diuturna febre imbecillis facta, & à relaxantibus,
ac admodum reserantibus medicamentis vexata, totam humorum molem alvi profluvio, ob contentricis facultatis amif-
sum robur, tanquam viribus omnibus destituta, ad mortem usque demitteret. Meminit Spina alba Gal. lib. 6. simpl. medic. sic
inquiens: Spina alba radix desiccatoria est, & modicè adstringens. Quæ mobrem & celiacos, & stomachicos juvat, & san-
guinis rejectiones cohibet, & ædemata illita contrahit, ac dentibus dolentibus prodest, si decocto ejus colluantur. Semen te-
nuis essentie & calidæ facultatis est. Itaque, potum iis, qui convelluntur, convenit. Quæ planta Κνωβα λέγεται Græcè, Spina Nomina.
60 alba Latine dicitur: Arabicè Bedeguar: Italicè, Spina bianca.

Circa Spinam albam non levis controversia, alibi tractanda. I. Quæ hic primo loco posita in primis non habetur editionibus, at in duabus, ubi majores figuræ, Spina alba altera dicitur: in Italica edit. titulus est, Spina alba & nigra: in compendio prætermittitur, quare nomine Spinæ albe alterius Matth. Lugd. historia pinxit, Spinam albam Penæ, pronunciando. II. Quæ verò Spina alba altera Matthiolo nominatur, in primis editionibus, ut & compendio, pro Spina alba pingitur: editione verò Italica, Spina alba quorundam nominatur: dicitur Chamæleon verus, Trag. Chamæleon niger, Fuch. fol. Spina incognita, eidem in icon. Spina peregrina, Dod. gal. Carduus Sphærocephalus, Cord. hist. Dod. fol. Tab. Crocodilium, Lac. an & Cord. in Dios. Echinopus aliquibus, Spina alba, Gef. hor. Spina alba putata, Cam. ad Matt. Chalceios Theoph. & Plinii, Lugd. Tetralix spinosa, eidem. Crocodilium, Fuch. & Cordi, Lob. in obser.

Ritro seu Rutro Theoph. Lob. icon. Hujus & alteram speciem Cam. addit suo Matthiolo, quæ à præcedenti potissimum floris colore, qui cæruleus est differt, & quòd illo humilior, foliaque candidiora & angustiora habeat.

Αἰκὴν ἀνὰ πρὸς πύλιν.

SPINA ARABICA.

CAP. XIII.

α Πρὸς Ἰω-
άννην γλωσ-
σσοι.

Spinam
Arabicā
non esse
Acetiam.

Ruellii
hallucina
tio.

Plinius
de Spina
Arabica.

A Rabicam spinam natura albæ spinæ similem esse constat. Ipsa siquidem stringit. Ad sanguinis rejectiones, & mensium abundantiam, cæterasq; fluxiones radix etiamnum valet. Provenit in asperis.

* SPINA ARABICA. *

Erasse eos nimirum crediderunt, qui sibi persuaferunt, Arabi-
cam spinam, cuius hic meminit Diosc. eam aculeatam Arabia
esse arborem, quam Acaciam vocant. Cujus erroris illud in pri-
mis indicium est, quod nusquam consueverit Dioscorides alicuius
stirpis historiam diversis capitibus repetere, nec etiam arbores
herbis commiscere. Nam cum longa historia Acaciam arborem,
quæ etiam Aegyptia spina vocatur, primo libro inter arbores de-
scripserit, absurdum quidem videretur, si eandem præter morem
hic inter aculeatas herbas repeteret. Ad hoc indicium & illa ra-
tio accedit, quod si seorsum harum plantarum historiam tradidit
Diosc. diversas quoque plantas esse necesse est. Quamobrem non
parum Ruellius hallucinatus deprehenditur, quod non animad-
verterit, in sua hujusce Arabica spina mentione. Dioscor. hoc loco
aculeatam quandam Arabicam herbam, alba spina in universum
amulam intellexisse, non autem (ut ipse putat) Acaciam nuncu-
patam. Quæ in re non satû virum hunc admirari possum, quippe
qui non modo & Græci & Latini literis sit habitus peritissimus,
ac inter eos, qui hac nostra ætate de stirpium historia scribere fa-
cile princeps, sed qui etiam Plinii historia fuerit studiosissimus:
quem tamen si accuratius perlegisset ac sequi voluisset, nunquam
arbitror in eum errorem incidisset. Quandoquidem Plin. lib. 24.
cap. 12. alteram ab altera separavit, & primo hujus, de qua agi-
mus, mentionem faciens, sic inquit: Spina Arabica laudes, in odo-
rum loco diximus: & ipsa stillat, stringitq; distillationes omnes,
& sanguinis excreationes, mensumq; abundantiam, etiamnum
radice valentior. Quæ à Dioscoride verbotenus translulisse per-
spicuum est. Mox meminit Arabica alterius spina, quæ in arborem
assurgit, his verbis: Est & Acacia spina. Fit in Aegypto alba, ni-
graq; arbore, item viridi, sed longè melior est prioribus. Ejusdem
meminit etiam lib. 13. cap. 9. postquam Persea arboris materiem
miris laudibus commendavit, ubi hæc habet: Nec minus Aegyptia
spina celebratur in eadem gente, dumtaxat nigra. quoniam in-
corrupta etiam in aquis durat: candida verò facile putrescit.
Quibus ex locis palam est, non credidisse Plinium, unam tantum
Arabiam, vel Aegyptiam esse spinam, quamvis Ruellius non ita
rem acceperit. Qui item Galen. sententiam hac in re non animad-
vertisse videtur: siquidem Galen. libr. 6. simpl. med. ita scribit:
Spina Arabica radix profluvium muliebri juvat, & alia quacun-
que, quibus auxilio est quæ apud nos nascitur spina: sed efficacius
amen omnia juvant tum radix, tum fructus ipsius. Hic verò &
olumella prodest, & iis, quæ in sede inflata sunt: tum ulcera ad-
cicatricem ducit, mediocrem habens, & non molestam adstri-
ctionem: hæc Galenus. Qui ut has plantas diversas habuit, ita
etiam seorsum de earum viribus disseruit. Planta ἀκανθὰ ἐραβινὴ
Græci dicta, Spina Arabica Latinis pariter & Italis appellatur:
Mauritanis, Suchaba.

Quam prospina Arabica figuram adjecimus, Spinam Arabicam Diosc. & Plinii cenfet Cæf. at Adversaria & Lob. Carduum tomentosum nominant: Suchaha Arabum, Guilandino dicebatur, de qua in historia.

Στέλιος. CARDUUS. CAP. XIV. 60

CARDUUS, Græci scolymon vocant, † folia chamaeleonis habet, & albæ spinæ, nigriora, & crassiora: caulem *a* longum edit, foliosum, capite spinoso: radice *b* nigra, & crassa. Quæ illita graveolentiam alarum, totiusque corporis emendat: item si decocta in vino bibatur: copiosam autem urinam, foetidamque expellit. Herba cum recens tenerescit, in olera, asparagi modo, transit.

Et β

Spinæ A-
rabieꝝ vi-
ces ex Ga-
eno.

Nomina.

† Oribaf.
μαλίζου ζο-
μασθέντος
κὲ τῆς λελ-
κῆς ἀκύν-
θης. i. in-
terchamē
leonem,
& albam
spinam.
a Cat. μα-
πρόν. i. par-
vum; sed
mendosē
ut puto.
b Cat. λευ-
κῆ. i. alba.

1. CARDIUS ACULEATUS.

Etsi unus tantum Cardui breviter etiam hoc loco meminerit Dioscorides, Theophrasto tamen, Plinio, ac aliis probatis auctoribus, plura Cardui genera traduntur. Verum ut primum de his, qui natura cultrice sponte proveniunt, sermo fiat, scire sane convenit, quod eorum diversa sunt genera: quorum tamen nomina propria, quod sciam, non habentur. At qui Plinio lib. 30. c. 23. duo tamen eorum genera produntur: unum fruticosius statim a terra: alterum vero unicum, & crassius. Sativorum autem, qui tum in hortis, tum in agris seruntur, multiplex est genus. Horum principem locum tenent, qui Hetrusci vulgo vocantur Cardoni. Namq; ii diligenti cultura adeo teneri, fragiles, albiq; evadunt, ut magno quidem apparatu, secundis cœnis pro bellariis cum sale, & pipere expetantur. Quo argumento ductus, equidem putaverim de his verba fecisse Theophrastum libro 6. cap. 4. de plantarum historia, cum ita scribit. Quam autem Cactus nuncupata est, in Sicilia tantum nascitur, Græcia nusquam habetur sui generis planta: hæc enim statim ab radice caules repentes in terram mittit, folio lato, atq; spinoso: caules hos Cactos appellant, desquamati cibo idonei sunt, paulo amaricantes: & reservare hos aqua salsa conditos consueverunt: hæc Theophrastus. Nostrates, quibus ubiq; nunc Hetruria scatet, eo ex Neapoli allati fuerunt. Neapolim vero (ut audio) ex Sicilia. Quapropter nostri cum hoc Theophrasti genere maxime convenire videntur, quod scripserit, Cactum Sicilia peculiarem esse plantam. Carduus ACULEATUS folia gerit non aculeato magis divisa, magisq; laciniata, tenuibus circumdata spinis, caulem quoq; alteri similem, striatum, subalbicantem, in cuius summitate echinatum, aculeatumq; extuberat caput, flore hyacinthino: semine Cnici minore. Radice nititur crassa, firma, non insuavi. Colitur in hortis ad mensuram bellaria. Idem præstare potest, quod alter. Continentur præterea in Carduorum genere etiam ii, quos in Italia Hetruscum vulgus appellat Carcioffi, alii vero inibi Archiocchi dicuntur, quorum item meminit Theophrastus eodem loco, cum subdit: alium vero caulem erectum producit, quem pernicem vocant. Is quoq; cibis aptius excrevit, sed reservari non patitur: fructus in quo semen echinatum specie est. Verum exemptis lanuginosis semibus, ii quoq; vespens relinquitur, & cerebro palma similis est: hæc tamen Theophrastus. Qui pro palma cerebro illud, quantum equidem reor intelligit, quod Galenus encephalon pluribus in locis appellari tradidit, & quod nunc corrupta voce Neapolitanis, & Siculis vulgo vocatur Cefaglione, de quo libro primo in Bdellii mentione abunde disseruimus. Carduorum autem, quos vulgo Carcioffi vocari diximus, nobis plura sunt genera, varia capituli forma distincta. Siquidem proferunt omnes echinata capitula, sed aliqui spinis sursum respicientibus constant, alii vero ad terram versis, nonnulli etiam tam in foliis, quam in fructu aculeis vacant, ob idq; ceteris in cibis præstant. Sunt præterea in hoc postremo genere, quibus echini in longum fastigium, quibus vero in globum extuberant, dehiscentibus in altero squamatis spicis, in altero iisdem squamis, veluti corticosis unguitibus in unum compactis, & coagmentatis, nucis pineæ instar. Spinis carebunt, ut hortorum cultores testantur, Carduorum capitula, si priusquam feratur semen, acuminata ejus latera retundantur. Sine aculeis etiam nascuntur, si delibratis lactucaradicibus, & dissectis semina integra condantur. Unde illud facile potuit factum esse, ut ii, qui aculeis non regunt, humano cultu mitiores evaserint, cum natura Carduorum omne genus spinis vacare nequeat. Carduus

II. CARDIUS NON ACULEATUS.

III. CARDIUS VULGA.



qui ACULEIS caret, folia promit grandia per ambitum laciniata, aversa parte subalbicantia, numerosaq;: caulem edit longum, foliosum, capite echinato sine aculeis tamen: & quadantenus pini cono simile. Seritur passim in hortis & viridariis. Radicum decoctum potum hydropicos, & ictericos sanat. Echini nondum florescentis pulpa, & carni jure decocta, pro bellariis utimur: una cum sale & pipere, & qui veneri indulgent, galanum quoq; addunt. Itali raro decoquunt, sed echinata capita cruda cum sale vorant. Cardui meminit Galenus libro 8. simplicium medicamentorum: nec tamen plura de ejus viribus tradidit, quam fecerit Diosc. Sed de temperamento differens, et caliditatis secundum ordinem completum, aut tertium incipientem, siccitatis vero secundum a signavit. Et lib. 2. de alimentorum facultatibus, Carduum Cinaram appellavit,

Nomina. pellavit, ac alimentum, quod corpori praeber, meritiò damnavit, quòd melancholicum succum generet. *Ἐνάλιμ* & ea planta est Graecis, quae Latinis Carduus, Cinara, & Strobilus nominatur: Arabibus, Raxos, Harxos, sive Sacolomas: Italis, Cardo, Carcioffo: & Archichioeco: Germanis, Strobilsdorn: Hispanis, Caroo de comer, sive Cárδος: Gallis, Artichault, & Carciophe. Carduus aculeatus, Graecis, *Ἐνάλιμ* & *ἀκανθώδης*: Italis, Cardo & Carcioffo Spinoso.

Scolymus sativus est & sylvestris: Sativus duplex, aculeatus & non aculeatus, & rursus capitis figura nunc oblonga, nunc rotunda, haecque maximum, mediocre & parvum, cujus squamæ in aculeum definent brevem, nunc robustum, nunc infirmum, nunc propè nullum: quorum color nunc subrubens, nunc viridis. Dicitur Carduus Plinio, Cinara Galeno & Columellæ. I. Scolymus aculeatus, C.B. Tab. Scolymus, Trag. Fuch. Cord. in Dioscor. & hist. (cui & Carduus sativus) Lobel. (cui & Cactos Theophrasti) Cam. Carduus aculeatus, Matth. Carduus Lacun. Carduus hortensis spinosus, Gef. hort. Cast. Carduus Scolymus, Lon. Carduus altilis, Lugd. Cactus, Matthioli eidem. Cynara aliud genus, Dod. gal. Cinara, Dod. fol. à Cinere, ut habet Columella, quo stercoreari amat. Cardones Cæsalpino. II. Scolymus non aculeatus, C.B. Tabern. Cardui alterum genus sine aculeis, Trag. Carduus non aculeatus, Matth. Carduus aut Scolymus non aculeatus, Lonicer. Carduus hortensis non spinosus, Cast. Carduus hortensis, Scolymus Cactus, vel Cinara vulgo Artischau, foliis sine spinis, Gef. hort. Carduus sativus, Cæsalp. Cinara, Dod. gal. Lac. Cinara non aculeata, Lugd. sæpè ex uno semine utraque provenit, ut speciatim aculeata ex semine non aculeati: quamvis & majore & minore habeatur semine. III. Carduus vulgaris, Matth. quem in compendio omisit Lugd. Carduus vulgarissimus viarum, & Onopyxos Guilandino, Lob. Carduus sylvestris alter, Dod. fol. cui & Scolymus Plinii, Scolymus sylvestris, Cam. ad Matth. Heracantha Tabernæmontano.

Ποτέριον.

POTERIUM.

CAP. XV.

a Meum
Scolymus
in pulvis.
ita habet
meum.
Sed Cata.
Scolymus
in pulvis.
b Oculi
in pulvis.
L. in pulvis

Poterii
consider.

Cornarii
opinio fal
sa Prunū
sylvestre
Poterium
credentis
Poterii
vites ex
Galen.

Nomina.

Poterium, Jones neurada vocant, a largè fruticat, cortice obductum tenui, spinis horridum, lanugine spissa, ramulis longis, mollibus, lentis, tenuibus, tragacanthæ proximis: foliis parvis, rotundis: flore exiguo, candidi coloris: semine nullius usus, sed gustu acuto, & odorato. Nascitur in b aquis, & collibus. Radices demittit binum ternumve cubitorum, nervosas, & firmas: quæ proximè terram recisæ, dant succum gummi similem. Tufæ, præcisus nervis, & vulneribus glutinandis illinuntur. Decoctum quoque ejus nervorum affectibus prodest.

POTERIUM.



qua collecta & neta, vestes bombicinis similes texunt. Folia vel radices ad remedia opisthoroni bibuntur.

Acanthii
consider.

Si planta in Italia nascitur, quæ legitimè Acanthium repræsentet, hac profecto, cujus hic imaginem expressimus, Acanthium mihi rectè repræsentare videtur. Siquidem foliis est & albæ spinæ per extremitates aculeatis, & araneosa lanugine obductis. Id quod non nobis tantum opinionem auxit, sed aliis quoque, rei plantariae studiosis. Nascitur in montibus & locis incultis.

Poterium adeò Tragacantha proximum habetur, ut illi omnibus suis notis congener esse videatur. Peculiariter autem supremos ramos habet in vertice extuberantes, & tenui lanugine obductos, quod in Tragacantha non visitur. Plantam itaque quam hic pro Poterio appinximus, misit ad me Constantino poli Clarissimus Augerius de Busbecke, Cæsaris Ferdinandi Orator apud Solimanum Turcarum Imperatorem. Sed hic nobis admodum mirari subit Janum Cornarium, virum aliqui aetatis nostræ insignem, quod prunum sylvestrem Poterium esse crediderit. Quæ certè sententia, ut est meo judicio absurda, ita non immerito à Fuchio medico clarissimo refellitur. De Poterio scripsit Galenus libro octavo de simplicium medicamentorum facultatibus, his verbis: Neuras, quidam Poterium vocat. Desiccandi absq; morfu facultatem possidet, adeò ut nervos incisos glutinare credatur. Radices ejus porissimum sunt ejusmodi: quin & decoctum earum quidam exhibent iis, quibus affecti sunt nervi. Id Graeci ποτέριον, quod item Poterium Latini vocant: Itali, Poterio.

Poterium, Matth. Cast. Lugd. Tabern. videtur eadem cum ea quam Clusius historia Hisp. pro Tragacantha altera proposuit, & an Poterium sit dubitat, quem sequutus Lobel. & Lugd. Tragacantham alteram, sive Poterium Clusii nominant, & Tragacanthæ secundæ nomine Tabernæmontanus exhibet, sub quo nomine & Bellonius libr. 1. observat. 17. referre videtur.

Ακανθιον. ACANTHIUM. CAP. XVI.

Acanthium albæ spinæ simile, folia aculeatis per extremitates, & lanugine araneosa obductis, ex

I. ONONIS.

* II. ANONIS NON SPINOSA

Purpurea. *



admodum sit infesta. Nam etsi praedura, callosa, sit eorum cutis, eam tamen suis perforat aculeis, quibus quasi spiculis, cum maturuerit, horrida conspicitur. Insuadet hanc vulgo Bonaga vocant. Caterum quamvis floru ejus nihil memnerit Bonaga, Dioscorides: constat tamen flore plerumq, purpureo subalbicante, interdum tamen aureo. Sed hac quibusdam in locis aculeis vacat flore melino, quanquam in aculeata purpureus flos perpetuo spectetur. Eandem floribus albis vidimus nos parumper extra Pragam, via qua itur ad Divam Margaritam. Meminit Anonidis, ononidis nomine, Theophrastus l. 6. c. 3. de plantarum historia, sic scribens: Ononis ramus aculeiger est, anno tantum perdurans, foliorum ruti similis sed per totum caulem apposito, ut veluti coronam ex intervallis tota species repraesentet. Florem minutulum, & in filiqua non undiq, septum edit.

40 Nasitur glutinoso latro, solo, & praecipue in segetibus, atq, cultis, qua de causa agricolis inimica exit. Vivax: admodum est: cum enim altam nata tellurem fuerit, protinus sua infusa pellit: & singulis annis, surculus in latum emisso, rursus postero anno deorsum versus pellere solita est. Ideoq, effodienda tota, extirpandaq, penitus est. Incipit germinare estate, perficiturq, autumno: haec Theophrastus. Hujus quoq, mentionem fecit Plinius l. 27. cap. 4. ubi sic inquit: Anonim, quidam ononida malunt vocare, ramosam similem saxo Graco, nisi fruticosior hirsutiorq, esset, odore jucundo: post ver spinosa: hac Plinius. Qui tamen hac in re errasse deprehenditur: siquidem non post ver Anonis spinosa redditur, sed (ut Theophrastus auctor est) in autumno. Id quod etiam experimento comprobatur. Anonidis radix vim maximam praestat ad renum calculos comminuendos, expellendosq, obstructis praesertim urinae meatibus: quod multorum testimonio compertum est, qui calculo affecti, ubi tantum radicum pulverem ex vino diutius bibissent, pristinae sanitatem recuperarunt. Novi ego quendam, qui hujusce radicum pulvere duntaxat pluribus mensibus sumpto, carnosum ramicem absumpsi & sanatus est: licet a medicis nullo alio medicamento, quam sola sectione unctioneq, hunc curari posse antea statutum esset. Prodentur radicum pulvere callosi ac indurati ulcerum margines. Decoquitur eadem ex posca utiliter ad dentium dolores, mulcet enim hos, ubi jure os colluatur, & praesertim ubi pituita redundet. Sunt qui putent sanari hemorrhoidas epoto tantum radicum decocto. Caterum id, ut mihi compertum est, praestat potum summopere ad Jecinoris, & vasorum infarctus. Fit e radicum aqua, qua pota non solum calculosos expedit renes: & urinam provocat, sed etiam vesicam, & ejus cervicem glutinosis excrementis obfessam expedit. Sumuntur Corticum recentium radicum libra quatuor: haec minutim concisa, in vini Cretici libris octo macerantur, deinde vitreo alembico in aqua calentis balnei collocato, elicitur aqua, qua in praescriptis affectibus plurimum praestat, pota semilibra pondere. Anonidis vires descripsit Gal. l. 8. simpl. med. sic inquit: Ononis radicem habet tertio quadantenus ordine excalfacientem. Cortex ejus maxime est utilis, habens quippiam & absterforium, & incisforium. Proinde non tantum urinas provocat, sed & lapides confringit. Eadem facultate & crustas cito detrahit. Liuntur porro ea quoq, & ad dentium dolores, in oxycrato decoquentes, & collui decocto jubentes. Huic planta nomen Graecum est ἀνωνίς, & ὀνώνη, Latinum item Anonis, & Ononis: Italicum, Anonide: Germanicum, Hantbechel und Stallfrant: Hispanicum, Gatilbos, & Gathinos: Gallicum, Bugraves, & Burgrundes: Bohemicum Gebbica: Polonicum Tglica, sive lisiogon.

60 Anonis Dioscoridi & Plinio a non juvando, siquidem aratoribus impedimento sit, unde Remora aratri, at Theophrasto & Galeno Ononis, quod asinos ad illam seseferentes juvet. Hanc distinguimus in spinosam & non spinosam: spinosam in purpuream eamq, majorem & minorem, luteam, albam: non spinosam vero in purpuream & luteam. I. Anonis spinosa purpurea, C.B. Restia bovis, Trag. Lonic. Anonis sive Ononis, Matth. Lac. Tab. Anonis, Fuch. Dod. gal. & fol. Cast. Anonis, Gef. hor. Cord. in Diosc. Anguil. Lob. Cæsal. Thal. Lugd. Aegyptios Cratevæ, Anguillæ. II. Anonis non spinosa purpurea, C.B. Tab. Ononis perpetuo lævis, Gef. hor. Anonis non spinosa sive mitior prima, Clus. Pann. cui & trifolium

Anonidis
bist. ex
Theoph.Plin. l. 27.
cap. 4.
ubi sic inquit:
Anonim, quidam ononida
malunt vocare, ramosam
similem saxo Graco, nisi
fruticosior hirsutiorq,
esset, odore jucundo: post
ver spinosa: hac Plinius.Anonidis
vires Mat
thiol.Aquez Anonidis
vires.Anonidis
vires ex
Galen.
Nomina.

foetidum. Anonis live Ononis sine spinis, Camerario. III. Anonis non spinosa lutea, C.B. Hæc ex radi-

* ANONIS NON SPINO-
sa lutea. ** Meum
mixtus i-
zeus. i.
amaram
valde.

ce parva, lignosa & fibrosa, caules emittit pedales & altiores, ramosos, geniculatos, hispideos, unctuosos, quos folia multa lata basi alternatim amplectuntur, plerumque quina, interdum etiam terna ex eodem pediculo prodeuntia, quæ molliora & longiora, quam vulgaris, in summo obtusa & crenata, saluginea. Flores in summis cauliculis brevioris spica nascuntur, luteopallidi, leguminum specie quibus succedunt siliquæ oblongæ hirsutæ in capreolum sinientes, quibus semen pullo colore includitur. Tota planta lento & unctoso humore obita est, non tamen adeo graviter odorato, ita ut attrectanti quasi manus visco retineantur, & ubi sponte nascitur candidior, quam si in hortis colatur. Hanc passim circa Monspelium ad agrorum margines, & inter segetes observavimus: in Hispania & Lusitania quoque reperitur. Dicitur Natrix Plinii herbariorum, Lobel. cui & Melilotus sylvestris pinguis Pennæi. Ononis lutea montana, Cam. ad Matth. Ononis lutea non spinosa, Lugd. Anonis mitior flore luteo, Clus. hist. Pann. qui Hispanis Ciceris genus existimari scribit.

Anonis lutea.

LEUCACANTHA.

CAP. XIX.

Leuacantha, prædita est radice cyperi, & valida & amara quæ manducata dolorem dentium sedat: veteri laterum dolori atque ischiadicis prodest, decocto cyathis tribus ex vino poto. Eadem ruptis, & convulsis medetur. Radicis epotus succus eisdem præbet effectus.

In manifesto errore versantur, qui sentiunt, Leucacantham, hoc est albam spinam, de cuius historia, & viribus hoc capite tractatur, ab Acantha leuce, id est, spina alba, de qua paulo superius differuimus, nullo pacto differre. Quia in sententia, vel potius errore, fuere nonnulli ex recentioribus, alioqui rei herbaria periti. In quorum etiam numero Ruellius fuisse ex eo maxime deprehenditur, quod cum debuisset, more suo, post Anonidis tractationem, cuius titulo spinam albam quoque adjunxerat, quam tamen albam nominasse rectius forte erat, ejusdem alba spina historiam referre, ex industria eam silentio præterit. Nam cum existimasset, alteram ab altera non distingui, non opus esse judicavit, earum historiam in alba spina repetere, quam antea in spina alba mentione tradiderat. Quo tamen in loco ab errore vindicari non potest: quippe quoniam postquam spina alba, quam Mauritanii Bedeguar appellant, meminere, alteram ejus nominis spinam subdidit: quam cum in arbutum undiq, aculeis armatum assurgat, sepibus extruendis rusticis nostratibus maxime expetitur. Non tamen ob id declarat ipse hanc esse Leucacantham: sed lubrico quodam lapsu, quasi sui ipsius, & cuius spina alba mentionem faceret, oblitus, in capitis calce aculeatæ illius arbutula radicibus, quæ (ni fallor) candida est Dioscoridi rhamnus, omnes tribuit facultates, quibus legitima spina alba à Dioscoride commendatur. Qui quidem Ruellii error omnibus evidenter est, quam ut pluribus refelli postulet. Quod autem differant inter se Acantha leuce, & Leucacantha, non modo Dioscorides inter ceteros simplicium medicamentorum scriptores facile princeps ostendit: sed Galenus etiam & Paulus, qui præterquam quod alteram ab altera diversis capitibus distinxerunt, earum singulam differentibus facultatibus præditam esse tradiderunt. Quorum sententia subscribit Plinius: nam de Acantha leuce differens l. 24. c. 12. sic inquit: Spina alba semen contra scorpiones auxiliatur. Corona ex ea imposita capitis dolores minuit. Sed vires longè alias ab his Leucacantha idem retulit l. 22. c. 16. ubi sic habet. Leucacantham alii phyllon, alii ischiada, alii polygnaton appellant, radice cyperi, quæ commendata a dentium dolorem sedat: Item laterum, & lumborum (ut Hicetius tradit) semine poto drachmis octo, aut succo. Eadem ruptis, convulsisq, medetur: hæc Plinius. Quæ quidem vidisse debuerat Ruellius, alioqui Pliniana historia studiosissimus: aut certe Hermolao doctissimo viro credidisse, à quo (et si nunquam illum citet) integra quandoq, capita, imò (pace ejus dixerim) integrum fere surripuit opus, ita ut in omnibus illud suum fecisse videatur. Siquidem Hermolao cum in Leucacantha, tum alias sepe numero commonuit in suo Corollario, hanc ab acantha leuce differre. Porro illud etiam nobis silentio non dissimulandum, ut ingenuè quod sentimus de simplicibus dicamus, quod Leucacantha herba est, non autem arbutula sepibus conficiendis idonea, ut falsò, mea quidem sententia, Musa Brasavolus suo de syrupis libello in eupatorii syrupo existimat. Nam hoc loco de herbis tantum, & non de arbutulis scribit Dioscorides: qui nimirum in stirpium historia peritissimus, arbutulam illam supra libro primo inter Rhamni genera descripsit, & sub candido, ut puto complexus est. Ceterum cum nec Dioscorides, nec Plinius tradant, quibus foliis, quo caule, flore, ac semine Leucacantha proveniat, difficile quidem fuerit inter tot aculeatarum stirpium genera, unam secernere, quæ verè Leucacantham repræsentet: tamen si damnnandus usquequaq, non esset, qui dixerit Leucacantham esse sortasse aculeatum illum Carduum, de quo in Acanthalence diximus, cujus folia albis quibusdam maculis depinguntur, unde illi nomen apud Italos est lacteus carduus, & apud alias nationes Maria carduus. Nam præterquam quod conjectura quadam dici posset, eam à maculis illis albicantibus sibi Leucacantha nomen advenisse, radicis etiam ipsius tum durities tum amaritudo, et si forma cyperinas non emuletur, consentire videtur. Sed hoc potius disputandi, quam asserendi gratia proponimus: cum adhuc haud ulla nobis comperta sit planta, quæ legitimam Leucacantham repræsentet. Ceterum cum hæc CARDUUM, quem quidam Diva Maria, alii Lactarium ab albis maculis vocant, in mentem revocaverit, non ab re sanè esse judicavimus, si ejus historiam, & vires hic explicabimus. Est itaq, Carduus hic, quem

Leuacantha vires ea Plin. Ruellius Hermolao doctissimo viro credidisse, à quo (et si nunquam illum citet) integra quandoq, capita, imò (pace ejus dixerim) integrum fere surripuit opus, ita ut in omnibus illud suum fecisse videatur. Siquidem Hermolao cum in Leucacantha, tum alias sepe numero commonuit in suo Corollario, hanc ab acantha leuce differre. Porro illud etiam nobis silentio non dissimulandum, ut ingenuè quod sentimus de simplicibus dicamus, quod Leucacantha herba est, non autem arbutula sepibus conficiendis idonea, ut falsò, mea quidem sententia, Musa Brasavolus suo de syrupis libello in eupatorii syrupo existimat. Nam hoc loco de herbis tantum, & non de arbutulis scribit Dioscorides: qui nimirum in stirpium historia peritissimus, arbutulam illam supra libro primo inter Rhamni genera descripsit, & sub candido, ut puto complexus est. Ceterum cum nec Dioscorides, nec Plinius tradant, quibus foliis, quo caule, flore, ac semine Leucacantha proveniat, difficile quidem fuerit inter tot aculeatarum stirpium genera, unam secernere, quæ verè Leucacantham repræsentet: tamen si damnnandus usquequaq, non esset, qui dixerit Leucacantham esse sortasse aculeatum illum Carduum, de quo in Acanthalence diximus, cujus folia albis quibusdam maculis depinguntur, unde illi nomen apud Italos est lacteus carduus, & apud alias nationes Maria carduus. Nam præterquam quod conjectura quadam dici posset, eam à maculis illis albicantibus sibi Leucacantha nomen advenisse, radicis etiam ipsius tum durities tum amaritudo, et si forma cyperinas non emuletur, consentire videtur. Sed hoc potius disputandi, quam asserendi gratia proponimus: cum adhuc haud ulla nobis comperta sit planta, quæ legitimam Leucacantham repræsentet. Ceterum cum hæc CARDUUM, quem quidam Diva Maria, alii Lactarium ab albis maculis vocant, in mentem revocaverit, non ab re sanè esse judicavimus, si ejus historiam, & vires hic explicabimus. Est itaq, Carduus hic, quem

CARDUUS LACTEUS.



quem ego potius Asininum vocarē, quod ejus pabulo Asini dele-
 rentur, planta folia fundens magna, pinguis, per ambitum la-
 ciniata, & acuta tenuibusq; aculeis circumquaq; stipata, quin
 etiam lacteis plurimis respersa maculis. Caulem proferit bicubi-
 talem, tricubitalēq; rotundū, spinis horrentem, brachiatumq;
 echinatis aculeatisq; in summitate capitulis, quae estate media
 florent cinerea modo, florib. purpureis ac capillaceis, semine car-
 dii simili cnici minore, papposa lanugine scatente. Radice niti-
 tur valida altē descendente, amaro sapore. Nasitur spontē in
 campestribus, incultis locis secus itinera, agrorū marginibus, &
 à quibusdam quoq; in hortis feritur. Radix excalfacit, abster-
 git, aperit, provocat, & attenuat. Radicis decoctum datur uti-
 liter potandum ad Jecuris, & vasorum obstructions & re-
 morantes urinas: quare confert hydropicis, ictericis, ac nephri-
 ticis. Idem ducit menses, tam potum, quam in defensionibus ad-
 hibitum. Sunt qui radicis sicca pulverem addito fœniculi se-
 mine, & longi piperis momento, ex præsana propinent nutrice-
 bus, lacti augendo. Stillatitia foliorum aqua utuntur nonnulli
 ad lateris dolores, cui alii ut valentius agat, seminis semidra-
 chman adjiciunt. Leucacantha vires paucis perstrinxit Gale-
 nus libro 7. simplicium medicamentorum, sic inquit: Leuca-
 canthon, quidam autem polygonaton, alii ischiada nuncupant.
 Hujus amara radix est, ac proinde incidit, & exicat in tertio
 ordine in calfaciendo autem ex primo est ordine. *Leucacantha*
 quae Græcis, alba spina Latinus appellatur: Itali, Bianca spina,
 Carduus verò Mariæ, & Carduus lactarius, Italis appellatur
 Scardaccio del latte, & Scardaccio bianco: Cardo del latte.
 Germanis Mariendistel: unser Frawendistel: Gallis Cardon
 de nostre Dame. Bohemis, Ostropes: Polonis, Ostropest.

Cardui
lactei vi-
res Matth.

Leuca-
cantha vires
ex Gal.

Nomina.

Carduus Mariæ, aliquibus Silybum veterum, aliis
 Leucacantha, aliis Leucographis Plinii, aliis Carduus

Galaxias, ejusdem. Videtur Theophrastus Acani nomine intellexisse, unde reliqua Carduorum genera
 Acanacea dicta videntur. Dicitur Carduus albus, Brunf. Chamæleon. eidem in 4. Carduus Mariæ,
 Trag. Fuch. in icon. Gef. hor. Cast. Lon. Cam. Carduus Marianus, Cord. in Diosc. Tab. Carduus lacteus
 Matth. Lugd. Leucographis Plinii, eidem, Carduus leucographus, Dod. fol. Cardui sylvestris aliud ge-
 nus, Cæsalp. Spina alba hortensis, Fuch. fol. Spina alba, Dod. gal. Lac. Leucacantha, eidem & Cornaro,
 Silybum, Lob. sic & Anguillara suspicatur. Hujus est altera species ex Syria allata a Neuvvolffio, & à
 Camerario, Carduus lacteus Syriacus dictus.

TRAGACANTHA.

Τραγανθα. TRAGACANTHA.
CAP. XX.



Tragacanthæ radix lata, & lignosa, summo cespiti-
 te nititur: unde furculos humiles, & robustos, la-
 tif. me fundit: in quibus minuta folia, multa, non-
 nunquam tenuia exoriuntur: quæ sub se spinas albas,
 rectas, & firmas occulunt. Est etiamnum tragacantha
 lachryma, quæ vulnerata radice manans, concrevit.
 Præstat pellucens, gracilis, & lævis, sincera, & subdul-
 cis. Cutis spiracula, ut gummi, obstruit. Hujus incre-
 buit usus ad oculorum medicamenta: ad tuilim, exa-
 speratas fauces, retusas voces, cæterasq; destillatio-
 nes, cum melle in delinctu: subdita quoq; linguæ li-
 quescit. In passo madefacta, drachmę pondere bibitur,
 contra renum dolorem, & vesicæ rosiones, misto cor-
 nu cervi usto, & eloto, aut scilli aluminis momento.

† Ori. ad-
dit, πρῶτον
id est, fre-
quentes.

† Catac,
ἀσκή, i. e.
alba.

Tragacantha plantam, à qua effigiem, quam hic exhibe-
 mus, deprompsimus, jam pridem ad nos misit quidam rei
 herbaria studiosus, qui illam attulerat ex Apulia Gargano
 montē. Ea certe est, quæ nullis prorsus notis à Dioscoridis histo-
 ria dissentiat, ut ex ejus pictura omnibus liquido constare po-
 test. Cæterum lachryma è vulnerata radice manans, quam se-
 plasarij vulgò vocant Gomma draganti, passim in officinis
 concreta visitur, è Creta, Asia, & Græcia advecta. At non mo-
 dò hæc (ut Dioscorides inquit) è vulnerata prius radice manat,
 sed etiam spontē (ut Theophrastus est author) ab ea scisso in la-
 tere cortice distillat. Sed hanc, qua utimur, Monachi illi reve-
 rendi, qui in Mesuem commentarios ediderunt, veram esse errata.

Tragac-
thæ conu.

Mon-
achorum
errata.

U u

Traga-

Traga-
cantha
vires
Matth.

Traga-
cantha
vires ex
Gal. No-
mina.

Tragacantha lachrymam negant, quod legitima lingua subdita facile, Dioscoridis testimonio, colligescat: hac vero nū-
quam, cum lingua supposita adeo lenta, tenaxq, evadat, admista saliva, ut nullo serē temporis tractu dissolvi liquariq, pos-
sit. Quia quidem in re us pace eorum dixerim) toto celo aberrant, ut qui Dioscoridis sententia perperam acceperint. Siqui-
dem Dioscorides non de sola lachryma lingua subdita, sed in eclegmate cum melle conformatā, illud fieri scribit, cum in-
quit: Usus ejus ad oculorum medicamenta, ad tusses, exasperatas fauces, retusas voces, ceterasq, destillationes, cum melle
in delinctu: liquefcitq, subiecta lingua: hac Dioscorides. Ex quibus palam est voluisse Dioscoridem Tragacantha lachry-
mam non solam, & per se tantum, sed in eclegmate cum melle paratam lingua esse subjiendum, ut clarissimorum medico-
rum institutione fieri ad solet cum bechicis catapotis, & diatragacantha trochiscis, quibus ipsa commiscetur. Quippe cum
oporteat medicamenta, quibus aspera arteria, pulmo, ac pectus universum expurgari debent, quadā temporis duntaxat
ore retentā, vel lingua subdita, sensim leniterq, liquefcere, ut commodē in tracheam percolentur arteriam, voluit hic Dio-
scorides eclegmatis usum recta methodo describere. Nam si hujusmodi medicamenta devorarentur, nihil prorsus profice-
rent, cum ita non in pectus & pulmones deferantur, sed in ventriculum. Huic & alia accedit ratio, quod si intellexisset Dio-
scorides lachrymam per se tantum lingua submittendam, subjunxisset quidem ut sui moris est quibus in morbis id faci-
endum esset: quandoquidem planē absurdum videretur scribere, quod aliquod gummi lingua subijciatur, paulatimq, lique-
fcere cogatur, ac deinde silentio involvere, quibus in morbis id faciendum. Huic itaq, rationibus non modō recte, meo quidem
judicio, intelligi potest, voluisse Dioscoridem eclegma, quod Tragacantha lachrymam acceperit, lingua subjiendum esse,
non ipsam tantum lachrymam, sed etiam monachos in hoc, ut alias saepe deceptos esse. In collyriis oculorum addita Traga-
cantha lachryma non solum humorum acrimoniam in oculos defluentium retundit, sed oculos quoq, roborat, & longē ma-
gis adstringit, quā sarcocolla. Quinetiam lacte macerata, & illita, oculorum ungues, & palpebrarum pustulas, pruritum,
& scabiem sanat. Valet ad pulmonum pectoris & tracheae arteriae morbos, & medetur eorum ulceribus. In summa praestat
Tragacantha lachryma ad defluxiones omnes, in fauces, guttur, & pectus permeantes, & tussim excitantes & praesertim in
confectionibus addita, quae lingua subijciuntur. Datur utiliter exulceratū renib. Auxiliatur quoq, dysentericis, quae tōstā
fuerit, tum ex vino cydoniorum pota, tum clysinatē infusa. In summa ubi laevigare, obtundere, & reprimere opus est, pra-
stantissimum semper fuerit medicamentum. Tragacantha vires scriptas reliquit Galenus lib. 8. simplicium medicamentor-
um, his paucis verbis: Tragacantha similem gummi vim obtinet, emplasticam quandam, & acrimoniam hebetiorem (le-
gant aliqui, quae acrimoniam obtundit.) Et senē similiter illi deficiat, Texāxvōx sic Græcē, ut etiam Latine, & Italicē
Tragacantha vocatur: Arabicē, Chitira, Itica, Chatech, Alcuted, seu Alchabad: German Dragant: Hispanicē, Alquetira.

Tragacantha vocem Gaza apud Theophrastum Hirci spinam reddidit: ipsa planta nominatur Tra-
gacantha, Matth. Gef. hort. Clus. in Cord. ad Dod. gallicum, Dod. fol. Lac. Lob. Cast. Lugd. Cæsal. Tra-
gacanthum, Cord. in hist. Lon. Tragacantha prima, Tabernæmontano. Ex radicibus colligitur lachry-
ma seu gummi, officinis gummi Dragaganthi nominatum, glutinosum, quod per cribrum aurarum
lintheum exprimitur, candidum, pellucidum, nitidum, licet & flavescens, subruffum reperiatur. Sub-
stantia est glutinosa quae difficulter teritur, & aquam qua dissolvitur, in densam mucilaginem instar
glutinis convertit. Eligendum candidissimum, parum translucens & cujus minima portio maximam
aquae copiam coagulet. Ex Asia adfertur.

* CARDIUS STELLATUS. *

H'gryier. ERYNGIUM. CAP. XXI.

Cardi-
us stel-
latus
ita me-
d. Cat.
add. e-
d. i. val-
de.
b Meom.
& Cat.
b. uades
q. h. uari
C. u. i.
odorata,
& aro-
matica.
Eryngii
confide-
ratio.
Caca-
treppola.

Eryng.
Diosc.

Eryngi-
um ma-
ri-
num.



capitulis caeruleis majoribusq, radicibus longioribus, renioribus mollioribusq, digitali crassitudine, saccharo asservandis
longe magis idoneis, quā alterius. Radix minus secat quā altera, sed easdem possidet vires. Hujus tamen non memine-
rit Dioscorides, Plinius tamen lib. 22. cap. 7. utriusq, historiam tradidit. Quo fit, ut eorum sententiam minimē probaverim,
qui Eryngi-

Eryngion aculeatarum generis, cujus folia in prin-
cipio sale condita, in cibos recipiuntur. Lata au-
tem sunt, & extremo ambitu aspera, gustu aromatica:
sed ubi adoleverunt, circa complures caulium emi-
nentias in spinas aculeantur: in quorum summitatib.
globosa capitula, durarum, acutissimarumq, spinarum
ambitu a stellatim circumvallantur, quorum colos a-
lias viridis alias albus, interdum caeruleus invenitur.
Radix oblonga, lata, foris nigra, internē candida, pol-
licis crassitudine, odorata. Nasctur in asperis, & cam-
pestribus. Vim habet calfactoriam. Pota menses, &
urinas pellit: tormina, inflationesq, discutit: contra
jecinorum vitia, serpentium morsus, & hausta venena,
cum vino prodest: bibitur adversus plurima, cum se-
minis pastinacae drachma una: appensa, illitave, tuber-
cula discutere proditur. Pota cum hydromelite radix,
opisthotonicis, & comitialibus medetur.

Longē quidem aberrant seplasiarii Senenses in Eryngii co-
gnitione, utpote qui pro Eryngii radicibus assumant aculea-
ta cujusdam stirpis radices, quam Cacatreppola vulgō vocant.
Hinc error omnib. facile deprehenditur, quod nulla penitus illius
planta nota eryngio respondeat. Legitimum Eryngium: quod,
meo judicio, Dioscoridis descriptioni nihil refragetur, & cujus
hic imaginem appinximus, frequens invenitur in compluribus
Italia locis, nullis reclamantibus notis. Est & Eryngium mari-
num, quo Veneta litora undiq, referta spectantur. Assurgit hoc
foliis altero latioribus, circinato ambitu spinosis: & casto resper-
sis colore. Caulem carnosorem, crassorem atq, striatum habent:
qui Eryngi-