

zur, quod scilicet celeriter flos ejus defluat. Alterum domesticum, quandoquidem colitur. Quin & altera dua sunt prater
has species sylvestris papaveris: alterum velut incidentem calycem sustinens: alterum longiorem quam illud calycem obti-
nens, totum au. em procerius, ac squalidum. Ab hoc succus defluit, atque hinc est, quod hanc speciem quidam Rhœada no-
minant. Porro omnium facultas refrigeratoria est. Caterum sativi semen, quod & thylacite cognominant, mediocriter so-
mnum conciliat, visu candidum. proinde pani ipsum inspergunt, ac melle maceratum edunt. At ejus, quod primo loco re-
censuimus, cujus florem celeriter decidere posuimus, validius semen refrigerat, ita ut nequaquam eo qui innoxie solo uti
posuit, sicut sativo sive domestico melli admiscens. Admodum verò, si ita sumptum sit, somnum conciliat. Caterum pusil-
lum ejus inspergunt iis, qui ex melle conficiuntur bellariis, atq. placentis, panibusq. Porro tertio loco disti semen atrum e-
tiam medicamentosum est, admodum refrigerans. At quod quarto loco positum est, omnium est medicatissimum, tum in
10 semine, tum in calyculis, tum in foliis, tum in succo. Valide enim refrigerat, ad stuporem usq. & mortem perducens: quare
medici quò probe eo utantur medicamentis miscentes, frigiditatis vehementiam retundunt. Est enim ex quarto, & ultimo
refrigerantium ordine. Porro quo pacto maximè ex methodo missionem facere oporteat, non est presentis tractationis
proprium. Ex libro 2. de compositione medicamentorum secundum locos, de dolore capiti agens citra manifestas causas
oborto, ita de opio differit. Rarò, inquit, cogimur pharmacia ex opio uti, cum videlicet pro dolori vehementia homo de vi-
ta periclitatur. Quamquam & tunc solida partes ex ejus usu offendantur, adeò ut post hac correctione opus habeant. Sic &
ex opio collyria multis detrimento fuerunt, adeò ut debile oculum reddiderint, & visus hebetudinem amblyopiam Gra-
cis appellatam, induxerint: velut etiam auditus gravitatem inducunt, quacunque ad vehementem aurium dolorem ex
papaveris succo sunt composita. Idem Galenus l. 3. ejusdem tractatus, de aurium inflammationibus agens, sic inquit: Phar-
maca ex papaveris succo omnia sensum stupefaciunt: & ob id sanè necessariò cogimur ipsis uti ubi nullum aliud mitiga-
20 tivum opem tulit: hac Galenus. Ex quibus sanè omnibus admoniti esse debent medici, ne temerè aut inconsultè ad usum
opii se conferant. Sed ratio, qua id corrigendum, administrandumq. fit, ex ipso Galeno colligi potest, lib. 8. de compositi-
one pharmacorum secundum locos ubi ita scriptum reliquit. Calascientia miscetur, quæ refrigerantium stupefactio-
nem deducere possunt, cum illa ipsa per se tardi transitus existant. Hac igitur, ubi quis inaudierit, quantitatem consideret
simplicium pharmacorum, quæ in compositiones miscetur. Ex hac enim sciet num magis, an minus efficere possit com-
positum pharmacum, ea quæ promittit. Si namque refrigerantia plura apparuerint, sensum affectuum magis obtundit,
& quantum caloris in ipsa particula fuerit, etiam hunc extinguit. Ubi verò calascientia fuerint aucta, minus quidem
hac efficiet ipsum pharmacum, innocentius autem reddetur. Nosse enim oportet, corpora viventium mortificationi simi-
le quippiam perpeti ab omnium ex opio, hyoscyamo, & mandragora compositorum pharmacorum usu: nimirum causis
dolorem insipientibus insensibilibus factis, & multi sanè qui assidue talia accipiunt, ad immedicabilem frigiditatem par-
30 ticulas perducunt. Papaver erraticum sic Latinis, *μῆλον ποῖον* Græci appellantur: Italis Papaver o salvatico: Germanis
Klapperrosen: Hispanis Amapolita, & Paponilla: Gallis Coquelourdes, Pavor sauvage, sive Consanons. Papaver verò sa-
tivum Latine dictum, *μῆλον ὄπιον* & Græcè vocatur: Arabicè Thaxibax, Thaxiba, seu Chaschas: Italicè Papavero dome-
stico: Germanicè Magsamen: Hispanicè Dormidera: Gallicè Pavor blanc, seu Pavor privé. Quod deniq. Græci *ὄπιον* &
μῆλον ποῖον, Latini item Opium & Meconium dicunt: Mauritanii, *afjun*: Itali Opio.

Opium ut
admini-
strandū.

Nomina.

Papaver sativum est & sylvestre: floris & seminis colore, & florum textura multiplices differentiæ.
I. Papaver erraticum majus, C. B. Papaver erraticum, Matth. Brunf. Cord. in Diosc. Gef. hor. Lac.
Lon. Cast. Thal. Cæsalp. Taber. cui & rubeum & floridum: Papaver erraticum primum, Fuch. Lugd.
Papaver Rhœas alterum, Dod. gal. Papaver rubrum, Brunf. Papaver Rhœas, Lobel. Cam. Argemone
40 vulgaris Trago. Rarius pleno flore, item & albo inter segetes, apud nos Doctor Jacobus Cargillus Sco-
tus lectum, exhibuit. II. Papaver hortense flore & semine albo, quod sativum Dioscoridi & album Pli-
nio, C. B. Papaver sativum, Matth. Dod. gal. Lugd. Taber. Papaver, Brunf. Lon. Papaver album, Trag.
Dod. fol. Papaver sativum, Dod. gal. Papaver album sativum, Gef. hor. Lob. Cast. Papaver sativum
thylacite, Cord. in Diosc. Papaver candidum, Cæsalp. Papaver pithitis, Lacunæ. III. Papaver Polyan-
thos, C. B. Papaver multiplici flore, Cam. in suo Matthiolo. Papaver album & nigrum Polyanthum,
Lob. a vulgari solum multiplici textura foliorum in flore variat: Variorum item colorum, purpurei, sa-
turatè rubri, violacei, albi mixti: sic & folia in florib. aliquando fimbriata, quædam integra observantur.

Μῆλον κερκίτης.

PAPAVER CORNICULATUM.

CAP. LXI.

50 PAPAVER ceratites, id est, corniculatum, folia habet candida, hirsuta, verbasco similia, in ambitu sylve-
stris papaveris more serrata: caule non dissimili: flore pallido: calyculo fæni græci, in corniculorum
modum inflexo, unde nomen mutuatur: semine papaveris, pusillo, nigroq. radice per summa cespiti-
um, nigra, crassa: nascitur in maritimis, & asperis. Radici ea vis inest, ut in aqua decocta ad dimidias, co-
xendicum, & jecinoris affectus potu sanet: prodest his, qui crassa quædam, & arenosa cum lorio red-
dunt. Alvum leniter purgat semen, acetabulo in aqua mulsa potu. Cruistas emarginant, illita ex oleo fo-
lia floresq. argema in nubeculas jumentorum, perunctas abstergunt. Sunt qui glaucium hoc papaveris
genere factitari existimarunt, falsi quodam foliorum cognatione.

a Meum
i. e. d.
λαττ. i.
radice, te
nui, ita
Meum.
b Meum,
& Or. n.
ἐλαττ. i.
λαττ. i.
radice, te
nui, ita
Meum.
b Meum,
& Or. n.
ἐλαττ. i.
λαττ. i.
radice, te
nui, ita
Meum.
b Meum,
& Or. n.

60

Μῆλον ἀφροδῆς.

PAPAVER SPUMEUM.

CAP. LXII.

ALIUD Papaveris genus aphrodes, id est, spumeum vocatur, ab aliis heracleum, caule dedranti: fo-
liis admodum parvis, radiculae similibus: fructu inter ea candido: nam herbula alba est, & spumea
tota a: radice in summo cespiti. Legitur æstate semen, cum integrè adolevit, deciditque exiccatum.
Datum acetabuli mensura in aqua mulsa, vomitione expurgat: privatim hujusmodi purgatio, comi-
tialibus prodest.

Papaver Corniculatum in maritimis nostris Senensibus Crassetano, & Orbetellano agro, & circa Herculis portum Ar-
gentario promontorio, itemq. in Adriatici maris litore non longè à Timavo fonte, & Tergesto saxoso litore tractu, ubi
Rrr 3 sapius confid.

Papave-
ris corni-
culati
confid.

I. PAPAVER CORNICULATUM.



Papaver
corni-
culati vi-
res ex
Gal.

lia similia reddidit. Quemadmodum & Theophrastus, qui de eo loco citato ita scriptum reliquit. Papaver heracleon nuncupatum folio constat struthi, hoc est radiculæ, qua linteis candorem conciliant, radice candida, in summa terra eunte: fructu albo. Hujus radix purgare superius nata est. Non desunt, qui contra comitiales ea utuntur in vino mulso: hac Theophrastus. Papaveris corniculati meminit Galenus libro 7. simplicium medicamentorum, de ejus viribus in hunc modum differens: Papaver corniculatum nominatum quidem est à semine levem inversionem habente, veluti & fanum græcum, ut

* II. PAPAVER SPINOSUM. *



Nomina.

sapius ipsum legimus frequentissimum provenit: quanquam etiam in aliis Italia locis nascitur, sed quod potissimum in hortis, & viridariis ad publicum omnium commodum, & spectaculum fuerit satum. Quod in præscriptis locis nascitur, florem aureum profert, sive (ut Dioscorides inquit) pallidum. Sed alterum quoque habetur genus, foliis minus asperis, atque minoribus, quod florem rubeum edit. Hoc in Moravia & Bohemia, in campestribus copiosum vidimus. Corniculati papaveris meminit Theophrastus libro 9. cap. 14. de plantarum historia, sic inquit: Papaveris quoque sylvestris genera plura notantur: quoddam enim corniculare appellatum: quoddam autem nigrum est, folio constans verbasci nigri, sed minus nigro: cauli altitudo cubitalis: radix brevis, per summam cespitum: fructus inflexi, ut cornicula figurantur. Legitur circa messes. Alvum purgare potest: solum albuginem oculis aufert: nascitur juxta mare, saxosis locis: hac ille. Credidere nonnulli Glaucium, quod Mauritanii memithe vocatur, fieri à corniculati Papaveris succo. Verum ii (ut Dioscorides est author) procul dubio decipiuntur. Caterum Papaver spumeum, quod aliqui heracleon vocant, nondum mihi compertum est, neque etiam hæcenus aliquem reperi, qui illud legitimum ostenderet. Quo fit, ut ipsum quoque inter tot alias nobis incognitas plantas relinquere malum, quam aliquod incertum proferre, ut quidam faciunt. Veruntamen non mihi videtur silentio prætereundus fatalis ferè Plinii lapsus, in Papaveris spumei mentione lib. 20. cap. 19. Quippe qui hujus papaveris folia speciem passerum avium representare tradiderit, deceptus nimirum duplici ejusdem nominis Græci significatione: ὀρνίθιον enim Græcis non modò passerem aviculam significat, sed & plantam eam, quam Latini radiculam, sive lanariam herbam appellant: cui quidem Dioscorides, non autem aviculis, quas passeris Latini dicunt, Papaveris spumei fo-

bovis cornu videatur esse simile. Vocatur porro à quibusdam paraliū, quandoquidem ut plurimum juxta mare nascitur. Vim habet incidendi, & abstergendi. Itaque radix herba in aqua decocta, ad dimidium hepaticos affectus adjuvat. Porro folia, & flores sordida admodum, & maligna ulcera juvant. Sed ab his abstinere oportet, ulceribus jam expurgatis: adeo enim abstergere valent, ut & pura quoque carnis nonnihil eliquent. Hoc virium robore non sordem duntaxat, sed & crustam ulceribus detrahit. Papaver verò Herculeum, quod & aphrodes, hoc est, spumeum vocatur, eò quod totum sit candidum, & spumofum, exile est. Semen habet pituitam expurgans. Μένιον ὀρνίθιον id Græcis vocatur, quod Latinis Papaver corniculatum: Arabibus Almacharam: Italis Papavero cornuto: Germanis Gelb Delmagen Wönn und Gelb Delmagamen: Hispanis Dormidera marina: Gallis Pavot Cornu. Id verò μίνιον ὀρνίθιον Græcè dicitur, quod Latine Papaver spumeum: Arabice Dabre, & Zebeolii: Italicè Papavero spumeo.

I. Papaver Corniculatum luteum, habetur enim violaceum, item phæniceum, hirsuto, vel glabro folio. Papaver Corniculatum, Matt. Lac. Cast. Cæs. Papaver sylvestre corniculatum, Trag. Papaver corniculatum luteum, Fuch. Turn. Papaver corniculatum majus, Dod. fol. Papaver cornutum, Dod. gal. Cord. in Diosc. & hist. Gef. hor. Lon. Lug. Tab. Cam. II. Papaver spinosum elegantissimum: hoc papaver, cum nemo ejus meminisset, in Phytopinace ante sesquiannum descripsimus, jam cum ipsius genuina effigie addere placuit. Ex radice tenui, oblonga, fibrosa, caulibus sesquipalmaris, rotundus, striatus, minimis aculeis armatus, mollis, alba medulla plenus exurgit, qui

qui in summo in alas brachiat. Foliis est glaucis, papaveris Corniculati instar laciniatis, non hirsutis, sed mollibus & nitidis, trium quatuorve unciarum longis, per margines flavescentibus aculeis armatis, aliquibus etiam ipsi nervo parte averfa, minoribus tamen, adpositis: parte superna nervi quasi levi pulvere obsiti albicant: hæc ex levi vulnere subcroceum succum fundunt. Flos in caulis summitate quinquefolius luteus, cui succedit capitulum oblongum, quinquangulum spinis flavis horridum, semina plura nigra sextuplo aliorum majora, rotunda in apicem desinentia elegantissime striata, continens. Ex Anglia primum semen allatum, quod una cum planta, Figo del inferno, id est, Fici infernalis nomine, Doctor Doldius Norinberga primum misit: quo nomine ante paucos dies etiam Nobiliss. Cortusus Patavio transmisit: in hortis nostris habuimus. Notæ aliquot à Dioscoride Glavio tributæ, huic etiam conveniunt.

Υπερκοον.

HYPECOUM.

CAP. LXIII.

Hypecoon, aliqui Hypopheon vocant: nascitur in segetibus arvisque, foliis rutæ, exilibus ramis. Natura eadem, quæ papaveris succo.

HYPECOUM.



Hypecoum iis facile sese offeret, qui inter segetes, & legumina ipsum perquirere non gravabuntur. Hoc pro sylvestri ruta olim Petrus Spezzalancia Clesii valli Anania oppiduli pharmacopola compater meus, mihi ostendere solebat. Quandoquidem id provenit in arvis, foliis rutæ paulo majoribus, si singulatim expendantur: caulibus exiguis, mollibus, hirsutis: in quibus sunt flores, qui in luteum pallescunt. et si prope calycem purpurei spectentur: in horum medio stocculus erumpit colore aurum amulans, visu jucundus. Floribus succedunt capitula, tenui involucrio contracta: in quibus semen clauditur nigrum, tactu asperum, pseudomelanthio proximum. Caterum scio non deesse nasutos, qui jam diu plantam hanc nostram impugnant, dicuntque, folia illi non esse rutæ, sed potius Alceæ. Atqui si singulatim examinentur, si facile cognoscent, a ruta parum admodum distare. Adhæc si vires expendantur, nihil sane obstat, quin ea in hac planta reperiantur, quæ in ipso quoque sunt papavere. Quo fit, ut horum susurrorum bombo nihil à priori mea sententia dimovear, quousque aliam plantam, quæ magis facie & viribus Hypecoon referat, in medium asserant. Nullam hætenus plantam mihi videre licuit quæ magis Hypecoum referat: tamen si id mihi per omnia non satisfaciit. Meminit huius Gal. lib. 3. simplicium medicamentorum, his paucis verbis: Hypecoon, inquit, refrigerandi vim habet, ex tertio ferè refrigerantium ordine, adeo ut parum absit à papavere. Quod Græci ὑπερκοον, Latini quoque Hypecoum vocant: Itali Hypecoo.

Hypecoi
confid.Hypecoi
vires ex
Gal.

Nomina.

Alceæ vesicaria, C B. Hypecoum, Matth. Lac. Cast. Lug. Casal. Hypecoum, alterum spurium, Ges. hor. Alceæ Veneta, Trag. Dod. gal. Lugd. Alceæ peregrina, Ges. hor. Taber. Alceæ Bononiensis, Ges. hort. appen. Alceæ peregrina, solifolia, Lobel. Alceæ vesicaria, Dodo. fol. Malva Veneta, Ges. hort. Lonic. Herba Ungarica, eidem.

Υποκυμν.

HYOSCYAMUS SIVE APOLLINARIS.

CAP. LXIV.

Hyscyamus frutex est caules emittens a crassos: folia lata, oblonga, divisa, nigra, hirsuta: flores è latere caulis, ordine prodeunt, tanquam puniceorum cytini, scutulis septi seminum plenis, ut papaveris. Tres ejus differentie. Una semine nigro, floribus penè purpureis, smilacis foliis, cytini præduris & spinosis. Alterius semen subflavum ut irionis: flores lutei, folia & filiquæ simpliciores, ambo infaniam gignunt, & soporem, ideo in communi usu damnantur. Tertium genus, ut quod mirissimum esset, medicici receperunt: pingue, lanuginosum, molle, candidi floris seminisque, in maritimis rudibusque nascens: cujus occasio si non adsit, rufum usurpari oportet: niger, ut deterimus, improbat. Recenti semine, caulibusque, tussis succus in sole exprimitur, & exiccato humore, usus ad annum usque prorogatur: nam facile corruptionem sentit. Extrahitur etiam ex sicco semine separatim in aqua calida tuso & expresso. Liquamentum autem succo lacteo præstantius est, & magis dolores finit. Contusa herba recens, addita d. trimestri farina, digeritur in pastillos & reconditur. Liquamentum primum & quod à sicco semine exemptum est, collyriis, quæ doloris sensum auferunt, commodissime inferi solent: contra acutas calidasque fluxiones, dolores aurium: atque vulvæ mala profunt: cum farina autem, aut polenta, oculorum, pedum cæterarumque partium inflammationes placant. Semen eadem præbet: tussi, destillationibus, oculorum fluxioni, & doloribus efficax: contra mensum abundantiam, & erumpentem aliunde sanguinem, oboli pondere cum papaveris semine, & aqua mulsa bibitur: podagris subvenit: testibus, inflatis, mammisque tummentibus à partu, tritum ex vino illinitur. Aliis quoque cataplasmatibus, quæ doloris levamentum præstant, admisceri solet. Folia omnibus medicamentis dolorem sedantibus, per sese, & ex polenta utilissime imponuntur: recentia ad mitigandos omne genus dolores oblinuntur: cum vino terna, quaternave porta sanant.

n Orib.

addit.

περὶ ὑπερκο.

multos.

Et ita

quoque

meum.

b Orib.

ἀπὸ λαλίου

ges. i. te-

neriores.

e Orib.

addit.

αὐτὸς ὁ

τὸ λαλίου

i. c. d. d. d.

itaque ut

dum est.

d Meum

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

αὐτὸς ὁ

Rrr 4

sanant

fanant al'gidas febres, quas epialos vocant. Cocta olerum modo folia, si acetabuli mensura manduntur, mediocrem infaniam gignunt: idem efficere tradunt, si colo ulcus sentiente, infundantur. Radice in aceto decocta, dentes in dolore colluuntur.

I. HYOSCYAMUS.

II. HYOSCYAMUS ALBUS.



Hyoscyami conf.

IV. HYOSCYAMUS TERTIUS.

Hyoscyami lutei descript.



Hyoscyami albi delineatio.

Hyoscyamus tertius.

HYOSCYAMUS (ut Dioscoridi placet) tres habet differentias. Prima, nigrum fert semen: secunda, subflavum: tertia, album, quae omnia ut semine differunt, ita & floribus. Si quidem in prima purpurei, in altera lutei, in postrema vero candidi spectantur. At hyoscyamum purpureo flore resectum nusquam hactenus videre licuit. Cetera vero genera & vidimus, & saepe legimus. Quae flore luteo, & subflavo semine provenit, ubiq; fere locorum nascitur, locus incultus, secus itinera, & in agrorum limitibus, folio brassicae, lato, venoso, pinguis, nigricante, oblongo, in acutum desinente & scisso. Acanthi modo, circumquaq; ambitu hirsuto, sed tactu molli. Caudales habet teneros, teretes, pilosos, pingues, subalbicantes, & quibus a medio rami prodeunt numerosi, in quibus flores in altera tantum parte & latere prodeunt. Hos calyces quidam sequuntur Punicorum Cytini similes, serrato, ac pungenti acumine ocimoidis fere modo, in quibus semen concluditur, rotundis quibusdam sentulis, caliculos occludentibus. Nam his maturitate exclusis protinus semen decedit. Radice nititur stirpium a longitudine alba, molli, succosaq;. Tota planta graviter olet, adeo ut olfactu mentem afficiat. Quae autem alba vocatur, folius crescit alterius fere similis, sed subrotundis, pinguioribus, mollioribus, hirsutioribus, rarioribus & albicantibus. Flores profert alteri similes sed candidos, aut subpallidos, subluteos, & quib. eodem ordine quo in ceteris Cytini oriuntur, sed rariores & clementiores, in quibus album concluditur semen. Nascitur sponte & feritur in hortis. Non desunt qui novam quandam in Italiam attulerunt plantam, speciatu sane pulcherrimam, quam inter Hyoscyami genera connumerant. Caudales edit haec sesquicubitales, rotundos, tenui obductos lanugine, ramososq;, foliis amplis, pinguis, tenui pilo refertis, mollibus, solani saporiferi speciem quadantenus referentibus, odore etiam gravi. Flores edit pallidos, luteos, Hyoscy-

Hyoscyami amulos, è quibus capitula subrotunda oriuntur, qua nonnullam Hyoscyami speciem pra se ferunt. Nam & similibus ferè scutulis concluduntur, coronato circumquaq; orificio, & semine intus subflavo colore. Radice nititur alba, spithama longitudine, numerosis ubiq; fibris, & digiti crassitudine. Hanc jam pridem ex Italia ad me misit in Bohemiam. Jacobus Antonius Cortusius: seritur in hortis. Hyoscyami meminit Scribonius Largus, inquit: Altercum, quod Graeci Hyoscyamus vocatur, qui biberint, capitis gravitate, & venarum distensione laborant, menteq; abalienantur cum quadam verborum altercatione: unde & nomen apud Latinos. Hoc idem equidem testari possum, quod viderim in Anagninae vallis montibus pueros, qui Hyoscyami semen comederant, adeo desipientes factos, ut parentes, & vicini eos crederent à cacodamonibus vexatos esse. Hinc est, quod ejus regionis incolae Hyoscyamum vulgari sermone appellant Disturbio, ut quod mentem maxime turbet. Aves, quae hujus herbae semen ederint, praecipue quae in gallinaceo habentur genere, non multo post tempore pereunt, quemadmodum & pisces. Hyoscyamus videtur Graeci dicta, quasi faba suilla: propter ea quod (ut Helianus inquit) hujus herbae pastu resolvantur apri, & convellantur apri. Sed remedium novere: aquas enim statim adveniunt, & caneros venantur, atq; ita protinus saluti restituntur. Hyoscyami vires recensuit Galenus lib. 8. simpl. med. his verbis: Hyoscyamus, cui semen atrum est, insaniam, ac saporem affert. Huic autem is, cui semen mediocriter flavum est, propinquam facultatem obtinet. Verum utriusq; fugiendi sunt ut inutiles, & venenosi seu deleteri. Ceterum cuius semen, ac flos candidus est, ad sanationes vel maxime idoneus est, ex tertio quodammodo ordine refrigerantium. Porro flos ejus quidem, cui semen est nigrum, mediocriter purpureus est: ejus verò, cui est subflavum, leviter mali colorem refert: hac Galenus. Hyoscyamus tertius, refrigerat ordinem tertio completo: soporem inducit, adeo ut ea sit ejus natura, quae ceteris Hyoscyamis. Ceterum, ut ad Hyoscyami historiam nostra revertatur oratio, mihi quidem non videtur praetermittenda suspicio, quae est, quod in hujus capituli initio, ubi de floribus sit mentio, mendum aliquod subsit. Eam namq; in floribus tribuuntur, quae si quis legitime debentur. Etenim si quae sunt, quae scutulis continguntur, atq; semine intus continent, non autem flores. Auget hanc nobis suspicionem Serapio: quippe qui illud de fructibus Hyoscyami Dioscoridi acceptum refert, quod hic de floribus scriptum legitur. Quare non temere, meo judicio, conicere possumus, hunc locum in Dioscoride depravatum, aut mutilatum esse. Planta, quae Graeci ὀρνυμῶν, Latini appellantur Hyoscyamus, Apollinaris herba. Altercum: Arabibus Bengi: Italis Jusquiamo: Germanis, Bilsomen & Bilsen: Hispanis Velenbo: Gallis Jusquame & Nomia, Hanc hanc. At Hyoscyamus albus Graeci ὀρνυμῶν λευκός, Latini Jusquiamo bianco. Sic Hyoscyamus tertius, seu potius quartus, Italis Jusquiamo nuovo seu Jusquiamo maggiore.

Hyoscy-
amus cut
a tercum
dicatur.

Hyoscy-
ami vires
ca Gal.

Nomia,

Hyoscyamus, id est, faba suilla, quod ejus pastu resolvantur apri, ut Helianus prodidit, praesenti mortis periculo, nisi copiosa aqua itatim se foris & intus polluerint. I. Hyoscyamus vulgaris, vel niger, C. B. Hyoscyamus, Matth. Brunt. Turn. Lac. Lug. Caes. Hyoscyamus secundus Galeni, Trago: Hyoscyamus flavus Fu. h. Hyoscyamus niger, Dod. gal. & fol. Lon. Lob. Cast. Hyoscyamus vulgaris, Gef. hor. Thal. Hyoscyamus primus, Tab. Apollinaris, Altercum, Symphoniaca, Cord. in Diosc. II. Hyoscyamus albus major, (habetur enim & minor) vel tertius Dioscor. & quartus Plinii, C. B. Hyoscyamus albus, Matth. Turn. Dod. gal. & fol. Gef. hor. Lon. Lob. Cast. Cam. Hyoscyamus candidus, Trag. Hyosc. secundus, Tab. Apollinaris tertia, Cord. in Diosc. III. Hyosc. Creticus luteus, C. B. planta est pulcherrima, folia

* III. HYOSCYAMUS CRE-
ticus luteus. *

* V. NICOTIANA MAJOR
latifolia. *



habens

habens lata, subrotunda, sinuata & circumrofa, non ut in vulgari laciniata, sed hyoscyami albi minoris foliis multum similia, hirsuta, longis pediculis hirsutis, ex caule robusto, rotundo, hirsuto prodeuntia. Flores habet in summitate ex calyce hirsuto prodeuntes, oblongos, Lamii melissophylli seu Nicotianæ forma luteos, ex quorum medio stamina quædam prodeunt, quibus delapsis ipsorum calyces oblongi hirsuti in quinque apices abeuntes indurantur, semenque minurum subrustum continent. IV. Nicotiana minor seu Hyoscyamus luteus, C.B. Hyosc. tertius, Matth. Lugd. Hyoscyamus niger, eidem in Ital. Castor. Lugd. Hyoscyamus luteus, Dod. gal. & fol. Lonic. Ges. hor. Cam. Hyoscyamus dubius luteolus Solanifolius, Lob. Hyoscyamus Peruvianus, Tab. Priapeia, Ges. hort. Tarnabone congener, Cæsalp. V. Nicotiana major latifolia (habetur enim & angustifolia & etiam minima) ex radicibus albis in multos ramos fissis, caulis exurgit ad trium & plurium cubitorum altitudinem, viridis, villosus, ramis brachiat: folia habet ampla, nonnunquam sinuata, latiore basi caulem amplectentia (rarius exigua & pediculo prominentia) sensim in mucronem se colligentia, pingua, dilute virentia, molli lanugine pubescentia: flores in summo caule oblongi, concavi, patentes, pentagoni, dilutius purpure rubentes & ad marginem albicantes: quibus succedunt vascula oblonga acuminata, interstitio divisa, minutissimo pullo semine referta. Hujus semen ex Occidentali India, apud quos locis humidis & umbrosis, levique solo provenit, primum in Europam allatum, ubi in hortis autumnis satum feliciter sequenti anno adolescit. Americanis Petum, ut habet Theverus: Picielt, Monardi: Perebecenus, Oviedo: Tabacum, ab ejus nominis Insula dicitur. Hyoscyami tertia species, Ges. hor. Hyoscyamus Peruvianus, Dod. fol. Camer. in Matth. Tabacum, Monardi: Tabacum latifolium, Cam. cui & vulgo Vulneraria planta Indica, Sana san-
cta Indorum, Adversarii & Lob. Nicotiana & Herba Regine, Lugd. Nicotiana major, Tab. Nicotiana,
Lon. Tornabona, Cæsalp. Herba S. Crucis, Castori, Hispanis Petun & Tabaco: Gallis Herbe de la Roine
mere, Germanis Indianisch Wundkraut. Diversis facultatibus prædita est, calidam esse foliorum acrimonia ostendit, quæ & salivam elicit: narcoticam autem & stupefacientem vim ei inesse, mentis perturbatio, quæ ex fumo attracto causatur, declarat: foliorum item applicatio podagricorum cruciatibus medendo, matricis tormina discutiendo, succi denique collutio diros dentium dolores tollendo etiam declarat. Ad infinitos morbos commendatur, cujus nomine peculiarem de hac planta libellum Ægidius Everardus, Herbam Panaceam nominans, scripsit: plurima de ejus viribus etiam Carolus Stephanus in suo de Agricultura libro. Sunt qui Syrupum ex hac tussientibus & Asthmaticis utilem conficiant. Unguentum paratur ad ulcera, scabiem & scrophulas præstantissimum: Exemplum x. Foliorum Nicotianæ libram unam, Axungia porci recentis libram semis. Herba trita in vino rubro per noctem maceretur: manè lento igne cum axungia ad vini consumptionem bulliat: cola exprimendo: colato adde succi Nicotianæ quartarium unum, Resinæ abiegnæ uncias duas: coquantur ad succi consumptionem, addendo circa finem radicis Aristolochiæ rotundæ pulverisatæ unciam unam, ceræ novæ quantum sufficit, fiat unguentum.

ΨΥΛΛΙΟΥ.

PSYLLIUM.

CAP. LXV.

a Meum
gerat
i. sceni
modo
furculosa

PSyllion foliis est coronopo non dissimilibus, hirsutis, longioribus: a sarmentosa sceni modo in totum herbula, ramis dodrantalibus: coma a medio caule exoritur, duobus tribusve convolutis in cacumine capitulis: in his semine duro, nigro, pulicum simili, unde & nomen: in arvis & incultis nascitur. Vis ei ad refrigerandum, inspissandum, & molliendum conveniens: articulorum morbis, parotidibus, tuberculis, tumoribus, luxatis, illitum auxiliatur: imponitur in dolore capitis, cum rosaceo, aqua aut aceto: enterocelis infantium, & prominenti umbilico, illitum ex aceto medetur: teritur acetabuli mensura, & in aquæ sextario madefactum, ubi concrevit aqua, illinitur: siquidem vehementer refrigerat, & in ferventem aquam dejectum calorem reprimat: contra ignes sacros efficax est. Fama est, si virens domum importetur, non sinere in ea pulices gigni. Cum adipe tusum sordida ulcera, & quæ cacoethe vocantur, expurgat. Succus vermiculosis auribus, aut fluxione laborantibus, ex melle prodest.

Psyllii
confid.
& genera

PSyllium, quod & Pulicariam herbam nuncupant, duplici recensetur genere, foliorum capitulorumque differentia. Alterum foliis est incanis, longis, hirsutis, coronopo amulo, non tamen corniculato. Ramos gerit numerosos, dodrantales, rotundos, graciles, & foliosos, humotenus potius quam in altum sese diffundentes, in quorum cacuminibus capitula oriuntur, compacti squamarum congerie a natura fabricata, ut in scabiosa. & longis pediculis nitentia. Flosculos edit pulillos, prætenues, lanuginosos, pilorum speciem referentes, albo colore. plantaginis angustifolia modo. Semen pusillum, quod nigrum pellucidumque habetur, pulicum effigie, in ipsi capituli continetur. Radice nititur subalicante, dodrantali, numerosis stipata fibris. Nascitur locis incultis, & a multis quoque, feritur. Alterum longe sarmentosius est, & numerosioribus refertum foliis, longioribus angustioribus densioribusque, pilosis pariter, atque incanis, & inter se complicatis: capitula illi sunt alteri similia, sed minora paulo & numerosiora, in quibus semen progignitur alteri simile. Radicem habet multifidam, & numerosis scatentem fibris. Nascitur in campestribus, sed in maritimis frequentius. Sepiasia semen recondunt ad glutinosos liquores conficiendos, quibus in infrigidandis inflammationibus, prohibendisque calidis defluxionibus, & ad extinguendam sitim levigandamque linguam, & faucium scabritiem, in ardentissimis febribus utuntur medici: quin etiam ad alvum emolliendam. Psyllii vires retulit Mesues inter ea medicamenta, quæ dejectoria vi pollent, ubi hac ad sensum saltem habet. Psyllium de his est, quæ temperamentum immutant, & quæ emolliendo alvum citant. Hujus seminis tria habentur genera, candicans, sublavum, & ad purpuram vergens. Præstantius perfectiusque maturum, ponderosum, & quod in aquam demissum statim immum petit. Contrarium constat cum viribus, tum substantiis: ea siquidem, quæ in medulla continetur, calida est, & sicca ordine quarto, admodum acris, incidens, exulcerans, septica, & deleteria facultatis. Quæ verò in cortice residet, fesse Ruso, infrigidat, humectatque, tertio excessu. Infunditur Psyllii semen in aqua fontana frigida, agitaturnque, rudicula tamdiu, quousque aqua lentorem contrahat, percolaturque, deinde a seminibus, & admiscetur oleo, aut Symplo violaceo: hoc enim modo Psyllium potu mirifice alvum emollit, & dejicit. Verum si fixum prius semen rosaceo admixtum eodem modo agitur, tunc

I. PSYLLIUM.

II. PSYLLIUM ALTERUM.



tunc sumptum dysentericū remediū est, & ceteris alvi floribus, præsertimq̃, ijs, qui dejectorio medicamento exuperantē hausto superveniunt, sed præcipue acri, quale est scammonium. Ceterū maxime animadvertendum est, ne Psyllij semen (id quod tamen desectantur recentiorum quidam) rufum in pulverem potandum exhibeatur. Quippe quod, attrita, mellatula i substantia, ventriculū, & intestina exulcerat: jecur & sanguinem inflammat, & omnia deniq̃ viscera ledit. Integri seminis dilutum eo modo, quo diximus, paratum, bilem dejicit: eaq̃ propter ardentissimos febribus intolerabili sitienti, inflammatis valde spiritibus, & faucium & pectoris asperitatibus mirifice medetur. In aceto diu agitata inflammatione, igni sacro, & herpete laborantibus auxiliatur, exterius illitum: privatim prodest capite dolentibus fronti impositione, igni sacro, & herpete laborantibus auxiliatur, exterius illitum: privatim prodest capite dolentibus fronti imposi-
tum, si tamen dolor à causa calida fuerit excitatus. Hac ex Mesue decerpimus. Psyllij vires paucis perstrinxit Galenus
lib. 8. simplicium medicamentorum, sic inquirens: Psyllij semen admodum utile est, ex secundo refrigerantium ordie-
tur: Arabicè Bazara chathona, seu Bezzer cotbume: Italicè Psillio: Germanicè Psyllienkraut: Hispanicè Zargaton,
Gallicè Herbe a pulces.

Psyllium duplex est, majus quod duplex (alterum enim, ramosius) & minus Gotne dictum in Phy-
topinace (cum nemo prius proposuerit) descriptum & pictum. I. Psyllium alterum, C. B. Psyllium,
Matt. Trag. Fuchf. Turn. Dod. gal. & fol. Cord. in Diosc. & hist. Gef. hort. Lob. Castor. Lugd. Tab. Psyl-
lium minus, Cæsal. Cynops Theophrasti, Gef. hort. Pulicaris herba, Lob. in Iconibus. II. Psyllium ma-
jus, C. B. & Cæsalpino. Psyllium alterum, Matth. Castor. Lugd. Taber. Psyllium Plinianum fortè radice
perenni supinum Lobelo.

Στείνχιν⁹ κηπαί⁹.

SOLANUM HORTENSE. CAP. LXVI.

Hortenſe Solanum frutex eſt cibus idoneus, exilis, puſillus, multis concavus alis: folio nigro, majore quam ocimi, & latiore: fruſtu rotundo, viridi, qui poſt maturitatem nigricat aut fulveſcit: herba innocentis guſtus. Natura ei refrigerandi: quare folia ulceribus quæ ſerpunt, & ignibus ſacris convenienter cum polline polentæ illinuntur: ægilopia, capitifq; dolores, trita & impoſita per ſe ſanant: æſtuanti ſtomacho auxiliantur: parotidas cum ſale detrита illitu diſcutiunt. Valer ſuccus ejus ad verſus ignem ſacrum atq; ulcera quæ ſerpunt, cum ceruſſa, roſaceo & argenti ſpuma: ad ægilopas cum pane: infantium aduſtioni, quam ſyriaſin vocant, cum roſaceo perſuſus proſicit: in collyriis, aquæ vel ovi vicem exhibet, contra acutas fluxiones illitus: aurium dolori inſtillatus prodeſt: menſium abundantiam ſiſtit invellere ſubditus. Succus fulvo gallinarum cortalium ſimo ſubaſtus, & linteo appoſitus, ægilopis præſentaneo eſt remedio.

Στρεψήτης ἁλιεύου.

SOLANUM HALICACABUM. CAP. LXVII.

Est & aliud Solanum, quod peculiari nomine Halicacabon aut Phyalida, id est vesicariam vocant, foliis antedicto similibus, verum latioribus: cujus caules, posteaquam adoleverunt, prona terram spe-

ram spectant: folliculis orbiculatis, vesiculis similibus: in quibus semen continet fulvum, rotundum, laeve, acinorum uvæ figura: quo coronarii utuntur, corollis intexentes. Vim usumq; hortensis Solani habet: verum cibus nequaquam expetitur. Regium morbum purgat, semine potio, & urinam pellit. Ex utraq; herba succus extrahitur, qui siccatus in umbra reconditur, ad eadem valens.

I. SOLANUM HORTENSE.



Σαπύνη & ὑπναισινός.

II. SOLANUM HALICACABUM.



10

20

30

SOLANUM SOMNIFERUM. CAP. LXVIII.

Solanum somniferum, aliqui etiam Halicacabon appellant, fruticat multis ramis, densis, caudicosis, fractu contumacibus, pinguium foliorum, coroneaq; mali similium plenis: flore grandi, rubro: fructu in folliculis crocato: radice grandi, subrubro cortice vestita: nascitur in saxis, non procul a mari. Radicis cortex in vino drachmæ pondere potus, somnificam vim habet, opio mitiorem. Semen vehementer urinam cit. Corymbi duodecim hydropicis dantur: si quid numero adjiciatur, alienationem mentis faciunt. Remedio est aqua copiosa mulsa, potui data. † Succus pastillis inferitur, & medicamentis, quæ doloris levamentum præbent: decoctus in vino, si in ore contineatur, dentium doloribus auxiliatur. Radicis succus, cum melle illitus, oculorum hebetudines tollit.

† Meum.
φλοιός. i.
cortex.

Σαπύνη & ὑπναισινός.

SOLANUM FURIOSUM. CAP. LXIX.

Solanum manicon, aliqui perflon, alii thryon appellavere. Huic folium erucæ simile, majus aliquantò, satis acantho, quam pæderota vocant, accedens: caules à radice, proceros emittit decem aut duodecim, ulnæ altitudine adolentes: caput in cacumine olivæ figura, sed ut platani pilulæ hirsutius, verum majus latiusq; florem nigrum: postquam eo exiit, racemus exit rotundus, niger, dens aut duodenis acinis constans, similibus hederæ corymbis, ut uvæ mollibus: radice firmatur candida, crassa, cubitali: gignitur in montibus vento perflatis & plataneatis. Radix drachmæ unius pondere pota ex vino, facit species vanas, imaginationesq; non jucundas observari: sed duplicatus hic modus, ad tres usq; dies mentis alienationem avertit: quadruplicatus interimit. Remedio est aqua mulsa copiosius pota, & vomitione rejecta.

60

E Quatuor Solani generibus quæ hic à Dioscoride describuntur, et si in commentariis, quos antea Italico sermone conscripsi, me duo tantum genera novisse prodiderim, hortense scilicet, & quod aliqui Halicacabum, alij Vesicariam vocant: hoc tamen anno tertium, quod Somniferum appellant, Pisis ad nos misit vir rei medicæ eruditione clarus Lucas Gbinnus Forocornellensis: idq; mihi planè omnibus notis legitimo respondere videtur. Verum quantum Solani genus, quod Manicum cognominant, hactenus me non vidisse fateor. **HORTENSE** apud veteres concessit in ciborum usum, & pro oleo habitum est: foliis ex utroque majoribus, Vesicaria emulis, sed angustioribus nigrioribusq; mollioribus & oblongis. Plures circumquaq; fundit ramos non sine alarum cavitatibus floribus albis, & in medio luteis, stellæ figura. Baccas edit rotundas, racematim dependentes, vinoso succo prægnantes juniperinis haud minores orobi quantitate, in quibus album minutumq; semen continetur. Variat in his color: siquidem in hac planta nigra, in illa lutea, in altera subvirides habetur. Radix

Solani
generum
confid.Horten-
sis Solani
descrip-
tio.

III. VESICARIA REPENS.

IV. SOLANUM SOMNI-
ferum.V. SOLANUM SOMNI-
ferum.

Radix illi est alba pluribus divaricata fibris. Nascitur in hortis & viridarius, secus publica itinera, & praesertim propter sepes, & adificiorum muros. Praestat cum foliorum, tum baccarum succus addito rosaceo, & aceti momento, adversus capitis dolores a caliditate exortos: quinetiam phreneticos juvat, ubi illitus in eo linteo ex aceto & rosaceo syncipiti superponatur. Illinitur fronti eodem modo ad calidas oculorum fluxiones. Gargarizatur quoque utiliter cum aceto, ad faucium & columellae inflammationes, & additur convenienter in unguentis & emplastris, quorum ad ulcera contumacia magnus est usus: cibis idoneum est. In summa ubi refrigerare, exicare, cohibereq; opus est, hortense Solanum mirifice convenit. Quod autem HALICACABUS sive Vesicariam vocant, quodq; Arabes & officina Alkekengi nuncupant, foliis est hortensi similibus, sed latioribus firmitioribusq;, subasperis, nec adeo, ut in illo nigricantibus. Caulibus lentis, qui ubi adoleverint, facile sese in humum prosternunt. Flores illi sunt candidi, hortensis modo: e quibus vesica oriuntur juglandium magnitudine, & quandoq; majores, turbinatae facie. Haec octonis compaginantur costis, aequalibus inter se spatium distantibus. Recenter edita virides sunt, sed per maturitatem rufescunt, baccis intus vinosis, quae singula singulis inhaerent inaequali parte, rubicunda uva acino (ruscibaccis) similis, sapore austero simul & amaro, ac numeroso, minutoq; intus semine, ipsoq; albicante. Nascitur propter uliginosas sepes, & locus umbrasis. Baccarum vis est praestantissima non solum ad renum vitia, & ad ciendam urinam, sed ad ejus quoq; ardorem mulcendum. Siquidem earum succus ex papaveris albi cremore, aut seminum melopeponum, aut cucurbitae cucumerisve, aut ex malva decocto, aut hordeacea prissana potus mirifice urinae ardoribus auxiliatur. Aspidibus adeo adversissimum est Halicacabum, ut admodum proprius ejus radice, sopore

Solani
hortensis
vires Mat
thiolo.

Solani
Halica-
cabi de-
lineatio.

Solani
Halica-
cabi vi-
res.

inexpugnabili necentur. Baccae musto diluta imponuntur efficaciter incipientibus oculorum carbunculis. Calcantur eadem in una cum maturis uvis, & diebus aliquot simul effervesce sinuntur, sitq; inde vinum calculosis admodum utile. Siquidem arenas mirifice pellit, & renes mundat unciarum quatuor pondere potum. Est & aliud VESICARIAE g. rui, ab hoc tamen valde diversum, quod hac tempestate feritur in hortis ac feticilibus, scenas, atregias, pergulas & fenestras in

Vesica-
riae re-
pentis de-
scriptio.

Sff

stras in

strat inumbrat, & topiario opere contextit & opacat. Constat hac foliis oblongis per ambitum laciniatis: floribus ex candi-
do lutescentibus, aut simpliciter candidis, e quibus vesica prodeunt virides, subrotunda, semisecundum longitudinem di-
visurus, semine intus pullo erui magnitudine, aut paulo majore, in cuius latere veluti humani cordis effigie visitur, ob si-
gnata albo colore, nec sine causa id a natura factum credimus, quod fortasse hujusce nota nos doceat, ad cordis affectus
hoc semen prestare, quemadmodum & in Echio herba contra viperarum morsu celeberrima, semen viperinis capitibus si-
mile procreavit. Caterum **SOMNIFICUM**, sive Soporiferum Solanum numerosis fruticat ramis, densis, sinuosisq;
fractu contumacibus, foliis multis, subpinguibus, coronea mali haud absimilibus: floribus subrubentibus: caules per inter-
valla verticilli in modum ambientibus, fructu crocato bacca figura, in folliculis hirsutis delitescente. Radice nititur longa
vegetaq; brachiali quandoq; crassitudine, cortice subrubenti circumvestita. Nasitur maritimo tractu, locis plerunq; sa-
xosis: adeo ut mihi dubitandum non sit, quin planta, qua hic Soporiferum Solanum representat, legitima dici possit, cum
omnibus sane notis hoc Solani genus referat: etsi non desint nasuti, & qui aliorum laboribus invident, ac insidiantur, qui
frivolis, inanibusq; argumentis eam oppugnent, quorum latratibus jam aures nostra obsurdescunt. Est & alia **SOMNIF-
ICUM** Solani species cuius hic quoq; imaginem expressimus: foliis angustioribus, venosis, in humum spectantibus, caule an-
gulofo: floribus tintinnabuli figura, subpurpurascens, & in ambitu denticulatis, & e longo pediculo dependentibus: ex
quibus bacca proveniunt nigra, aut ex nigro purpurascens, vinosa, minuro semine referta, quemadmodum & reliqua
Solanorum: bacca hac viridi quodam tegumento ad medium usq; occultatur, cuius orificium in corona modum denticu-
latum desinit. Radicem habet grandem strumosam, teneram, albicantem: Majo floret, & Junio fert fructum. Nasitur in
agro Goritienfi Salvatino monte inter saxa, unde aliquot nobiscum tulimus plantar. Vires alteri similes habet, sed pro-
culdubio imbecilliores. Caterum errant, mea quidem sententia, qui eam plantam, quam herbariorum vulgus Solanum
majus nominat, Veneti vero vulgo Herba bella donna, Solanum somnificum Dioscoridis esse existimant. Siquidem id fru-
ctum non profert in folliculis croceum, tamen si ejus bacca largius sumpta interficiant. Vnde quamvis haec planta viribus
convenire possint, facie tamen inter se maxime distant. Horum sententia ad stipulatus est Euchsius, in suo magno de stir-
pium historia commentario. Sed cum in hoc se manifeste errasse deprehendisset, in suo postea parvo plantarum libro, hanc
herbam in Mandragora reposuit, eamq; Mandragora speciem voluit esse, quam Dioscorides Morion vocari tradit, Lapsius,
nisi fallor, de uno in alterum errorem, Mandragora siquidem nomine Morion, folia fert Mandragora mari similia, dodran-
tali longitudine, terra procumbentia, circa radicis summum. Id quod manifestum praebebat indicium, hanc perpetuo caule
viduam esse, quemadmodum cetera Mandragora genera: nam pediculi, quibus Mandragora fructus sustentur, caules
dici non possunt. Hinc itaq; fit, ut plantam hanc, qua vulgo Bella donna vocatur, in nullo Mandragora genere legitime
referendam putem: cum hac folia emittat bortenfi Solano majora, palmi mensuram nunquam excedentia, minime can-
dicantia, nec humi strata, sed in caulibus exeuntia, adnatis plurimis refertis bicubiti alibi, & ligni modo praeuris. Quin-
immo crediderim ego hanc esse Solani quintam speciem, antiquis scriptoribus incompertam. Nam, quantum equidem
longa experientia comperi, varia ac diversa Solani reperiuntur genera. Provenit hac planta, quam ego Solanum majus
appello, in montium sylvis, saxosis, & feritur in hortis, foliis bortenfi Solano majoribus: caudice bicubiti alibi, &
quandoq; majore, subrutilo colore, ramis numerosis, aliis multis concavis, in quibus flores oriuntur longi, lutea digitati vo-
cata emili, prolixo pediculo & campanula instar concavi, colore ex pallido purpurascens, capillaceo intus staminibus.
Hus flaccescentibus, bacca suboriuntur singulatim e suo pediculo dependentes, dissecto breviq; calyculo superiori parte

VI. SOLANUM MAJUS SIVE herba Bella donna.

Solani
majoris
vires.

Solanum
majus
esse Ma-
drago-
ram Theo-
phrastii.



comprehensa. Haec maturescens nigricant, acini uva magnitu-
dine, pellucida exterius cute. Eadem vinoso succo referta sunt,
ac pariter numero atq; minuto semine. Radicem fundit lon-
gam, crassamq; albicantem, & succi plenam. Plantata semel,
Vere appetente, quotannis ex eadem radice repullulat, semperq;
auctior provenit viribus. Refrigerat ordine tertio, & siccat se-
cundo. Manico correspondet Solano, sed facie ab eodem pluri-
mum differt. Nam bacca quatuor aut sex ipsa devorata su-
mentes dementant, & in furorem agunt, adeo ut demoniaci
facili videantur. Inducunt tamen plures sumentes quando-
que in veterum: nam & pueros quosdam ex harum bac-
carum esum mortuos scimus, qui discriminis ignari eas uva vi-
ce devoraverunt. Non desunt quoq; qui hanc plantam Theo-
phrastii Mandragoram esse velint. Verum & ipsi hallucinan-
tur, quod u ejus historiam minime describat, sed tantum de
fructu meminerit, qui non solum in hac planta parvior, sed
diversis reperitur, sed in aliis quam pluribus. Sed hi (quan-
tum video) ex unguibus leonem describere volunt, cum &
Ursi, & Tigres exungues non habeantur. Sunt qui hanc
plantam jam in usum medicum (ut audio) trahant. Si-
quidem, ut quidam promittunt experimentatores, aqua a
tota planta distillata, pota duorum, aut ad summum trium
cochleariorum mensura, internas viscerum inflammationes
extinguit, nullo corporis incommodo, sed (ut illi ajunt) a co-
piofiori potu abstinendum. Idem praestat exterius adnota
ad erysipelas, sacros ignes, & alios calidos affectus. Contusa
folia & illita, oculorum palpebrarumque phlegmonas le-
nunt. Sicca radice mira vi: nam si semidrachma pon-
dere crassiuscule trita ea maceretur in vino horis ad sum-
mum septem, ac inde percolatum vinum quis degustaverit
jejunus, fiet ut is nullo pacto edere possit, nisi epoto paulo
post aceto. Hoc enim Antidoto succus statim excluditur, re-
dit.

