

Π Ε Δ Α - PEDANII

ΚΙΟΥ ΔΙΟΣΚΟΡΙ-
ΔΟΥ ΑΝΑΖΑΡΒΕ-
ΩΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ
ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΒΛΙ-
ΟΝ ΠΡΩΤΟΝ.

D·I·O·S·C·O·R·I·D·I·S
Anazarbeide medicinali ma-
teria libri primi præfatio,

Io. Ruellio Suctionē si interprete.



ΟΛΛΩΝ ἔμο-
νον ἀρχαίων, ἄλ-
λὰ καὶ νέων συ-
ταξαμένων πρὸς

τῆς τῶν φαρμά-
κων σκευασίας τε καὶ δυνάμε-
ως, καὶ δοκιμασίας φίλτατε Ἀρεῖ·
πειράσομαι σοὶ παραστήσαι μὴ
κενῶν, μὴ δὲ ἄλογον ὀρυκτὸν ἐρη-

κίνας πρὸς τίνδε τίμω παραγμα-
τείας. διὰ τὸ τῶν ᾧ αὐτῶν, μὴ
τετελειωκέναι, τὸν δὲ ἐξ ἰσοείας
τὰ πλείετα ἀναγράψαι. Ἰόλας ᾧ
γαρ ὁ βιθυνὸς καὶ Ἡρακλείδης ὁ

ταραντίνος, ἐπ' ὀλίγον ἠΐσαντο τῇ
αὐτῆς παραγματείας. τίμω βο-
τανικῶν παντελῶς ἐάσαντες πα-
ράδοσιν, οὐ μὲν ἔδεδε γῶν μεταλ-
λικῶν, ἀρωμάτων πάντες ἐπιη-
μόνευσαν.* Κρατεύας δὲ ὁ ῥίζο-
τόμος, καὶ Ἀνδρέας ὁ ἱατρός,

οὗτοι γὰρ δοκούντων ἀκριβέστερον
τῶν λοιπῶν ἀπὸ τοῦτο τὸ μέρος
ἀνερπράφθαι, πολλὰς ῥίζας ἐυχρη-
στοτάτας, καὶ πῆλας βοτάνας ἀπα-
ρασημειώτους εἶασαν. πάλιν τοῖς
ᾧ ἀρχαίοις μαρτυρητόν μετὰ

τῆς



Vanquā amicissi-
me Arce, complu-
res nō veterū mo-
dō, sed recetiorū

quoq; de medicamentorū cōpo-
sitione, virib; atq; probatione
cōmētati sunt: nobis tū nec va-
nū, nec à ratioe abhorretē im-
petū animi ad hoc op' incessif-
fe, tibi ostēdere tētabimur: q' eo-
rū nōnulli absolutū nihil ἐδide-
rūt, alij ᾧ plurima, ᾧ auditu per-
cū ἔταδο didicerāt, scriptis tra-
diderūt. Siq; dē Bithin' Iolas &
Heraclides Tarentinus, omīssa
pr̄fus herbarū tractatiōe, ré sa-
nē ᾧ paucis perstrixerūt. Neq;
verō oēs illi de metallicis quic-
ᾧ reb; aut odoramētis memo-
riā prodiderūt. Crateuas autē
herbari', & Andreas medic', ᾧ
ceteris diligētius hac in parte
versati vidētur, radices multas
apprimē vtilēis, herbasq; haud-
quaquā adnotatas, reliquerūt.
Veruntamen pr̄scorū subscri-
bere oportet sentētias: quos et si

a pauca

DIOSCORIDIS

pauca ipsis referatur accepta,
magna tamē impēdisse diligen-
tia cōstat. Iunioribus minus af-
fentiendū: ē qbus Iulius Bassus,
& Niceratus, & Petronius, Ni-
ger, & Diodotus, Afclepiadae
omnes, medicinalē materiā ver-
naculā cognitāq; vulgō, dignā
cētuerūt quē ab ipsis literis ex-
actē mādaret: & ut medicamē-
torū vires pbatōnēsq; cursum
cōplexi, sic nullo experimento
eorū effectus colligētes, inani
verō reddēdārū causarū studio
verba fundētes, alia p aliis scri-
pitādō, rē in acervū cōgeriēq;
cōtrouersiarū extulerūt. Siqui-
dē qui inter eos egregius habe-
tur Niger, euphorbiū, nascētis
in Italia, chamelæ succū esse
cōtēdit: androsamōnq; eandē
herbā cū hyperico esse. quin-
etiā aloē in Iudæa fossilē na-
sci, & pleraq; his familia expo-
nit, reclamāte euidentia, q̄ pror-
sus veritati refragāt. Quibus cō-
iectura colligi potest, ea nō o-
culata fide sed narratiōe poti⁹
ab aliis accepisse. In ordine iudē
ipsi aberrarūt, partī eorū difcre-
pātis nullāq; cognatione cō-
iūctas vireis collidētes: partī p
elemēta literarū scripta i ordi-
nē digerētes, quō facili⁹ memo-
riē mādaretur, genera & eorū
effectus

τῆς ὀλιγότητος τῶν παρὰ διό-
των, καὶ τὴν ἀκρίβειαν περὶ
περὶ λαβοῦσι. τοῖς μὲν τοι νεοῖς
οὐ συγκατατίθεν, ὅν ἔστι Βά-
σος ὁ Ἰουδαῖος, καὶ Νικηράτος,
καὶ Πετερόνιος, Νίγερτες, καὶ διό-
δοτος, ἀσκληπιάδαι πάντες. οἱ
τὴν μὲν πᾶσι σύμφυλλον καὶ
γνώριμον ἔλκω, ἠξίωσαν ἐπὶ
πρὸς ἀναρχαφῆς ἀκριβοῦς· τὰς
δὲ τῶν φαρμάκων δυνάμεις καὶ
δοσιμασίας ἐξ ἐπιδρομῆς πα-
ρέδοσαν, οὐ τῇ ἀείρει τὴν ἐνέ-
ρειαν αὐτῶν καλονίζοντες. τῇ δὲ
τῆς αἰτίας κεροφανία, εἰς ὅ-
κον διαφορὰς ἐχάσεν αὐτῶν ἀ-
ναφύοντες μετὰ τοῦ καὶ ἄλ-
λα αὐτῶν ἄλλων ἀναρχαφῆν. ὁ
ῥοῦν διαπερπῆς δοκῶν εἶναι ἐν
αὐτοῖς Νίγερ, τὸ ἐφόρειον φη-
σὶν ὅπῃ εἶναι χαμελαίας, γιν-
νομῆν ἐν ἰταλία. καὶ τὸ αὐ-
δράσαιμον, τῶν τὸν ὑπάρχειν
ὑποκίῳ, ἀλδύν δὲ ὁ ρυκτὴν ἐν
ἰουδαίᾳ γινώσκει. καὶ ἄλλα
τούτοις ὅμοια περὶ παρὰ τὴν
ἀλήθειαν ἐκτίθεται ψευδῶς. ἀ-
πὲρ ὅτι τακμήναι οὐκ αὐτοψίας,
ἀλλὰ τῆς ἐκ περὶ κοινότητων
ἰσοείας, ἡ μάρτυρ δὲ καὶ περὶ τὴν
τάξιν. οἱ μὲν ἀσυμφύλους δι-
νάμεις συγκερύναντες, οἱ δὲ κα-
τὰ τοῖς αἰσθησι * ἀναρχαφῆτες
διὰ ζεύξαν * τὰς ὁμογενείας, τὰ
τῇ γλῶσσει καὶ τὰς ἐνεργείας αὐ-
τῶν,

τῶν, ὥς διὰ τοῦτο ἐμνημό-
 νευτα γίνεσθαι. ἡμεῖς δ' * ὥς ἐ-
 σιν εἰπεῖν ἐκ παλαιῆς ἡλικίας,
 ἀλλήκτων πῖνα ἔχοντες ἐπιθυμίας
 πᾶσι τῶν ἐπιγνώσων τῆς ὕλης, καὶ
 πολλῶν γλῶττι ἐπελθόντες. ἰδὲ
 γδ ἡμῖν φρασιπικὸν τὴν βίον, συ-
 ναγασάμενοι τὴν παρρησιαστείαν
 ἐν ἐξ βιβλίοις σὺ παρρησιασθέντες,
 ὧς καὶ τῶν συνταξιν ἀναπείθεσθαι,
 ἐν χειρὶ σὺν ἐκπληρωμένοις πάθος.
 10 δι' ἡμῶν ἔχεις παρὸς ἡμᾶς διὰ δε-
 σιν, φύσει καὶ παρὰ πάντας τὰς
 ἀπὸ παιδείας ἀναρροφῆρας οἰκί-
 μους, καλίστη δὲ παρὸς τὸν ὁμο-
 τέγνωσις, ἰδιαιτέρον δὲ πρὸς ἡμᾶς,
 δεῖμα δὲ ὅσμιον δὲ ἐν σοὶ κα-
 15 λακαράδιος, καὶ ἡ τῶν κρατίστου Λι-
 κινίου Βάσου παρὸς σὲ διὰ δεσιν,
 ἣν ἐξηγάμενοι συνδιόροντες ὑμῖν,
 ἀξιοζήλων τὸ παρ' ἀμφοτέρων
 ὑμῶν παρὸς ἀλλήλους εὐνοίᾳ δ-
 ρῶντες, παρὰ καλοῦ καὶ δὲ σὲ καὶ
 20 τὸν ἐν τεύχεσιν τοῖς ὑπομνή-
 μασι, καὶ τὴν ἐν λόγοις ἡμῶν δό-
 ναν σκοπεῖν, ἀλλὰ τῶν ἐν τοῖς
 παρρησιαστικῇ ἐμπειρίας ἐπι-
 μελίας, καὶ τὰ γδ παλαιοῦς ἀκει-
 ρείας τὰ μὲν παλαιοῖς δι' αὐτοψίας
 γινόντες, τὰ δὲ ἐξ ἰσοείας συμφώ-
 25 ρου τοῖς πᾶσι καὶ ἀνακρίσεως τῶν
 παρ' ἐκείνοις ἐπιγνώσεων ἀκριβέ-
 σαι, παρρησιασθέντες καὶ τῇ τάξει
 διαφόρῳ χρίσασθαι, καὶ τὰ γλῶττι καὶ
 καὶ διὰ μὲς ἐκείνου αὐτῶν ἀνα-
 γρά-

effect^o à sua cognitiōe dissi-
 tes. Nos verò ab ieiūte, vt ita di-
 cā, iūcta iugi desiderio cogno-
 scēdæ materiæ allec-^{ti}, p multis
 regiōib⁹ peragratiss (nec. n. ne-
 scis nos militare vitā exegisse)
 tuo hortatu cōmētationē i sex
 libros cōtulimus. quod op^o tibi
 dicamus, Arce, animi grātitudi-
 ne obsequētes, ob eū quo nos
 psequeris affectū. Etenim natu-
 ra cū in omneis eruditione ex-
 cultos, tū verò in eos qb⁹ cū ti-
 bi ciuīlde artis necessitudo iter-
 cedit, p^o ad amicitia eē soles:
 in nos etiā aliquāto peculiari⁹.
 Enimuerò nō parū pbet tuæ
 pbitatis argumētū, optimi viri
 Licinij Basi singularis erga te
 amicitia: quā vnā nobiscū degē-
 tes nouimus, cū mutua iter vos
 bñuolētiā emulatiōe dignā in-
 tueremur. Admonitū autē te ve-
 lim, cōsq; qui in hosce cōmēta-
 rios incidēt, ne i verbis faculta-
 tē nostrā æstimetis, sed potius
 adhibitā reb⁹ cū peritia curā.
 Etenī prurima visu ipsi exactif-
 simē cognouim⁹. quēdā etiā ex
 ea, de qua iter oēs cōuenit, hi-
 storia p cūctatiōeq; rerū apud
 singulos vernacularū diligēter
 accepim⁹. Dabimus igit operā,
 vt differēti ab aliis ordine tradi-
 to, genera medicinarū virēsq;
 a ij descri-

DIOSCORIDIS

describāt. Quod autē necessaria
sit medicamentorū ratio nemo
est fermē q. ignoret, q. ea & to-
ti arti cōiūcta sit, vniuersisq; e-
ius partib⁹ efficax administret
auxiliū. Quare per medicamē-
torū cōpositiones atq; mistu-
ras, & facta in morbis pericula
extēdi, & incremētū capeſce-
re potest, q. plurimū conferēte
singulorū medicaminū cogni-
tiōe. Quinetiā vernaculā fami-
liarēq; materiā cōplectemur,
vt pfecta sit quē à nobis relin-
quēdo doctrina. Verū imprimis
curā impēdere oportet, vt suis
tēporib⁹ singula & demetatur
& recodatur. certē p horū ra-
tione aut valēt virib⁹, aut eua-
nido nullōq; munere fūgūtur.
Serena igitur coeli cōstitutiōe
demetēda sūt. Magni siq; de re-
fert iter colligēdū, si vel squalo-
res vel fibres infesti sint: quē ad-
modū si loca, in qb⁹ prodeūt,
cliuosa, & vētis exposita sint &
pflata, frigidāq; & aquis carē-
tia: in his. n. locis vires eorū lō-
gē validiores intelligūtur. Cō-
trā, quæ in capeſtribus, riguis,
& opacis, ceterisq; locis à vē-
to filētibus enascūtur, plerūq;
degenerāt, & min⁹ virib. valēt,
multōq; magis, si nō suo tēpo-
re nec opportunē colligantur,
aut

γράψαται. Οτι γαμιν ἀναγκά-
ος ἐπαρχει ὁ πῶς φαρμάκων λί-
θος, παντὶ που δῖλον, σω-
ζευμένος ὅλη τῇ τέχνῃ, καὶ τὴν
ἀπ' αὐτοῦ συμμαχίαν ἀντή-
τον παντὶ μέρει παρεχόμενος. 5
καὶ διότι δύναται αὐξάνει κα-
τὰ τε τὰς σκευασίας καὶ τὰς μί-
ξεις καὶ τὸν ὅπιν τῶν πασῶν
πειρασμοῖς, πλείστα συμβαλλο-
μένης τῆς πῶς ἔχουσιν τῶν φαρ-
μάκων γνώσεως. περὶ αὐτῶν ἐλ-
θόμεθα δὲ καὶ τὴν συνήθει καὶ
σύμφυλλον ὕλην, ἵνα ἡ γράφῃ
ῥῶνται τελεία. περὶ πάντων
οὕτω φερνθήσιν τῆς ἀποδείξεως
καὶ συλλογῆς ἕκαστον κατὰ τοὺς
οἰκείους καμμοὺς περὶστέλει. πα- 15
ρὰ γὰρ δὴ τούτοις ἡ ἐνεργεί,
ἡ ἐξίτηλα γίνεται τὰ φάρμα-
κα. ἀνδρῶν γὰρ ὄντος τοῦ κα-
ταστήματος συλλέγειν δεῖ. με-
γάλη γὰρ * καὶ τούτῳ ὑπάρχει
διαφορὰ, * τῶν ἀνθρώπων ἢ ὁμι- 20
βρων γυρομένην τὴν συλλογὴν
πειθεῖται. ὥς περ καὶ τὸ ὄρεσιν
καὶ ὑψηλοῦς καὶ διαπερσμένους
καὶ ὑψηλοῦς καὶ ἀνύδρους εἶ-
ναι τοὺς τόπους * ἰομετέτραν γὰρ
εἶσιν αἱ δυνάμεις αὐτῶν, αἱ δὲ 25
ἐν πεδίοις καὶ κατὰ ὄρεα καὶ
καταστάσις καὶ μὴ διαπερσμέ-
νοις, ἀποώτερον κατὰ τὸ πλεί-
στον, καὶ μᾶλλον αἱ μὴ κατὰ
ἄρην ἐνχαίρας συλλέγειται, ἢ
δι'

- δι' αὐτῆς ἐπεισὶν ἐφ' ὅτι καὶ ἐν ἀγρο-
 τῶν μὲν τοι ὅτι πολλὰ καὶ, τῶν
 τα παρὰ τὴν ἰδιότητα τῆς γῆρας,
 καὶ παρὰ τὴν σύγκρισιν τῆς ἔτους,
 τὰ γὰρ ἢ βελόδιον ἀκμάζει· ἐν γὰρ
 5 δι' αὐτῆς τὴν ἑαυτῶν ἰδιότητα,
 ἐν γῆρας μὲν αὖτις τε καὶ φύλλα φέ-
 ρει· πρὶν δὲ καὶ δι' αὐτῆς τῆς ἔτους ἀνθο-
 φορεῖ· τὸν δὲ βελόδιον ἐν τοῦτοις
 ἐμφανέως ἔχειν, δεῖ κατὰ τὴν τῶν
 ἀρπυγῶν βλάστησιν ἐν τῆς γῆρας, ἀκ-
 10 μάζειν καὶ παρὰ μάλιστα τοι παρὰ
 τυχεῖν· οὐτε γὰρ ὁ τῆς βλάστη ἐν
 τετυγμένως μόνον, δυνάμει τὸ ἀκ-
 μάζον γινώσκουσι, οὐτε ὁ ἐωρεῖ καὶ
 τὰ ἀκμάζοντα, τὸ ἀρπυγῶν ἐπι-
 γινώσκουσι· παρὰ γὰρ τὸν μετασχημα-
 15 τισμοῦ τῶν φύλλων, καὶ τὰ μετέστη
 τῶν χαλκῶν καὶ αὐτῶν καὶ χαλκῶν,
 καὶ πῶς ἄλλας ἰδιότητας, μετέστη
 πλάνη γίνεσθαι ἐπ' ἐνίοις τοῖς μὴ
 τῶν τῆς ἐάν ποιηταῖς· παρὰ
 τῶν τῶν γοῶν τὸ αἰετῶν, πῶς τὸ
 20 γὰρ ἀλφειῶν ἐπὶ λαμπρότητι, εἰ πῶς
 πῶς μὴ αὖτε αὖτις μὴ καλὸν
 μὴ καλὸν φέρειν· καὶ δὲ αὖτε ἐπὶ τῇ
 ἀγροῦ καὶ βελόδι καὶ πενταφύλλ-
 λα· ὁ δὲ πολλὰ καὶ ἐν τετυγμένως
 αὐτοῖς καὶ ἐν πολλοῖς τοῖς μάλιστα
 25 καὶ τὸ ἐπὶ γῆρας ποιήσας, καὶ μὲν
 τοι εἰδέναι ὅτι μόνον τὸ βοτανικῶν
 φαρμάκων ἐπὶ πολλὰ ἐπὶ δια-
 μύει, οἷον ἐλλείβορος ὁ λευκὸς καὶ
 μέλας, τὰ δὲ λοιπὰ μέγιστον βιότιαν
 ἐπὶ τοῖς πλείστον εἶσιν· ἐν γὰρ
 * αὐτῶν

aut si per imbecillitatem inta-
 buerint. Neq; ignorandum, sæ-
 pe pro peculiari loci natura,
 aut anni clemetia, maturi⁹ aut
 feri⁹ adolescere. Nonnulla pro-
 pria vi, hyeme florent & folia
 pariūt: quædā bis anno florife-
 ra. Quare cui in animo est ho-
 rū peritiā asseq; necesse est cū
 prima germinatiōe solo emer-
 gentibus, adultis & senescenti-
 b⁹ adesse. Nā qui pullulātī her-
 bę dūtaxat adstiterit, adultā co-
 gnoscere nō potest, neque qui
 adultā tantū inspexerit, nuper
 erūpentē noscet. Quo fit, vt p-
 pter mutatā foliorū faciē, cau-
 liū proceritates, florū seminisq;
 magnitudinē, & id genus alias
 peculiaries notas, nōnulli q. olī
 has rerū varietates nō pspexe-
 rūt, magno in errore versētur.
 Quæ causā etiā nonnullis scri-
 ptorib⁹ ipso fuit, q. herbas quas-
 dā, verbi gratia, gramē, quinquē-
 folium, & tussilaginé emittere
 florē, fructū & caulē, negāt. Er-
 go qui sæpius ad visendas her-
 bas & earū natales se contule-
 rit, earū cognitionē maximē cō-
 seque. Scire etiāmn cōuenit,
 sola ex herbaceis medicamini-
 bus veratri genera, nigrum, in-
 quā, & cādidū multis edurare
 annis: reliqua à trimatu iutilia.

a iij Quæ

DIOSCORIDIS

Quę vero fruticosa sunt, sicut
stoechas, trixago, poliū, abroto-
nū, seriphū, ablinthiū, hyssopū,
& alia id gen^o, semine pregnā-
tia demetāf. flores quoq; antea,
q̄ spōte sua decidāt. fruct^o autē,
vt maturi decerpāf necesse est:
& semina, vbi sicari coeperūt,
priusq̄ defluāt. Herbarū succus
& foliorū elici debet, germinā-
tib^o tū primū cauliculis. Lac &
lachrymā excipiātur, iciso per
fumū adolefcētē vigorū cau-
le. Radices, & liquamēta, corti-
cēfve vt recōdanē, eximere cō-
uenit cū herbe suis foliis exuū-
tur. Siccātur etiā expurgatē ini-
bi, lo cis asperginē nō redolēti-
b^o: sed quę luto aut puluere sūt
oblitā, aqua elui debēt. Flores
& omnia quę iucundū odorē
efflāt, arculis tiliaceis, nullo situ
obductis, reponātur. Nōnunq̄
charta aut foliis semina, vt per-
ennēt, aptē iuuoluūtur. Liqui-
dis medicaminibus dēfior ma-
teria, argentea, vitrea, aut cor-
nea cōuenit. Fictilis etiā, si mo-
dō rara nō sit, accōmodatur: &
lignea, præsertim ē buxo: sed
ęnea vasa oculariis medicamē-
tis liquidisq;, & oīb^o iis quę ace-
to, pice liq̄da, aut cedria cōpo-
nūtur. Adipē autē & medullas
stagneis vasis recōdi cōuenit.

Iris.

* ἡ ἰρίς ἐν ἐνώβῃ ἐστὶν, σιχρὴς, χα-
μαῖδρις, πῆλιν, ἀλγέστον, στεί-
ρον, ἀψήδιον, ὕστατον, καὶ τὰ ἐ-
μοια τούτοις, συλλέγειν δεῖ, ἐγκυ-
μονα τὸ σπέρματόν. αὖθις δὲ πρὸς
τὸ ὑποπύως αὐτὴ τὸς δὲ καρ-
ποὺς πεπείρους ὄντας, καὶ τὰ σπέρ-
ματα δὲ ἀρχομένα ἐκτρέφεται
πρὸς τὸ ἀπορρεῖν, χυλίζεν δὲ καὶ
ταὶ βοτάναις, ἀπὸ βλάστων ὄντων τὴν
καυλὸν, ὁμοίως καὶ τὰ φύλλα, ἐ-
ποὺς ὅ καὶ δάκρυα λαμβάνειν, τέ-
μνοντας ἐν ἀκμῇ, * ἐπὶ τῶς καυ-
λοῦς, ταὶ δὲ εἰς ἀπόστασιν εἰζας
καὶ χυλίσματα καὶ φλοιοὺς ἀφα-
ρεῖν ἀρχομένων φυλορρεῖν τὴν βο-
τάναν, καὶ ταὶ πρὸς καυτὰς αὐτῶν
ἐκτρέφειν ἐν τέποις ἀνότησις, ταὶ
ἢ μετεχρύσας γῆς ἢ πηλὸς, πλύνειν
ὑδατι. ἀποπύδεσθαι δὲ καὶ αὖθις, καὶ
ὅταν ἐνώβῃ τυγχάνῃ ἐν κισσῶσις
φιλλυεῖνοις ἀνότησις, ἐστὶ δὲ ὅτε
καὶ ἐν χάρταις ἢ φύλλοις χρυσί-
μως περικεῖται πρὸς διαμωγὴν τὴν
σπερμάτων, πρὸς ὅ τὰ ὕδα φάρ-
μακα ἀρμόσει ὕλη πάσι ἢ πυκνῇ
ἢ ἀργύρῃ ἢ ὕλει ἢ κεράτων γέφυρῃ
μύρμη, καὶ σφακίῃ ὅ καὶ μὴ ἀφ᾽ αὐ-
δετος. * ἔυλινον ὅ ὅταν ἐκ πύξης κα-
τασκευάζῃ τὰ ὅ χαλκῷ ἀλγεία, 25
ἀρμόσει πρὸς τὰ ἐφθελμικά * φάρ-
μακα καὶ ὑδρῶς, καὶ ὅταν δι' ὄξους ἢ πῶς
σιν ὕδατος ἢ κεδείας κατασκευά-
ζῃ. σέαται ὅ καὶ μυθῆς, ἐν κασι-
τερίοις ἀγρίοις ἀποπύδεσθαι δεῖ.

Περί

Ἰρις Ἰείδους. Κεφ. α.

Iris. Cap. I.

Ῥίς ἀπὸ μὲν τῆς κατ'

Ris à coelestis arcus si-

I ἕρσαντ' ἐμφερείας ἀνό-
μασαι, φύλλα δὲ φέρειI militudine nomē acce-
pit. Folia fert gladioli,

ὁμοία ξιφίῳ, μείζονα δὲ καὶ πλα-

sed maiora, latiora, & pingui-

5 τύτερα καὶ λεπυρώτερα. ἀνθὴ δὲ

ra. Flores in caule equalib⁹ in-

ἐπὶ χαλκῷ παρθέλληλας, ἐπιχαμ-

ter se spatijs distant, incurui, va-

πῆ, ποικίλα· ἢ γὰρ λευκὰ, ἢ ὠχρὰ

rij: siquidē cādidi, pallētes, lu-

ἢ μύκηλα ἢ πορφύρεα ἢ κυανίζον-

tei, purpurei, aut cœrulei cōspi-

τα ὁρᾷται· ὅθεν διὰ τὴν ποικι-

ciuntur: qua diuerfi coloris spe-

10 λίαν ἀπεικάζει Ἰείδῃ τῇ οὐρα-

cie quādā coelestis arcus ima-

νία· ῥίζαι ὅσπερ γονατώδεις, στε-

go representari videtur. Radi-

ρεαὶ, ἐνὸς δὲ, ἃς δὲ μετὰ τὴν

ces subiacēt geniculatę, durę,

τομὴν ξηρῶντα ἐν σκιᾷ καὶ*

odoratę, quę frustatim disse-

διείραντα λινῷ, ἀποτίθειται. ἔστι

ctę, in vmbra siccantur, & tra-

δὲ βελάνην ἢ ἰλλυρικὴν καὶ μακε-

iectę lino recondūtur. Melior

25 πυκνὸρρίζος, καὶ ὑποκόλοχος, καὶ

est Illyrica, & Macedonica: &

δυσθέραι, καὶ τῇ γῆρᾳ ὑπο-

inter has laudatissima, quę pu-

κίρρος, καὶ σφόδρα ἐνὸς δὲ καὶ

mila ferē & densa cōstat radi-

τῇ γῆρᾳ πυκνότερα. τὴν τε ὁ-

ce, frangenti cōtumax, subrufo

σμυλὴν εἰλικρινήν, καὶ μὴ νοτίζου-

colore, gustu amaro, odore p-

σα. παρμῶν τε ἐν τῷ κόπτε-

quā syncero, ita vt nullū pror-

20 θται κινεῖται.* ἢ λιγυρὴν δὲ λευ-

sus fitū redoleat: quę dum tū-

κὴ κατὰ γῆραν, πικρὰ πρὸς

ditur sternutamēta mouet. Se-

γῆρσιν δευτερεύοντα τῇ διωάμει,

cundum locum habet Africa-

παλαιούνηται ὃ περιδονίζον).

na, candicans, gustūq; amara.

ἐνὸς δὲ τεραὶ μὲν τοι τότε γίνονται.

Teredines in vetustate sentiūt,

διώων ὃ ἔχουσι πᾶσαι δερμαί.

tūc tamē odoratiores reddi so-

25 πικρὰ, λεπυρὰ πικρὴν ἀρμόζουσιν

lēt. Vis omnib⁹ excaľfactoria,

πρὸς ἑῷ χάς, καὶ τὰ δυσανάγνωστα

extenuās, cōtra tussim efficac:

ἔχει. λεπτοποιῶσαι καὶ θαλάσσιον

humorū q. agrē reijciunt cras-

δὲ* χολεὰς ποτίζόμεναι μεθ'

sitiam digerūt, bilē crassāmque

ὑδρομελιτος, ὅλκως < ζ'. εἰσὶ ὃ

puitam ex hydromelite dra-

καὶ ὑπνοποιοί, καὶ δακρυοποιοί.

chmis septem epotę purgāt, fo-

καὶ

mnū cōciliāt, lachrymas ciunt,

torminibus medentur. Eadem pota ex aceto auxiliatur serpentium icibus, lienosis, co'uulsis, pfrictionibus, horrorib⁹, & quibus genitura effluit: menses ex vino pota pellunt. Decoctum carum, foeminarum fotibus vtiliter imponit, ad emolliendos locos, laxandaq; in eis venarum spiracula, ischiadicis infundit, fistulas ac sinus carne explet. Radices ex melle gladis modo subdita, parte extrahunt: quietia cocta & illite, strumas, veteresq; duritias emolliunt. Sicca quoq; vlcera replent, & cum melle purgant: nudata ossa corpore operiunt: doloribus capitis, cum aceto & rosaceo magna vtilitate illiunt. Admotae cum albo veratro & duabus mellis partibus, letigines & vitia cutis in facie a sole contracta emaculat: pefsis, malagmatis, & acopis inferuntur. In vniuersum, magni ad omnia vsus.

Acorum. Cap. II.

Acorum folia iridis habet, angustiora tamen: radices non diffimiles, complicatas, non in rectum sed obliquum actas, & summo cespite sparsas geniculis interceptas, albicantes, gustu acres, odore non ingratas. Optimum est densum, candidum, plenum, carie non excusum, odoratum, cuiusmodi

ἐν σφόδρα ἰσχυρὸν ἐστὶν. κατὰ τὸν ἔξωτον ὅσον πηλὸν
ἔσται διὰ τὸν ἄνθρωπον ἀνθρώποις, καὶ
πληντικαῖς, καὶ σπασμῶδεις, καὶ πτε-
φυγῶν τοῖς ἢ ῥιγῶσι, καὶ τοῖς ῥιγῶσι
πρὸς τὸν ἄνθρωπον. συνὸν οἶον δὲ ποτε
συνὸν, ἀνθρώπων ἐμμελῶν, καὶ τὸ ἀπό-
ζημα δὲ αὐτῶν, πρὸς γυναικείας
πνεύμας. οὐδὲ τὸν, μαλακῶν τὸν
τόπον καὶ ἀναστομῶν, ἰσχυρὸς τε
εἰς ἐκκυσμα, καὶ συνείργων καὶ κόλ-
πων σαρκαπτικῶν. πρὸς τὸν συνὸν δὲ
ὡς καλὸν ἔστιν μὲν μέλιτος, ἐμμελῶν
κατασπῶσι, μαλακῶσι καὶ χοιρῶ-
δους καὶ σκίρρωματα παλαιὰ. ἐφ-
θαλμὶ καὶ ἀπλῶς ἐστὶν, ἐστὶν καὶ πλε-
ρῶσιν ἔλκεα, καὶ ἀνὰ καὶ ταύροις μὲν
μέλιτος, καὶ τὰ ἐφελκῶντα τὸ ὅσον. 15
ὡν σαρκαπτικῶν ὡς καλὸν ἐστὶν καὶ κερα-
λαλῶν, συνὸν ὅσον καὶ ῥοδίων καὶ
πλεθῶσιν. φανερὸν τε καὶ ἐφελκῶν
ἀποκαταστήσει, συνὸν ἐλλεβόριον καὶ
καὶ καὶ διπλασίονι μίλιον καὶ δι-
πλασίονι, μίλιον δὲ καὶ περὶ 20
σπῆς καὶ μαλακῶν καὶ ἀκόποις, καὶ
καὶ τὸν εἰς τὸν πολὺ χρόνον.

Πρὶ Ακόρι. Κεφ. β.

Ακόρι τὰ ῥιζὸν ἔχει ἐμ-
φρῆν ἰσχυρὸν, σενώτῃ δὲ καὶ τὰς ῥι-
ζὰς ἐκ ἀνομίας, διαπεπλεγμένους
καὶ καὶ εἰς ἐνθὺ πεφυκέναι, ἀλλὰ 25
πλεθῶν καὶ ἐξεππολῶν, γόνιαι
διηλημμέναι, ὑπολευκῶν, δριμύ-
ται τῇ γούσῃ, καὶ τῇ ὁσμῇ ἐκ ἀν-
δρῶν. διαφέρει δὲ τὸ πικρὸν καὶ λευ-
κόν, ὁ ὅσον τὸ καὶ πλεονέχον ἐν ὅσον
ἐστὶν

ἥτο δ' ὅτι τὸ ἐν χαλκίδι καὶ τῇ
χαλκιδίᾳ ἀσπλήπον λεγόμενον.
Διότι αὖν ὃ ἔχει ἡ ῥίζα θέρμαντι-
κὴν, πνέμενον ὃ τὸ ἀφ' ἑλίου ἀν-
τὶ ἔρα κινεῖ ἀρμόζον πρὸς πνευ-
5 ρας πόνον καὶ θώρακος καὶ ἥπατος,
σπλάχνου, ῥήγματα, σπασματα·
σπλῆνις τήκεται, ὡφρὶ καὶ σπαστου-
ριδόντας, θυροδύκτους, καὶ εἰς ἐκ-
δοσιμα ὡς ἱρις πρὸς τὰ γυναικεία,
* ὃ ὃ χαλκὸς ἔχει ῥίζαν ἀποκαθάρσει.
10 ἐπισκοπῶντα ἢ κόρας, μίσιν) ὃ καὶ
τοῖς ἀνδράσι ἡ ῥίζα χροσμήσας.

Περὶ Μείου. Κεφ. γ'.

Μείον τὸ χαλκιδέον ἀθαρμα-
πικόν, ὅπου τὰ πλείονα ἐν μακε-
δονίᾳ καὶ ἰσπανίᾳ, ὅμοιον χαλκῷ καὶ
15 τοῖς φύλλοις ἀνήδον, παχύτερον ὃ
τὸ ἀνήδον. ὁππῶς περὶ αἰσθάνον,
ταῖς ῥίζαις ἡσπασπάρων λε-
πτῶν πλαγίαις, καὶ ἐνδοταῖς, μα-
κράς ἐνὸς δεσμοῦ, θερμανούσας ὃ
γλῶτταν, αἱ πινεὶ ἀποξείθεται
20 μεθ' ὕδατος ἢ καὶ λείαν δίχα ἐ-
λίσσας ποθεῖται, τὰ στεγνὰ πε-
ρὶ κύστην καὶ νεφροὺς πάσῃ παρη-
γορεῖται, καὶ δυσουρίας ἀρμό-
ζουσι. σωμαχὸν τὸ ἐμπνευματώ-
σεσι καὶ σπλάχνου, ὡς εἰκῆς ἔχει δια-
25 θέσει, ἀφ' ὅθεν πόνους, θώρακι πε-
ματίζοντων σὺν μέλιτι λείαν ἀν-
τι ἐμλκτικῶς βοηθεῖται, αἷμα τὸ ἀ-
ριστὸν δι' ἐμμύνην ἀποξείθεται εἰς
ἐκδοσιμα. πασιδὼν δὲ καταπλα-
θεῖται ἐφ' ἡσθάνουσι οὐρεθρῶν ἄρσιν,
651

cuiusmodi Colchidicū & Ga-
laticum, quod aspletion dicūt.
Radici vis calfactoria. Deco-
ctum potuvrinā citi prodest la-
teris doloribus, & iocineris at-
que thoracis: itē torminibus,
vulsis, ruptis: lienē absūmit, vri-
næ stillicidio & serpentum icti-
bus auxiliatur, insidentibus ad-
muliebres affect⁹ iridis modo
vtiliter imponitur, oculorū ca-
ligines succo discutit, antidotis
radix magno vsu cōmiscetur.

Meum. Cap. III.

Meon, quod Athamanticum
vocāt, in Macedonia & Hispa-
nia plurimum gignitur, anetho
foliis & caule simile, sed eo cras-
sius, binū fermē cubitorū al-
titudine attollitur, sparsis ī obli-
quum rectūq; radicibus, lon-
gis, tenuibus, odoratis, linguam
excalfacientibus. Quæ feruefa-
ctæ ex aqua, vel tritæ citra co-
ctionē, præcluserum renū vesi-
cæq; farctæ vitia potu leniunt,
vrinæ difficultati medetur, sto-
machi inflatiōes discutiūt. Tor-
minibus, affectæ vuluæ, articu-
lorū dolorib⁹, atq; fluxionibus
pectoris, tritæ cum melle in e-
clegmate auxiliatur, sanguinē
per mēstrua pellūt, discelsioni-
bus feruefactæ: infantib⁹ autē
illitæ imo vetrici, yrinās mouēt
quod

DIOSCORIDIS

q̄ si plus quàm deceat ex his
bibatur, caput dolore afficiūt.

Cypirus. Cap. IIII.

Cypirus, quem aliqui erysi-
sceptum, vt aspalatum appel-
lant, folia fert porraceis pro-
xima, sed longiora & exilio-
ra: caulem odorati iunci, cubi-
talem aut maiorē, angulosum,
in cuius cacumine minuta fo-
lia cum semine exoriuntur: ra-
dices, quarum in medicina est
vsus, cohærentes inter se oleis
oblongis similes, aut rotunda,
nigro colore, suaui odore, ama-
ro gustu. In lacunosis, palustri-
bus & cultis nascit̃. Optima est
grauissīma, dēsa, fractu contu-
max, plena & aspera, odoris cū
quadā acrimonia iucūdi, qua-
lis est Cilicia, Syriaca, & quē ā
Cycladibus insulis petiūt. Huic
calida vis inest. Venarū spiracu-
la laxat, vrinam ciet, ad calcu-
los aquāmq; subter cutē vtilis-
simē bibitur, aduersus scorpio-
num ictus remedio est, perfric-
tionib⁹ vuluæ & p̄clusionib⁹
fotu pdest, pellit mēses. Cōtra
vlcera oris etiā si depascāt vo-
rētq; farina ei⁹ efficax est. Ma-
lagmatis calfaciētib⁹, & vnguē-
torū spissamētis bene adijci so-
let. Aliud cypiri gen⁹ tradūt in
India nasci, gingeris effigie,
quod

ἐστὶ δὲ καὶ κεφαλαλγὴς πλεον
ἢ δειπνόμενον.

Πρὶ Κυπέρη. Κεφ. δ'.

Κυπέρης, οἱ δὲ ἐρυσίπτη-
πτον ὡς τὴν ἀσπλάδον χαλοῦ-
σι, φύλλα δ' ἔχει ὅμοια περὶ σῶ, 5
μακρότερα δ' ἢ ἰσχυρότερα, καυ-
λὸν δὲ πυκνόν, ἢ καὶ μείζονα.
γωνιάδην, ὁμοιον ῥήνω, οὐ κατὰ
κορυφῇ φύλλα εἰῶν ἐστὶν ἔκφρις
μικρῶν καὶ σπέρματος. ῥίζα δ'
ὑπαιστὴν ὄν καὶ ἡ χεῖρ, ἐπιμή- 10
κης ὡς περὶ ἐλάτης συναφῆς ἐσιν-
ταῖς, ἢ καὶ τρογύλαι, μήλαναι,
εὐώδεις, ἐμποικροί, φέεται δὲ ἐν
τόποις ἐργασίμοις καὶ τελευτά-
δων. αἰεὶ δὲ ἐστὶν ἡ βαρυτάτη 15
καὶ πυκνὴ καὶ ἄδρα, δύσδραυ-
τος, τραχεῖα, εὐώδης μετὰ πνοῆς
δριμύτητος. τοιαύτη δὲ ἐστὶν ἡ*
κιλική, καὶ ἡ σικελικὴ, καὶ ἡ ἀπὸ τῆ
κυκλάδων νήσων. διώμας δ' ἐστὶν
αὐτῇ σερμαντικὴ, ἀνασωματι- 20
κὴ, διουρητικὴ καὶ διὰ τὸ καὶ ὑδρω-
πικοῖς πνομῶν βοηθεῖ, καὶ σκορ-
ποδιήκτοις, καὶ ταῖς περὶ μύ-
τρας δὲ κατὰ λύξας καὶ μύσσοις
πνευμαίνῃ* ἀρμόζει, ἀρουσα
ἐμμηνα. ποιεῖ δὲ καὶ τοῖς ἐν σῶ- 25
ματι ἔλκεσι καὶ νευμαδύμοις ἐνεσ-
κῆα. μύγνεται καὶ μαλάγμασι
σερμαντικοῖς, καὶ εἰς τὰ σήματα
τῶν μύρων εὐδετέεισθρεῖ) δ' καὶ
ἐντέροις εἶδος κυπέρου ἐν Ἰνδία
χυνόμενον, φροστοικὸς ζῆνός ἐστι.
ὁ δὲ αὐ-

ὃ διαμασθῆν* κροκῶδες καὶ πικρὸν εὐείσκειται, καὶ αἰσθηθῆν δὲ, παρὰ ῥῆσιν καὶ ψιλοῖ τὰς τείχας.

Πρὶ Καρδαμώμου. Κεφ. ε.

Καρδαμώμον ἄριστον τὸ ἐκ τῆς κομμαθηνῆς καὶ ἀρμενίας καὶ βοσπόρου κομίζουμένων. ἡνῶται δὲ καὶ ἐν Ἰνδία καὶ ἀραβία. ἐκλήρου δὲ τὸ δύσθρανεν, πικρὸν, μεμικρὸς, τὸ γὰρ μὴ τοιοῦτον, ἐξωρεῖν ὅσιν, καὶ τὸ τῇ ὁσμῇ πικρὸν κπικόν, γένεσι δὲ δειμὺ καὶ ὑπόπικρον, δύσμιον δὲ ἔχει δυσμασθικήν. ποιεῖ δὲ μετ' ὑδατος πινόμενον πρὸς ἐπιληπτικούς, βήτοντας, ἰσχιαδικούς, καὶ παρὰ λισιν, ῥήγματι, σπασμάτα, σφόδρους, καὶ ἑλμινθὰ πλατείαν ἐκβάλλει, μετ' οἴνου δὲ πινόμενον, νεφελκοῖς, δυσσυνεῦσι, σκωρποπλήκτικα, καὶ πᾶσι τοῖς ἰοβόλοις ἀρμόζει, μετὰ δὲ δόφνης ῥίζης φλοιοῦ ποτὲν ὅσον ἡ λίθους θρύπτει, φτεῖρει καὶ ἐμύθρια ὑποδυμώμενον, καὶ ψάρα ἐξαίρει σκωρὸν κατὰ ῥιζόμυρον, κίγνυται δὲ καὶ εἰς τὰς τῶν μύρων συψείας.

Πρὶ Νάρδα. Κεφ. ς.

Νάρδα ἐστὶ δύο ἡνῶν ἡ μύρα, γὰρ πρὸς καλεῖται ἰνδική ἢ δὲ συριακή. ἐκ τῶν ἐν σινεία εὐείσκειται. ἀλλ' ὅτι τὸ ὅσιν ἐκ τῆς ἡνῶται, τὸ μύρα πρὸς σινεία πρὸς ἀπταί, τὸ δὲ πρὸς ἰνδούς, καὶ τὸ κερμαθῆν συριακή, ἐστὶ βελτίων ἢ πρὸς σφάτος, καὶ

quod māducatū croci vim reddit, gustu amaro sentiū, & illitū presentē psilothri vim exhibet.

Cardamomum. Cap. V.

Cardamomū optimū est, qđ ex Comagene, Armenia, Bosporoq; deuchit: in India quoque & Arabia puenit. Eligi debet plenū, frangenti cōtumax, occlusum, farctūmq; (qđ enim huiusmodi non est, exoletū iudicatur) & gustu acre, subamarum, & odore caput tentās. Ex calfactoriā vim habet potūmq; ex aqua facit ad comitiales, ischiadicos, tussiles, neruorū resolutionē. Itē ad rupta, vūlla, tormina: latas vētris tineas excutit. Ex vino autē potū, renibus, difficultati vrinae, à scorpione ictis, neq; non omnibus venenū vibratibus, auxilio est. Cū cortice radicis lauri epota drachma calculos comminuit, partus suffitu enecat, scabiē ex aceto illitum adimit. Et ad vnguentorū spissamenta additur,

Nardum. Cap. VI.

Duo nardi genera: vnū Indicum, alterum Syriacū appellatur, non qđ in Syria proueniat, sed quodd mōtis in quo oritur, pars vna ad Syrios, pars altera ad Indos flectitur. Ex hoc Syriaci genere p̄cipuū est recēs &

DIOSCORIDIS

& leue, largā gerēs comā, flauū
colore, perquam odoratum, ac
cyperum redolens, breui spica,
amaro sapore, linguā ficcante,
quod diu in sua odoris gratia
permaneat. Ex Indicis aut nar
dum quoddā Gangitis vocat,
à fluuio Gange, apud quē ena
scitur, montē praterfluente: qđ
genus ob multā loci, in quo p
dit, vlginem, viribus infirmius
est, atq; proceri⁹ adolescit, plu
res ferens spicas ab vnica radi
ce comosas, vnq; conuolutas,
ac grauiter olētes. Montanum
autē odoratius, spica breui ac
mutila, odore cypero vicino,
cēteras habēs Syriaci dotes. Est
& genus quoddā cui Sāphari
tico nomen locus indidit, fru
tice breui, ī magnas se spargēs
spicas candidiore interim me
dio caule, hircorū virus supra
modū redolente: quod impro
batur. Madefactū vēdi solet: qđ
vitium ex eo deprehenditur, qđ
cādida sit spica, & squalida, nul
lōq; puluere obsita. Adultera
tur stilbio cum aqua aut pal
meo vino, inspissationis ponde
rīsq; causa inspirato. Intueri au
tem oportet si lutū radicibus
insideat, & in cerniculo pulue
rem excutere, eluēdis manib⁹
vilem. Vim habēt excalfacto
riam,

καὶ κέφα, πολὺ κομος, ξανθὴ ἡ ῥιζό
αν, λεωδης ἄραν, καὶ κτῆ κινωρεί
ζιν ἐν τῇ ὁσμῇ, μικρὸν ἔχουσα ἡ
σάχυν, πικρὰ ἡ γαστρικὴ, καὶ ἰσχυρὴ
ἀναξήρα πικρὴ, ἐπιμυθουσα τε τῇ
λευδία ἐφ' ἰκανόν. ἡ ἰνδικὴ δὲ
μυόπις λέγεται γαγγίτις. ἀπὸ πινος
ποταμοῦ παρὰ ῥέοντος ἡ ὄρεσι γὰρ
καὶ καλὰ μύρα παρ' ἡ φύει. ἀδινε
σέρα καὶ δυνάμειν ὅσα διὰ τὸ ἐφ'
ὕδατος δύνει τῶν εἶναι καὶ ἐπιμυ
κασέσθαι, πλείονας τε ἔχουσα τὰς
σάχυν, ἀπὸ ἡ ἀντ' ῥιζὴς καὶ πολυ
κόμης καὶ περιπλεμένης, βρομώ
δεις καὶ ἡ ὁσμῇ. ἡ ὁρενοτέσσα
λευδεσέσσα, κολοβόσα καὶ κινωρεί
ζουσα καὶ ἡ λευδία ἔχουσα ἡ καὶ
ἄλλα ἐν αὐτῇ, ὅσα παρ' ἡ συρια
καὶ λεβομύρα, καλεῖται δὲ πικρὴ καὶ
σφοδρὰ κολοβὴ, ἀπὸ χω
εἶου ὀνομασμένη, μεταλλόσα καὶ
λευκότρον καμλόν, ἐστὶ ὅτι μέσον
ἔχουσα, ὅσα βαλίζονται τῇ ὁσμῇ, ἡν
δεῖ ἀπεκλέμεσθαι. παρὰ σκεῖται δὲ
καὶ ἀποβρεβέμενη, ὅσα γινώσκει
ἐν ἡ λευκὸν εἶναι ἡ σάχυν καὶ δυν
χωρεῖν, καὶ μὴ ἔχουσα ἡ γαστρικὴ
ζοισι δὲ ἀντ' ἐμφυσώσιντες σίμ
μι μετ' ὕδατος ἡ οἶνον φοινικίτην,
πρὸς τὸ συμπλοῦν αὐτῶν, καὶ
βαρυτέραν γίνεσθαι. ἐπὶ ἡ ἡ ῥι
ας ἀφαιρεῖν δεῖ, εἰ πρὸς σίμῃ ἡ ῥι
ζας πηλός, καὶ σὺν γαστρικῇ καὶ
κοινῇ τῶν. λευκῶν πάντα εἰς χεῖρ ἐν
πύρον. δύνανται ἡ ἔχουσι θέρμαν
κίω.

9 *ἐν, ἐξαρπαιὴν, ἐρπαιὴν, ὅθεν κοι*
λῶν τὸ ἱσθὶς προέρχεται, καὶ τὰς
ἐκ μύρας ῥύσας πρὸς τὸ ἐκβαλεῖν, καὶ
ἐκ τῆς σελήνης ἐκβαλεῖται ὃ καὶ γὰρ
πάντες συνήλκοντο ὑδῶν, ἵνα προέρ-
 10 *χθῇ καὶ καρδιαί μῶς, καὶ ἐκ πνεύμα*
τελειούσιν, ἥτοι πλοῖς τε καὶ ἡλῆ-
κοῖς καὶ ψευθευκοῖς, ὅσα φησὶ Ἰησοῦς
τὸν ὁ ἴδωκεν, καὶ πνευματικῶν, εἰς
ἐκείνην ὥσπερ φησὶ μύρας ἰδὼν
ταῖς ποίαις καὶ πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλ
 10 *μοῖς μύρας τῶν βλεφάρων, εὐ-*
φρανται καὶ διασώσονται τὰς βλεφα-
εἶδας, καὶ ζήσονται τὸ σῶμασι διὰ
πάσιμα, μὴ ζῶντι καὶ ἀπὸ πνεύματος
ἀποτρίβει, καὶ εἰς τὸ ὀφθαλμικὸν ἐν
ἀλγέῳ καὶ ὁ ἀκόντις φησὶ ἰδὼν
 15 *ταὶς συνὶ οἶνον καὶ ἀναπλάθειται.*

Πρὶς ἑξήκων Νάφδ. Κεφ. ζ'.
 Η δὲ κελευμένη ἀφ' οὗ, ἡν' αὖ) μὲ
 ἐν τοῖς κτ' ἡγουμένη ἀλπεσι, ἐπὶ
 χειρὶς ἀνομασίαν* ἀληθινά.
 ἡν' αὖ) δ' ἐν τῇ ἱερᾷ, ἐστὶ δὲ σα-
 20 μίντος μικρὸς σὺν τῇ ρίζῃ, εἰς
 δέσμας ἀναλαμβανόμενος χει-
 ροπαλῶν. ἔχει δ' φύλλα ὑπομυ-
 κει, ὑπὲρ ἑαυτὴν, αὐτὸς μόνον, μὴ
 ἰσὺς δ' τῇ κεφαλῇ, ὅτι καὶ τῇ ρίζῃ ἢ
 ἡλπίσας, καὶ ἡ ἐνομή. ὅθεν δέει ἀπὸ
 25 μῆος ἡμέρας καταρραγάντας ὑδα-
 τας δέσμας, καὶ χειρὶ ζώνας τὸ
 γένος, πηγαίαν ὅτι ἐδάφους νο-
 τρου, ἀποπικνυμένη χαρτί, τῇ
 δὲ ὑπερᾷα καταρραγνύουσαν συν-
 ἀποκαταίρεται τῶν ἀχρεώδων καὶ
 ἀλυστέων.

riam, & exiccantē. Vrinam mo-
uent, aluum potu sistunt, vuluę
profluua, saniemque apposita
supprimūt. Nauseę ex aqua frī-
gida auxiliantur, & stomachi
rosionibus, inflationi, iocineri,
regio morbo, renum vitij. A-
quę autē incoctę fotu ad in-
fessum, vuluę inflāmationibus
medentur: ad glabras oculorū
genas valent: siquidem eas ad
densiorē pilum reducant, per-
fusus humore corporib⁹ inspar-
guntur. Miscentur antidotis, &
in fictili nouo non picato ad-
ocularia medicamenta recō-
duntur, trita in farinam, & cū
vino in pastillos coacta.

Nardú Celticú. Cap. VII.

Celticum nardum nascitur in Liguriæ Alpibus, salu-
ca patrio nomine appellatum.
prouenitque in Istria. Exiguè
fruticat, & cum radicibus in
manuales fasciculos compo-
nitur. Folia habet oblonga,
colore in flauum languido, flo-
rem luteum. Cauliculorum &
radicum duntaxat vsus est, &
odori suauitas: vnde pridie
fasciculos aqua abluere expedit,
& exempta terra pauito so-
lo atq; humeti subiecta char-
ta reponere, postridie repur-
gare, siquidè vtile, cū aceroso
alienoq;

DIOSCORIDIS

alienoq; propter humoris vim, ἀλλοτρίω τὸ εὐχρηστον, διὰ τὸ
non excutitur. Adulteratur im- ἐν τῷ ἱκμάδος εὐπορίαν. δοκίμει-
posita herba simili, quæ hircu- 3) ὅτι συναποπλομῶνται αὐτῷ, πο-
lus vocatur, ab odoris graui- ἀς ἐμφρῶς, ἢν διὰ τὸ πᾶσι τῷ ὁσ-
tate : sed facilis cognitio. nan- μὴν βρομῶδες, βάλαν καλῶσιν. εὐ-
que herba candidiorest, sine χερῶς 3) ἢ ἐπὶ τῶν σπῆλαις, ἀκμῶν γὰρ 5
cauliculo, minoribus folijs, ὅστιν ἢ πᾶσι καὶ λευκοτέραι, καὶ ἢ πᾶσι
radice neque amara, neque ο- ἐπιμένει τὰ φύλλα ἔχει, ἢ δὲ τῷ
dorata, vti verum nardum est. ῥίζαν πικράν ἢ ἀρωματίζουσαν ὡ-
Itaque radices atque cauliculi, σπερ ὅτι τὸ ἀληθινὸν ἔχει. ἀπο-
abiectis folijs triti secernūtur, κρίνας ἢν τὸ καυλῶν καὶ τὰς ῥί-
vino excipiuntur, digeruntur ζας, τὰ δὲ φύλλα ῥίνας, εἰ βέλαι 10
que in pastillos, & ita fictili no- δ' ἀποτίθειται, ἀναλαμβάνων
uo diligenter operto, asserua- λεία οἶνω, καὶ βρομῶδες ἀναπλά-
ri debet. Laudatur maximè re- σους φύλλα πᾶσι ἐν σπῆλαις ἀγρίω
cens, iucūdi odoris, radice nu καμῶ, πᾶσι μάλιστ' ἐπιμελῶς. ἀει-
merosa coharēs, plenū, nec fra ση δὲ ὅστιν ἢ σπῆλαιος καὶ εὐώ-
gile. Ad eadem, quæ Syriacū δης, πολὺ ῥίζας, οὐκ εὐπορίος, 15
poller: sed vehementius vri- πᾶσι πᾶσι. δοκίμει 3) ὅτι οὐ καὶ ἢ σπῆλαι
nam cit, & stomacho vtilius καὶ διερρηκτικότερα τὰ καὶ εὐστομα-
est. Inflammationibus ioci- χωτέραι. ὡφελὲς 3) καὶ τὰς πᾶσι τὸ
neris, & felle suffusis auxili- ἢ παρ' φλεγμονῶς, καὶ ἢ πᾶσι καὶ
atur. Contra stomachi infla- πνευματώσεως σπῆλαις, μὲν ἀφε-
tiones, cum absinthij decocto- λήματος ἀφ' ἡνδίου πινόμεν. 20
bibitur: item aduersus lienem, μοίως καὶ σπληνῶν, καὶ τὰς πᾶσι τῷ
renum & vesicæ vitia & vene- κύστιν καὶ νεφρῶς. καὶ πᾶσι τὰ ἰσθ-
natos ictus, ex vino. Additur λων δόσηματα σπῆλαις οἶνω. καὶ εἰς τὰ
in malagmata, potiones, & cal μαλάγματα μίξιν 3) καὶ ποτῆμα-
facientia vnguenta. τα, καὶ χρίσματα θερμαντικὰ.

Mōtanū nardū. Cap. viii. Περὶ Ὀρίνης Νάρδα. Κεφ. viii.
Montanum nardum, quod 25
ab aliquibus thylacitis, & niris
appellatur, in Cilicia, & Syria
nascitur, furculo & folijs erin-
gio similibus, minoribus, mi-
nimè
H δὲ ὅστιν ἢ πᾶσι πᾶσι, καλῶν-
νη δὲ πᾶσι πᾶσι καὶ σπῆλαις καὶ
νῆσι, ἡνιᾶται ἐν κελύξιν καὶ
σπῆλαις. φύλλα καὶ καυλῶν ὁμοία
ἡνιᾶται ἔχουσα, μικρότερα μὲν,
ἢ μὲν

ὅν μὲν παρχέα καὶ ἀκανθώδη.
ρίζαι δὲ ὑπὸ τοῖς μέλαινοι ἐνώ-
δεις δύο, ἡ καὶ πελείοις, ὥσπερ
ἀσποδέλου, ἰσχυρότεραι καὶ μι-
κρότεραι πολλῶν. οὗτε δὲ χυ-
λὸν οὗτε καρπὸν, οὗτε αἶδος φέ-
ρει. ποιεῖ δὲ ἡ ρίζα περὶ ὅσα καὶ
ἡ καλπικὴ γάρδος.

Πρὶ Ἀσάρι. Κεφ. θ'.

Ἀσάριον, οἱ δὲ γάρδον ἀγρίαν
καλοῦσι πᾶς ἐνώδης σεφανώμα
10 πικρῇ φύλλα ἔχει κισσῶ ὅμοια,
μικρότερα δὲ πολλῶν καὶ στρο-
γυλώτερα. αἴσθη μεταξὺ τῶν
φύλλων περὶ τῇ ρίζῃ, πορφυ-
ρᾷ, ἐνώδης, ὑοσκυμῶ κατάνω
ἐμφερῇ, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα ἐσι-
15 κὸς γράφτω. *ρίζαι ὑπὸ τοῖς πολ-
καί, γονατώδεις, λεπταί, πλά-
ται ὅμοιαι ἀγρώσει. ἰσχυρότεραι
μὲν τοὶ πολλῶν καὶ ἐνώδεις στε-
μαίνουσιν καὶ δάκνουσαι λίαν
τὴν γλῶσσαν. δύναμις δὲ αὐτῶν
20 διουρητικὴ σερμαντικὴ, ἀρμό-
ζουσι ὑδρωπικοῖς, ἰσραδιοῖς
χερσίοις, ἀγροισὶ δὲ καὶ ἐμυλῶ
μετὰ μελικράτου ποδίσσει αἱ
ρίζαι πλῆθος < 5'. χαταίρου-
σι ὡς ἐλλέβορος λευκός. μύρτυ
25 δὲ καὶ μύρις, φέρεται ἐν ὑποσι-
οῖς ὄρεσι, πλεῖστα δὲ ἐν πόντῳ καὶ
φρυγίᾳ καὶ ἰλλυρίδι, καὶ * ἰουστ-
νῇ τῆς ἰταλίας.

Πρὶ Φῦ. Κεφ. ι'

Φῦον, οἱ δὲ καὶ τὸ αἶμα
γάρδον

nimè tamen spinosis, asperisq;
Radicib⁹ binis nitur, aut plu-
rib⁹, nigris, odoratis, ceu bastu-
lae regie, sed longè graciliorib⁹,
& lōgè minoribus. Neq; cau-
lem, neque fructum, neq; florē
profert. Ad eadem ad quē Cel-
ticum efficax.

Asarum. Cap. IX.

Asarum, quod & ipsum ali-
qui sylvestre nardum appellāt,
hederae folijs minoribus mul-
tō, rotundioribusque, floribus
cytino hyoscyami similibus,
purpureis, inter folia proxime
radicem emicantibus, odora-
tis, in quibus semen acinosum.
gradices numerosas, genicula-
tas, tenues, obliquas, grami-
ni non dissimiles, longè tamen
graciliores, odoratas, excalsa-
ciētes, & quæ linguam vehe-
menter mordent. Excalfacto-
riam vim habet: urinā cit, hy-
dropicis & vetusto coxendi-
cum dolori prodest. Radices
senis drachmis ex aqua malsa
potē, menses trahunt, & vera-
tri albi modo purgant. In vn-
guenta additur. Vmbrosi mō-
tibus puenit, sed plurimum in
Pōto, Phrygia, Illyrico, & Ita-
liae Iustinienſi agro.

Phu. Cap. X.

Phu, quod & aliqui sylvestre
nardum

DIOSCORIDIS

nardum appellant, nascitur in Ponto, folio olusatri, aut claphobosci, caule cubitali, aut altiore, leui, cauo, molli, in purpuram vergente, geniculis intercepto, floribus narcisso proximis, maioribus, tenerioribus, & ex albicante purpureis: radice superius ad digiti minoris crassitudinem, ex obliquo villosa in nigri veratri aut iunci odorati modum: capillamentis inuicem cōtextis, flauescens, odoratis, cum quadam odoris grauitate nardum æmulantibus. Excalfacit, vrinā mouet, si sicca potui detur. Decoctum eadem præstare potest. ad lateris etiam dolorem efficax, mensēs cit, antidotis inseritur. Adulteratur radice rufci ammista: sed maleficium deprehenditur: quoniam hæc dura est, & frangenti contumax, sine vlla odoris gratia.

Malabathrum. Cap. XI.

Malabathrum arbitratur aliqui esse Indici nardi folium, falsū quadam odoris cognatione: permulta enim nardum olent, quemadmodum phu, asarum, niris. secus autem res fe habet. Nanque malabathrum foliū sui generis est, quod Indicæ gignunt paludes, lentis palustris

ναρδον καλεῖται, γινώσκειται ἐν πόν-
τω, φύλλα ὅτε ἀφοδῶσκει ἢ ἰσπο-
σελῆτω παρὰ πλῆσιν ἔχει, καὶ κεν
πικρῶτον, ἢ μέζω, λεῖον, τευφρὸν
ἐμπόρφυρον, μεσοκοῖνον, διειλημ-
μὸν γόνασιν, αἰσθητὸς τὰ τοῦ
ναρκίσσου, μέζω δὲ καὶ τευφρῶτε-
ρα, καὶ ἐν τῷ ὑπολευκῷ διατρέ-
φεται. ῥίζα δὲ ἢ ὡς ἀνωτέρω, πρὸς
δυσκτύλου μικροῦ τὸ πάχος, πλά-
για δὲ ἐπιρρίζα ἔχει καὶ διάπερ-
χῆτος ἢ μέλας ἐλλέβορος, ἀλλ' ἢ
λοις ἐπιπεπλεγμένον, ὑπερβαρύνει,
ἐν δὲ νάρδι ζῶντι τὴν ὀσμὴν, με-
τά πνος βάρους βεβρωμένον. δύ-
ναται δὲ θερμαίνειν, οὐρα κινεῖν
ἐκ τῶν ποτισμῶν, καὶ τὸ ἀπό-
ξημα ὅτι αὐτῆς, τὸ αὐτὸ δύνανται
ποιεῖν, καὶ πρὸς πλευρὰς πόνου, ἐμ-
μηνῶ τε ἄγει καὶ ἀντιδότικος μί-
γνυται. δολοῦται δὲ ὀξύμυρσίνης
ρίζας παρὰ μίγνυμην. ἐν χειρὶ
δὲ ἢ ἐπιγνώσκειται αὐτῆς ὅτι. σκλη-
ραὶ γὰρ εἰσι αὐταὶ καὶ δύσπεστοι.
σοὶ δίχα ἐννοίας.

Περὶ Μαλαβάθρου. Κεφ. ια.

Μαλαβάθρον ἐνίοι ὑπολαμ-
βάνουσιν εἶναι τῆς ἰνδικῆς ναρ-
δου φύλλον, πλανώμενον ἀπὸ
τῆς κατὰ τὴν ὀσμὴν ἐμφερείας
πολλὰ γὰρ ὅσιν ὅμοια τῇ ὀσμῇ
ναρδῶ, ὡς τὸ ποῦ, ἄσπερον, γή-
εις. οὐκ ἔχει δὲ οὕτως. ἴδιον
γὰρ ὅτι ἥλιος θερμῶν ἐν τοῖς
ἰνδικαῖς τέλει, φύλλον ὃν ἐπι-
νηγέ-

νηχόμενον τῷ ὕδατι, καὶ ἀπὸ τοῦ
 ἐπὶ τοῦ τελευτάτου φακῆ, ῥίζαν
 ἔχον, ὅπου συλλέγοντες, ἐν ὕδα-
 τος διαπίρροισι λίνω, καὶ ἐκείναις
 ἀποπίθονται. φασὶ δὲ καὶ τῇ
 5 ῥερίαι ἀναζήσαντες τῷ ὕδα-
 τος, καὶ ἐνταυτοῖς πάλιν γίνω,
 μήχρως μὴ καὶ τὰς μικρὰς φύε-
 εσται. ἔστι δὲ καλὸν τὸ προσφάτον
 καὶ ὑπόλευκον, ἐν τῷ μελανίῳ
 ἀδραμεῖν τε καὶ ὀλόκληρον, πλη-
 10 κτικὸν τῇ ἑσπέρῃ, καὶ ἐπὶ δὲ μύρον
 τῇ ἐν ὁδῷ, νερὶ δὲ τῇ γού-
 σει μὴ ἀλμυρίῳ. τὸ δὲ ἀδρα-
 μεῖς καὶ τὸ λεπτικὸν μύρον, ἐρω-
 πώσαν ἔχον τὸ ἀποφύειν, φαῖ-
 λον, διώκειν ὃ ἔχει πάλιν αὐτῷ
 15 τῇ γάρβῳ, ἐν ῥερίῳ δὲ ἐκείνῃ
 πάλιν ποιεῖ. διερρηκωτέρα μὲν
 ποὶ καὶ ἐντομαχότερα ἐστὶν, ἢ τῷ
 μαλακῷ ἀδρου διώκειν, καὶ πρὸς
 ταῖς ὀφθαλμικαῖς φλεγμοναῖς ἀρ-
 μόζει ἀναζέσθαι ἐν οἴνῳ καὶ λείον
 20 ἐπὶ γὰρ μύρον. ὑποπίθεται δὲ καὶ
 γλώσση πρὸς ἐν ὁδῷ σόματος,
 καὶ σὺν ἱματίοις τίθεται. ἀβρωται
 γὰρ καὶ ἐν ὁδῷ ταῦτα τηρεῖ.

Περὶ Κασιᾶς. Κεφ. ιβ'.

Κασιᾶς δὲ ἔστι πλείονα εἶδη,
 25 ὅτε πάλιν ἀρωματοφόρον ἀραβίαν
 γυγνώμενα ἔχει τὴν ῥάβδον παρὰ
 φλοιον, φύλλα δὲ ὡς πεπέρως. ἐκ-
 λέγει δὲ τὸ ἔγκυρον, ἔχον, κορα-
 λίζουσαν, σενλίαν, μακρὰ καὶ
 παχεῖαν, τοῖς σενγίοις πλούτην,
 δηκτικὴν

lustris modo innatans aquis,
 fine radice. Id collectum sta-
 tim lino transluitur, & sicca-
 tum reconditur. Tradunt sic-
 catis æstiuo feruore aquis, hu-
 mum aridis fruticibus vri: quod
 ubi non euenerit, ne amplius
 quidem renasci. Laudatur re-
 cens, ex candido nigricans,
 integrum, nec fragile, odore
 caput feriens, quod diu in sua
 vi odore permaneat, & nar-
 dum sapore imitetur, nullo fa-
 lis gustu. Infirmum verò & mi-
 nutum contusum, præsertim si
 cariosum virus olet, vitiosum
 est. Eisdem nardo fortitur vires;
 sed efficacius omnia præstat.
 Vrinam vehementius ciet, ac
 stomacho magis pdest mala-
 bathri vis, Lippitudinibus, inflā-
 mationibusq; tritū & in vino
 feruefactum cōmodè illinitur:
 subditū linguæ, oris halitū &
 suauitatem cōmēdat. Vestium
 quoque odorem interpositum
 feruat, & ab erosione tuetur.

Cassia. Cap. XII.

Cassia, cuius complura sunt
 genera, iuxta odoriferam Ara-
 biam gignitur, crassi corticis
 farmento, folijs piperis. Eligē-
 da est fuluescēs, pulchri colo-
 ris, coralli æmula, perquā an-
 gusta, longa, crassa, & fistulosa,
 b gustu

DIOSCORIDIS

gustu mordens, & cū aliquan-
to feruore astringens, aroma-
tica, vinoso odore, cuiusmodi
est, quæ ab incolis, achy appel-
latur, ab Alexandria negotia-
toribus, daphnitis. Huic præferi
crassa, purpurea & nigricans,
Zigir cognomine, quæ rosam
odore imitatur, præcipui in me-
dicina vsus. Secundum locum
tenet antedicta. Tertia, cui Mu-
feletico blasto, id est germi-
ni, cognomen est. Reliquæ viles,
& quæ aphemum dicitur, ni-
gra, insuavis, cortice tenui, ac-
rimoso: & quæ darca, & citto
vocitatur barbaro nomine. Si-
milior huic est pseudocalsia,
quàm vt explicari possit, quæ
gustu coarguitur, cū nec a-
cris, nec odorata sit, hærentēq;
medullæ corticē habeat. Inue-
nitur etiam lata quædam fistu-
la, mollis, levis, surculosa, q̄ an-
tedictæ præfertur. Damnatur
candicans, scabra, hircinum vi-
rus redolens, & quæ tenui fi-
stula, & scabra cute fit. Vim
obtinet calfaciēdi, yrinam ci-
endi, succandi, & leniter astring-
gendi. Cōuenit ad medicamē-
ta oculorum, quæ præstandæ
claritatis gratia cōcinnātur, &
ad malagmata. Lētigines tollit
cū melle illita, menses trahit,
cōtra

δικηπλὴν ἐν τῇ γούσει, καὶ εὐφρο-
σαι μὲν πολλῆς πικρώσεως, ἀρω-
ματίζουσαν, οἰνίζουσαν τῇ ὀσμῇ, ἢ
δὲ τοιαύτη ὑπὸ τῶν ὀπρωείων
ἀχὺ καλεῖται, διαφίπτε δὲ παρ-
ουαρύεται ὑπὸ τῶν ἐν ἀλεξαν-
δρείᾳ ἐμπύρων. παρὰ δὲ τούτης
ἐστὶν ἡ μύλαινα καὶ ἐμπύρυνος πα-
χείας, ζιγίς καλεῖται, ἢ ῥοδίζουσα
τῇ ὀσμῇ, μάλιστ' αὖτε ἰατρει-
κὴν χρῆσιν εὐθετος. δευτερεύει δ'
ἡ παρὰ ρημύνη. τεῖτη δὲ ὅστις ἡ κα-
λεῖται ἢ βλακτος μεσολήπτε. αἱ
δὲ λοιπαὶ εὐτελεῖς, ὥς ἡ καλου-
μένη ἀσπρήμων, μέλαινα καὶ ἀπ-
δὴς καὶ λεπτόφλοιος, ἢ καὶ φλοιοῖρα
γῆς, ὥς καὶ ἡ κητὴ καὶ δάκαρ κα-
λεῖται. Est δὲ πρὸς καὶ ψευδοκασ-
σία ἀφάτως ἐμφυῖς, ἢ πρὸς ἐλέγ-
χεται τῇ γούσει, καὶ οὕτω δριμύεια,
ἢ δὲ ἀρωματώδης, παρὰ σεχόμε-
νόν τε τὴν φλοῖον ἔχει τῇ ἐντεριώ-
νῃ, ἐντερίσκειται δὲ καὶ παλατεία συ-
εργῆς, ἀπαλὴ, κάρη, ἐμερῆς, δια-
φύρουσα δὲ τὴν αἰλῆς. ἀποδοκί-
μαζε δὲ τὴν ὑπόλευκον καὶ ὑπο-
ρώδη, τσαγίζουσαν ἐν τῇ ὀσμῇ, καὶ
τὴν μὴ ἔχουσαν δὲ τὴν στείρη κα-
παχείαν, ὑπορώδη δὲ καὶ λεπτήν.
δυναμὴν δὲ ἔχει διεμαντικὴν καὶ
οὐραντικὴν, ξηραντικὴν, εὐφροσαν
παράως. ἀρμύζης δὲ εἰς τὰ παρὰ
ῥόδου κίαν ὀφθαλμικὰ καὶ μαλά-
σματ' ὀφθαλμῶν τὴν αἰσὶν μάλιστα
καταχρῆται, καὶ ἐμμηνα ἀγει,
καὶ

καὶ ἐχρὸν ἴκτοις βοηθεῖ πινυέ-
νῃ, καὶ παρὲς τὰς ἐν τῇς φλε-
γμοναῖς πάσας ποιεῖται καὶ παρὲς
νεφροῦς. εἰς ἐγκαθίσταται τε
καὶ ἀποδυμνάματα γυναιξί,
5 παρὲς ἀνευρυσμὸν μήτρας. διπλά-
σιον δὲ αὐτῆς μεγάλῳρον πῖς
φαρμάκοις, εἰ μὴ παρέιν κιννά-
μων, τὸ αὐτὸ δρᾷ, ἄλλαν δὲ
ἔστι πολὺ χρηστός.

Περὶ Κινναμόμου. Κεφ. γυ'.

Κινναμόμου ἐστὶ πολέονα εἶδη,
10 ὀνομαζόμενα ἐπιχρεῖως. δια-
φέρει δὲ τὸ μόσυλον, διὰ τὸ σώ-
σειν ποτὸς ἐμφερεῖται, παρὲς πῶν
μοσυλίπιν χαλκιδόλῳ καλῶται. ἢ
τούτου παρὲς τὸ παρόσφατον, τῇ
15 χροῖα μέλαν, τεφρῖζον ἐν τῷ οἴνῳ
δεῖ, λεπτὸν δὲ τοῖς βαθεύοις καὶ
λεῖτον, ὅλοις συνεχεῖσι κεχευμένον,
σφόδρα ἐν ὧδες. ὁρᾷ δὲ ὅδ' ἡ τοῦ
αἵματος κράσις ἐστὶ παρὰ τὸ ἐν τῇ
ἐν ὧδῃ. ἰδιότητα. ἐν εἰσέκεται ὅδ'
20 μὴ τὸ αἷμα καὶ ἰδιόζοντος ἢ
ὁσμῇ παραίξουσα ἢ καρδαμόμου
ἐμφορῆς. ἐπὶ καὶ δριμύτι καὶ δριμύ-
τι καὶ γένεσι, καὶ ὑφαλμυρίζον
μὴ δριμύτης, ἐν τῇ παρὰ τῇ
λεῖ μὴ παρὲς δασυμόλῳρον, καὶ
ἐν τῇ θραύεσθαι ὁρᾷ δὲ καὶ λεῖτον
25 ἔχον τὸ μεταξὺ τῶν ὧδων. δοκι-
μαζέ. δὲ ἀπὸ μῖσος ῥίχης λαμ-
βάνων τὸν δασυμόλῳρον. ἐν γένεσι ὅδ' ἢ
παιαύτη δοκιμασία. τὰ ὅδ' θραύ-
σματα, μίγματα τυγχάνει,
καὶ

cōtra viperarū iētus pōta auxi-
liat̃, aduersus īteftinas inflāma-
tiones omneis & renū vītia,
pota proficit. Fœminis in folio
desidētib⁹, aut suffimētis, pdest
ad dilatationē vuluæ. Ea duplo
pondere medicamentis mixta
cinnamomi vicē supplet, si ip-
sum desit: nā eosdē esse & p̃re-
bet, ad plurima perquā vtilis.

Cinnamomū. Cap. XIII.

Cinnamomi genera plura,
patrium sibi nomen vendica-
tia. Præfertur ramen mosyliti-
cum, quod casia, cui Mosyliti
nomen est, aliquam referat ef-
figiē. Sed in eo genere recens,
nigrum, ex vino in cinerium
vergens, læue, tenuibus ramu-
lis, ac frequentibus nobis cin-
ctum, perquā iucundē olēs.
Optimi ferē indicium, iucundi
odori proprietate cōstat. In-
uenitur enim cū optimo, eoq;
quod peculiare est, odor rutæ
aut cardamomo p̃xim⁹. Insuper
acre, mordēs, & cū calfactiōe
quadantenus falsum, quod nō
citō confricanti asperum, aut
frianti lanuginosum, leuib⁹ ta-
men internodijs appareat. Si
certior fieri voles, vellito ab ra-
dice furculū. facilis est huiuscē
modi probatio: nāq; fragmēta
miscellanea qdā esse vidētur.
b ij Quæ

DIOSCORIDIS

Quæ autē melius spirāt, suo ha-
litu cū nares primū cōsulūtur,
olfactū explentia, deterioris di-
gnotiōē impediūt. Est etiā
montanū, crassum, pumilū, ful-
uescens admodū. Tertiū à Mo-
silitico, perquā suauiter olet,
nigrū, fruticosum, paucis inter-
cedētibus geniculis. Quartum,
fungosum, cādicās, aspectu tu-
berosum, vile, ac friabile, ma-
gnā habēs radicē, quæ calsiam
planē representat. Quintū ge-
nus, odore nares feriens, subru-
fum, & cortice fulvæ calsiæ si-
mile, tangēti firmū, minus ner-
uosum, densa radice firmatum.
Iis quæ thuris, calsiæ, myrti, aut
amomi odorem spirant, minus
suauitatis inest. Deligito sca-
brum, albū, rugosum: at læue,
& lignosum circa radicem, vt
inutile reijcito. Est etiamnum
fimile aliud, cui pseudocinna-
momo cognomē est, vile, inua-
lidi odoris, solutarūq; viriū. Vo-
catur etiam Zingiber, cū tamē
sit xylocinnamomum, præbēs
quandam cinnamomi faciem.
Est aut lignosum cinnamomū,
farmēta lōga robustaq; ferens,
odore lōgē cinnamomo infe-
riore. Sūt qui xylocīnamomū,
à cinnamomo genere differre
dicāt, q̃ à natura ei⁹ abhorreat.

Cinna-

ἡ κατὰ τὴν πρῶτον δοκιμα-
σίαν τὰ κρείττονα ἀειπνεύοντα ἡ
πληρωμένα τὴν ὁσπρησιν, ἐμπο-
δίζῃ τὴν τῆς ἡπτόνος ἐπικρισιν. ἔστι
δὲ ἡ ὄρεγνον, παχὺ, κοιλόν, σφό-
δρα ὑπόκιρρον ἢ χροάν. ἡ τε-
τον παρὰ τὸ μύστυλον, μέλαν καὶ
λίαν ἐνῶδες, ἐν ῥιζώδεσσι δὲ ἡ οὐ
πολυρόνατον. Τέταρτον, λευκόν,
χαλκόν, ὀκτώδες, ἰδέσθαι ἡ ἐντε-
λές, εὐδραυστόν τε καὶ μεγάλῃ
ἔχον ῥίζαν καλίστησαν. πέμπτον
τῇ ὁσμῇ πικρὸν, ὑπόκιρρον ἢ
καὶ περὶ σφύρας καλίστα πυρρῶ,
πρὸς τὴν ἀφῶ δὲ στερεόν, ἐπὶ
νυκτὶ ἰσώδες, παχὺ ῥιζόν, τῶν δὲ
τὸ πνεῖον λιθανώτῃ ἢ μυρσίνῃ ἢ
καλίστας ἢ ἀμώμῃ, ἐνῶδεις ἡ πτόν
ἔστιν. ἀπολέρου δὲ τὸ λευκόν καὶ
τὸ ἰσώδες, καὶ τὸ ῥυαπόκαρπον.
ἡ λείον, ἡ τὸ ξυλῶδες δὲ κτλ. ἢ
ῥίζαν ὡς ἄλλοιον περιγίτῃ. ἔστι
δὲ π ἡ ἄλλο ὁμοιον τὸ καλού-
μενον ψευδοκιννάμωμον ἐντε-
λές ἐκ εὐτόνον τῇ ὁσμῇ, ἐκλειυ-
μένον δὲ ἡ τῇ δυνάμει. καλεῖ-
ται δὲ ἡ ζιγγίβερ ξυλοκιννάμω-
μον ὅν. ἔχον δὲ πῖνα ἐμφέρειαν
κιννάμωμον. ἔστι ἢ ξυλῶδες κιν-
νάμωμον, ἔχον ῥαβδόεις μακράς
καὶ ῥωμαλέας καὶ τὴν ἐνῶδαν
πολὺ κατὰ δεξιέρους. λέγεται δὲ
ὑπὸ ἐνίαν καὶ κατὰ γένος δια-
φέρειν τοῦ κιννάμωμου τὸ ξυλο-
κιννάμωμον ἐτέρως ὅν φύσεως.
δύναμις

δύναμιν δὲ ἔχει πᾶν κνηδά-
μον, θερμαστικὴν, οὐρητικὴν, μα-
λαστικὴν, πεπτικὴν. ἔχει δὲ καὶ ἐμ-
μύνα καὶ ἐμβρυα πινόμενον καὶ
5 πρεσβυτέρων καὶ σμύρνης, καὶ ἰο-
5 νόχοις, θηείοις καὶ θηασίοις
ἀρμόζει· καὶ τὰ ταῖς κόραις ἐπι-
σιτοῦται ἀποκαθαίρει, θερμαί-
νει τὴν λεπτιώει, καὶ ἐστὶ διουρητι-
κὸν, φακὸς τε καὶ ἐφῆλεις ἀποκα-
θαίρει μετὰ μέλιτος ἐπιχρίσας.
10 ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς βήχας· καὶ κα-
τάρρει, ὅθρυπας, νεφρίτιδας, δυσου-
είας, μίγνυ· καὶ τοῖς πελ-
τέσι μύεσι· καὶ καὶ δόλη ἐστὶ πο-
λύχρηστον. ἀποτίθει δὲ εἰς δια-
μονὴν λεῖον οἶνον ἀναλαμβάνομε
15 νον, καὶ ξηραίνόμενον ἐν σκιά.

Πρὶ Αμώμου. Κεφ. ιδ'.

Αμώμῳ ὅτι θάμνισκος οἰοῦνται
βόξιν, ἐκ ξύλου αὐτὴ μετεπλεμέ-
νος ἐαυτῶν. ἔχει δὲ πικρὸν καὶ ἀνδρὸς μι-
κρὸν, ὡς λευκοῖον, φύλλα δὲ βρυο-
20 νία ὁμοία. κάλλιστον δὲ ὅτι τὸ ἀρ-
μόμιον, χρυσαῖον τῇ χροίᾳ, ἔχον τὴν
τὸ ξύλον ὑποκίρρον, ἐν ᾧ δὲ ἐκ-
νῶς. τὸ δὲ μηδικὸν διὰ τὸ ἐν πε-
δίοις καὶ ἐν ἐφύδροις τόποις φύε-
σθαι, ἀδυνατῶτερον. ἐστὶ δὲ μέγα
25 καὶ ὑποχλωρον, καὶ πρὸς τὸ ἀφω-
ἀπαλόν, καὶ ἰσχυρὸς τοῖς ξύλοις,*
πηγνύει τὴν ὀσμὴν. τὸ δὲ πεν-
τικὸν ὑποκίρρον, οὐ μακρὸν, οὐ δὲ
δυσφραστον, βουτυρῶδες, πλεῖρες
καρπῶν, καὶ τῇ ὀσμῇ πικρὸν.

ἐν

Cinnamomum omne excalfa-
cit, emollit, & concoquit, urinā
ciet, tā mēses, quā partus po-
tum aut ex myrrha impositum
pellit, contra bestias, quæ virus
ei aculatur, venenāq; cōuenit:
caliginē pupillis oculorū ob-
uerlantem discutit, crassitiem
extenuat, lentigines, & vitia cu-
tis in facie ex melle illitū deter-
git: cōtra tussēs, defluxiones, a-
quam subter cutē fusam, renū
vitia, & urinæ difficultatē effi-
cax est, vnguentis preciosis in-
feri solet: & in summa, magni
ad omnia usus. Tritū vino ex-
cipitur, ymbraq; siccatum, quō
diutius eduret, reconditur.

Amomum. Cap. xiiii.

Amomum exiguè fruticat,
ex ligno se conuoluēs in rāce-
mi modum, flore, ceu candi-
dæ violæ, paruo: folijs vitis al-
bæ similibus. Laudatur quā-
maximè Armeniacū fuluo au-
ri colore, ligno subrufo, val-
de odorato. Medicum, quo-
niam in campestribus, & a-
quosis nascitur, infirmius esse
constat. Est autem magnum,
subuiride, tactu tenerum, fru-
tice venoso, odore origani.
Pōticum verò subrufum, par-
uum, fragile, racemosū fructu
turgens, & odore nares feries
b iij Deligito

Deligito recens, candidum vel
fubrubrum, quod nec astri-
ctum cohæreat, nec conuol-
uatur, sed solutum diffunda-
tur, seminis plenum, vuis par-
uis simile, graue, valde odora-
tum, modo cariem non con-
traxerit, acre, gustu mordens,
simplici colore non euarian-
te. Vim habet calfaciendi, a-
stringendi, exiccandi. Somnum
allicit, & illitum fronti, doloris
sensum aufert, inflammatio-
nes, & meliceridas conco-
quit, discutitque: iuuat quos
scorpius percussit, ex ocimo
illitum, & podagricis confert,
inflammationes oculorum, vi-
scerumque lenit ex vua passa,
ad vuluarú vitia, in pelsis, aut
insefsionibus vtile est. Deco-
ctum iocineri, renibus, po-
dagræ, potu conuenit. Anti-
dotis immiscetur, & preciosis-
simis vnguentis. Adulteratur a-
momum herba simili, quæ a-
momis vocatur, sed sine odo-
re, sine fructu. Nascitur in Ar-
menia, flore origani. Quare in
huiuscemodi probationib⁹ fra-
gméta fugienda sunt: eligenda
autem, quæ ab vna radice in-
tegros furculos emittunt.

Costus. Cap. X V.

Præcellit Arabicus, cãdidus,
leuis,

ἐκλέγε δὲ τὸ πρὸς σφατον καὶ λευ-
κὸν ἢ ὑπερῶτον, καὶ πεπλημένον ἢ
συμπεπλημένον, λευκὸν μὲν ὅτι καὶ
διακεχυμένον, σπέρμα τὸς πλε-
ρες, ὁμοίον βότρυδι, * βαρὺ, σφό-
δρα ἐν ὄσφρ, δίχα ἐν ὄσφρ, καὶ 5
δριμύ, δάκναι ὅτι γινύσκει, ἀπὸ τοῦ
ὅτι χροῖαν καὶ ἐπικίλον. διωάμην
ὅτι ἐχει διεμαντικὴν, συπτικὴν, ἐν-
ερυντικὴν, ὑποποιδὴν, ἀνὸδιον ἢ
μετώπῳ καταπλαστέον, φλε-
μονας ὅτι καὶ μελικερίδας πεπλί- 10
ναι καὶ διαφρεῖ. σαρρποσπλάκτοις
τὸ μὲν ὡς καὶ καταπλαστέον ὡφε-
λεῖ, ποδαγρικοῖς συμβάλλει καὶ
ὡφελεῖ, καὶ παραγορεῖ, καὶ ὀφθαλ-
μῶν φλεμονας καὶ τὴν ἐν σπλά-
γχοις σπυγμῶν, πρὸς δὲ τὰ 15
γυναικεία καὶ ἐν πρὸς ὄσφρ καὶ ἐν
ἐλκυσίμασι χροῖσιν, ποδὲν δὲ
τὸ ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἀρμόζει ἡπα-
τικοῖς, νεφρικοῖς, ποδαγρικοῖς,
μύνηται δὲ καὶ ἀντιπρόδοις, καὶ
τοῖς πολυτελεσάτοις τῶν μέρων. 20
δολίχοισιν δὲ πνεύς τὸ ἄμωμον
τῇ λευκῇ ἄμωμῇ δι' ἐμφρεῖ ἡ-
στὴ ἀμώμῳ ἀνὸσμι μὲν τι καὶ
ἀκέραιον, γυναικῶν δὲ ἐν ἀρμε-
νίᾳ, αὐτὸς ἐχέσθ' ἐμφρεῖς ὀρεῖ-
ων. δεῖ δὲ ἐν τοῖς ὅτι τοῖς πᾶσι 25
κιμασίας τὰ θραύσματα ἐκ-
φύγειν. ἐκλέγε δὲ τὰ ἀπὸ μῖσος
ρίζης ἐχόντα * κλάδους τελείους.

Πρὶ Κόστου. Κεφ. ιε.

Κόστου διαφέρει ὁ ἀραβικὸς, λευκός,
ὡν,

ὦν καὶ κῆφος, ἀλείψην ἔχον καὶ ἡ-
 δέαν ἢ ὀσμίνην. δευτέρως δ' ὁ ἰν-
 δικὸς ἀδρός ὦν καὶ κῆφος καὶ μέ-
 λαι ὡς νάφθη. τρίτος δὲ ὅστις ὁ
 5 σπειρακός, βαρύς, ἢ ῥόαν πυξί-
 νης, πλινκτικός τῇ ὀσμῇ. αἰετός
 δὲ ὅστις ὁ περόσφαιος, λευκός, πλῆ-
 ρης δόλου, πυκνός, ξηρός, ἀτερπὲς
 νικτός, ἀβρωμος, γάσει δηκτικός,
 καὶ πυράδης. δύναμιν δ' ἔχει θερ-
 10 μαντικὴν, διερρηκτικὴν, ἐμυλῶν
 ἀρωγὸν καὶ τὸ ἀεὶ ὑσέραν πατρῶν
 ἀρωγόν, ὡς περὶ δέμασι καὶ κα-
 τὰ τλήμασι καὶ πνεύμασι, πνέ-
 μος δὲ ἐχρόνικτος βοηθεῖ ὑγ-
 γίας β' πλῆθος, καὶ πρὸς θάλα-
 15 κος πύκας καὶ σπασίματα, καὶ πνευ-
 ματώσεις μετ' οἶνου καὶ ὠφινθίου,
 καὶ ἀφροδίσια δὲ παρ' οἶμα' μετ'
 οἶνου μελισσῶν, ἄγει δὲ καὶ ἐλμινθὰ
 πλατεῖαν μετ' ὕδατος, σύγχε-
 σμά τε ῥιζοῦσι μετ' ἐλαίου πρὸ
 20 τῆς ὀπσημασίας, καὶ παραλυτι-
 κῶς, καὶ αἵρει δὲ καὶ ἐφελαν κατὰ
 ῥιζοῖς μετ' ὕδατος ἢ μέλιτος.
 μύρουται δὲ καὶ μαλάγματα καὶ
 ἀντιδότοις, μινύουσι δ' ἐνὶ ταῖς
 ῥομαλεωτάταις τοῦ κομμαλμοῦ
 ἐλενίου ῥίζας, δολοῦντες αὐτὸν,
 25 ἐν ἑσπέρῳ δὲ ἢ διὰ γινώσκοντες, ὅτε
 πύρεθ' αὐτῷ γένηται τὸ ἐλενιον, ὅτε
 αὐτῷ ἐνωδία ἐύπονον καὶ πλινκτι-
 κὴν παρέχει.

Πρὶς ῥίζαν. Καθ. 15.
 ῤῥινος, ἢ ῥορ πρὸς γινέει ἐν λιθύνῃ,
 ἢ δὲ,

leuis, eximia odoris suauita-
 te. Secundum locum sibi ven-
 dicat Indicus, leuis, vber, vt fe-
 rula niger. Tertius est Syri-
 acus, grauis, colore buxeus, &
 odore feriens. Optimus est re-
 cens, albus, abunde plenus, dé-
 fus, aridus, à teredinibus non
 erosus, sine graueolentia, gu-
 stu calidus ac mordens. Vis ei
 ex calfaetoria, vrinam ciet, mé-
 ses pellit, vitijis quæ vuluâ ma-
 lè habent, tam impositu quàm
 fotu & suffitu auxiliatur. Cò-
 tra viperarum morsus sextan-
 tem bibere prodest: item ad-
 uersus pectoris dolores, con-
 uulsa, inflationesque, ex vino
 & ablinthio: venerem ex mul-
 so stimulat, latas ventris ti-
 neas ex aqua pellit, horri-
 bus ex oleo, ante febrium ac-
 cefsiones, & neruorum reso-
 lutionibus oblinitur: vitia cu-
 tis in facie, cum aqua vel mel-
 le illitus emendat. Additur in
 antidota & malágmata. Sunt
 qui admittis helenij comage-
 ni præduris radicibus, adulte-
 rét, quod deprehéfu facile est:
 siquidem neq; gustu feruet he-
 lenium, neque validú odorem
 vibrat, vt caput tentare possit.

Odorat' iúcus. Cap. XVI.

Odoratus iuncus, in Africa
 b iiij &

DIOSCORIDIS

& Arabia nascitur. Laudatissi-
mus ex Nabathæa : proximus
Arabicus, quem aliqui Baby-
lonium cognominant, alij teu-
chitin : pessimus ex Africa. Eli-
gendus est rufus, recens, flo-
ribus refertus, tenuis, ruben-
tibus fragmentis, qui mani-
bus confricando rosæ odo-
rem emittit, igneæ mordaci-
tatis ad linguam. Floris, cul-
morum, radicisq; est vsus. Vim
vrinæ ciundæ habet, menses
pellit, discutit inflationes, ca-
put aggrauat, modicè astrin-
git, comminuit, excoquit, ac
venarum spiracula laxat. Flos
eius in potu utilis sanguinem
reiciientibus, doloribus sto-
machi, pulmonis, iocineris,
& renum, miscetur antidotis.
Radix astringentior est : ideo
fastidijs stomachi, hydropi-
cis, conuulsis, drachma vnà
cum pari pondere piperis, per
dies aliquot datur. Deco-
ctum vuluæ inflammatio-
nibus, ad defidentium
fotus vtile est.

Calam^o odoratus. Cap. XVII.

CALAMVS odoratus
in India nascitur: melior est
fuluus, dense geniculatus, &
qui assulose frangitur, plena
araneorum

ἢ δὲ, ἐν ἀραβίᾳ. ἐτέρεα δὲ ἐν τῇ
ἀραβίᾳ λεγομένη ἢ πρὸς ἐστὶν κρα-
τιστα. δευτέρου δὲ ἢ ἀραβικῆ,
ὡς ἔνιοι βαβυλωνίον καλοῦσιν, οἱ
δὲ, τευχίτην. ἢ ὅτι λεβυκὴ ἀρχαῖος.
ἐκλέγει δὲ τὴν περὶ σπυρίαν, ἔμ- 5
πυρρον, πολυανθή, χαλκιδόνικον καὶ
ἐμπόφυρον καὶ λεπτὴν, καὶ ῥοδί-
σαν τῇ ἐν ὠδίᾳ ἐπειδὼν διατεί-
νει) τῇ χρυσῇ, καὶ δάκτυλῳ τῇ γλωσ-
σαν μετὰ πολλὰς πυρώσεως, χρυσῇ 10
σις δὲ πρὸς ἀνθρώποις καὶ τῇ χαλκιδόνικῳ
καὶ τῇ ῥίζῃ. δύναμιν ὅτι ἔχει δια-
ρηκτικὴν, ἐμμελῶν ἀγῶν, πνευ-
μάτων διαλυτικὴν, κεφαλῆς χα-
ρκαρικὴν, ὑποσύφικον μετέως,
ἐπὶ καὶ βυττικὴν, πεπτικὴν, καὶ ἀνα- 15
σωματικὴν. τὸ μὲν οὖν ἄνθρωπος ἀν-
θρώπος, ποτίσματος χρῆσιμον περὶ
αἵματος ἀναγωγῆς καὶ πόνης σο-
μάτου, πνεύμονος, ἡπατος, νε-
φρῶν, μίγνυται δὲ καὶ ἀντιδότοις,
ἢ δὲ ῥίζα συπικνωτέρεα. διδὼ καὶ 20
τοῖς ἀσώδεσι συμπότοις δίδεται
ὕδρωπιώσι τε καὶ σπασμοῖς με-
τὰ ἰσχυρῶς πεπτεῖως περὶ ἡμέρας
πέντε. τὸ δὲ ἀπόζημα αὐτῆς, τῇ
ὡδὲ μύξαν φλεγμοναῖς εἰς ἐγ-
χάτισμα ἀρμόδιον.

Πρὶ Καλάμου. Κεφ. ιζ'. 25

Κάλαμος ἀρωματικὸς, φύει)
μὲν ἐν Ἰνδίᾳ. ἐστὶ δὲ αὐτῇ χαλκιδόνικος ὁ
κίβρος, πυκνοὶ ὄντας, καὶ εἰς πολλὰς
σκινδαλμοὺς θραυρόμενος, γέμων
ἀρχιῶν

ἀραρχίαν τῆ σύριγγα, ὑπόλευκος,
 ἐν τῇ διαμασσίσει γλίσχρος· συ-
 πτικός, ὑπόδριμς, δυνάει) ὃ ἔρα-
 κινεῖν ποθεῖς. ὅθεν ἀρμόζει μέλα
 ἀρρώσεως ἢ σελίνου σπέρματος ἀ-
 5 φελήδεως καὶ ποθεῖς, ὑδρωποκοῖς,
 νεφριτικοῖς, σπαραγχειῶσι, ῥήγμα-
 σιν. ἀρεὶ δὲ καὶ ἐμυλῶα πινόμνος
 καὶ περυσινός, βῆχας τε ἰά-
 ται ὑποδυμώμνος καὶ εἰς αὐ-
 τόν, καὶ σὺν ῥητίνῃ περὶ ἐν δίνῃ, τὸ
 10 καπνὸν διὰ σύριγγος ἐλκομένη τῷ
 σόματι, ἀφέλεται δὲ καὶ εἰς ἐγκυ-
 δισμασίου γυναικεία, καὶ ἐκλύσμα-
 τα, μίγνυται δὲ καὶ μαλάγματα,
 καὶ θυμιάματα πρὸς ἐνὸς δύναν.

Περὶ Βολύμου. Κεφ. ιη.

15 Βόλυσμον τὸ μὲν δένδρον κα-
 τὰ μέγεθος λευκοῦ ἢ πυρα-
 κινῆς βλέπεται, φύλλα ἔχον
 ὅμοια πηλάνθῃ λευκότερα, δὲ
 πολλὰ καὶ ἀειθαλέστερα, γλυ-
 νόμνον ἐν μόνῃ ἰουδαίᾳ, κα-
 20 τὰ πᾶσι ἀνθρώποις καὶ ἐν αἰγύ-
 πτῳ, διαφέρειν αὐτὸ ἐκαστὸν τῶν
 γένεσι καὶ μύκει καὶ ἰσχύϊ, καὶ
 λέγεται γυνὴ τὸ λέπιδον καὶ πε-
 ρὸς τοῦ θάμου περὶ τὸν ἴσον
 25 δὲ τὸ ἐν ἑρῶν περὶ τὸν ἴσον
 γυνὸν. Τὸ δὲ ὑποβάλυσμον
 λεγόμενον ἐπίκειται ἐν τοῖς ὑπο-
 κυλίσμασι ἐν τελευτῇ τοῦ
 σιδήρεος ὀνύξι τοῦ δένδρου, ῥεῖ
 δὲ ἐλάνθον, ὡς καὶ ἔχαστον ἑ-
 τος μὴ παλεῖον ἢ ἐξ ἢ ἐπὶ τὰ
 γόας

araneorum fistula, albicans,
 lentus in mandendo, & astrin-
 gens, ac cum aliquanta acrimonia
 amarus. Vrinam potu
 ciet: quare cū graminis, aut apij
 semine coctus, in aqua subter
 cutē fusc morbo, renum vitiiis,
 stillicidio vrinæ, ruptisq; cōmo
 dē bibitur: mēses & potu & ap-
 positu pellit. tusi suffitu mede-
 tur per se, aut ex resina terebin-
 thina, hausto per arundinē fu-
 mo: ad muliebres infessus deco-
 quitur, & clysteribus imponi-
 tur. Suffitionibus, malagmatif-
 que odoris gratia cōmiscetur.

Balsamū. Cap. XVIII.

Balsamū, arbor albæ violæ, ly-
 cij, siue pyracāthæ magnitudi-
 ne cōspicitur. Foliū rutæ proxi-
 mū, lōgē cādidius, perpetuū vi-
 rens: in Iudæa solū quadā valle
 & Ægypto nascēs. his differēs
 modis: scabritia, pceritate, gra-
 cilitate. Quod igit tenui & ca-
 pillacea coma est, theristū vo-
 cant quasi demessile: fortassis
 quoniam ob gracilitatē facile
 demetatur. Æstius sub ortu Ca-
 nis ardoribus, arbos vnguibus
 ferreis inciditur, manātque ē
 plaga succus, quem Opobalsa-
 mum vocant: sed tam exiguo
 stillatu, vt annis singulis, ne plu-
 res quidē quā senī septē mve
 congij

DIOSCORIDIS

congi cogantur, inibiq; pódus
duplo repéditur argéto. Succī
probatio est, vt sit recēs, validi
odori, syncerus, non ad acorē
vergēs, dilui facilis, lauis, astrin-
gēs, ac modicē mordēs gustu.
Sed variē vitiatur, misto ab ali-
quibusterebinthi, cypri, létisci,
balani vngueto: itē fusino, me-
topio, melle, aut Cypri cera li-
quida. quod maleficiū facile
deprehéditur. Nanq; merus in
laneam vestē fufus, neq; macu-
lā facit, neq; si eluatur notā re-
linquit: vitiatus autē inheret: &
lac instillatus coagulat, quod
adulterat⁹ nō efficit. Quinetiā
syncerus in aqua aut lacte ce-
lerrimē liquatur, colorēq; la-
ctescit: vitiat⁹ verò olei modo
innatat, se conuoluens, aut in
stellā modū diffundēs. Syncer-
us senescens crassescit, dete-
riorq; redditur. Hallucinantur,
qui aqua concretū pessum ire,
& ad ima fidere arbitrátur, po-
stea dissipatū supernatare. E li-
gni genere, quod xylobalsa-
mum vocant, probatur recēs,
sarmento tenui, fuluum, odo-
ratur, quadámtenus opobal-
samum spirás. Necessarius etiā
femini erumpit vsus: quare e-
ligatur flauum, plenum, gran-
de, póderosum, mordēs gustu,
feruēs

χρῆς συναθροίσεαι, πελεῖν) ὃ ἐστὶ
τὸ πῶς παθὴνός αὐτὸς πρὸς δι-
πλὸν ἀργύριον. ἐστὶ δὲ ὅτις ὁ πῶς ἡλὸς ὁ
ἀσπρόσφατος, τῇ ὁσμῇ τοῦτον καὶ
εἰληκρινὲς, καὶ μὴ παρεξίζων, ἐν δὲ
αὐτῷ, λεῖος, ὑψων καὶ δάκνων με-
τέως δὲ γλῶσσαι. δολῶται δὲ ποι-
κίλως, οἱ μὲν γὰρ χρίσιν αὐτὸ μίσγν-
σιν αὐτό. ὡς τὸ τερεβινθιον, κύ-
πριον, ῥήνιον, σάκτιον, βλαάνιον,
μετόπιον, μέλι, κηρὸν ἰωρσίνην ἢ
κυπρίνην ὑγρὰ, λείαν. ἐλέγχεται) ὃ 10
ἐν γὰρ ὅς ὁ τοῦτον ἐπισαχρὴς γὰρ ὁ
ἀκέραιος εἰς ἑρῖν ὑψος, καὶ ἐκπλυν-
θεὶς, κηλίδαι ἢ ποιεῖν ὑδὲ σπῆλον. ὁ
δὲ δεδολωμένος προσμένει καὶ γὰρ αὐ-
τῷ δὲ ἐπισαχρὴς πῆλινσι τῷ ὅσῳ
δεδολωμένος ἢ δρῶν, ἐπὶ ὁ ἀκέραι-
ος ἐπὶ χυθὴς γάλακτι ἢ ὑδατι χρί-
ται ταχέως καὶ γάλακτι. ὁ δὲ δε-
δολωμένος ἐπιπλεῖ καὶ δάκνων ἐ-
λαιον, συσπρόμενος ἢ διασπρόμενος
ἀσπρόδωτος, τῷ μὲν τοῖς χυθὸν καὶ ὁ
ἀκέραιος παχυνόμενος, ἐστὶ γὰρ χρί-
σιν γίγεται. πλανῶν) ὃ ἢ νομίζον-
τες τῷ παχυνόμενον ἐπισαχρὴτα ὑ-
δατι εἰς χυθὴν εἰς βάθος περὶ τὸν
εἶτα ἀναπλεῖν ἐν δίαχυτον. * τὸ
δὲ ξύλον ὁ καλεῖται) ξυλοβάλασμον,
δοκιμὸν ὅτι τὸ πρόσφατον καὶ λε-
πτόκαρπον, καὶ πυρρὸν ἐν ὧδες, βρα-
χυ πένον ὁπερ δάκνει. τῷ γὰρ πῶς,
καὶ γὰρ τότε ἢ χυθὸς ἀσπράχμα.
ἐκλέγου τὸν ξανθόν, πλῆρη, μέ-
λαν, βαρυὺ, δάκνωντα τὸν γὰρ αὐτὸν
καὶ

ἢ πυρεῖται, μετρίως παραπνέ-
 οντα τῷ ὀπιδιόσμου, φέρεται δὲ
 π' ἀπὸ τῆς πέτρας, ὅ δολιχοῖσι τ'
 χειρὶν, πείσμα ὑπερκαθ' ὁμοιον.
 5 ὅσῳ γινώσκει τὸ πᾶν μετρίον π' ἔχει
 ἢ κανὼν ἢ ἀτυσίαν, πεπείον
 τῇ γένεσι. διώκων δὲ ἔχει ἐν ῥ-
 γασίᾳ τὴν ὁπότε, θερμαντικώτα-
 τος ὢν, σμύχων τὰ ὀπισθοποῦ-
 τα τῶν κόρας, καὶ τὰς πᾶσι μύ-
 τταν. Ἰδέσθαι ἰώμενος, πρὸς τὴν
 10 ῥοδίνης κινωτῆς, ἀρετὴν ἢ
 ἐμύλμα, ἢ δούτερεα, ἢ ἐμύλμα,
 ἢ ῥίγη συγχύει, καὶ καὶ τὰς
 δὲ ἢ τὴν ῥυπαρά, τῶν ἐλκῶν, ἔστι ἢ
 καὶ πεπικὸς ἢ οὐρητικὸς πνέμε-
 νος, διανοῶσιν ἀμύλμα, ἢ τοῖς
 15 ἀκόνιτον πεπικὸς μετὰ γάλα-
 κτος, καὶ διεισδύκτους. μίγνυται
 δὲ καὶ ἀκόποις, καὶ μαλαγμάσι
 ἢ ἀντιδοτοῖς, ἢ καὶ δόλου δρασ-
 κωτά τῶν ἔχει τ' διώκων ὁ ὅπως
 τὸ βλαστάμου, δούτερεα δὲ ὁ καρ-
 20 πὸς, ἐλαγχάνει δὲ τὸ ξύλον. ὁ δὲ καρ-
 πὸς πνέμενος, ἀμύλμα πλεονε-
 πκοῖς, πειπνυμονοῖς, βλάστου-
 σι, ἰσχυρικοῖς, ὀπιδιόσμοις, σπο-
 τωματικοῖς, ὀπιδιόσμοις, σπο-
 φουμῶν, διουρεσῶν, διεισδύ-
 25 κτοις, ἢ εἰς τὰ γυναικεία δὲ ὑ-
 ποθυμιάματα εὐθελεῖ, ἢ εἰς ἐγ-
 χαθίσματα ὑπερκαθ' ὁμοιον ἀντι-
 μοῖ τ' μύλμα, ἢ ὀπιδιόσμοις ὑγ-
 σίαν. Τὸ δὲ ξύλον τ' ἀντ' ἔχει δι-
 ναμὴν τῶν καρπῶν, ὥσπερ ἀμύλμα
 βονδεῖ

feruens in ore, modicè opobal-
 samum olēs. Adulteratur semi-
 ne hyperico simili, quod à Pe-
 tra oppido defertur. Sed coar-
 guitur magnitudine, inanitate,
 virium ignauia, sapore piperis.
 Efficacissima vis inest succo, &
 quàm maximè calfaciens: ab-
 stergit quæ tenebras oculorū
 pupillis offundūt, medetur per
 frictionibus vuluæ cum rosa-
 ceo cerato appositus: menses
 quoque, secūdas & partus ex-
 trahit, horrores illitu discutit,
 vlcera fordida expurgat &
 cruda concoquit, vrinam po-
 tu ciet, ægrè spirantibus pro-
 dest: datur in lacte contra a-
 conitum haustum, aut serpent-
 tium ictus: miscetur acopis,
 malagmatis, & antidotis. In
 summa, præcipua autoritas
 succo, secunda semini, mini-
 ma ligno. Semen commodè
 potui datur doloribus lateris,
 pulmonum vitiis, tussi, ischia-
 dicis, comitialibus, vertigi-
 nosis, orthopnoicis, vrinæ dif-
 ficultati, torminibus ac ser-
 pentum morfibz: ad mulie-
 bres suffitus perquàm vtile est:
 vuluam aperit in defensionibz
 balnearū decoctum, & humo-
 rem euocat. Lignū easdem ha-
 bet vires, aliquantò minores.

Ex

DIOSCORIDIS

Ex aqua potum cruditatibus, torminosis, vullis, venatorum ictibus opitulatur, vrinam cit, ad capitis vulnera cum sicca Iri couenit, squammas ofsium extrahit, & ad vnguentorum spissamenta additur.

Aspalathus. Cap. XIX.

Aspalathus, aliis crysficeptum, frutex est furculosus, multis spinis horrens. nascitur in Istro, Nisyro, Syria, & Rhodiorum insula: quo ad vnguentorū spissamenta pigmentarij vtuntur. Optimus est grauis, detracto cortice rubens, aut in purpuram vergēs, densus, odoratus, gustatu amarus. Est & alterum genus candidum, lignosum, sine odore: quod deterius habetur. Vim calfaciēdi cum astrictione obtinet. vnde decoctum cum vino ad tetra oris vlcera colluenda conuenit, ad nomas genitalium, & sordida vlcera infunditur: subiectum in pefso, partum extrahit, aluum sistit eius decoctum: & sanguinis reiectionē potu cohibet, vrinæ difficultatem inflationēsq̃ue discutit.

Muscus. Cap. XX.

Bryon, id est musc⁹, à quibusdam splachnon appellatur: in cedro

βονθεῖ δὲ ἀφ' ἡδὲν ὕδατι καὶ πινόμενον ἀπελτίας, σφόδρα, θυμολήκτοις, σπασμῶσις, ἔρατε ἀγει, καὶ πρὸς τὰ ἐν κεφαλῇ βλάβματα μετὰ ἰερίδος ἀρμόζει ξηραῖς, ἀνάγει δὲ καὶ λεπίδας, πίνονται δὲ καὶ εἰς τὰ τῶν μύρων σύμματα.

Περὶ ἀσπαλάθου. Κεφ. ιθ'.

Ἀσπάλαθος, * οἱ δὲ ἐρροσίσκηπτον, δάμνος ἐστὶ ξυλῶδης, ἀκαύσας πολλαὶ κεκτημένος, ἡννόμνος ἐν ἴστρο καὶ νισύρῳ καὶ 10
ρῶδα καὶ ῥόδα, ἢ ἡδὲν οἱ μωρεῖοι εἰς τὰς τῶν μύρων σύμματα. ἐστὶ καλὸς ὁ βαρὺς, καὶ μετὰ τὸ πεισφλοιδύσαι ὑπερῶδης ἢ πορφυρίζον, πυκνός, ξυλῶδης, πικρίζον ἐν τῇ 15
γεύσει, ἐστὶ δὲ πικρὸν καὶ ἔστιν αὐτῷ λευκόν, ξυλῶδες, ἀνοσμικόν, ὃ δὴ καὶ χεῖρεν κατέστηκε. Διῶαμιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν μετὰ σύμματος. ὅθεν πρὸς τε τὰς ἀφθὰς ἐν ἡδὲν μετ' οἴνου καὶ διακλυζόμενος ἀρμόζει * καὶ πρὸς 20
τὰς ἐν αἰδοίοις καὶ νομάς καὶ ἀκαθαρσίας ἐγκλυζόμενος, καὶ πρὸς τὰς ἐξυλίας, ἐμβρυὰ τε καὶ αἰσῶνι μινύμενος πεισφλὸν, τὸ δὲ ἀφ' ἡνῆμα αὐτοῦ κοιλίαν ἵσσει * καὶ αἵματος ἀιανθῶν 25
πρὸς τὸν διστυλιαν τὴν καὶ ἐμπνεύματωση λύει.

Περὶ βρύου. Κεφ. κ'.

Βρύον, ὡς πηγὴν δὲ σπλάγχχον καλεῖται, εὐερισκόμενον ὅππῃ δὲ ἴστρον

δένδρον καθεΐναι, ἢ λευκόνων ἢ
δριλίων. διαφέρει δὲ τὸ * κέδρινον.
δευτερον δὲ τὸ λευκόνων, ἔστι δὲ αὐτὸ
τὸ εὐωδέστερον, καὶ λευκὸν καλόν, τὸ
δὲ μελανίζον χεῖρον. Διωμάμιν δὲ
5 ἔχει συπληκίω ποιούτω παρὲς τὰ
σπεί μύτην ἐν ἀφελήμασιν εἰς
ἐγκάψισμα, μίγνεται δὲ καὶ μύ-
εις βαλανίοις καὶ χρίσμασι διὰ
τὸ ἐν αὐτῷ συπληκίον, καὶ εἰς θυ-
μαμάτων δὲ καὶ ἀκόπων σκευα-
10 σίαν ἐστὶν οὕδατον.

Πεὶλ Αγαλλόχου. Κεφ. κβ.

Αγαλλόχον ξύλον ἐστὶ φερέ-
μενον ἐκ τῆς Ἰνδίας, καὶ * ἀ-
ραβίας θυήνης, ὡς γινώσκον, ἐν αὐ-
15 δες, παρὰ σφον ἐν τῇ γούσει μὲν
ποσὴς πικρίας, φλοιὸν ἔχον δε-
ματώδη, καὶ ὑποπόικλον. ποιῶν
δὲ διαμαστώμενον καὶ διακλυ-
ζόμενον τὸ ἀφελήμα παρὲς ἐνω-
δαν σώματος, καὶ διάπασμα δὲ
20 ὅλου τοῦ σώματος ὅτι θυμιά-
ται δὲ αὐτὴν λεβανωτῷ, ἢ δὲ ῥί-
ζα αὐτῆς < ὅλην πνομήν, συ-
μάχου παλάδου καὶ ἀτογίαν
καὶ καύσωνα παρηγορεῖ τοῖς
τῆ ἀλγούσι παλευδὸν καὶ ἥπαρ
ἢ δυσεντερικοῖς ἢ σφοδρὸν
25 νοῖς, ἀρήγει πνομήν
μεθ' οὕδατος.

Πεὶλ Ναρκάφθου. Κεφ. κγ.

Ναρκάφθον, οἱ δὲ γάρκαφθον, καὶ
τὸ τοῦ ἐκ τῆ Ἰνδικῆς κομίζεσθαι. ἔστι δὲ
φλοιῶδες, συγκαμίνε λεπίσματι ἐο-
κάς,

cedro arbore, populo alba, &
quercu inuenitur. Optimum
est cedrinum, proximum po-
pulneum: in quo genere can-
didum & odoratius praestat, ni-
gricans improbat. Astringen-
di vim habet. Decoctum in-
fidentium vulvis vtile: vnguen-
to balanino, oleisque inspif-
sandi gratia inseritur, thymia-
matum, acoporūque compo-
sitionibus conueniens.

Agallochum. Cap. xxi.

Agallochū, lignum est quod
ex India atque Arabia depor-
tatur, thuiæ ligno simile, ma-
culatum, odoratum, gustu a-
stringens, cum quadam ama-
ritudine, cute verius quàm cor-
tice vestitur, aliquantulum ver-
ficolor. Manditur, aut deco-
cto os colluitur, commendan-
di halitus gratia. Sudores arce-
toto corpori insparsum: pro
thure ad suffimenta substitui-
tur. Radix epota drachmē vni-
pondere, humida stomachi vi-
tia, & imbecillitatē, feruorē-
que mulcet: si lateris, iocineris-
ue dolor excruciat, si dysente-
ria, aut tormina infestant, ex
aqua bibere prodest.

Narcaphthum. Cap. xxii.

Narchaphthū ex India deferit,
corticofum, simile sycomori li-
bro;

DIOSCORIDIS

bro quod iucūdi odoris gratia suffitur. Miscetur thymiamatis compositis : constrictionibus vuluæ suffitu prodest.

Cancamum. Cap. XXIII.

Cancamum Arabici ligni la chryma est, mirrhæ quodammodo similis, virosi gustus, quā ad suffimenta vsurpant. Vestes eo, additis styrace & myrrha, suffiuntur. Vim proditur obtinere extenuādī obefos, si ternūm obolorum pōdere ex aqua, aut mulso aceto plusculos dies ebibatur, lienosis datur, comitialibus, & suspiriosis: menses cum aqua mulsa pellit, oculorū cicatrices confestim emēdat, vino madefactū medetur eorūdem hebetudinibus, aduersus gingiuas humore pręgnanteis, dolo resq; dētiū, nō aliud efficacius.

Cyphi. Cap. XXIII.

Cyphi odorati suffimēti cōpositio est, dicata diis, qua abū dē Aegyptij sacerdotes vtūtur. In antidota misceri solet, suspiriosis datur in potu. Permulta componendi rationes, quarū vna hæc est: Sumito cyperi dimidiū sextarium, cū pari baccharum iuniperi adultæ modo: vux passæ pinguis, exēptis vinaceis, minas duodecim: resinæ repurgatæ minas quinq; calami

κός, θυμιάμνον διὰ τὸ εὐωδία, καὶ μύρρον τοῖς σκευαστοῖς θυμιάμασι, ὡφύων καὶ μύρραν ἐσθλὰ γινώσκοντες ὑποθυμιάσεν.

Περὶ Καλάμου. Κεφ. κγ'.

Κάλαμον δάκρυον ὅστιν ἀφ' αἱμοῦ ξύλου σμύρνης* πορσεοικός, βρομῶδες ἐν τῇ γένεσι, ὥσπερ ὡς θυμιάματι χρῶνται. ὑποκαταπί- ζοισι δὲ καὶ τὰ ἱμάτια μὲν σμύρνης καὶ εὐρακος. δάμνουν δὲ ἰσ- ρεῖται ἔχειν, ἰσχυραντὴν τῶν κα- 10 ταπνίων, τοιούτου πληθὺς πινόμενον, συν ὕδατι ἢ ὀξυμέλιτι ἐφ' ἡμερὰς ἡμέρας, δίδεται καὶ σπληνικοῖς, καὶ ἐπληκτικοῖς, καὶ ἀσθματικοῖς. ἐμμύσας τὸ ἄγει σὺν μελιχράτω, καθαίρει τὸ καὶ ἐν 15 ὀφθαλμοῖς παχέως οὐλὰς, καὶ ἀμεινωπίας ἰάται, διεθὲν οἶνον πρὸς τε μυδρίσιν οὐλῶν καὶ ὀδονταλ- γίας, ὡς οὐδὲν ἕτερον ποιεῖ.

Περὶ Κύψεως. Κεφ. κδ'.

Κύψι θυμιάματις ὅστι σκευα- 20 σία καχεκισμένη θεοῖς. χρῶνται δὲ αὐτῷ κατὰ κόρον οἱ ἐν αἰγύ- πῳ ἱερεῖς. μύρνεται δὲ καὶ ἀν- πιότοις, καὶ ἀσθματικοῖς δί- δοται ἐν ποτίσμασι. σκευάσται δὲ αὐτοῦ ἐμφέρονται σπληνογες, 25 ἐν αἷσι ὅστι καὶ αὐτῷ καπτεῖν ἡμῖ- ξεσιν, ἀφ' οὗτος ἀδραῖς τὸ αὐ- τό. σφιδων λιπαρῶν ἐκχυ- γαρπισμένων μίας 16. ῥητίνης ἀ- πεκεν. θαρμύνης μίας 16. καλὰ-

μοῦ

κεου ἀρωματικοῦ, ἀσπιλάθου,
 χίνου, ἐκάστου μῶν ἄ. σμύρ-
 νης < ις'. οἶνου παλαιοῦ ἑξῆς
 θ'. μέλιτος μῶς β'. ἐκτριγ-
 τίσας τὴν σαφίδα κόφον καὶ λεί-
 5 ανον μετ' οἶνου καὶ τῆς σμύρ-
 νης, καὶ τὰ ἄλλα κόφας καὶ σί-
 σους, μίξον τοῦτοισι, ἑασόν τε συμ-
 πτεῖν ἢ ὑέαν' ἄ'. εἴτα ἐψήσας τὸ
 μέλι ἄχχι κολλώδους συστάσεως,
 μίξον ἐπιμελῶς τὴν ῥητίνην τε
 10 τικῶσαν· εἴτα τὰ λοιπὰ συνανα-
 τεύσας ἐπιμελῶς ἀποπίπτεισιν εἰς
 ἀγγεῖον ὁσφάκιον.

Περὶ Κρόκου. Κεφ. κβ'.

Κρόκος ἐστὶ κρόκιστος ἐν ἑαρι-
 κῇ χεῖρσι, ὁ κορύκρος, πρὸς σφάτος
 15 τ' ἢ εὐχεῖς, ἐλίχρον τὸ λευκὸν ἑ-
 χον ἐπὶ τῆς ἑλικος, ἐπιμυκῆς, ὁ-
 λομελῆς, ἄθραυστος, * ἀνέλλι-
 πῆς, παλῆρης, βόλπων ἐν δίοσει
 τὰς χεῖρας, οὐα ἐυρωπῶν ἢ ἰκ-
 μάζων, ἐπακτικὸς δὲ ἐν τῇ ὁσ-
 20 μῇ καὶ δειμῇ· ὁ γὰρ μὴ τινύτης
 ἢ παλαιὸς ὅστις, ἢ βιβρεμῆρος.
 δευτέρου δὲ ὁ ἐκ τῆς πρὸς λυ-
 κίαν κορυκίου, καὶ ὁ ἀπὸ τοῦ λυ-
 κιακοῦ ἐλύμπτου. εἴτα ὁ ἐξ αἰγῶν
 τῆς αἰτωλίας, ὁ δὲ κυρλωαῖκος ὁ
 25 ἐκ καντοείας, πάντων τῶν κα-
 τὰ τὴν σικελίαν, ἁδένως κατὰ
 δαμάμιν, λαχαρώδεις ὄντες πα-
 τες. διὰ μὲν τὸ πλούχιον ἢ
 εὐχρησῶσι οἱ ἐν τῇ ἰταλίᾳ πῇν θύ-
 αιν βόλποντες, τούτῳ χεῖνται.
 πελλοῦ

lami & iunci odoratorum, &
 aspalathi, singulorum minam:
 myrrhae duodecim : vini vete-
 ris sextarios novem, cum dua-
 bus mellis minis: vnam passam
 detractis vinaceis tufam, cum
 vino & myrrha subigito: cate-
 ra tufa & cribrata adiiçito, die
 vno humorem cōbibere fini-
 to, dein mel coquito dum sibi
 glutinis asciscat crassitudinem,
 eliquatā refinam accuratē per-
 misceto cū reliquis diligēter cō-
 tritis, & in fictile vas recōdito.

Crocum. Cap. X X V.

Crocum optimū in medēdi
 vfu coryceū, recēs, & boni co-
 loris, paulū candidi gerēs in ca-
 preolo, oblongū, omnibus suis
 partibus cōstās, nō fragile, ple-
 nū, à quo detractū est nihil, qđ
 madefactū manus inficit, nec
 fitū redolet, aut cariem sentit,
 subacre: sin hui⁹ generis nō est,
 aut vetus, aut humore perfusū
 creditur. Secūsus locus datur
 Coryceo, è tractu Lyciæ con-
 termino. Tertius Lycio, è μό-
 τε Olympo. dein ex Ægibus
 Ætolia. Cyrenaicū & Céturi-
 pinū inter Sicilica omnia viri-
 bus infirmius est. Omnīū natū-
 ra oleracea. It li tamē ob suc-
 ci copīā, & coloris venustatē,
 tingēdis mortarijs dicauerunt:
 quibus

DIOSCORIDIS

quibus de causis magno vendi-
tur, Vtilissimū in medicina qđ
antē descripsimus. Adulteratur
immisto crocomagmate tulo,
atque etiam sapā sublitu: con-
trita, quōd pondus adiiciatur, si-
mul argēti spuma, aut plūbagi-
ne: sed maleficiū declarat infu-
dens pulvis, præsertim si defru-
tum in odorādo subolet. Thef-
salus ipsam tantum odoratū ef-
fe voluit. Alij exitiosum, tribus
drachmis ex aqua potis. Pro-
culdubio vim coquendi, emol-
liendi, atque substringendi ha-
bet: vrinam cit, elegantem co-
lorem præstat, qui ex passio bi-
berint, crapulam non sentient:
oculorum fluxiones illitū cum
humano lacte, cohibet: additur
in potiones, quæ interaneorū
causa tēperantur: ad vuluē etiā
sedisq; cataplasmata, vtiliter in-
ditur: venerē stimulat, vergētes
ad ignē sacrum inflāmationes
mulcet, auriculariis collectio-
nibus vtile. Quōd facilius cōte-
ratur, in calido fictili sole sicca-
ri oportet, celeritēq; versari.
Vrinam mouet radix ex passio
pota.

Crocomagma. Cap. XXVI.

Fit etiam expressis vnguenti
crocini odoramentis, & in for-
mas digestis, qđ crocomagma
vocat

πῶλλ' δὲ πωρῶσκειται διὰ τῶ-
το. εἰς δὲ τὰ φάρμακα, ὁ πορῶ-
γμαμένος ἐστὶ χρῆσιμος. διδύται
δὲ μίξει κροκομαγματος κεκομ-
μῶρου, ἢ δὲ ἑψήματος ὑποδυσφό-
μῶρος συνωπτεμμένου, εἰς τὸ βα-
ρυσταμίσει, λιθαργύρε ἢ μολυ-
βδαίνῃς. διηκοῖ δὲ ταῦτα τῷ, τῷ
ἐν τῷ ἐχθρῷ κοριορτώδε, καὶ τὸ ὅ-
σμιλν ἑψήματος πόδι πυρρῶν.
* Ἐχει δυνάμειν σπερμικὴν, μαλα-
κτικὴν, ὑποσφουσαι, οὐρητικὴν, 10
παρέχει εὐχρησιαν, καὶ ἀκράτα-
λός ἐστι μετὰ γλυκεῖος πινόμενος.
ρεῦμά τε ὀφθαλμῶν ἐπιχρίμε-
νος ἐξέλλει συνὶ γάλακτι γυναι-
κεῖα. μύζῃ τε καὶ τοῖς ποσὶ
τῷ ἐν τῷ ποτίσμασι χρῆσιμος, 15
καὶ ποσὶ δέμασι καὶ καταπλάσμα-
σι τοῖς ποσὶ τῷ μύζῃ καὶ δα-
κτύλοις, παρῖσισι δὲ καὶ ποσὶ ἀ-
φροδίσια, ταῖς ἑρυσσι πελατῶδε
φλεγμαῖς πορῶν κατὰ χρῆσιν.
20
ποσὶ δὲ καὶ ἀναρεπτικὸν αὐτὸν εἶ-
ναι μὲν ὑδατος πινόμενον πρὸς
αὐτὸν γίνεσθαι, δεῖ ἐν ἡλίῳ ὑψί-
ον ὀφθαλμῶν θερμῶν ταχέως ὅδε
ἐρέφειν, καὶ ἢ ἰρία δὲ αὐτὸ πινόμε-
25
νῃ συνὶ γλυκεῖ, οὐρα κηεῖ.

Περὶ Κροκομαγματος. Κεφ. κς'.

Τὸ δὲ Κροκομαγμα γίνεται ἐκ
τοῦ κροκίνου μύρης, τῶν ἀρωμά-
των ἐκ πεδύων, καὶ ἀπ' αὐτῶν,
δένων,

διεργων, ἐστὶ δ' αὖτ' τὸ ἐν ὧδες χα-
 λὸν, μέσως κατὰ σφυρῶν, βα-
 ρύ, μέλαν, ἄξυλον, ἐν τῷ διε-
 ρύμῳ ἰσχυρὸς, κερκιδες τὴν
 χροίαν, λεῖον, ὑπόκιρρον, βάπτον
 ἰσχυρὸς τοὺς ὀδόντας καὶ τὴν
 γλῶσσαν, ἐπιμύρον τὲ συχρὰς ὀ-
 ρας.* Διούκειον δὲ ἔχει σμηκτι-
 κὴν, τῇ ἐπισκοπούτων ταῖς κο-
 ραῖς. οὐκ ἐπιπλὺν, μαλακτικὴν,
 πεπικνύει, θερμαντικὴν. ἀνα-
 10 λογεῖ δὲ κατὰ πόσιν τῇ τοῦ
 κρόκου διωάμεν. πλεῖ-
 σον γὰρ τοῦτου με-
 τεύειν φεῖν.

Πεεὶ ἐλεγκίου. Κεφ. κζ'.

Ελέγκιον φύλλον ἔχει φλόμιον τῷ
 15 στενοφύλλῳ παρὰ πλῆστα, τεσσά-
 ρα δὲ καὶ ἐπιμήκη, χαλκὸν δὲ
 οὐκ ἀνίστην ἐν τοῖς τόποις· ῥίζαν
 * ὑπόκιρρον, ἐν ὧδῃ μετέλλει, ὑ-
 ποδαμνύει, ἀφ' ἧς εἰς τὴν φύ-
 λιν καὶ δάκρυ ἐπὶ τῶν κρινῶν ἢ
 20 ἄλλων λιπαρῶν παρὰ φύσιν λαμ-
 βάνονται. γίνεται δὲ ἐν ὄρεσι καὶ
 συσκότοις καὶ ἀνέμοις τόποις. ὀρύσ-
 σεται δὲ ἢ ῥίζα θέρει, καὶ τεμ-
 νομένη ξηραίνεται, κατεῖ δὲ τὸ ἀ-
 φέλλημα αὐτῆς πνόμιον οὖρον.
 25 καὶ ἐμύλα αὐτῇ δὲ ἢ ῥίζα λαμ-
 βανόμεν ἐν ἐκλικτῷ μετὰ μέ-
 λιτος, ἀμύζει βελίον ἔρτυπνοί-
 ας, ῥήγμασι, σπύσσει, ἐμ-
 πνεύμα τώσσει, θηλείον δὴγμα-
 σι καὶ δόλκις θρῆναι πικρὴ ὑπάρχει.
 τὰ δὲ

vocant. Optimum est odora-
 tum, modicè myrrham olens,
 grave, nigrum, ligni expers, la-
 ue subamarum, quod madefa-
 ctū croci colorem reddit, gu-
 statumque vehemēter dentes
 ac linguam inficit, multis du-
 rās annis, quale est quod à Sy-
 ria defertur. Habet suas vires
 ad delenda quæ caliginem ocu-
 lis obuersant: vrinā cit, calfacit,
 cōcoquit, & emollit. vires cro-
 ci proportionē quadamtenus
 repræsentat, quandoquidē plu-
 rimam croci partem sibi cro-
 comagma vendicat.

Helenium. Cap. XXV II.

Helenium folia habet ver-
 basci angustioris folij, aspe-
 riora, oblonga: caulem qui-
 busdam in locis non emittit:
 radicē subalbidam, interdum
 subrufam, odoratam, subacrē,
 vegetam, magnam, ex qua a-
 gnatę propagines liliorum aut
 ari modo feruntur. Montibus
 in vmbrosis, siccoq; solo pro-
 uenit. Foditur estate radix, par-
 ticulatimque dissecta siccatur.
 Potum radicis decoctum men-
 ses & vrinās ciet. ipsaq; in ec-
 legmate ex melle prodest tuf-
 si, orthopnoæ, ruptis, cōulsiis,
 inflationibus, & serpentium mor-
 sibus. In summa excalfaciens.
 C Folia

DIOSCORIDIS

Folia ex vino cocta vtiliter ichiadidis illinuntur. Heleniū sto macho vile in passō cōditū: si quidem salgamarij paululum siccata[m] radicem, mox decoctum, & frigida aqua madefactam, in sapam conijciunt, & ad vsus recondunt. Trita potaque ad cruentas excreationes efficax est.

Heleniū Ægyptiacum.

Cap. XXVIII.

Alterū helenij genus in Ægypto gigni Crateuas tradit: herba est cubitalibus ramulis, serpilli modo per humum repentibus, foliis lenticulæ circa ramos, sed longioribus crebriorque, radice pallida, digiti minoris crassitudine, per ima tenui, supernè crassiore, cortice nigro. Nascitur in maritimis collibusque. Radix vna in vino epota, contra serpentium ictus auxiliatur.

Omphacium, oleūmq;

Cap. XXIIX.

Oleū quod ex immaturis oliuiis exprimitur, ad multos vsus rectè valētibus accommodatissimū: omphacinū id appellatur. Præstat recēs, odoratum, quod non mordeat. Tale vnguentorum compositionibus idoneum intelligitur. Stomacho

τὰ δὲ φύλλα αὐτῆς ἐπιπλάττειται ἀφελθέντα μετ' οἴνου, ἰχθυαδικοῖς ἀφ' ἡμῶν· ἐστὶ δὲ καὶ ἐν σμαχος ταειχρυδέσσιν ἐν γλυκεῖ· ἐξηράναντες γὰρ αὐτὰ ἐπ' ὀλίγον οἱ ἀλμυροὶ, εἴτα ἀφελήσονται, ἀποβρέχουσιν ὕδατι ψυχρῷ· εἴτα βάλλοντες εἰς ἔλαιον, ἀποπίθονται εἰς χυτῆσιν, πειεῖ δὲ λεία πηρομένη αἰμοποιοῖς.

Πειεῖ Ἐλενίᾳ αἰγυπτίᾳ.

Κεφ. κη' 10

Ἐλενιον ἄλλο ἰσχυρὴ κρατεῦσας γινώσκειται ἐν αἰγυπτίᾳ· πόα δὲ ὅστις κλάνας ἔχουσα πηχυαῖος, ἐπὶ γῆς ἐρριμμένῳ ὥσπερ τὸ ἔρπονλλον. φύλλα δὲ τοῖς τοῦ φακοῦ ὅμοια, μακρότερα δὲ καὶ πολλὰ πλείονα τοῖς κλωνίοις, ρίζαν ὀχρεάν, παχὺς δακτύλου μικροῦ, καὶ πτωδὲν λεπύλῳ, αἰσθάνει δὲ παχυτέραν, φλοῖον ἔχουσαν μέλανα φύεται ὅτι ἐν περὶ θηλαστικοῖς τόποις καὶ γαλόφοις. Δύναμιν ὅτι ἔχει μετ' οἴνου πηρομένη μία ρίζα, θηλειοδικτοῖς βοηθεῖ.

Πειεῖ Ἐλαίου ὁμοποιητοῦ.

Κεφ. κθ'.

Ἐλαιον ὡς ἐστὶ ἐν ὑγείᾳ χυτῆσιν ἀείρειν τὸ ὁμοποιηεῖς· ὁ καὶ ὁμοφάκμον καλεῖται· τοῦτου διαφέρει τὸ νέον. ἀδνηκτον ἐν ὧδες, χηρίσμον δὲ τὸ τοιοῦτον καὶ εἰς τῶν τῶν μύρων κατασκευή. ἐστὶ δὲ καὶ ἐν σμαχος διὰ

vtile

διὰ

διὰ τὸ σφύρειν καὶ οὐκ ἔχειν σαλπικόν·
καὶ ὁδόντων κρατυπικόν, κρατού-
μενον ἐν τῷ στόματι. καὶ ἰδρώτων
ἰσχυρῶν.

Περὶ ἑλαίου κοινῆς. Κεφ. λ'.

Τὸ δὲ καὶ παλαιότερον καὶ λιπαρώ-
τερον, εἰς τὴν τ' φαρμάκων χρῆσιν
ἐνθελόν κοινῶς δὲ παλαιόν, θρ-
μαστικόν ἐστὶ καὶ μαλακτικόν γα-
στρός, διὰ περιχυλίσον φυλάσσον τὸ
σώμα, ἐτοιμότερον παρὰ τὸ ἐν-
10 γείας ποτὶν ἐστὶ καὶ ἐνκοίλιον καὶ
μαλακτικόν, ἀμβλύον τε παρὰ τ'
ἐλκόντων φαρμάκων δύναμεις ἐν
τῇ μίξει, διδόν· δὲ καὶ πρὸς τὰ θα-
νάσιμα συνεχρῶσιν ὁδόντων καὶ ἐξ-
κεντρίων, καθάπερ δὲ ὅσον κοτύλιον
15 σὺν πενταῖς ἰσχυρῶν ποθέν ἢ ὕ-
δατι. σφοδρῶς τε ἐν ποτῶ, ὡφε-
λίμως διδόν· καὶ πικρὰν ἐλκυσιν
καὶ ἰσχυρὰν ἐξ πλῆθος, ἐλκυσθὰς τε
ἐμβάλλει, καὶ ἐνίσταται δὲ τὸ αὐτὸ,
μάλιστα παρὰ τὰς εἰλεώδεις. τὸ δὲ
20 παλαιὸν θρμαστικώτερον καὶ θα-
φρητικώτερον· παρὰ δὲ ὕδωρ καὶ
τὸ ὑπάλκιμα, μικλίον δὲ εἰ μὴ πα-
ρεῖν παλαιὸν ἔλαον ὕδατι, κατὰ κε-
ράτους εἰς ἀλγέων τῶ παρόντος τὸ
κρείσσον, ἐλκυσθὰς ὅχι μάλιστος πα-
25 ρος καὶ χρῆσιν τὸ αὐτὴν τῶ προ-
σημῶ ἐπιδέρεται δύναμιν.

Περὶ ἑλαίου ἐν ἀγείας

ἑλαίας. Κεφ. λβ'.

Τὸ δὲ ἐν τῇ ἀγείας ἑλαίας ἔ-
λαον, * συπληρώτερον, παρὰ μὲν
τῶ

utile est, quodd astringat: gin-
giuas contrahit, dentes firmat,
si contineatur in ore, sudores
cohibet.

Oleū cōmune. Cap. XXX.

Et quod vetustius ac pingui-
us, eò ad medicamenta aptius
est. Et (vt reliqua in commu-
ne dicantur) omne oleum cal-
facit, emollit ventrem, à per-
frictionibus corpus tuetur, ip-
sumque promptius ad obeun-
da munera reddit, aluū emol-
lit, vlcerātium venenorum vi-
res permistum hebetat, contra
venena datur, absidue potū red-
ditūmque vomitionibus, soluit
aluū heminæ mensura cū pa-
ri ptisanæ succo aut aqua po-
tum, ad tormina calidum si-
mul decocta ruta tribus sexta-
riis in potu datur, ventris ani-
malia pellit, idem maximè ilei
intestini morbo laborantibus
infunditur. Vetus magis calfa-
cit & vehementius discutit, o-
culorum claritati subtilitū con-
fert. Si vetusti non sit occasio,
in vase decoquitur ad mellis
crassitudinem, vt vetustatē re-
præsentet.

Oleum syluestris oliuæ.

Cap. XXXI.

Oleū qđ syluestres oliuæ fun-
dūt, vehemēter astringit, & ad
c ij sano-

DIOSCORIDIS

fanorū vsus secundū sibi locū
vêdicat. In dolorib⁹ capitis vti-
liter p^o rosaceo substituitur, sud-
diores arcet, defluētes capillos
inhibet, furfures, vlcera capitis
manātia, scabiē leprāsq; abster-
git: tardius canitiē sentiūt, qui
eo quotidie perunguntur.

Oleū candidū. Cap. xxxii.

Candidum oleū fit hoc mo-
do: Album colore, nec annicu-
lo vetustius, in nouum fictile
oris patuli funditur, centum he-
minarum mensura, & sub so-
lem media quaque die cōcha
refunditur: ex altōque demitti-
tur, vt asidua deuolutiōe, iētū-
que agitātū respumet: octaua
die scœnum græcū mū dū quin-
quaginta denariorū pondere,
calida aqua madefactū donec
emollescat, in supradictū oleū
deiciitur, ita ne extillet aqua:
postea tedæ præpinguis piceæ,
assulatim cæfæ æquale pondus
adiicitur, & trāsactis octo die-
bus, oleū cōcha mouetur. Vbi
candorē contraxerit, in vas no-
nū vetere vino affusum recōdi
debet, substratis fertulæ Cāpa-
næ corollis drachmas vndecim
pēdentibus, cū pari iridis pon-
dere: sin minus, rursus soli mā-
dandū, & idem munus obeun-
dum, vsque dum in albescat.

Sicyoniū.

Ἐν ὑγείᾳ χρῆσιν, δευτέρῳ καφα-
λαχρῶσι δὲ ἀντὶ τοῦ δινησθῆναι,
ἐπέχον καὶ ἰδρῶντας καὶ τεύχεας ῥε-
ούσας, ἀπισμύχει δὲ καὶ πύτυρα,
καὶ ἀχῶρας, καὶ ἰσχυράς, καὶ λέπρας·
βρογχίον δὲ πολλοὶ καὶ δὲ ἐκείσιν ἡ-
μέρας ἐπαλαιφάμενον.

Ελαιον λευκόν. Κεφ. λβ.

Λευκῶν ἐστὶν ἔλαιον ἕτοιμασθαι
τὸ τῇ χρῶσιν μὲν λευκόν, ἡλικίαν δὲ
μὴ πλεονεχῆσαι, ἔχει εἰς κερα-
μεῖν ἡλίον παλαιοῦ, καμνόν, 10
ἔστω δὲ τὸ μέτρον κοίτης αἰ. εἴτα θεῖς
ὑφ' ἡλίον, ἀνάχει καὶ χυμὸν ἐκεί-
σιν ἡμέραν καὶ τὸ μέτρον ὑψοῦ τῇ
καλαφρῶν χρῶματος, ἵνα τῇ συνε-
χῇ κυλίσσῃ καὶ πληρῇ μελίσσας 15
καὶ ἀφρίσιν. τῇ δὲ ἰδρῶν ἡμέραν, βρέ-
ξας πῆλιν καὶ θαλάσσης < ν. ἐν ὑδατί
θέρμῳ, ἐμβάλε μελισσὰν ἡμομυρῶν
εἰς τὸ παρρησιμῶν ἔλαιον χωρὶς
τὸ σφαιρίσαι τὸ ὑδρὶ προσποδός
δὲ καὶ δαλὸν πιτύνης ὥς ὅτι λιπα-
ρώτατον καὶ εἰς λεπτόν καὶ τετραμῆ- 20
νον τὰς ἰσας ἡλικίας, καὶ ἕτως ἔασον
ἄλλας ὁκτώ ἡμέρας διηθεῖν, καὶ
ταῦτάς ἀνάχει τῷ κοίχῳ τὸ ἔλαι-
ον. τότε λοιπὸν εἰ μὴ εἴη τὸ τέλει
τετελευτῶς, εἰς καμνὸν ἀλγείον παρ-
εκλισμένον, οἶνον παλαιὸν καὶ ἀκα- 25
ράτους, ἀποπείσας προῦπεσφωμέ-
νων μελισσῶν σφαιρίσκειν ἡλί-
σκων ὁκτὼν ἡμέρας καὶ ἵππεως εἰ-
δὲ μὴ, πάλιν ἐν ἡλίῳ θεῖον ἀνὶ ὁ. καὶ
ἐργασίον ἀλγείας ἢ λευκὸν ἡμῶνται.

Ἰτερὸ

Περὶ Σικωνίου ἐλαίου.

Κεφ. λγ.

Εἴνεστι ὃ καὶ σικωνίον τὸ περι-
εχόμενον οὗτω σκευάζειν· εἰς λέβη-
τα κερασοτέρωδον, πλατύτα-
μον, ἐν ἧς νέου ἐλαίου ὡμοτε-
λοῦς καὶ λευκοῦ χύμα. καὶ ὕδατος
ἡμίχρη, καὶ κούφου πυλὸς κινῶν
περάσει· ὅταν δὲ ἀναλίσκηται, ὅ-
πως αὖτε τὸ πῦρ καὶ ἡ ἰσχυρία ἀπο-
κόνιζον τὸ ἐλαιον, εἴτα ἄλλο ἐ-
πεσθὲν ὕδατος συνανέξουσιν αὐτῷ καὶ
τὰ λοιπὰ πύκνους καὶ ὥς σοι ὅ-
πως δὲ δεικνύται, ἀπὸ δε. σκευάζεται
δὲ τοῦτο μέλιτα ἐν σικωνίᾳ σι-
κωνίον καλούμενον. Διῶαται δὲ
ἐν χειρὶ ποσὶς θέρμαντικῇ, ἀρμόζον
ἐν πυρετοῖς καὶ τοῖς περὶ νεύρα
πάθεισι. χρῆνται δὲ αὐτῷ καὶ γυ-
ναῖκες, ἐπὶ τῇ* σιλοπύῳ.

Ρύπος βαλανείων.

Κεφ. λδ.

Ὁ ὅς ἐπὶ τοῖς βαλανείοις συνα-
εῖνός, διῶαται θέρμαντικῇ, μα-
λάσειν, διαφορῇ, ἰαχόσ τε καὶ
κοινολάμασιν ἐν διαχρίσι.

Ρύπος ἐν τῇ πελαίᾳ.

Κεφ. λε.

Ὁ δὲ ἐπὶ τῇ πελαίᾳ περι-
εχόμενος τὸν κόνην, εἰσὶν δὲ
ρύπων, τὰς περὶ τοὺς κοινύ-
λους συριφῶς ἐπιπυρῶν ὡ-
φεί· καὶ ἰχθυαδικὸς θερμὸς
ἀντὶ μαλάγματος ἢ πυλῆος ἐ-
πιπυρῶν.

Ρύπος

Sicyonium. Cap. XXXIII.

Sicyonij componendi ratio
hæc est. In lebetē oris lati stan-
no inductum, funditur olei al-
bi quod crudæ oliæ reddide-
runt, congius vnus, aquæ semi-
congius: leui id igne coquitur,
leniter mouendo: at vbi bis ef-
ferbuit, & subtracto igne refri-
xit, innatans oleū concha de-
capulatur, & adiecta noua a-
qua cōseruescit, & reliquis vt
diximus peractis reponitur. In
Sicyonia maximè fieri cōsue-
uit, Sicyonij inde accepto co-
gnomine. Calfactoriā ad quen-
dam vsq; modum vim habet.
Febri ac neruorum vitis pro-
dest. fœminæ ad commendan-
dum faciei nitorē eo vtitur.

Strigmenta balnearum.

Cap. XXXIIII.

Strigmenta à balneis calfa-
ciunt, molliunt, discutiunt: ad
sedis rimas & condylomata
illinuntur.

Strigmēta palæstrica.

Cap. XXXV.

Illa verò quæ ex palæstris
puluerē sibi ascuerunt, in for-
dis speciem redacta, articulo-
rum nodos imposita adiuuāt:
ischiadici in fetus aut mala-
gmatis locum, calida commo-
dè sufficiuntur.

C iij Strigmen

DIOSCORIDIS

Strigmēta gymnasiōrū.

Cap. XXXVI.

Deraſe gymnasiōrum parietibus simulacrisque fordes, calfaciunt: tubercula, quę ægrē ad coctionem perducuntur, dissipant: desquamatis & vlceribus senum profunt.

Elæomeli. Cap. XXXVII.

In Palmyris Syriæ, quod elæomeli vocant, ex quodā caudice manat, oleum melle crassius, sapore dulci. Bilem, cruditatēsq; detrahit, sextario cū vna aquę hemina dato. Sed qui sumpsere, torpescunt & viribus deficiuntur: quod minime vereri oportet, verum crebro excitare, ne veterino presfi somnos captent. Fit & oleum è pinguitudine furculorum oleę: optimum vetus, crassum, pingue, non turbidum. Calfacit, priuatimque caliginibus oculorum illinitur: lepras, neruorumque dolores illitum emendat.

Cicinum oleum.

Cap. XXXVIII.

Cicinum oleū hoc modo retinetur: Maturi ricini quales quātitate torrido sole flaccescunt, & vuarū more instrati tātisper inſolatur, dū vestiēs

cortex

Ρύπος γυμνασίων.

Κεφ. λς'.

Καὶ ὁ ἐν τοῖς τῶν γυμνασίων τοῖς τοῖς ῥύπος, καὶ ὁ ἀπὸ τῶν ἀνδρῶν τῶν δερματῶν τε καὶ διαχρῆται τὰ δύσπεπτα φύματα, καὶ πρὸς ἄπο-
σύματα καὶ περὶ ἐλκῶν περὶ σφύ-
πτα ἀφμόζει.

Περὶ ἐλαιομέλιτος.

Κεφ. λς'.

Ελαίόμελι καὶ παλμυρῶν τῶν
ρίας ἐκ πινος τελέχους, ἐλαίου μέ-
λιος παχύτερον ῥεῖ, γλυκὺ τῇ γεύ-
σει, ὁσπρὸς πνέοντων πλῆθος κυάδων
β' μζ' κοτύλης μῖας ὕδατος, ἄγει
κατὰ κοιλίαν ὡμὸν* καὶ χολῶδες
ἐννοῶται ὅτι γίνονται καὶ ἐκλυται οἱ
λαμψάνοντες, ὁσπρὶς δὲ εὐλαβεῖ-
ται, διεγείρει δὲ αὐτὸς μὴ ἐν-
τας κατὰ φέρεσθαι. σκευάζεται δὲ
καὶ ἐκ τῶν λίπιδων τῶν θηλῶν ἐλαίου*
ἐστὶ δὲ αὐτὸ καλίστην καὶ παλαιὸν,
καὶ παρὰ καὶ λιπαρὸν, οὐ τεθρολ-
μῶν. ὁρμαίνει δὲ ἰδίως πικρῶν
περὶ τὰ ἐπισκοτοῦντα τῶν κό-
ρας ἐπιχειρόμενον, καὶ λίπερας καὶ
ἀλγύματα περὶ νεύρα ἐν χειρὶ
νον ὡφθῆναι.

Περὶ κικίνου ἐλαίου.

Κεφ. λθ'.

25

Κικίνον ἐλαίου σκευάζεται καὶ πνέ-
ται τῶν τριῶν ἡλικῶν ὡρίμων κρο-
τῶν ὅσον αὐτὸν δόξῃ, καὶ ἰσχυρῶς
εἰς ἥλιον, κατὰ τρεῖς ἡμέρας
δοῦ τριῶν ἡλικῶν αὐτὸν περικείμενος
φλοῖδες

φλοιὸς ἀπαρρηγείς ἐκπέσοι, συνα-
 γαζόν τ' σπέρχας, ἐμβάλε εἰς ὄλκον
 καὶ κόφας ἐπιμυθεύς εἰς λέβητα κα-
 χασιπερωμένον βάλε, ὑδαρ' ἔρχο-
 ντα, καὶ ἀνάβρασον ὑποκαίων, ὅταν
 5 ὃ ἀνῶσι τ' ἐν ἀνιούσιν ὑγρότητα πᾶ-
 σαι, ἄρας τ' λέβητα ἀπὸ τοῦ πυ-
 ρὸς, ἀπολαμύναμι τὸ ἐπιπλέον ἔ-
 λαμον καὶ ἀποτίθεσσοι δὲ ἀργύ-
 ρισι διὰ τὸ διαλυθῆναι χυλίζον, ἐ-
 τέρας αὐτὸ σκευάζουσι, μὲν γὰρ τὸ
 10 χαθάσαι εἰς μύλῳ ἀποδιδόντες
 τοῖς κρότωνασι, ἀλλήλους ἐπιμα-
 λῶς· εἴτα εἰς σπυρίδας ἐμβάδον-
 τες τὸ ἀλληλεσμένον, δι' ὀργάνῳ ἐκ-
 θλίβουσιν, αἶε μοι δὲ εἰσὶν οἱ κρό-
 τωνες, ὅταν ὑπὸ τῶν πεπλεγμένων
 15 αὐλῶν σπαιρίων ἀποτρίβωνται· παῖ
 ὃ τὸ κίχινον περὶ ἀχῶρας καὶ ψά-
 ρας καὶ τὰς ἐν ἔδρα φλεγμονὰς,
 πρὸς τ' ὑστέρας μύσεις καὶ διασπο-
 ραί· ἐπὶ δὲ οὐλὰς ἀπορεπείς καὶ ἀ-
 τηγίας, ἐμπλάσσοις τὸ μύλον, ἐμ-
 20 πρεσσοτέρας αὐτὰς ἐργάζε· ἀ-
 γει δὲ καὶ κατὰ κοιλίαν ὑδακτωδὲς
 ποδὲν, ἐκκρίνει δὲ καὶ ἑλμυνθας.

Περὶ Ἀμυγδαλίνου ἔλαιου.

Κεφ. λθ.

Ἀμυγδαλίον ἔλαμον ὃ πινες
 25 μετόπιον καλεῖσθ' σκευάζεται οὐ-
 πως· Ἀμυγδαλίων πικρῶν* χδβ'.
 χαθάρας καὶ ξηράνας, κόφον
 ὑπορωξυλίῳ ἐν ὄλκῳ κοῦφως
 μέγρις μάζα γίνεται, ἐπιχέ-
 ρας τὸ ζεστοῦ ὕδατος κοτύλας β'.

κα

cortex fractus decidat. Caro
 colligitur, & coniecta in pi-
 lam diligenter tunditur: po-
 stea in lebetem stanno illito,
 qui aquam habeat, demitti-
 tur, subiectoque igni ferue-
 scunt: & ubi insitum prorsus
 humorem reddiderunt, subla-
 to ab igni vase, innatans o-
 leum concha tollitur, & re-
 conditur. Sed in Ægypto, ubi
 largior increbuit vius, longè
 secus fieri solet. Nam repurga-
 tos ricinos molæ mandant, &
 accuratè molitos per sportu-
 lam torculo exprimunt. Tum
 quidem ematuruerunt ricini,
 cum continentibus orbiculis
 exuuntur. Ad psoras, & vlce-
 ra capitis manantia valet: pro-
 deest fedis inflammationibus,
 vuluis conuersis atque præ-
 clusis: item indecoris cicatrici-
 bus, & aurium doloribus: em-
 plastra efficaciora reddit ad-
 ditum, potu aquâ aluo extra-
 hit, ventris animalia pellit.

Amygdalinū. Cap. XXXIX.

Amygdalinum oleum, quod
 aliqui metopium vocant, hoc
 fit modo: Semodius ex ama-
 ris nucibus repurgatis ficcatif-
 que, in pila ligneo pistillo leni-
 ter tunditur in offas, aquæ quæ
 ferbuerit sextarius adicitur,

c iiij & ubi

DIOSCORIDIS

& ubi dimidia hora humorem
 hauserit, vehementius quàm
 ante tunditur, mox tabellis
 premitur, & quod digitis hæ-
 sit, concha excipitur. Pressis
 nucibus rursus hemina aqua
 inspergitur, & postquam ebi-
 berint: idem opus proficien-
 dum. Singulas heminas red-
 dunt singuli modij. Contra
 vulvarum dolores, strangula-
 tus, conuersiones, & eorundè
 locorū inflammationes, & ef-
 ficax est: vitiis renum, calcu-
 losis, difficili vrina, suspurio-
 sis, lienosisque proficit: dolo-
 res capitis, grauitatem audi-
 tus, sonos incertos, tinnitūque
 discutit: maculas & vitia cus-
 tis tollit è facie, & eam erugat
 cū melle, radice lilij & Cypria
 cera aut rosaceo cerato: & o-
 culorū hebetudines emendat,
 vlcera capitis manātia & fur-
 fures cum vino abstergit.

Balaninum.

Cap. XL.

Simili modo fit Balaninum
 oleum, quod repurgat macu-
 las, lentigines, varos, & cica-
 trices nigras. Aluum soluit, sto-
 macho aduersatur, contra au-
 rium dolorem, sonos, & tinni-
 tus auxilio est, cum anserino
 adipe instillatum.

Sesfa-

ἐὰν συμπιῇν ἡμώρειον, ἀφ' ἧς πά-
 λιν βιαστέον τέλει, εἴτα ἀπο-
 θλίβων πρὸς πλάτα ἐξίπνου, καὶ
 τὸ ἀπὸ τῶν δακτύλων εἰς μέλα-
 κα ἀναλίσκων· εἴτι πάλιν εἰς
 τὸ ἀποτεθλιμμένον κοτύλιον ὕ-
 δατος μίαν ἐπιχέας, καὶ συμ-
 πιεῖν ἐύστις, τὸ αὐτὸ ποιεῖ. ἀ-
 ποδίδωσι δὲ κοτύλιον ἢ τὸ τι-
 τραχόνικον. ποιεῖ δὲ πρὸς τὰς
 ἐν μήτρᾳ ἀλγηδόνας καὶ πίνκας 10
 ὕστερας, διαστροφάς τε καὶ φλε-
 γμονὰς τῶν αὐτῶν τόπων· ἐπὶ
 δὲ κεφαλῆς καὶ ὧτων πό-
 νοις, καὶ ἡχρῖς καὶ συριγμοῖς· ὠ-
 φελεῖ δὲ καὶ νεφριτικοῖς, καὶ δι-
 στυειῶντας, καὶ λιθιῶντας, καὶ 15
 ἀσθματικούς, καὶ σπληνικούς·
 αἶρεσι δὲ καὶ στίλοις ἐν πρὸς σῶ-
 που, καὶ ἐφ' ἡλεις καὶ ρυτίδας, μέ-
 λιπ' μινυῖον καὶ κρίνου ρίζην καὶ
 κυπερινήν ἢ ροδίην κηρωτῇ, καὶ ἀμ-
 βλωπίας δὲ ἐστὶν ἀν' ασκυστικόν· 20
 σὺν οἴνῳ δὲ ἀχρεῖς καὶ αἰτύ-
 ρη σμύχει.

Πεὶ Βελαντίνου ἐλάειν.

Κεφ. μ.

Εοικότως δὲ καὶ τὸ βελαντίνον
 σκευάζεται· διυάμιν δὲ ἔχει κα-
 θαρπικὴν σπύρον, φακὼν, ἰσίδων, 25
 οὐλῶν μελανίας, κοιλίας καὶ θαρ-
 κτικῆς, ἐστὶ δὲ κακοστ' μαζον' ἀφ' ἧς
 ζεῖ καὶ ὠταλγίας, καὶ ἡχρῖς, καὶ συ-
 ριγμοῖς, μετὰ χυμίου σέατος
 ἐγχρόμῳ.

Ελαίου

Ελασσον σπασμινον. Κεφ. μα'.
Ομοίως δὲ σκευάζεται τοῖς
πρεσβερεμένοις, τῷ τε σπασμινον
ἐκ τῶ σπασμινον.

Sesaminum. Cap. XLI.
SIMILIS sesaminij ra-
tio.

Caryinū. Cap. XLII.

Fit etiā è nuce iuglāde oleū,
quod caryinū vocant. Eādem
vim habet quam Balaninum.

Hyoscyaminū. Cap. XLIII.

Hyoscyaminum sic fit: Semē
candidum, recens ac siccū tū-
ditur, & calida aspergit aqua,
vt in amygdalino diximus, dē-
que infolatur, siccata, quæ sub
manu sunt, partes cum reliqua
massa permisceantur: hoc autē
fieri oportet dum nigrescat &
grauiter oleat: mox pressū atq;
excolatum reconditur. Ad au-
rium dolores efficax est, pefsis
miscetur, ad emolliendū vtile.

Gnidicū oleū. Ca. XLIIII.

Fit & è grano gnido pur-
gato & tuso. Vis ei aluum sol-
uere potu.

Cnicinū oleū. Cap. XLV.

Non secus cnicinum oleū
temperatur: cui facultas ea-
dē est quæ factō è gnido gra-
no, verum inualidior.

Oleū Raphanicū. Ca. XLVI.

Raphaninum è raphani
semine fieri solet, caterorum
more. Phthiriasis mala valem-
tudine contractas tollit, sca-
britias

Ελασσον καρύνον. Κεφ. μβ'.
Καὶ τὸ καρύνον ἐκ τῆ βασιλικῶν
καρύνων συνπιζέμενον, δύναμις ἔ-
χει καὶ τῷ αὐτῷ τῷ βαλανίνῳ.
Πρὶ Ιοσσυαμίνῳ ἐλάει. Κεφ. μγ'.
Καὶ τὸ ὑοσσυαμίνον δὲ σκευά-
ζε(ε) ὕψω λαδῶν τὸν λευκὸν καρ-
πὸν ξηρὸν πρέσσειον καὶ κόψας,
ὑδατι θερμῷ φύει, ὡς πρεσβερε-
ται ἐπὶ τῷ ἀμυγδαλίνῳ, ἡλιόζων
δὲ τὰ ὑποχέειρα ξηρανόμενα
αὐτῇ μέρῃ, τῷ ὅλῳ αὐτὸ μισγέ· καὶ
τὸ αὐτὸ πρὶ ἄρχεος ἀν' μελανθῶ
καὶ ὑποσπείρει γῆνιν· εἴτα διηθήσας
καὶ ἐκθλίψας ἀποπίπτει. ποιεῖ δὲ
καὶ πρὸς ὠταλγίας, καὶ περὶ τῆς μύ-
της μαλακτικὸν ὄν.

Πρὶ Κνιδελαίου. Κεφ. μδ'.

Ομοίως δὲ καὶ τὸ διὰ τῶ κνι-
δοῦ σκευάζε(ε) κόκκῳ λεπιδέν-
τος καὶ κοπέντος, καὶ παρτικῆν δὲ
ἔχει δύναμις κοιλίας πνέμενον.

Πρὶ Κνικελαίου. Κεφ. μέ.

Ὡσαύτως καὶ τὸ κνίκικον σκευά-
ζε(ε). δύναμις ἔχει αὐτὸ τῷ διὰ τῶ
κνιδεῖν κόκκῳ, ἀνέμενη ἢ μάλλον.

Πρὶ Ράφανηλαίου. Κεφ. μς'.

Τὸ ὃ ραφανίνον σκευάζε(ε) ἐκ τῆ
αὐτῆς σπέρματος ὡς καὶ τὰ λοι-
πά. τοῖς ἐν νόσῳ ὃ φθειριώσῃ ἀρ-
μύζῃ, καὶ ταῖς αἰεὶ τὸ πρεσβερε-
τικῇ χει

DIOSCORIDIS

britias cutis in facie emen-
dat. Ad obsonia vtuntur Æ-
gyptij.

Melanthinum oleum.

Cap. XLVII

Melanthinum idem quod ra-
phaninum poteft.

Oleū Sinapicū. Cap. XLVIII.

Tritū sinapis semē, & calida
aqua madefactū, adiecto post
ea oleo exprimit, id ad diutur-
nos dolores efficax est, trāsfert
humores q̄ in aliqua parte cō-
creuerūt. Mirteū. Cap. XLIX.

Myrtei faciūdi ratio hęc est:
E myrto nigra syluestri, aut fa-
tina, foliorū molissīma quęque
tusa premunt: succo pares om-
phacini olei portiōes adiiciūt,
subiectisq; carbonib⁹ iferue-
scūt donec cōcoquant, innatās
oleū deradif. Sed lōgē facilior
hęc cōpositio: Tenera folia cō-
tusa coquūt in oleo & aqua, &
qđ inat eximīt. Priuatim alij
deiecta ī oleū folia ī sole mace-
rāt: alij pri⁹ oleū īspissant mali-
corio, cupressō, cypiro et iūco
odorato. Efficaci⁹ est amarum
gustu & oleosū, viride, translucens,
& olens myrtū. Astringit
ex indurat, ideō medicamentis
miscetur quę cicatricē obdu-
cunt: prodest vlceribus in ca-
pite manantibus, ambustis igni
&

σκήχει τρυφύταται. χρῶνται δὲ
αὐτῷ οἱ ἐν αἰγυπτῷ τοῖς περὶ σπο-
νδύμασι συνέχοντες αὐτό.

Πρὶ Μελανθελαιῶν. Κεφ. μζ'.

Καὶ τὸ μελανθίνον δὲ τίττω ἀν-
τίττω ἔχει δύναμιν, καὶ σκευασίας 5
τῷ ῥαφανίνῳ.

Πρὶ Σινάπελαιῶν. Κεφ. μν'.

Τὸ δ' σινάπιον σκευάζεται, λεανθὸ
μῆλον τριήντης καὶ βρεχόμενον ὑδα-
τι. Συγχρῶς, ἔπειτα μινυμένους ἐλαί-
ου, καὶ συνεκθλιβόμενον ποιεῖ τὸ πρὸς 10
τὰ χρῶντα ἀλγύματα μζ' σύγ-
κρισιν. Πρὶ μυρσινελαιῶν. Κε. μθ'.

Μυρσίνιον δὲ σκευάζεται οὕ-
τως· λαβὼν τὰ ἀπαλὰ φύλλα τῆς
μελάντης μυρσίνης ἢ ἀγρίας ἢ ἡ-
μέρου, κόπτε πέλων ἵσον δὲ τῷ 15
χυλῷ, ἐλαίου ὀμφακίνης μίσθον,
χλίαςιν ἐπ' ἀνδράκων, ἕως ἂν
συνεψῇσθ' αἶρον τὸ ἐφιστάμενον.
Συκοπωτέρα δὲ σκευασία, τὰ ἀ-
παλὰ τῶν φύλλων κόψαντα, ἐ-
ψιν μὲθ' ὕδατος, καὶ ἐλαίου, καὶ τὸ 20
ἐφιστάμενον ἀποψῆν, ἰδίως δ' τὰ
φύλλα χυθέντα εἰς ἥλιον, ἐν ἐ-
λαίῳ ἀποβρέχεν. ἔνιοι δ' περὶ σπυ-
ροισι τὸ ἐλαϊον σιδήοις, κατὰ ρίσι-
σιν, καὶ πείρω, θήνω. ἔστι δὲ ἐμπερα-
κτικώτερον τ' ἢ γένουσι περρίζον, καὶ 25
ἐλαϊῶδες, χλωρόν, διαφανὲς ὄζον
μυρσίνης. Δύναμις δὲ αὐτῆς συ-
πτικὴ, σκληρωτικὴ, διὸ καὶ ποιεῖ
μυρμύμενον ἀπουκωπτικόν, καὶ
πρὸς πνεύματα, ἀρχώδεις, πίτυ-

εσ.

&

ρα, ἐξανθήματα, παρατείματα,
τα, ρογάδες κονδυλώματα ἄρ-
θρα κεχλασμένα· ἰδρώτας ἐ-
λκεῖ, καὶ ὅσα σύφκως ἢ πυκνώ-
σιως ἔχει χρεῖαν.

Περὶ Δαφνελάου.

Κεφ. ν'.

Τὸ δὲ δάφνηνον σκευάζει διὰ
τῶν δαφνίδων, ὅταν ὅσι δρυοπε-
τεῖς, ἐξομύων μὲν ὕδατος· ἐν
τῷ τῷ περικειμένου λέποις, ἀνί-
10 πιν λιπαρίαν πινά, μὲν διακό-
ψαντες χερσὶν εἰς μύακας ἀνα-
λαμβάνουσιν. ἔνιοι δὲ ὀμφάκων
ἐλαιον περὶ ψάντες, κυπείρω, καὶ
ρίνω καὶ καλάμω καὶ μὲν ταῦτα

δάφνης φύλλα ἀπαλλάττοντες
15 τες, συνέχουσιν. οἱ δὲ, καὶ δα-
φνίδας ἕως ἀν' ἰσχυρὸν ῥήνται τῇ
ὀσμῇ. ἔνιοι δὲ καὶ σύρεκα μίση-
ροισι καὶ μυρσίνοις. ἀείρη δὲ
περὶ σκευάσαν ἢ ὀρενὴ καὶ πλα-
τύφυλλος δάφνη, διαφέρει δὲ τῷ

20 δαφνίς τὸ περὶ σκατον, χλωρὸν
τῇ χροίᾳ, πικρότατον, δριμύ. Δύ-
ναμιν δὲ ἔχει δερματικὴν, μα-
λακτικὴν, ἀνασσωτικὴν, κόπων
λυτικὴν. ἀρμόζει καὶ τοῖς περὶ τὰ
νεύρα πάσχει πᾶσι, καὶ ὅταν γί-
25 αὖς, καὶ καταρροὶς ὀφθαλμοῖς· ἔστι δὲ
καὶ ναυτιῶδες ποτὲν.

Περὶ Σχημαλίου. Κεφ. νδ'.

Τὸ δὲ σχιμνὸν ὁμοίως ἐν
τῷ καρποῦ πεπεῖρεσιν σκευάζειν,
ὡς τὸ δάφνηνον, περὶ σκατον.

ὑγιάνει

& popularū eruptionib⁹. Facit
ad attrita & furfures, sedis ri-
mas, cōdylomata, articulos la-
xatos, corporis sudores cōpe-
fcit, & omnia quæ aftrictionē
inspiffationemq; desiderant.

Laurinum.

Cap. L.

Laurinū fit hoc modo: Lau-
ri baccæ cum maturæ sunt, in
aqua coquantur: siquidem ex
obducto cortice quandā pin-
guitudinē reddunt, quæ mani-
bus subacta, cōcha excipitur.

Alij omphacinū prius oleū cy-
piro, iūco odorato, & calamo
inspiffant, deinde tenera lauri
folia cōcoquūt. alij etiam bac-
cas, donec oleū odorē cōtra-
xerit. alij styracē & myrtū ad-
dunt, Optima laurus ad id la-
tifolia & montana. Oleū lau-
rinū vtilius quod recēti⁹, quoq;
viridius colore: amarissimū, &
acre. Vis ei excalfactoria, emol-
liens: venarū spiracula aperit.
lasisitudines discutit, omnibus
neruorū vitijs, algoribus, destil-
lationib⁹, auriū dolorib⁹, malis
renum frigore cōtractis, illitū
non aliud iuuantius: attamen
potum nauseam parit.

Lentiscinum. Cap. LI.

Similis lētiscini ratio. Nā ē ma-
turo fructu téperat, factis prius
spiffamētis, vt ī laurino dixim⁹.

Hoc

Hoc scabiem iumentorum canūque sanat, vtilissimū pefsis, acopis, & leprarum medicamētis: sudores cohibet. Nec secus terebinthinum fieri solet, quod refrigerat & astringit.

Mastichinum. Cap. LII.

Mastichinum ē trita fit mastiche, quod contra omnia vuluæ mala efficax est: mediocriter calfacit, astringit, & emollit. Aduersus prominentes stomachi duritias, coeliacorum, dysentericorumque cruciatus vtile: faciē emaculat, & colorem nitidum facit. optimum in Chio insula componitur.

Vnguentorum cōpositio.

Cap. LIII.

De ratione vnguentorū cōsequēter tractādū existimaui-
mus, quādoquidē ea in nōnul-
lis corporū vitijs, aut medica-
mētis mista, aut corpori perfu-
sa, aut narib⁹ obiecta, plurimū
profunt. in quorū probationi-
bus cōsultare nares oportet, an
ea oleāt ex quibus tēperatur.
Optimū huiuscemodi iudiciū,
qd̄ in qbusdā planē obseruari
nō potest, ppter ea q̄ admiscēt
odore ceteris pualētia: vt in a-
maracino & crocino, telino et
plerisq; alijs, q̄ crebra circa hęc
meditatiōe experiri cōueniet.

Rosaceū.

ὑγιαίνει ψώρας κτηνῶν καὶ κυνῶν
καὶ εἰς πρὸς τοὺς καὶ εἰς ἀνθρώπους καὶ
λεπιδόμας ἐπιπιδείκνυται μύχνηται.
σέλλει δὲ καὶ ἰδρώτας, καὶ τὸ τερε-
βινθινον δὲ ὁμοίως σκευάζεταιται.
ἰσχυρεῖ δὲ καὶ σύφει.

Πρὶ Μαστιχαίνου. Κεφ. νβ'.

Τὸ δὲ μαστιχινον, ἐκ τῆς μα-
στιχῆς λείας σκευάζεταιται. ποιεῖ δὲ
πρὸς τὰ ἐν ὑστέρα πάντα, ἡπίως
θερμαίνει, σύφει, μαλακώνει, καὶ
πρὸς τὰ πλεονάζοντα τὸν σῶμα χρόν
ἐπιπιδείκνυται σκλήρυνματι καὶ κοι-
νιαι καὶ, καὶ δυσεντερίαν, καὶ τὰ ἐπι-
τὰ πρὸς σῶμα καὶ δάκρυα, καὶ ἐν-
χρῶσαν περιουσίαν συντίθεται ὅ ἐν
χρῶ τῇ νύκτι καὶ λυγρῶν.

Συνθεσις πλεονάζοντων.

Κεφ. νγ'.

Ἐπεὶ δὲ καὶ τὰ μύρα ἐνθε-
τεῖ ἐκ τῶν ἐνίων παθῶν καὶ μυγνύ-
μας φαρμάκοις καὶ ἐμβρεχόμε-
να καὶ ὁσφρανόμενα, ἀκόλουθον ἡ-
γούμεθα καὶ τῶν τέκτων παραδο-
σθῆναι ποιεῖται, ἃ δὲ δοκιμάζον-
τας ἐπιτελέειν, εἰ ἀφ' ἧς ἡ κράσις
ἐστὶ τῶν μύρων, ἐκείνη ποιεῖ καὶ ὁ
ὁσφρησθῆναι. ἀείσθῃ δὲ ὅτι ἡ τοιαύ-
τη κράσις ἐπ' ἐνίων μύρων τοι οὐ
φυλάττει τὸ τοιαύτον δι' ὅτι κρά-
τειαν μυγνύματων σφοδρότερων,
ὡς ἐπὶ τῷ μαρμαρίνου καὶ κροκίνου
καὶ πηλίνου καὶ ἄλλων πηλῶν ἀ-
φ' ἐκ τῆς πλεονάζοντος γυμνασίας
δοκιμασθέντων.

Πρὶ

ΠΙΣΙ ΡΟΔΩΝ ΣΚΕΥΑΣΙΑΣ. Κεφ. νδ'.

Ρόδον ἑλαον γίνεται οὕτω
 ἄνευ λίβας ἑ. ὀγγίας ἢ. ἑλάου λί-
 τρας κ. ὀγγίας ἑ. κόψας καὶ φρεσ-
 σας ὕδατι, ἔψε ἀνακινῶν· εἴτα ἀ-
 5 πωθήσας εἰς τὰς κ. λίβας καὶ ὀγ-
 γίας ἑ. ἑλάου, βάλε ρόδων ἀβρό-
 χων ἀριθμῶ χίλια πέταλλα· καὶ
 ταῖς χείρας μέλιτι χρίσας, ἀνα-
 κίνει πλεονάκως ὑπερλίτως ἡρέ-
 μα· ἔπειτα ἐλάσας τὴν νύκτα ἐκ-
 10 θλίβε, ὅταν δὲ τὸ πρυγῶδες ὕ-
 ποστὴ ἀλλάξῃ τὸ ὑπερλίτως ἡρέ-
 μα· ἔπειτα ἀποτίθεις δὲ εἰς κρα-
 τήρα μέλιτι κατακεχρισμένον.
 βαλὼν δὲ εἰς λαμπέδιον τὰ ἐξί-
 πτωθέντα ρόδα, ὀπρὲς λίβας ἢ.
 15 ὀγγίας γ'. τῆ ἐστυμνίου ἐλάου,
 καὶ πάλιν ἐξίπτει. ἔσται δὲ σοι
 τοῦτο δευτέρον, καὶ βαλάντης
 ἔχει γ'. ἢ δ'. ἀποθερῶς ἐ-
 πλεον ἐξίπτει. γίνεται γὰρ τὸ μὲν
 α. τὸ δὲ β'. τὸ δὲ γ'. τὸ δὲ δ'.
 20 μύρον, ὁσάκις δ' ἂν ταῖς, τὸν
 κρατήρας, περικατάχρεις μέλι-
 τι. εἰ δὲ θέλεις δευτέραν ἐμ-
 βολὴν ποιήσασθαι, εἰς τὸ πρῶτον
 ἐξίπτωθαι ἑλαον, τὸν ἴσον ἀειθ-
 μὸν περὶ σφάτων ρόδων ἀβρό-
 25 χων ἐμβαλε καὶ ἀνακινῶν ταῖς
 χερσὶ περὶ δευτέρως μέλιτι,
 ἐκπίεζε, καὶ ποιεῖ τὸ δευτέρον
 καὶ τρίτον καὶ τέτατον ὁμοί-
 ως ἐκθλίβων, καὶ ὁσάκις δ' ἂν
 ποιῇς τοῦτο, νεαροὶ ὀνυχίων
 περὶ βάλαν

Rosaceum. Cap. LIIII.

Rosaceum sic fit: lunci odo-
 rati quinque libras & bessem
 tundito, et subactas aqua in vi-
 ginti olei libris & quincunce
 subinde mouedo, coquito: dú-
 que percolaueris, in olei libras
 viginti & quicuncem, adii cito
 rolas non madefactas numero
 mille, & manib⁹ melle perun-
 ctis, identidem moueto, inter-
 diu premens, finito nocte tota
 macerari, postea exprimito: &
 vbi recremētum pessum erit,
 mutato vase, in craterē melle
 illitū recondito. Caterum ro-
 las quæ antea pressæ fuerunt,
 in tabellum demittito, & affu-
 sis octo libris & quadrāte spif-
 fati olei, iterum premito, erit-
 que secundarium oleum: Quod
 si tertias vsq; quartasve perfu-
 siones infundēs exprimere vo-
 les, secundarium fiet, tertiariū,
 & quartarium vnguetum. Sed
 quoties id feceris, vasa melle
 oblini debent. Si verò secundā
 infusionem instituere libet, in
 expressum oleum, numero pa-
 ri recētes rolas, nullo humore
 imbutas inijcito: manib⁹ melle
 premadefactis, agitās pmito: &
 iterum, tertio aut quarto simili
 modo exprimēs facito, totiesq;
 recētes rolas detractis vnguib⁹
 immittito

DIOSCORIDIS

immittito : fiet enim ita oleum multò validius: nam septies oleum rosarum infusionem admittit, nec amplius. Prelum melle perſigatur, oleum à ſucco diligenter ſecerni oportet: nam ſi minimū quid relinquatur, vnguentum corrumpet. Alij autem detractis vnguibz, roſas tantū oleo macerant in ſole hoc modo: Roſæ quæ ſelibram pondere æquant in ſextario olei diebus octo madefcunt, & uſque tertiam perſuſionem quadraginta diebus inſolantur, & ſic oleum reconditur. Alij calamo, aut aſpalatho prius olei ſpiſſamenta faciūt. Alij coloris cauſa anchuſam admiſcent, & ſalem, quò minus oleat. Vim aſtringendi & refrigerandi obtinet, fomentis & cataplaſmatibus vtile. Potū ſolui aluum, ſtomachi ardorem reſtringit, vlcera caua replet & mulcet, quæ cacoëthe vocantur: vlceribus in capite manantibus, atque feruidis eruptionibus illinitur: caput dolens eo perſunditur, dentes inter initia doloris collui pdeſt, ad genarum durtias illitū efficax eſt, ad laceſſita interanea & concitatas vulnas vtiliſſimè ſubiicitur.

Elatinū.

περὶ ὧν ῥόδα, διαμικνόμενον γὰρ γίνεται ἄρχη δὲ ἐκδομῆς ἐμβροχῆς, ὁποῖα γίνεται τὸ ἐλαιον* τῶν ἐμβροχῶν τῶν ῥόδων, ἵππειτα δὲ οὐκ ἐπὶ κατερίδων δὲ καὶ ἡλιωδὸς μάλιστα, δὲ δὲ ὁποῖα μελὸς τὸ ἐλαιον τῶν χυλοῦ χυρί-
ζειν ἀπολιφθῆν γὰρ τοὺς ἀχρεῖς, τὸ μύρον φθείρει. ἐνιοὶ δὲ αὐτὰ μόνον τὰ ῥόδα ὀνυχίσαντες καὶ ἡλιάσαντες, ἐναποβρέχουσιν τῶν ἐλαίων ἔχοντα ταύτην οὐρίαν 10
ς. εἰς μίαν ἡμέραν ἐλαίου, καὶ ἀλλὰ ὄντοντες, ἡμέρας ἢ καὶ ἡλιάζοντες ὅτι ἡμέρας μὴ ἄρχη τε-
της ἐμβροχῆς, οὕτως ἀποπίνονται. ἐνιοὶ δὲ περὶ σφοῖσι τὸ ἐλαιον, καὶ αὐτὸν καὶ ἀσπάλατον ἐμ- 15
βάλλοντες* οἱ δὲ καὶ ἀργυροῦς ἐνεκὸν εὐχρείας, καὶ ἄλλας περὶ τὸ μὴ φθείρεσθαι. δυνάμει δὲ ἔχει συπικνύει, πυκνικὴν, οὐ-
δε τὸν εἰς ἐμβρέγματα καὶ κατα-
πλασμάτων μίξεις. λυεῖ δὲ καὶ 20
κοιλίαν πεπτιζόμενον, καὶ χαλῶσιν σβέννυσσι σωμαζοῦντες δὲ καὶ πρε-
πικὸν κοίλων ἐλκῶν, καὶ τῶν κα-
κοῦθων περὶ σπικνόν, ἀχρεῶν καὶ ἐκζημάτων ἐπάλειμμα. καὶ κε-
φαλαλγίας ἐμβροχῆς, ἐν ἀρχῇ 25
ὁδονταλγίας διάκλυσμα. πίνει δὲ καὶ περὶ βλεφαρῶν ἐσκληρωμένων ἐργασίον, περὶ τε ἐντέραν ἐρεθισμοῦ καὶ ὑστέρως ἐγκλυζόμενον χηρῆσμον.

Πρὶ

Πρὶ Ἑλατίνης σκευασίας. Κεφ. νβ.

Ἑλατίνω θλάσει καὶ διακνή-
σαις, ἔμβαλε εἰς λουτήρα καὶ ἐ-
πίχει ὑμφάκνον ἔλαιον ἐπὶ ἡμέ-
ρας γ'. ἀνελόμενος τὸ εἰς σπυρί-
δα ἐξίπνυ. ἔσω δὲ ἐκείτερεα ἰσο-
σταθμα, εἴτα ἀποδέμενος ἐν κα-
δαρῷ ἀγγείῳ, ἡσῶ. Διωάμιν δὲ
ἔχει ἀναλογῶσαν τῷ ροδίῳ, κοι-
λίαν δὲ ἔμβάλασει.

Πρὶ μελίνης σκευασίας. Κεφ. νγ'.

10 Ἐλαιον μέλιμον σκευάζει τὸν
πρόπον τῶν ἑλατίνης ἔσας ε'. ὕδα-
τος ἔσας ι'. μέλας, πρὸς σέμβαλε
λαπάθης τεθλασμένης οὐρίας
γ'. ὅγνη οὐρίαν ἀ. καὶ ἑσας ἡμέ-
ραν μία, ἔλυσον, εἴτα ἀπὸ πύσας
15 τὸ ἔλαιον, βάλε εἰς ἀγγεῖον παλα-
πύσμον, ἐπιδείξτε εὐπὸν ἐν κα-
λάμου, ἢ φοιάδον* ἀραιὰν, ἀνω-
θέν τε ἐπιδείξτε κυδώνια μέλα καὶ
σπικαλύνφας ἱματίοις, ἔασον ἡ-
μέρας ἱκανὰς ἕως ἂν ἐπασπασ-
20 ται τὸ ἀπὸ τῶν μέλων δύναμιν τὸ
ἔλαιον. εἴνοι δὲ τὰ μέλα σπικαλύν-
λοντες ἱματίοις ἐπὶ ἡμέρας ἵνα
συνέχῃ καὶ μὴ διαπνέῃ ἢ ἐνω-
δία, καὶ ταῦτα ἀποβέχῃσι τῷ
ἐλαίῳ ἡμέρας β' καὶ γύκτας· εἴτα
25 ἐξίπνωσαντες ἀποπίνον. Διωά-
μιν δὲ ἔχει σπικινῶν, ψυκτικῶν
ποτῶν πρὸς τὰ ψωρόδη ἔλκη καὶ
πίτυρα, χυμὴ λαγυρπίας, καὶ πρὸς
ταὶς ἐν ὕστερα ἐλκυσίσι γυγυμα-
πίζόμενον, οὗ ἐξ τε ἡμεδισμένηα
τέλλει

Elatinum. Cap. LV.

Fracta elate tufa & scarifica-
ta, in labellū deiicitur: ompha-
cinū oleum triduo infunditur,
mox per sportulā exprimitur:
verūm pares esse debēt vtriuf-
que portiones, dein mūdo va-
se ad vsus reconditur. Viribus
rosaceo pportione respōdet:
aluūm tamen non mollit.

Melinum. Cap. LVI.

Melinum hoc modo tēpe-
ratur: Olei congius decē aquae
sextariis admiscetur. Adciuitur
elatae palmarum fracta qua-
drans, & iunci odorati vncia:
quae die vno macerata coquū-
tur, mox in vas oris patuli oleū
excolatur, & indita arundina-
cea crate, aut vetusta tegete,
cotonea mala superponuntur,
& vestimentis operta tantisper
inibi resident, dum malorū vi-
res ad se oleum alliciat. Aliqui
cotonea, decem dierum spa-
tio operimentis inuoluunt, vt
contineat odoris suauitas, nec
euanescat: postea biduo mace-
rata oleo exprimūtur, oleumq;
recōditur. Id vim refrigerato-
riam & astringentē habet. Cō-
tra scabiosa vlcera & quae ser-
punt, ac furfures, perniciūlōf-
que effectū praebet: exulceratis
vulūis infunditur, citatā vrinā
sistit

DIOSCORIDIS

fistit infusum, sudores cohi-
bet, contra cantharidas, bu-
presium, pinorum erucas, bi-
bitur. Laudatur maximè quod
cotonea mala olet.

OEnanthini compositio.

Cap. LVII.

OEnanthe è labrusca, opti-
mè olens postquam emarcuit,
deiecta in omphacinū oleum
mouetur, voluiturque: & cum
biduo manserit, exprimitur, &
reconditur. Astringit, proxi-
mum rosaceo effectum præ-
bens: sed alium non resoluit,
aut mollit. Probatissimum est,
quod odore cœnâthen refert.

Telini componendi ra-

tio. Cap. LVIII.

Fœnigræci libræ quinque,
calami libræ vna, cypiri libræ
duæ, olei libris nouem, septe-
nis diebus macerantur, quo-
tidie ter mouetur, postea pre-
muntur, & reponuntur. Aliqui
pro calamo cardamomū sub-
stituūt, & cypiri loco xylobal-
samum macerât. Alij oleo an-
tea his odoribus spissato fœ-
nigræcum macerantes expri-
munt. Hoc telinum abscessus
emollit, & concoquit, omni-
bus vuluarum duritiis magno-
pere cōuenit. fœminis difficilè
pariëtibus subiciit, vbi præ ex-
cretis

ἐλλει ἐγκλιζόμενον, καὶ ἰδρωτὰς
ἐφίστησι, πίνεται δὲ καὶ παρὰ κα-
θαρίδας, βουφρήσεις,* πτυο-
καμπύλου. ἐστὶ δὲ αὐτῆς δόκιμον τὸ
κεδωνίον ὄζον μύλον.

Πρὶ Οἰνανθίνου σκευα-
σίας. Κεφ. νζ'.

Οἰανθίνου πλὴν ἐν σαφελῆς
ἐυώδην μαράνας, βάλε εἰς ὀμφά-
κινον ἑλαιον, καὶ κίλει ματαστρέ-
φον, ἑτάσας δὲ ἡμέρας δύο, ἐξίπνῃ,
καὶ ἀποτίθῃς. Διψάμην δὲ ἔχει 10
κυπρίνου, ἀνακαλύψαν τῇ σῆ βό-
διν, ἐκ τῆς σῆ πλὴν κοιλίαν λύσει
καὶ μαλαώσῃ. καὶ τότε δὲ ὅτε
δοκιμώτατον, τὸ ἐμφανέον ἐν τῇ
ἐσμῇ πλὴν οἰανθίνου.

Περὶ Τηλίνου σκευασίας.

Κεφ. νη'.

Τήλειος λίβρας ἑ. ἑλαίου λίβρας
θ'. καλὰ μὲν λίβαν ἁ. κυπεύρε λί-
βρας β'. ἀποβρεχέ τῷ ἑλαίῳ ἐπὶ
ἡμέρας ζ'. κινὸν ἐκείνης ἡμέρας
τεῖς· εἴτα ἐξίπνῃ καὶ ἀποτίθῃς. 20
οἱ δὲ, ἀντὶ μὲν καλὰ μου καρδὰ-
μων, ἀντὶ δὲ τῆς κυπεύρε, ἐυ-
λοβήλατον συναπτερέχουσιν. οἱ
δὲ, παρὰ σφύρας τὸ ἑλαιον τούτοις,
καὶ μετὰ ταῦτα πλὴν πῆλην ἀπο-
βρέχοντες ἐξίπνῃσι. Διψάμην 25
δὲ ἔχει μαλακτικῶν ἀποσημά-
των, κυπρίνου. μέλινον δὲ ἀρμό-
ζει τοῖς σπλὴν μύτην παῖσι σκλη-
ρώμασι. δυσκοῦσται τὸ ἐγγυ-
ματῆς ἐπιθεῖν κατὰ ξηρὰ
τὰ σπλὴν

cretis

τα ἀπὸ τῶν τόποις ῥηήτων, περ-
 ειμισθέντων τῶν ὑγρῶν, πρὸς τὴν
 ταῖς ἐν δακτυλίων φλέγμασι, καὶ
 ἐκκλίσσεται ἐπὶ τῶν τεινεσμένων
 ὀφθαλμοῖς, πίπτει τε καὶ ἀχρ-
 5 ρας σπένχει, καὶ πρὸς κατακρύ-
 μματα καὶ χύματα ποιεῖ μετὰ κη-
 ρεῦ, σπένχει τε ἐφ' ὀφθαλμοῖς καὶ
 εἰς σιελώματα μίγνυται. ἐκλέ-
 γου δὲ τὸ πρὸς ὄφθαλμον καὶ μὴ λίαν
 παρεμφανέον τιμὴν τῆς πύλης ὁ-
 10 σμίν, σπένχον ταῖς χεῖρας, γλυ-
 κύπκρον ἐν τῇ γούσει, τὸ γὰρ τι-
 οῦτον ἐλάττωσιν.

Πρὶ Σαμψυχίνου σκευα-
 σίας. Κεφ. νδ'.

Ερπύλην, χαλκίαν, ἀβροτὸν, σι-
 15 συμβρίαν ἀνθους, μυρσίνης, πετ-
 λων σαμψυχίνου, ἐκείνου λαμβάνων
 σοχαμίδ, πρὸς τὴν ἐκείνου αὐτῶν
 δυνάμειν ἀποβλέπων, κόπτει ἐν
 τῷ αὐτῷ πύλα, καὶ ἐπὶ χεῖ ἐλαίου
 ὀμφακίνου πρὸς τὸν, ὡς τε μὴ χα-
 20 τακράτῃσι τὴν δυνάμειν τὴν ἐν αὐ-
 τῷ βρεχρῶν, καὶ ἔασον ἡμέρας
 τέσσαρας καὶ ἐκθλίβει, καὶ πάλιν τὸ
 αὐτὸ πύλατος τὴν αὐτῶν πρὸς ὄφθα-
 λμῶν, ἀπὸ βρεχρῶν τὴν ἴσον χεῖνον, καὶ
 ἐξίπταται γὰρ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ. ἐκλέ-

25 γου δὲ τὸ μέλαν χλωρὸν τῇ χεῖρα
 σαμψυχίνου, ἐπὶ πύλατος ὅσον, μετρί-
 ως δ' ὀφθαλμῷ. Δυνάμειν ὅς ἐστι δερ-
 μαντικὴν, λεπτὴν πικρὴν, δριμύτην,
 ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς μύσιν καὶ δια-
 στροφῶν ὑστέρας, ἐμμητὶς τε καὶ ἐμ-
 βρυα

cretis humoribus loci siccita-
 tem cōtraxerunt, sedis inflam-
 mationes lenit, tenesmo subdi-
 tum prodest, vlcera capitis ma-
 nātia furfuresq; expurgat, am-
 bustis, & permonibus addita
 cera proficit, vitia cutis in facie
 emēdat, pigmētis ad cōcilian-
 dum faciei nitore inferit. Eligi
 oportet recens, quod nō vhe-
 menter fœnigraci odorē præ-
 se ferat, & manus abstergat, fa-
 pore ex dulci in amarū incli-
 nato: tale enī optimū iudicat.

Sampsuchini cōpositio

Cap. LIX.

Serpilli, cassiæ, abrotoni, flo-
 rum silymbrij, frondiū myrti,
 sampsuchi singulæ portiones,
 quadā pro viribus ipsorū con-
 iectatione, vnā tundunt, atque
 is omphacini olei modus adij-
 citur, qui madentium vires nō
 euincat: hæc post quatrimum
 exprimūtur. Denuo noua alia,
 simili mēsurā, & equali tēporē
 macerata p̄mūtur: ita enī vali-
 dius reddi solet. Eligi oportet
 sampsuchū colore ex atro vi-
 ridi, plurimum redolēs, medio-
 criter acris. Vim habet acrem,
 calfactoriā, extenuātem, ad-
 uersus vuluæ præclusiones cō-
 uersionesque efficax est, mēses
 & secundas & partus extrahit,
 d vuluæ

DIOSCORIDIS

vulvæ strangulatus recreat, lū-
borum inguinūque dolores
lenit : sed cum melle vti eo
præstat, quandoquidem vehe-
mentū aftrictione locos indu-
rat. Lasisitudines illitum dif-
cutit, in opisthotonicorum,
vulforūq; cataplasmata vti-
lissimè additur.

Ocimini compositio.

Cap. LX.

Ocimum oleum fit vt cy-
prinum : Ocimi folia decer-
pta librarum vndecim, & bef-
sis pondo, die noctūque vi-
ginti olei libris macerato, pre-
mito, colato : cūmque exhau-
seris quallum, rursus parem o-
lei modum fundito, & expri-
mito. Vocatur autem id se-
cundarium: nam tertiæ perfu-
sionis non est capax. Deinde
recens ocimum æquali pon-
dere, vt in rosaceo diximus,
rursus maceratur, & cūm tan-
to temporis spatio maduerit,
exprimitur, & oleum recun-
diatur. quod si in animo fue-
rit ter aut quater madeface-
re, semper ocimum recens ad-
des. Potest ex omphacino cō-
fici: sed illo modo melius.

Idem quod sampfuchi-
num potest, sed
inefficacius.

Abroto-

βρυά επ' αὐτῷ, καὶ πίνος ὑπερβα-
ρύνει τὸ σπύριον καὶ βελώνων
ἀλγύματα παραινέει, συν μάλιστα
δὲ αὐτῷ χρῆσθαι βέλπον, ἐπεὶ τῇ
σποδρᾷ συνέεισιν αἰσχυρῶς τὸν τό-
πον, λύνει καὶ κύσας συγχύματα-
ς νογ, εἰς τε τὰ ἐπὶ τῷ ὀπισθοτονικῶν
καταπλάσματα, ἐπιτηδεύει μί-
γνυσι, καὶ τ' ἄλλως ποτομένων.

Πρὶ ὀκρινίου σκευα-
σας. Κεφ. ξ'.

Καλὸν ἐλαίου λίτρας ἑ. ὠ. 10
κιμῶ σαδμῶ λίτρας ἑ. οὐγγί-
ας ἡ. ἀποφυλλίσας, ἀπόβρεχε
νύκτα καὶ ἡμέραν ἐν τῷ ἐλαίῳ,
εἴτα ἐξίπτου καὶ ἀποτίθης σὺν
κενώσας δὲ τὰ ἀπὸ τῆς κυρτί-
δος, ἐπιχέει πάλιν τὸ ἴσον πλῆ-
θος τοῦ ἐλαίου καὶ ἐξίπτου. καλεῖ-
ται δὲ τὸ το δευτέραιον· τεύττω
γὰρ οὐκ ἐπιδέχεται βροχίῳ. εἴτα
περὶ σφατον ὀκρινίου καλὸν ἴσον,
πάλιν ἀπόβρεχε ὡς ἐπὶ τοῦ ῥο-
δίνου εἴρηται, τὸ δὲ ἥδη ἀποβρε-
χε γὰρ ὀκρινίου ἐπιχέων καὶ ἐὼν τὴν
αὐτὴν χρῆσιν, ἐκδύσει καὶ ἀπο-
τίθης. καὶ γὰρ τῆς δὲ ἡ τετάρτης
δύσεως, ἀπόβρεχε, περὶ σφατον
αἰεὶ ὀκρινίου ἐμβάλλων. διδά-
ται δὲ καὶ ἐκ τοῦ ὀμφακί-
νου σκευάζειν βέλπον δὲ
ἐκείνως. διδάται δὲ
τὰ αὐτὰ τῷ συμ-
μυχνῶ ἐλαπτῶν
ἐν βρωμῇ.

Πρὶ

Πρὶ Ἀβροτονίνου σκευα-

σίας. Κεφ. ξδ'.

Ἀβροτόνιον ἐκ τῶ εἰς τὸ κύ-
πριον ἡρώματισμένον ἐλαγγελίβας
β'. οὐγγίας ε'. Ἀβροτόνιον φύλλων λί-
βας ἡ. ἐμβλαλὼν καὶ ἀποβρέξας,
νύκτα καὶ ἡμέραν ἐξίπνου. πολυ-
χρόνιον δ' εἰ βέλῃ ποιῆσαι, ἐμβλα-
λὼν τὰ περὶ τὰ φύλλα, ἐμβλαλε
ἑτέρα φύλλα, καὶ ἐναποβρέχων
ἐκπέζει. Διούαμιν δὲ ἔχει θερ-
μὰ πικρὰ, ποιοῦσαν πρὸς τὰς ἐν-
τέρας, μύσεις καὶ σκληρίας, ὄζον
ἐμμύλω καὶ δεύτερα.

Πρὶ Ἀνθήνης σκευα-

σίας. Κεφ. ξε'.

Ελαίου λίβας ἡ. οὐγγίας* θ'.
ἀνθήνου αὐτοῦ λίβας ια'. οὐγγίας
ἡ. ἐναποβρέχῃ τῷ ἐλαίῳ ἡμέ-
ραν ἅ' εἴτα ἐκπέζει τὰς χερεὶ
καὶ ἀποπίπτει. ἐὰν δὲ θέλῃς διὰ
βροχὴν ποιῆσαι, περὶ σπῆλον ἀνθή-
νης ὡς αὐτῷ ἀποβρέχῃ. δύ-
ναται δὲ μαλάσσειν τὰ πρὸς μύ-
σησιν καὶ ἀταξιομυῖν, ἀρμόζον
πρὸς τὰ πρὸς διὰ τὴν θερμότη-
τον καὶ κόποις λυόν, καὶ ἀλγύμα-
τα ἀρθρῶν ὠφελού.

Περὶ Σοισήνου σκευα-

σίας. Κεφ. ξζ'.

Τὸ δὲ σούσινον, ὃ ἔριον
κρίνιον καλοῦσιν, οὕτω σκευ-
άζεται. ἐλαίου λίβας θ'. οὐγ-
γίας ε'. χαλάμου λίβας ε'. οὐγ-
γίας γ'. σμύρνης οὐγγίας ε'.
φουδάσας

Abrotonini compositio.

Cap. LXI.

Olei cyprini odoribus im-
buti libris nouem & quincun-
ce, foliorum abrotoni libras
octo die noctūque madefa-
ctas, premito. Quod si in lon-
gum tempus oleum velis as-
feruari, eiectis prioribus foliis
noua appones, & macerata
exprimes. Calfacit, ad vuluæ
duritias præclusionēsque effi-
cax est, menstrua & secundas
pellit.

Anethini compositio.

Cap. LXII.

Olei libris octo & dodrātē,
florū anethi libras vndecim &
besslem, maceratas in oleo die
vna, manibus premito & recō-
dito. Quod si iterū perfunderē
velis, recētes anethi flores cōsi-
militer madefacito. Vuluarum
duritias emollit, venarū spiracu-
la laxat, cōtra horrores febriū
circuitu redeūtes auxiliat: calfa-
cit enī, & lassitudines discutit:
prodest articulorū doloribus:

Susinum.

Cap. LXIII.

Susinum, quod alij liliū
appellant, sic temperatur: Olei
libræ nouem cum quincunce,
calami libræ quinque & qua-
drans, myrrhæ vnciæ quinque,
permixto

d ij

permixto

DIOSCORIDIS

permixto odorifero vino decoquuntur & colato oleo, cardamomi tufi & coeleſti aqua madefacti libræ tres, & ſemis macerantur, premunturque, tres libræ cum ſemiſſe ſpillati olei aſſumuntur, mille lilia decerptis foliis, in latū, non tamē profundum, labellum demittuntur: iniectum oleum, manibus melle peructis agitur: die noctūque conquieſcunt, & in pyxidem matutinis exprimuntur, quod defluet oleū, protinus ab aqua, quæ ſimul expreſſa fuerat, coloſcerni oportet: (nō enim, ut roſaceum, moram tolerat: nam concalfactum fernet & cōputreſcit: quare ſæpius decapulandum) vaſa melle illinenda tenuis ſal inſpargendus, & ſi qua ſordes vaſis faucibus hæſit, eximenda. Odoramenti iam expreſſis ex quaſillo in labellum trāſfuſis, ruſſum olei prius odoribus imbuendi, quod primum pondus æquet, & cardamomi tufi drachmæ decem conijciuntur. Hæc manibus ſcitē preſſa interiecta breui mora exprimuntur: quod profluat, repurgatur. Tertio eadē inſunditur, adiecto cardamomo, & ſale, & manibus melle madefactis.

Longē

φυεῖς οὖν ἐν ὕδατι, ἐλβε, εἴτα ἀποθήσους τὸ ἔλαιον, ἀπὸ χειρὸς καρδαμόμου κεκομμένον, & βεβρεγμένον ὑδατι ὁμβεῖν λίβας γ' ἐλίβας δ' ἑκάστος βραχύναι, ἀπὸ θλίβης, & λαβὼν ἐν τῷ ἐστυμμένῳ ἐλαίῳ τρεῖς ἢ ἑμισυ λίβας, κρήνη ἀφ' ἧς μὲν γάλα, ἀποφύλλιστος, δὲς ἐν λεπτῇ πλατῇ, μὴ βαθεῖ ὅπερ χέας τὸ τὸ ἔλαιον, ἀνακίψει τὰς χερσὶ μάλιστα κεχρησμένους ἑκάστος δὲ ἡμέραν μίαν καὶ νύκτα, περὶ 10 ἐνελόμβρος εἰς πυξίδα ἐξίπται, τὸ δὲ φρόνιδρον ἀπὸ δεινῆς ἀπὸ τοῦ συνεκθλιθέντος ὑδατος τῷ ἐλαίῳ ἢ τῷ ὑπομόρῳ ὡς τὸ ῥόδιον, συνδερεμανόμβρον δὲ ἀναζεῖν ἢ σῦπερ, μετὰ γριζέ δὲ πολλὰ 15 καὶ εἰς ἑτέρας ἀγγεῖα μέλιτι κατακεχρησμένα περὶ σπασσάντων ἄλλα λεπτὸν, ἢ τιμὴν συλλεγομένου ἀκαθαρσίαν ὀπμιελῶς ἀφαιρῶν, μετακαθάρας ὅσον κρηλίδος τὸ ἐξίπτωδεν ἄρωμα εἰς τὸ λεπτέον, 20 πάλιν ὀπίχει τὸ ἡρώμα ποτιμένου ἐλαίου τὸ ἴσον πληθὺς τῷ περὶ τῶν καὶ καρδαμόμου κεκομμένου συνέμβαλλε ὁλκὰς ἰ. & ἀνακίπτει τὰς χερσὶ μάλιστα χερσὶ, ἢ ὀπρὸν μικρόν, ἐξίπτει, τὸ ἀποφύρον ἀποκαθαίρων. καὶ τρίτον ἐπιχέας πάλιν τὸ αὐτὸ πικρὸν περὶ 25 ἐπεμείλλων, & τὸ καρδαμόμον καὶ τὸς ἄλλας ὁμοίας, καὶ τὰς χεῖρας βρέχων τῷ μέλιτι θλίβων. καὶ

5 καὶ ἐστὶν τὸ μὲν πρῶτον ἐκπιεῖν
 ἀριστον ἐγχύμαρον ὃ τὸ ἐξ ἡσ. τεύτον
 ὃ τὸ τελευταῖον. καὶ πάλιν λαβὼν
 χυλὴν κρίνα καὶ ἀποφυλίσας διὰ
 10 τῆς καὶ ἐπιχέας τὸ πρῶτον ἐκπι-
 5 πὲν ὑβόδευε, τὰ αὐτὰ ποιῶν ὡς
 πρῶτον ἐπὶ τῷ πρῶτῳ καρδία-
 μωμον παρὰ μύσων, εἴτα ἐξίππων,
 ποίῃ τὰ αὐτὰ καὶ ἐπὶ τῷ δευτέρῳ
 καὶ τρίτῳ ὡς εἴρη. πρὸς μεμβά-
 λων καὶ τὸ καρδιαμωμον εἴτα ἐξί-
 10 πων καὶ ποίῃ τὰ αὐτὰ ὁστικὸς δ' ἐν
 ἀποβέξῃ νεαρά κρίνα διωμι-
 κώτερον ἐξείς τὸ μύρον. ἐπὶ τέλει
 ὃ ὅταν αὐτὰ γὰρ ἐχέῃ σι δοκίμῃ,
 μύσγα ἐχέσῃ σκευασίαν σμύρνης
 15 χηστῆς < ὅς. χρόνος < ἰ. καρ-
 15 διαμωμον < ὅς. οἱ δὲ χρόνος καὶ κιν-
 ναμωμον τὸ ἴσον κόλως ἐμεβαλε
 εἰς τὸ λυτῆρα μὲν ὕδατος, καὶ ἐπι-
 χέας τὸ πρῶτον ἐκπιεῖν μύρον
 εἴτα ἑάσας μύρον, ἀναλαμβάνει
 εἰς αἰγεία μικρὰ ξηρὰ πρὸς κακλῷ
 20 σμένια κόμμι ἢ σμύρνη, καὶ χρόνον
 καὶ μέλιτι μὲν ὕδατος διεμύσας.
 τὰ δ' αὐτὰ ποίῃ καὶ ἐπὶ τῷ δευτέ-
 ρῳ ἐκπιεῖσθαι καὶ ἐπὶ τῷ τρίτῳ.
 ἔνιοι δὲ τὸ ἀπλοῦν ἐξ ἐλαίου βα-
 λανίνης καὶ κρίνης ἢ ἄλλης ἐλαίας σκευ-
 25 ἀξέσσι. δοκεῖ δ' ἀποβέξῃ τὸ ἐν φοι-
 νίκῃ, καὶ ἐν αἰγύπτῳ γινόμενον. ἀρι-
 στον δὲ αὐτὸ τὸ ὄζον κρίνον. Διὸ α
 μιν δὲ ἐχει τῆς μασητικῆς, μαλα-
 κτικῆς, ἀναστομωτικῆς, τῶν πρὸς
 μύρων μύσων καὶ φλεγμονῶν.

καὶ

Longe optimū erit, quod prius
 exprimitur: secundum quod se-
 quitur: tertium locum sibi ven-
 dicat, quod nouissimum pro-
 dit. Denuo in mille lilia euulsis
 foliis expressum primo oleum
 infunditur: tum eadem ratio-
 ne prosequendum, idemq; fa-
 ciendum, vt prius, addito carda-
 momo, dein expresso: & quod
 frequentius recentia lilia ma-
 ceraueris, eò validius vnguen-
 tum efficies. Denique cū factū
 abundè videbitur, singulis cō-
 positionibus miscere conuenit
 myrrhæ q̄ optimæ duas & se-
 ptuaginta drachmas, & croci
 decem, cardamomi quinq;, &
 septuaginta: croci verò & cin-
 namomi parēs portiones tun-
 duntur, & cribrate in lutrā cū
 aqua demittūtur, expressumq;
 primò vnguentum infunditur,
 & paulò post excipiūtur vascu-
 lis siccis, myrrha aut gūmi an-
 teā perfusis, & croco, melle &
 aqua madefactis. Eadē fiunt in
 altera aut tertia expressione.
 Aliqui simplex ex balanino, a-
 liōve oleo, & liliis componūt.
 Optimū esse cōstat in Phœni-
 ce, mox Ægypto factū. Sed cū
 primis laudat, qđ lilia redolet.
 Excalfacit, emollit, vuluæ præ-
 clusiones, et collectiōes aperit.
 d iij vtilissi-

DIOSCORIDIS

utilissimū ad muliebria mala:
vlcera in capite manātia, ferui
das eruptiōes, varos, furfurēsq;
emēdat: vibices cicatricēsq; ce
lerrimē ad colorē reducit, ita
vt sæpe fallāt. In summa exte
nuat, potū bilē per aluū extra
hit, vrinam ciet: sed stomacho
alienum est, & nauseam parit.

Narcissinum .

Cap. LXIII.

Narcissini olei spissamenta
ita fiūt: Sex librę aspalathi cum
sextate tūdunt, olei eloti librę
septuaginta cū vnciis quinque
assumūtur. Aspalath^o aqua ma
defact^o in tertia olei parte co
quit: quo exēpto, calam^o quin
que libris, & besse adiicitur, cū
myrrhæ gleba cōtundit, cribra
taq; ac vino veteri odorato i
mista, decoquitur: simul ac au
tem cū ijs efferbuerit, eximī:
refrigeratū oleū excolatur, cui
us portio in labellū mittitur,
flores narcissi quā plurimi cō
ijciūtur: qui bidui spatio (vt in
fusino dictū est) permoti expri
munt. Oleū subinde decapulā
dum, siquidē celerrimē putredi
nem sentit. Valet hoc ad emoli
endas vuluæ duritias, p̄clusio
nēsque: sed capitis dolores facit.

Crocinum. Cap. LXV.

Cū crocinū cōponere voles,
prius

ἢ καὶ δόλις πάντων ἐστὶ χροιομα
πατον παρὲς τὰ γυναικεία· ἀρμό
ζει δὲ καὶ παρὲς ἀρχώρας, ἰονδοῖς, π
τυραῖ, ἐκζέματα, μώλωπας ἢ τα
χέως μελαγχολία καὶ ὁμοχρεῖς π
τε, καὶ καὶ δόλις ἐστὶν ἀρρωτικόν, ἀλλ
δὲ καὶ χολὴν καὶ κοιλίαν πνέοντων.
κινεῖ δὲ καὶ κρεσσιν. ἐστὶ δὲ καὶ κακο
σόμαχον, καὶ ναυτίας πνιπτικόν.

Πρὶς Narcissinum σκευα

σας. Κεφ. ξδʹ.

Ελασιν narcissinum σύφεται 10
οὕτως· ἐλαίου πεπλυμένου λί
τρης ὁ. οὐγγίας ἑ. ἀσπαλάθου
λίτρης σʹ. οὐγγίας βʹ. κόψας καὶ
βρέξας ὑδατι, τῷ πλείονι τῷ ἐ
λαίῳ μίξας, ἔψε. ἔπειτα ἐξελὼν
τὸν ἀσπάλαθον καλὰ μόνον βάλε 15
λίτρης ἑ. οὐγγίας ἡ. καὶ σμύρ
νης χόνδρον κόψας καὶ σίσις, φύ
ρασον οἶνον παλαιῷ ἐυώδει, καὶ
μίξας ἔψε· ὅταν δὲ καὶ μετὰ
τούτων ἀναζέσῃ, ἐξελὼν ἀπώθει
τὸ ἐλαῖον. Ἰνδὸν· ἔπειτα λαβὼν ἐν 20
τῷ ἐλαίῳ εἰς λουτήρα, ἀπὸ χει
καὶ τοῦ narcissi ὥς ὅτι πλεί
στον ἐμβάλε τὸ ἄνθος, ὅπῃ ἡμέ
ρας βʹ. κινῶν. ὥς ὅπῃ τὸ στυσί
νου, ἐξίπνου τὸ καὶ μετὰ γριζεῖ πυ
κνῶς, καὶ γὰρ τὸ το σήπεται. ποιεῖ 25
δὲ παρὲς τὰ ἐν ὑστέρα, μαλακῶσιν
ταῖς περὶ αὐτῶν σκληρίας καὶ μύ
σεις· ἐστὶ δὲ κεφαλαλγές.

Πρὶς crocinum σκευασίας. Κεφ. ξεʹ.

Κρόκινον δὲ σκευάζων, παρὰ στυ

ψει

- 45 ἴδ' ἐλασιν ὡς εἶρη) ἐπὶ τῷ σού
 νη, πληθὺς καὶ συσταθῆναι τῇ αὐτῇ
 λαβὼν) ἐκ τῶν συσχυμένων ἐλαίων εἰς
 τὸ σέσποννον λίβρας βρεῖς ἡμισὺ βάλει
 κρόκον < ἢ καὶ ἀνακίνη πολλὰ αἰς
 5 ἡμέρας, πειθὼν τὸ συνεχρῶς ἐπὶ
 ἡμέρας ἐπὶ τῇ) ἐκ τῇ ἀπόχει τοῦ ἐ-
 λαίου ἀπὸ τῷ κρόκῳ καθαίρει, ἴδ'
 δ' αὐτὸ κρόκον ἐπὶ γὰρ τὸ ἴσον πλη-
 θος τῶν ἐλαίων καὶ ἀνακίνη ἡμέρας
 15 ἴδ'. εἴη ἀποχρῶς ἀποσμήξον σμύρ-
 νης κεκομμένης καὶ σεσημένης <
 μὲν καὶ κίνη) ἐν ὅλῳ μω χροσμίμω, εἴ-
 τα ἀποθνήσκουσιν δὲ τὸ ἴσον εἰς κῆ-
 ρον ἢ ὕδατος ἰσχυρὸν ἐλαίου καὶ εἰς
 τὸ κρόκον χροσμίμω. ἐστὶ δ' αὐτὴ
 25 κρόκον, τὸ καὶ ἀκόρεος κρόκον πνέ-
 ον, ὁποῦ εἰς τὸ ἰατρικὸν χρῆσθαι ἀρμό-
 ζει. δευτέρον) τὸ τῇ σμύρνῃ πα-
 ρέρον. Διώσμιον) ἐκ τῆς θύματι-
 κῆς, ὑπνωτικῆς, ὅθεν πολλὰ αἰς ἐπὶ
 φρενιτικῶν ἀρμόζει καὶ ἀερεχόμε-
 νον, ἢ ἀποσφραγισμένον, ἢ καὶ αὐ-
 30 μωζωλῆων διαχρῶμενον) ἐστὶ καὶ
 πνοπιδόν, καὶ καθαριτικὸν ἐλκῶν, καὶ
 τοῦτο ἴδ' ἐν μύρῳ σκληρίας καὶ μύ-
 σος καὶ τὰ ἐν αὐτῇ κακοήθει, σμύ-
 κριν καὶ κρόκον καὶ μυελὸν καὶ ἐλαίον
 διαλαστούν. συμπεπνίξ) γὰρ καὶ μα-
 35 λάσας) καὶ ὑγρὰν καὶ τοῦ αὐτοῦ πο-
 τὴ καὶ τοῦτο ἴδ' ἀπολαυνόμενος μὲν ὅ-
 δατος ὑπαλφόμενος. ἀναλῶ) ἐστὶ
 αὐτὸ καὶ τὸ καθαίρων βυτίρνον καὶ
 ὀνύχινον, καὶ συστάμενον, τοῖς ὀνό-
 μασι μόνος διαφύροισι, τῇ μὲν ἰοί-
 σκευασία

prius olei, ut in fusino dixim⁹,
 spissamenta facies, eisdem po-
 deribus, & mensuris: cuius o-
 lei libras treis & semissem, cro-
 ci unciam unam assumes, idē-
 tidem quotidie moueto, & se-
 xta die, quān hoc assiduo p-
 egeris, oleum à croco colis
 incernito, eidem croco pa-
 rem olei modum adiiçito, mo-
 ue triduo, dein confusa myr-
 rhæ atque cribrata drachmas
 quadraginta permisceto, & in
 pila agitatum recondito. Ali-
 qui oleo aromatibus ad cy-
 prinum imbuto in crocini cō-
 positione vtuntur. Optimum
 est, quod abundè crocum spi-
 rat, in medendi vsu expeti-
 tum. Proximum, quod myr-
 rham refert. Calfacit, somnum
 allicit, quare persæpe phreni-
 ticus subuenit, perfusum, aut
 naribus admotum, aut illitum:
 pus mouet, vlcera purgat, con-
 tra vuluæ duritias atque præ-
 clusiones, & vlcera, quæ ca-
 coëthe vocantur, prodest cum
 croco, cera, medulla, duplicato
 olei pondere. Concoquit enī,
 emollit, humectat, & permul-
 cet: ad oculorū glaucitates ex
 aqua illinitur. Huic autē ppor-
 tione respōdēt butyrinū, ony-
 chinū & styracinum: quæ etſi
 d iiii nomi-

nominiſbus diſtant, viribus & compoſitione cognata ſunt.

Cyprini ſpiſſamentum.

Cap. LXVI.

Olei omphacini eloti pars vna, aquæ cœleſtis tantundem cum ſemiſſe, cui⁹ vna parte oleum diluitur, altera adiciēdis odoramentis admiſcetur: dein aſſumptis aſpalathi libris quin⁹, & ſemiſſe, calami libris ſex, & ſemiſſe, myrrhæ libra vna, cardamomi libris trib⁹, & do-drâte, olei libris nouem, & vni-cuiſ quinque. Aſpalathus tuſus, & aqua aſſuſus decoquitur in oleo donec conferueſcat, myr-rha autem vino vetere odori-fero ſubacta, contuſusq; ſimul calamus, digeruntur in offulas, quæ exempto aſpalatho immit-tūtur: & vbi efferbuerint, ſub-lato ahenò, oleum percolatur. Cardamomū tuſum reliqua a-qua aſperſum infundit, ſpatha agitatur, nulla, dū refrixerit, iter-pellatione. Poſt hæc collato o-leo, in viginti octo libras olei, floris liguſtri, qđ cyprū vocāt, ſex & quadraginta libræ cum beſſe inſtillant, q̄ ſufficiēter ma-defactæ per ſportulā exprimū-tur. Quod ſi copioſi⁹ deſidere-tur, idem recentium florū pō-dus iniectū ſimili modo p̄maſ.

&

σκευαſία καὶ τῇ δυναμίει ὅν-
τα παρόμοια.

Πρὶ Κυπρίνης ſπ̄ſματος καὶ
σκευαſίας ἐλαίου. Κεφ. ξς'.

Ελαίου ὀμφακίνου πεπλυν-
μένου μέρες ἅ, ὕδατος ὀμφακίου 5
μέρες ας'. τὸ μὲν ὀπ̄χει τῷ
ἐλαίῳ, τὸ δὲ φύρα συν τῷς ἑμ-
ελευθέρουσιν ἀρώμασιν. ἔπει-
τα λαβὼν ἀσπλάθου λίττας ἐς ἡ-
μισυ, καλάμου λίττας ε', ἡμισυ. 10
σμύρνης λίτταν δ. καρδαμώμου
λίττας γ'. οὐγγίαι δ. καὶ ἐλαίου
λίττας δ'. οὐγγίαις ἐς πέντε ἀσπά-
λαθον κόβας καὶ βρέξας ἐν ὕδα-
τι ἐμβάλων, ἔλε μετὰ τῷ ἐλαίῳ
ἕως ἂν σιναρεῖς, τὸ δὲ σμύρ- 15
ναν, δίδεις οἶνον παλαιὸν ἐνὸςδε
τὸν καλάμου κακομύθου συν
ἀνατύρα μετὰ τῆς σμύρνης, καὶ
ἐξελὼν πέντε ἀσπλάθου, ἐμβα-
λε τὸ φύραμα. τὸ καλάμου. δ-
ταν δὲ μετὰ τοῦτου ζέσῃ, καθε- 20
λὼν ἀπὸ θύσης τὸ χαλκοῦ τὸ ἐ-
λαιον. καὶ κατὰ τὴν καρ-
δαμώμου κεκομμένον καὶ πεφυ-
ρα μὲν τῷ λοιπῷ ὕδατι, καὶ κίνη
σπείθῃ, ἕως ἂν ἡμὶν μὴ διαλει-
πων. εἰς ἀπὸ θύσης τὸ ἐλαιον, ἐμ- 25
βαλε εἰς τὰς κή. τὸ ἐλαίου λίβας
αὐθις κνυαίρας λίβας μς'. οὐγγίαις
ἡ. ἐάτους τὸ ἀποβραχυῖαι, ἐξίπω-
σον διὰ συρίδος. ἐάν δὲ πλείω
δέηται, τὸ νεαρὸν αὐθις τὸ ἴσον
ἐμβάλων πλείους ὁμοίως ἐξίπνῃ.
ἔλεγ.

ἴδιον τε δίστορον· ἐάν τε πείθορον
 βούλη ποιῇν· διωαμικώτερον γὰρ
 γίνεται. ἐκλέγεσθαι δὲ δεῖ τὸ ῥη-
 σὸν καὶ μετ' ἐνωδίας πλεμπικόν.
 ἔνιοι δὲ καὶ κιννάμωμον μίσχου-
 σι. Διῶαμιν δὲ ἔχει θερμανπι-
 κλὺν, μαλακτικλὺν, ἀντισωπι-
 κλὺν, ἀρμόζονταν τοῖς πλεμ-
 τισιν καὶ γένεσσι πάσας, καὶ πλε-
 ειπκοῖς καὶ χατάγμασι, καὶ ἐ-
 αὐτὸ καὶ κηρωτῇ μισγόμενον, μί-
 10 γνυται δὲ καὶ μαλάγμασι τοῖς ἀρ-
 μόζουσιν, ὁπισθοτονικοῖς συναγ-
 χκοῖς, βουβώνων φλεγμονῇ, καὶ
 ἀκόποις.

Περὶ Σπύλας Ἰρίνου.

Κεφ. ξζ.

15 Σπάθης λίτρας ε'. οὐγγίας
 ἡ. ἐλαίου λίτρας ογ'. οὐγγίας ε'.
 κόψας ὡς λεπτότατα, μίξον ὕ-
 διατος κοτύλας ἡ. καὶ βαλὼν
 ἐς χαλκοῦν, ἔψε μέχρις αὐτοῦ
 20 πύθαι εἰς κρατῆρα μέλιτι χα-
 τακκρισμένον· ἐν τούτῳ τοῦ
 ἡρώματισμένου ἐλαίου, τὸ περ-
 τὸν ἴριον σκευάζεται, ἐναπο-
 βρεχυμένης τῇ ἐσυμμένῳ ἐλαίῳ
 ἵρεως ὡς ἀπογέγραπται, ἢ οὐ-
 25 τως· ἐλαίου λίτρας ὁ. οὐγγί-
 ας ε'. ξυλοβαλσάμου λίτρας ε'.
 οὐγγίας β'. κόψας ὡς εἴρηται,
 συνέψε· εἴτα ἐξελὼν τὸ ξυλο-
 βάλσαμον, περσέμεθαλε κα-
 λάμου κεκομμένου λίτρας θ'.
 οὐγγίας

& iterū aut tertiū si quis velit
 madefacere poterit, & ita red-
 detur efficacius. Eligi oportet
 bonum, quod cum odoris sua-
 uitate nares feriat. Aliqui cin-
 namomum addunt. Calfacit,
 emollit, ora venarum adape-
 rit, vulvæ neruorumque vi-
 tiis conuenit, pleuriticis, fra-
 ctisque per se vel cerato im-
 mistum: malagmatis imponi so-
 let, quæ opisthotonicis, angina
 laborantibus, inflammationis;
 inguinum opitulatur: item in
 acopa adiicitur.

Irini spissamentum.

Cap. LXVII.

Spathæ quàm minutissimè
 confusæ sex libras cum besse,
 in tribus & septuaginta libris,
 & quincunce olei, æreo va-
 se, additis decem aquæ hemi-
 nis incoquito, quoad odorem
 acceperit: postea in capulam
 melle oblitam colato: ex eo
 aromatibus imbuto oleo, iri-
 num primò temperatur, irine
 ex oleo inspissato macerata,
 vt scripsimus. Sed alia est com-
 ponendi ratio: In olei septua-
 ginta libris & quincunce, xy-
 lobalsami (vt dictum est) con-
 tufi, libras quinque & sextan-
 tem excoquito, postea detra-
 cto xylobalsamo nouè libras,
 &

DIOSCORIDIS

& dextantem adicio, & myr-
 rhæ glebam vetere vino odo-
 rato perfusam, & in olei ita o-
 donibus imbuti quatuordecim
 libris, totidem tuskæ iridis, binis
 diebus ac noctibus madefacio,
 strenuè & vehementer di-
 stringito. Quod si vis validius
 fieri, par pondus iterum ac ter-
 tio similiter maceratum expri-
 mito. Lōgè optimum est quod
 solā irin olet, quale est in Per-
 ga Pamphiliæ, & Elide Achaia
 natum. Vim habet calfacto-
 riam atque emolientem, cru-
 stas adimit, sordida vlcera &
 putrida purgat, confert foe-
 minis vuluæ causariis. Item in-
 flammationibus eiusdem at-
 que præclusionibus, partus e-
 iicit, hæmorrhoidas recludit,
 contra aurium sonitus ex ace-
 to, ruta & amaris nucibus, pro-
 dest: diuturnis destillationi-
 bus, naribus illitum, & con-
 tra graueolentia earum vlce-
 ra, quas ozænas vocant, au-
 xiliatur: aluum purgat cyathus
 epotus, facit ad ilei cruciatus,
 vrinam mouet, difficileis vo-
 mitiones adiunat, peructis eo
 digitis & immisisis, vel iis quæ
 ad vomitum ciendum indun-
 tur: anginae etiam illinitur, aut
 ex aqua mulsa gargarizatur:
 item

οὐγγίης ἰ. σιμύνης ῥόνδρον οἶνον
 παλαιὸν ἐμβρέχων ἐνύδα· εἴτα
 λαβὼν ἐν τῷ ἐστυμένῳ ἐλαίου
 καὶ ἡρωμαπομένου λίτρας ἰδ'. ἐν-
 ατὼρεχε, ἱρεως κοκομμένης ἴσον
 τῷ σαθμῷ, ἐὼν ἡμέρας β'. καὶ
 ῥύκτας β'. εἴτα ἐξίπτου βίαιως καὶ
 νεανικῶς. καὶ εἰ βούλῃ διωαιμι-
 κώτερον εἶναι, τὸν ἴσον σαθμὸν
 καὶ δις καὶ τρίς ὁμοίως ἐναπο-
 βρέχων ἐξίπτου. κέρησεν δ' ὑπάρ-
 χει τὸ ἐν ὁσφρήσει μηδενὸς ἄλλου, 10
 μόνως δὲ τῆς ἑλιδος ποιοῦν. τὸ δὲ
 τὸν δὲ ὅτι τὸ ἐν πύρρῃ τῆς παμ-
 φυλίας, καὶ ἐν ἡλιδι τῆς ἀχαιίας
 γηγνάμνον. Διωαμιν δ' ἔχει μα-
 λακπικὴν, δερματικὴν, ἐχάρας
 τὴ καὶ σπινθόνας καὶ ῥυπαρίας 15
 ἀνακαθαίρει, καὶ ταῖς περὶ μύ-
 ταν διαδέσσει ἀρμόζει, φλεγ-
 μοναῖς τε καὶ μύσσει, ἐμβρύ-
 α τε ἐκβάλλει, καὶ αἰμορροΐδας
 ἀνασφίγγει, περὶ τὴν ἡγίαν ὥτων
 σὺν ὅξει καὶ πηλῷ καὶ σικκροῖς 20
 ἀμυδαλοῖς, καὶ περὶς κατάρ-
 ροις χρυσίζοντα, διαχειρομύων
 τῶν μυζωπύρων, καὶ περὶς ὀζά-
 νας· καθαίρει δὲ καὶ τὴν κοιλίαν,
 καὶ τοῦ πλῆθους ποσὸν ποιεῖ καὶ
 περὶς εἰλεώδη, κινεῖ καὶ οὔρεα. 25
 καὶ ἐπὶ τῶν δυσχερῶς ἐμειώτων,
 διαχειρομύων τῶν δακτύλων, ἢ
 τῶν ἐμετνηίων, καὶ ἐπὶ σωμα-
 γαῖων διαχειρομύων ἢ ἀναγα-
 γαίζοντων σὺν μελιθεῖ τῷ.

καὶ

ἢ πρὸς τραχύτητα ἀπ' πλείας. δίδεται ἢ τοῖς κόνειον ἢ μύκητας ἢ κόριον πεπωκόσιν.

Περὶ Γλευκίνου σκευάσας. Κεφ. ξή.

Γλευκίνον δὲ σκευάζεται τὸ ἀπλοῦν ἔκ τε ἐλαίου ὀμφακίνου, καὶ ὀίνου, καὶ χαλάρμου, καὶ νάρδου καὶ πικρῆς, καὶ ἀπείδης, καὶ ἀσπαλάθου, καὶ μελιλέου, καὶ κόστου, καὶ γλεῦκος συμπέμπει μύρων τῶν σεμνῶν φύλλων τῶν ἔχοντι ἀγρίον τὰ ἀρώματα καὶ τὸν οἶνον, καὶ τὸ ἐλαίου. κινείται δὲ ἐπὶ ἡμέρας κ'. διὰ τῆς ἡμέρας, καὶ μετὰ ταῦτα ἐκπεδν, ὅπου πίπτει. Διῶκται δὲ ἔχει θερμαντικὴν, μαλακτικὴν, ἀντιπικρὴν ποιοῦσαν πρὸς τὰ βίγια καὶ τὰ νεύρα πάσῃ, καὶ τὰ ἐν ὕεσσι παντὸς δὲ ἀκόπου μάλιστον ὁφθαλμομαλακτικὸν ὄν.

Περὶ Αμαρακίνου. Κεφ. ξβ'.

Αμαρακίνον δὲ ἐν κυζίκῳ χαλάρωσιν γίνεται σκευάζεται δὲ διὰ τὸ ὀμφακίνου ἐλαίου καὶ βελανίνης συμπωμένων ξυλοβαλσάμου, * ὀίνου, χαλάρμου, ἡδυομύρων δὲ, ἀμαράκων, κόστου, ἀμύμου, νάρδου, καρποβαλσάμου καὶ σμύρνης. οἷ δὲ πολυτελέστερον αὐτὸ ποιῶνται, μίσθωσι καὶ κινάμωνον. παρὰ λαμβάνεται δὲ μέλι καὶ οἶνος εἰς τὴν τῶν ἀγρίων χεῖρσιν καὶ φύεσιν τῶν κεκομμένων ἔρωμάτων, ἔστι δὲ θερμαντικόν, χαλάρω-

item cōtra arteriæ scabritiem, datur etiam iis qui cicutā, cōriandrum, aut venena fungorum hauerunt.

Gleucinum. Cap. LXVIII.

Gleucinum absolutè constat omphacino oleo, iunco odorato, calamo, celtica nardo, spatha, aspalatho, ferula campana, costo, & multo: circumdatis interim vinaceis vasi, quod aromata, vinum & oleum cōceperat. Tricenis diebus, his in die mouetur postea expressum oleū reconditur. Calfacit, emollit, remittit: horribus & nervorum vuluæque vitiiis auxiliatur. omni acopo iuuatius: quippe quod emolliat.

Amaracinum.

Cap. LXIX.

Amaracinum longè optimū in Cyzico fieri solet ex omphacino & balanino, spissamentis è xylobalsamo, iūco odorato, & calamo factis, conditisq; amaraci, costi, amomi, nardi, cassiæ, carpo balsami & myrrhæ odorib⁹. Aliqui, quod preciosius fiat, cinnamomum addūt. Mel autem & vinum assumuntur: hoc in vasorum illitione, illud ad cogendas tusorum aromatum offas. Amaracinū calfacit, sopor-

DIOSCORIDIS

foporem mouet, venarū spiracula aperit, emollit, feruorem excitat, vrinam cit, putrilaginibus ac fistulis per quā vtile: nec non humentibus herniis, postquam medica manus operam suam impenderit, crustas, & tetra vlcera, quæ theriomata vocant, rumpit: difficili vrinæ, illita sede, & eius inflammationibus auxiliatur: hæmorrhoidas illitu soluit, vuluæ subditum menstruos cursus euocat, duritias ac vuluæ tumores discutit, vulneratis nervis, & musculis confert, lano centunculo modicè madefactum & impositum.

Megalinū. Cap. LXX.

Factitabatur olim megalinū, sed nunc compositio exoleuit & prorsus obliterata est. Cuius ad historiæ complementū meminisse non fuit alienum. Misturā cum amaracino eadem erat, sed refina exuperabat, hac tantum ratione differens. Quare leuiter emollit. Refina vnguentis, neque tutelæ neque voluptatis gratia adiicitur, sed coloris crassamentiq; causa. Ea tantisper coquitur, dum definat olere: cuius coquendæ ratio declarabitur, dum de refina differemus.

Hedy-

καρωπικόν, ἀνασφωμικόν, μαλακτικόν, πυρεωτικόν, ουρητικόν, ἐν ρηξιστῶν εἰς τε τὰς σπάσας καὶ σπείγας, καὶ ὑδρεκνήλας μετὰ τὰς χειρουργίας περιβήσκει τε τὰς ἐσχάρας καὶ τὰ τεθνηκυῖα ἔλκει. πρὸς τε δυσουρίαν ἀρμόζει πειριχόμενου τοῦ δακτύλου· καὶ πρὸς τὰς φλεγμονὰς αὐτοῦ, καὶ πρὸς αἰμορροΐδων ἀναστόμωσιν περιχέμενον. ἐμυλῶν τε κινεῖ πρὸς τὸν δέμνον τῇ μήτρεσσι, σκληρίας καὶ οἰδήματα ἐν ὑστέρι διαφορεῖ, καὶ πρὸς τὰ νευρῶστα καὶ μυρῶστα, συμφέρει ἐν πικνύμασιν ἀραιῶς βρεχέμενον καὶ ἐπιτρίβεμενον.

Περὶ μεγαλείου. Κεφ. δ.
Τὸ δὲ μεγαλεῖον χαλοῦμενον, πάλαι μὲν ποτὲ ἐσκευάζετο, ἐκλέλοιπε δὲ νῦν. πρὸς ἐμπλήρωσιν δὲ τῆς ἰσοείας, οὐκ ἐστὶν ἄτοπον ἐπιμνησθῆναι, καὶ τοῦτου δὲ σκευασία ἢ αὐτὴ τῷ ἀμαρρακίνῳ, παλαιόταται δὲ τῇ ῥητίνῃ, καὶ ταύτῃ διαφέρει. ἔστι δὲ μαλακτικόν ἡπίως. ἢ μὲν περὶ τὴν μίγνυται τοῖς μέρεσι, οὐτε σκληρῶς οὔτε ἰσορῶς χράειν, χρώματος δὲ καὶ πάχους ἐνεκα μίγνυται δὲ ἢ περιβιβῆναι ἀφελόμενον, ἄχρως αὖ ἄσπινος γίνεσθαι. διηλωθῆσθαι δὲ ἐν τοῖς πρὸ ῥητίνης ἢ ἑλκυσσῶς αὐτῆς.

Περὶ Ἡδύ-

Περὶ Ἡδύχρου. Κεφ. οά.

Καὶ τὸ καλὸν ἡδύχρον δὲ ἡδύχρον,
σκευάζοντον ὅ ἐν καὶ τῆς αὐτῆς.
ἔρχεται θυμὸς μέσος τε καὶ σκευασί-
ας τῶ ἀμαρακίνου, ἐνωδίσσεν
5 δὲ πυργαίει.

Περὶ Μετοπίου. Κεφ. οβ'.

Σκευάζεται καὶ ἐν αἰγυπτίῳ
μύρεν, ἐπιχρῶν ὑπ' αὐτῶν κα-
λὸν ἡδύχρον μετόπιον, διὰ τὴν τῆς
χαλβάνης μίξιν· τὸ γὰρ ξύλον ἐξ
10 οὗ γινώσκται ἡ χαλβάνη, μετό-
πιον καλεῖται. δι' αὐτοῦ δ' ἄλκων
δὲ σκευάζον καὶ ἐλάου ὀμφα-
κίνου καὶ καρδαμώμου, κρίνου
τὲ καὶ χαλβάνου καὶ μέλιτος καὶ
οἴνου καὶ σμύρνης καὶ βελανθίνου
15 καρποῦ καὶ χαλβάνης καὶ ῥη-
τίνης συντίθεται. δοκιμον δὲ
ὅτι τὸ βαρύσμιον καὶ λιπαρὸν
ἐμφαίνει μᾶλλον τοῦ καρδαμώ-
μου καὶ τῆς σμύρνης, ἢ τῶ τῆς
χαλβάνης. σφόδρα δὲ θερμαί-
20 νει καὶ πυρετὶ καὶ ἀναιμοσί, ἐ-
πισπᾶται τε καὶ καθαίρει ἐλ-
κμ'· πρὸς τὴν νεύρα καὶ μύας δια-
κοπύεται ποιεῖ, ὑδρικήας τε συν-
σπᾶται. μίγνυται δὲ καὶ μαλά-
γμασι καὶ κηρωταῖς. πρὸς τὴν ῥη-
25 γιν καὶ ὀπίσθο τοιμῶς σπομῶντος
χρησιμεῖ· κινεῖ δὲ καὶ ἰδρῶ-
τας, καὶ ἀναιμοσί τὰ πρὸς ὑπέ-
ραν, καὶ σκληρίας τὰς πρὸς ἀν-
τιπὺ χαλὰ καὶ κατὰ τοῦ μαλακτι-
κὴν ἔχει τὴν δύναμιν.

Περὶ Μεγ-

Hedychroum. Cap. LXXI.

Quod hedychroon vocant,
in Co fieri solet: eisdem præ-
ditum viribus & misturis, qui-
bus amaracinum, sed suavius
spirat.

Metopium. Cap. LXXII.

Fit in Ægypto vnguentum,
quod metopion patrio nomi-
ne appellatur, propter galbani
mitionem: nā lignum in quo
galbanū enascitur, metopion
vocāt. Cōstat amaris nucibus,
omphacino oleo, cardamomo
odorato iunco, calamo, melle,
vino, myrrha, balsami semine,
galbano & resina. Probat
pingue, graui odore, quod ma-
gis cardamomum & myrrhā,
quā galbanum respiciat. Cal-
facit vehementer, & adurit, at-
que extrahit, ora vera venarū
aperit, vlcera purgat, extrahit-
que: ad præcisos neruos, & mu-
sculos, ad hernias humore con-
tractas, cum erodentibus me-
dicamentis efficax est: ceratis &
malagmatis inferitur: horri-
bus, conuulsisq; præsertim qui-
bus ceruix in scapulas deiecta,
& retrorsum cōtracta est, uti-
le habetur: sudores ciet, vuluæ
spiracula recludit, & eiusdem
duritias laxat: in summa mol-
liendi naturam habet.

Men-

Mendesium. Cap. LXXIII.

Mendesium constat balanino oleo, myrrha, casia, & refina. Aliqui tamen post singulorum pondera, cinnamomi exigui addunt, nullo compendio: nam quæ simul excocta non fuere, vim nullam exhibent. Similem metopio vim obtinet, sed inferiorem multo.

Staete. Cap. LXXIII.

Staete vocatur pinguitudo recetis myrrhæ cū exigua aqua tuse, & organo expressæ. Ea per quam odorata, ac preciosa est: atq; vnguentū per se facit, quod staete nominatur. Maximè probatur, quæ nullā olei mistionē admittit, cuius minima portio cōpos est viriū plurimarū. Vim calfactoriā myrrhæ & calidis vnguentis respondentē habet.

Cinnamominū. Cap. LXXV.

Cinnamominum confit ē balanino oleo, & xylobalsami, calami, iunci odorati spissamentis, atque cinnamoni, & seminis balsamini suauitate conditur, quadruplāque myrrhæ ad cinnamomum portione, mel ad cogenda omnia adiicitur. Laudat nō acre, molli odore, planè myrrhā redolēs, crassum, odoratū, gustu perquā amaro.

Id

Περὶ Μενδεσίου. Κεφ. οζ'. 10

Καὶ τὸ μενδεσίον δὲ λεγόμενον, ἐκ τοῦ βελενίνου ἐλαίου καὶ σμύρνης καὶ κασσίας* καὶ ῥητίνης σκευάζεται. ἔνιοι δ' αὖ τὸν κατὰ σμυθμιστὸν, κιννάμωμον μικρὸν ὡς περὶ βάλανου σπινθ. ἀν' ὧφελ' ὥς οὐκ ἐκδίδωσι γὰρ τὰ μὴ συνεληλυθότα τῶν δυνάμεων. ἔμφερή δ' ἐστὶ τὴν ἐνέργειαν τῶ μετωπίῳ, ἢ πλεοναχὺς τοι.

Περὶ Στακτῆς. Κεφ. οδ'. 10

Στακτὴ δὲ λεγείται προσόδου σμύρνης τὸ λεπτὸν ἐν, κακομμένης μὲθ' ὕδατος ὀλίγης, ἀποτεθλημένης τοῦ δι' ὄργανου. ἐν ὧς τὴν ἴαν καὶ πολυτελὴς ἐστὶ καὶ χαλδ' ἔαν τὴν ὅταν μύρον τὸ χαλδ' αἰσθάνηται. δοκιμὸς δὲ ὅταν ἡ ἀμικρὸς ἐλαίου καὶ ἐν ἐλαγχάστῳ παλίστην δύναμιν κεκτημένη, οὗδ' ἐρμαυτικὴν, ἀναλοροῦσαν τῇ σμύρνῃ καὶ θερμαίνουσι τῶν μύρων.

Περὶ κιννάμωμου. Κεφ. οε'. 20

Κιννάμωμον δὲ ἐκ τῶ ἐλαίου, βαλανίνου καὶ συμμέκτων ξυλοβασάμου, χαλδ' αἰμου, ῥήνου, ἡδυσμάτων δὲ, κιννάμωμου, βελσάμου καὶ πύ, σμύρνης τετραπλάσιονος παρὰ τὸ κιννάμωμον σκευάζεται. μίγνυται δὲ καὶ μέλι εἰς τὴν φύλασιν. δοκιμὸν δὲ ὅταν τὸ δριμύ, μαλακὸν δὲ τῇ ὁσμῇ, καὶ περιεμφαίνον σμύρνης, παχὺ τε καὶ ἐν ὧδ' ὥς, ἄν καὶ τῇ γούσει πικρὸν. τὸ γὰρ

τὸ ᾧ ποιεῖται ἐν ἐκρήνῃς, ἀλλ' ἐν σμύρνης ἔχει τὸ πάχος· ἡ γὰρ ἐκρήνη οὐ πρὸς διδωσι πικρίαν, οὐ δὲ ἐνωδίαν. Δωάμιν δὲ ἔχει σφόδρα δριμύτιαν καὶ θριμυαντικὴν καὶ πικράν, ἀνὰ τοῖς τοῦ θριμυαντικῆς καὶ διαφορεῖ, καὶ διαχρεῖ, καὶ ἐπισπᾶται ὑγρὰ, καὶ πνεύματα· ἐστὶ δὲ καρδιακόν, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ πᾶσι μύτην (ὡς ἐλάϊον διπλαστοῖσι καὶ κηρῶ, καὶ μυδιῶ, ὅτε τὸ ἀπεβάλλῃ τὸ πολὺ τῆς δριμύτητος, καὶ γίνεται μαλακτικόν. ἄλλως γὰρ συγκρίει καὶ σκληρύνει βασιότατα πύκτων τὴν πάχυν μύρων. ποιεῖ καὶ πρὸς σύειρας καὶ σήπας ἐναργῶς καὶ πρὸς ὑδρο-

15 κήλας καὶ ἀνθρακας καὶ γαγγράνας σὺν καρδιαμώμῳ· πρὸς τε βίλην τὰ πεποδιστά καὶ πρὸς τρεμοίς, καὶ τοῖς ἀπὸ τῶν ἰοβόλων ἐκείων δακρυμώδεις ἐν συγχρίσματι, ὅπῃ μακάρεσσιν σκορποπλήκταις

20 καὶ φθαγγροπλήκταις.

Πεὶ ναρδίνου μύρον. Κεφ. ος'.

Ναρδίνον μύρον πικρίλας σκευάζεται διὰ τὸ μαλαθευθῆναι φύλην καὶ δίχα τοῦτου ὥς τὸ πολὺ δὲ μύζουται τῷ βετανίνῳ ἐλαίῳ, ἢ

25 ὀμφακίνῳ· πρὸς μὲν τῷ σφύγι τοῦ ἐλαίου ὅλως· πρὸς δὲ τῷ ἐνωδίῳ κίστος, ἀμώμον, νάρδον, σμύρνα, βάλσαμον. ἐστὶ δὲ χρεῖς ἡ λεπτή, μὴ δριμύτης, ἔχουσα τὴν ἐνωδίαν τῆς ξηρᾶς νάρδου ἢ α-

Id nō āresina, sed myrrhā crassitudine obtinuit: resina enim neq; amaritudine præbet, neque vllā odoris gratiā adiciit. Vim habet admodū acré, amarā, & calfacientē. Itaq; ora venarum aperit, calfacit, discutit, diffundit, humores & spiritus attrahit, caput aggrauat, cōtra vuluæ vitia cū duplo oleo, cera, & medulla efficax est. Ita enim ferè multū acrimoniæ exolefcit, & quādā emolliēdi vis contrahitur. alioqui adurit, & præ omnibus crassiss unguētis indurat. Facit mirū in modum ad fistulas & vlcera quæ putredinis vitiū senserunt: itē ad hernias humidiores, carbūculos, febriū horrores, tremores, gāgræ nāsq; cū cardamomo: aduersus serpentiū morsus illinitur, scorpionū & phalangiorū ictibus cum tritis grosfis imponitur.

Nardinum. Cap. LXXVI.

Ratio nardini faciundi euariat. Nam aut malabathrino folio, aut sine eo fit: plerunq; autē balanino oleo, aut omphacino: iuncus odoratus spissamenti gratia adiciitur: sicuti propter odoris suauitatem, coctus, amomum, nardum, myrrha, balsamum. Laudatur tenuē, non acre, nardi aridæ aut

DIOSCORIDIS

aut amomi odorem referens.
Vis ei extenuans, acris, expur-
gat, exalfacit, absterget humo-
res, rarefacit. Hoc liquidū est,
nec habet strigmenti crassitu-
dinē, nisi resinā recipiat. Fit etiā
simplex ex omphacino oleo,
iūco, calamo, costo & nardo.

Malabathrinū. Cap. LXXVII.

Malabathrinum spissamenta
nardini habet, insuper myrrhae
plufculū additur: qua de causa
alfacit, crocino aut amaraci-
no viribus respondens.

Myrrha. Cap. LXXVIII.

Myrrha lachryma est arbo-
ris, quæ in Arabia gignitur, Æ-
gyptiæ spinæ non dissimilis: è
cuius vulnere defluit lachryma
in subiectas tegetes, alia circū
caudicē concrefcit. Dicitur ex
his aliqua pediafimos præpin-
guis, qua expressa, Staacte emit-
titur. Alia gabirea pinguis-
sima, læto & pingui solo nascēs,
ea copiosam sudat stacten. O-
mnium prima est, quæ troglo-
dytica appellatur, accepto co-
gnomine à loco, in quo pro-
uenit: splendens, subuiridis, ac
mordens. Quinetiam legitur
tenuis quædam, quæ à tro-
glodytica fecunda est, bdellij
modo mollis, verum odore
grauiuscula, apricis nascens.

Alia

ἢ ἀμάμου. Διῶαμις δὲ αὐ-
τῆς λεπτὴ πικρὴ, δριμύεια, στικ-
τικὴ, ἀραιωτικὴ ὑγρῶν, θερμαν-
τικὴ. ὕδα δὲ ὕδα καὶ οὐ γλοιώ-
δης, ἐὰν μὴ ῥητίνῃς ἔχῃ. σκευάζε-
ται δὲ καὶ λιτὴ δι' ὀμφακίνου ἢ
λαίου καὶ ὀφίου, καὶ καλὰ μου,
καὶ κόσου, καὶ νάρδου.

Περὶ Μαλαβάθρινου. Κεφ. οζ'.

Τὸ δὲ μαλαβάθρινον, ἔχει μὲν
σύμμια αὐτῇ καὶ ἡ νάρδος, σμύρνης
δὲ πλεον. διὸ καὶ γίνετ' θερμαντι- 10
κὸν, ἀναλοροῦν τὸ κροκίνον καὶ ἀ-
μαρακίον τὴν διῶαμιν.*

Περὶ Σμύρνης. Κεφ. οθ'.

Σμύρνα δάκρυόν ἐστι δένδρου
ῥηνομήνου ἐν Ἀραβίᾳ, ὅμοιον τῇ
αἰγυπτικῇ ἀκρόν. οὗ ἐγκοπι- 15
μένου ἀπορρεῖ τὸ δάκρυον εἰς ὑ-
περωμήνας ψάδας. τὸ δὲ, ἐπὶ
τῷ στελέχει σπεινὴ γινεται, καὶ λείε-
ται αὐτῆς ἡ μὲν τις πεδίασιμος
λιπαρὰ, ἥς πεζομήνης, ἡ στικτὴ
λαμβάνεται. ἡ δὲ τις γαβιρεία λι- 20
παρώτατη, ἐν ὑψηλοῖς καὶ λιπα-
ροῖς τόποις ῥηνομήνη, ἡ καὶ πολλὴν
ἀνίστη τὴν στικτίαν. περὶ τούτου δὲ
ἡ τρωγλοδυτικὴ καλουμένη, ἀπὸ
τῆς ῥηνώσεως αὐτῇ γάλακτος. ὑπό- 25
χλωρὸς καὶ δηκτικὴ οὖσα, διαυ-
γής. συλλέγεται δὲ τις καὶ λε-
πτὴ μετὰ τὴν τρωγλοδυτικὴν
ἀειθιμομήνη, ἐν ἀπαλλοῖς ὡς τὸ
βδέλλιον, ὑπερβρωμὸς τῇ ὁσ-
μῇ, ἐν ὑψηλοῖς τόποις ῥηνομήνη.
ἡ δὲ τις

ἢ δὲ τις χαυκαλὶς λεῖονδρῆ, ἡ δὲ
 ὠρεος, μέλινα, καὶ τοπίος, ἢ δὲ χει
 εἴσῃ ἐν ἀπάταις, ἐργασίμη κα-
 λεῖται, φαφάρει καὶ ἀλαπίς, δρι-
 μεῖα, κομμιζουσα τῇ ὀφεί καὶ τῇ
 5 δύναμει καὶ ἡ ἀμύνηα δὲ χαυ-
 κῆ, ἀποδοκίμος. καὶ πείσμα-
 τα δὲ ἐξ αὐτῶν γίνεται· ἀπὸ μύρ-
 τῶν λιπαρῶν ἐνὸδῃ καὶ λιπα-
 ρά· ἀπὸ δὲ τῶν ξηρῶν ἀλιπῇ
 καὶ οὐκ ἐνὸδῃ, ἄτονος διὰ τὸ
 10 μὴ ποροσειληφέναι ἑλκασιν εἰς τὴν
 ἀνάπλασιν. δοκίζεται δὲ κόμμι
 βραχέϊσι σπύργῃσι ἀποβρέγματι
 καὶ μυρουρῶν. ἐκλέρου δὲ τὴν
 νέαν, ψαυράν, κόφιν, ὁμό-
 χρου πειταχόθεν, καὶ πῆν ἐν τῷ
 15 θλαδίῳ αἰνέδοθεν, λευκός, ὄνυ-
 χρεῖ δέῃς, ἔχρου δὲ διαφύσεις, λείας,
 μικρόβωλόν τε, πικράν, ἐνὸδῃ,
 δριμεῖαν, θερμαπτικῶν· ἢ δὲ βρα-
 χεῖα καὶ τῇ χροῖα ποσώδης ἐστὶν
 ἄχρητος. Διωάμιν δὲ ἔχει θερ-
 20 μαπτικῶν, χαρωπικῶν, κολλυπ-
 κῶν, ξηρωπικῶν, συπτικῶν, μα-
 λάσσει δὲ καὶ μύτταν μεμυκῆαν
 καὶ ἀναστομοῖ· ἄγει δὲ ἐμμῆα καὶ
 ἐμβρυα συντόμως, ὣς ἀψινθίω
 ἢ θερμῶν ἀποβρέγματι, ἢ πη-
 25 γαίου χυλῷ περσεδεῖται. λαμ-
 βάσεται δὲ ἀντὶ καταποτίε, μέ-
 γετος κυάμου περὶ βῆχα χρο-
 νιον καὶ ὀρεσπνοίαν, καὶ πλεωρὰ πό-
 νον καὶ πώετος, λύσιν τε κοιλίας,
 καὶ δυσεντερίας, λυεῖ δὲ καὶ ῥίγν,
 30

Alia caucalis cognominatur,
 præter modum exoleta, nigra, &
 retorrida. Omnium deterrima,
 quæ ergasima dicitur, pingui ca-
 res, cano situ obducta, acris ad-
 gummi imaginé vergens, & viri-
 bus eius proxima. Improbatur
 aminnea cognomine. Ex iis
 pastilli fiunt, sed è pinguibus
 pingues, & odorati: è ficciori-
 bus haudquaquam pingues, &
 inodorati: minus odore pol-
 let, quæ oleum non admisit,
 cum in pastillos digerebatur.
 adulteratur macerato gummi
 aqua, in qua myrrha madue-
 rit. Eligenda est recens, squal-
 lore obsita, levis, vndique cò-
 color, quæ còfracta venas vni-
 guium modo candidas & læ-
 ues ostendat, minutis glebis, a-
 mara, acris, odorata, calfaciēs:
 superuacua & inutilis est pon-
 derosa, coloris picci. Calsa-
 cit, cohibet, soporem gignit,
 glutinat, siccatur, astringit, vul-
 uam emollit, & præclusam a-
 perit: menses & partus cele-
 riter extrahit, cum absinthio,
 lupinorum cremore, vel suc-
 co rutæ admota: tuberculo fa-
 bæ deuorat in vetere tussi, or-
 thopnoea, in laterum pectorisq;
 doloribus, in alui profluvio, &
 dysenteria: horrores discutit,
 e duabus

DIOSCORIDIS

duabus horis ante febrium ac-
cessiones, fabæ magnitudine
pota cum pipere & aqua: sub-
dita linguæ liquatæque, scabri-
tient arteriæ expolit: obtusam
vocem expedit, ventris tineas
enecat, contra grauem oris ha-
litum manditur, & aduersus a-
larum tædia cum liquido alu-
mine illinitur. gingiuas & den-
tes stabilit, colluto cum vino
& oleo ore: vulnera capitis il-
litu glutinat, medetur fractis
auribus ac ofsib⁹ nudatis, per-
uncta cum cochleæ carnibus.
Item purulentis auribus in-
flammarisque cum meconio,
castorio, & glaucio: ad varos
autem cum casia & melle il-
linitur, impetigines ex ace-
to purgat, defluentes capillos
cum ladano & vino myrteo
illita, firmat: diuturnas destil-
lationes lenit, illitis penna na-
ribus: oculorum vlcera com-
plet, albugines tollit, caligi-
nem discutit, scabritiem læ-
uigat, Fit è myrrha, perinde
atque thure, fuligo, & vt po-
stea ostendemus, ad eadem
conueniens.

Myrrha Boeotica.

Cap. LXXIX.

Boeotica myrrha, dissecta ra-
dix est arboris cuiusdā ī Boeo-
tia nascētis

πρὸ δύο ὥρων ἢ ἐπιτοκῆς μὲ πρὸ
πέρας ἢ ὑδαίος τὸ μέθος κυά-
μις ποθείσα ἀρθρίαις τὸ βράχνη-
τα ἢ δοσισμὸς φωνῆς, ἀπὸ καθι-
σησιν ὑποπτεῖσθαι τῇ γλώττῃ καὶ
ἀπὸ χυλίζουμένη κίνησις ἢ ἢ ἐλμυ-
νας, καὶ πρὸς δυσωδίαν σώματος
διαμυσσά. ἢ πρὸς ἢ μαλακῶν πό-
νος, μὲ συμπίεσις ὄρεας διαχρί-
ται· σὺν οἶνῳ ἢ ἢ ἐλάτῳ διακλυ-
ζουμένη, ὁδόντας ἢ ἢ ἐλα κρατύνει·
κολλὰ ἢ ἢ τὰ ἐν τῇ κεφαλῇ βρά- 10
μυα ἐπιπαρῶν, καὶ τὰ τεθλα-
σμένα ὅσα καὶ ψικωμένη αὐτῇ, ἢ ἢ
ταὶ σὺν κοιλίᾳ σαρκὶ ἐπιχειρῶ-
ν, καὶ τὰ πνοῦσθαι τὰ ὥτων ἢ
φλεγμαίνοντα, σὺν μνηκίῳ καὶ κα-
σείῳ καὶ γλαυκίῳ πρὸς δὲ ἰσθμὸς 15
μὲ κασσίης καὶ μέλιτος ἐπιχρίει, ἢ
λίχμῳς τὸ ἀπὸ σμύρνης σὺν ὄρεας, καὶ
πεύρας ῥέκτας μὲ λαδάνῳ καὶ οἶνῳ
καὶ μυρσίνῃ καὶ αἰσχρομυρσίνῃ ῥάννυ-
σι· περὶ οὗτοι ἢ καὶ πᾶσι χροστίς κα-
τάρρεας διαχρίουμένη πρὸς τὸ μυ- 20
ξωπύρων πληροῖ καὶ τὰ ἐν ὀφθαλ-
μοῖς ἐλκῃ, καὶ καταρρεῖ τὰ λευκά-
ματα καὶ τὰ ἐπισκοποῦντα τὸ κό-
ρας, καὶ βράχνηματα σμύρνης γίνε-
ται δὲ καὶ λιχνὲς ἐξ αὐτῆς ὁμοίως
τῇ ἐν τῷ λιθαίνου, ὡς ὑποδείξο- 25
μεν, ἀφ' αὐτοῦ ποτὶς τὰ αὐτά.

Περὶ Βοιωτικῆς σμύρνης.

Κεφ. οβ'.

Ἡ δὲ βοιωτικὴ σμύρνη, ἐστὶ δέν-
δρου πνὸς ἐν βοιωτίᾳ θύκω μέ-
γαν

του ῥίζα τετυμνωμένη. ἐκλέγου δὲ
 ἢ ἐμψυχή σπυρίον καὶ ἢ ἐνωδίαν.
 Διῶσαν ὅς ῥχει θερμαντικὴν, μα-
 λακτικὴν, διδρυτικὴν, μίγνυται ὅ
 καὶ θυμιαμασι χηρσίμως.

Περὶ στυρακος. Κεφ. π'.

Στύραξ δάκρυόν ἐστι δένδρου
 πηρὸς οὐαίου κυδωνίου. διαφύει ὅ
 αὐτὸς ὁ ξανθὸς καὶ λιπαρὸς ῥητι-
 νώδης, ἀρόμους ἔχων ὑπολευ-
 κοῖς, ἐπιδαμνῶν τῇ ἐνωδίᾳ ὥς

10 ὅππῃ ἔστιν, καὶ ἐν τῷ μαλάσσῃ
 ὅς ἀνέως ὑγρῶσαν πηλὴν μαλιν-
 ῶν τοῦτο δὲ ὅτιν ὁ κατὰ βαλ-
 τῆς καὶ πινυδακὸς καὶ κηλίκος.
 φασὶν δὲ ὁ μέλας καὶ * λαθυ-
 ρὸς, καὶ πιτυράδης. εὐείσκει-

15 ται δὲ καὶ δάκρυον κόμμι ἐοι-
 κὸς, διαγρῆς, σμυρνίζον· ἐλίζον
 δὲ τοῦτο γινώσκειται. δολίζουσι δὲ
 αὐτὸ τοῖς ἐκ τοῦ δένδρου πηρῶ-
 μασιν ἅπαρ ὑπὸ τῶν σκοληκῶν
 ἀναπτύσσεται μίγνυμένη καὶ μέ-

20 λιπὴ καὶ ἰσχυρὸς ὑποσαδμῇ, καὶ
 ἄλλοις πόνῃ. ἐννοῖ δὲ κηρὸν ἢ
 σέαρ ἀεραματίσαντες συμμεδράσ-
 σουσιν ἐν τοῖς ὀξυτάτοις ἡλίοις
 τῷ εὐρακί, καὶ δι' ἡθμοῦ ἐνερ-
 γήτου, ἐκδηλίζουσιν εἰς ὑδωρ ψυ-

25 χροῦν πειρωπῆς σκοληκῶν καὶ πω-
 λοῦσι, σκοληκῶν ὀνομάζοντες.*
 ἐγκρίνουσι δὲ οἱ ἄπειροι τὸν τοι-
 οῦτον ὥς ἀκέραιον, οὐ παρεστέχον-
 τες τῇ κατὰ τὴν ὁσμὴν ἐντυνία,
 θειμὴ γὰρ ἴσιν ὁ ἄδολος.

Διῶσαν

tia nascentis, Melior est quæ
 myrrham odoris suauitate re-
 presentat. Vis ei calfa & toria in-
 est, emollit discutitq; suffimen-
 tis commodissimè inseritur.

Styrax. Cap. LXXX.

Styrax lachryma est arboris
 malo cotoneæ similis. Præfertur
 fordescens, flavus, resinofus, al-
 bicatibus grumis, quàm pluri-
 mū in sua odoris gratia perma-
 nēs: qui dū mollitur, melleū li-
 quorē reddit: qualis ē Catabal-
 lis, Pissidia, & Cilicia deuehi-
 tur. Deterior niger, surfuriosus,
 friabilis, canoq; situ obductus.

Cæterum lachryma inuenitur
 gūmiū similitudine, perlucida,
 & myrthæ ἑμυλα: verū per pau-
 ca manat. Adulterať ligni sco-
 be, quā vermiculi erodētes ex-
 cusserūt, melle & iridis sedimē-
 to, & qbusdā aliis. Alij cerā aut
 adipē odoribus imbutū, flagrā-
 tiffimis solib⁹ cū styrace subi-
 gūt, & p laxa cribri foramina ī
 frigida aqua veluti vermiculos
 exprimūt, venūdantq;. Styraçē
 hūc (quoniā vermiculorū spe-
 ciē cōtrahat) scholēcitē cognō-
 minant, tanq̃ syncerū imperiti
 approbāt, nō animaduertētes
 ad præcipuam odoris fragran-
 tiā: liquidem acer admodū est,
 qui adulterationis vitio caret.

c ij Styrax

DIOSCORIDIS

Styrax calfacit, emollit, & concoquit: medetur tufsi, defillationibus, raucedini, grauedini, & interceptæ voci: vuluſ præcluſæ duritiæve laborantū conuenit, cit menſes potu poſſitūque, aliū leuiter mollit, ſi exiguū cum reſina terebinthina catapotij modo deuoretur. Miſcetur uſiliter diſcutiētibus maſtagmatis, acopisq̃ue. Adoletur autē & igni torretur, vt fiat ex eo, veluti ex thure, fuligo, ad eadem conueniēs ad quæ thuris fuligo. Ex eo etiam in Syria ſtyracinum oleum componitur, quod calfacit vehementer, & emollit: verum caput dolore afficit, adgrauatq̃ue, & ſoporem adfert.

Bdellium. Cap. LXXXI.

Bdellium alij bolchon appellant, alij madelcon: ſachryma eſt ſaracenicæ arboris. Probatuſ guſtu amarū, tranſlucidū, taurini glutinis in morē, intus pingue, liqueſcens facile, ligni ac ſordis expers, ſuffitu odoratum, vnguui ſimile. Eſt etiam nū bdellij genus ſordidum, nigrū, vberioribꝫ glebulis in offas cōuolutū, aſpalathi odore, ex India aduectum. Deſertur etiā à Petra oppido ſiccū, reſinoſum, huiuſcētis, ſed facultate ſecundū.

Adul-

Διώαμιν δὲ ἔχει θερμαστικὴν, μαλακτικὴν, πεπτικὴν. ποιεῖν πρὸς βήχας καὶ χατάρρους, κορρίδας, βρογχίτους, ἀποκοπὴν φωνῆς ἀρμύζει καὶ πρὸς τὰς ἐν ὕδατι μύσεις καὶ σκληρίας. ἔμμελυνά τε ἄγει πνέοντος καὶ πρὸς ἐξέμενος, κοιλίαν τε κόψας μαλάττει κατὰ πνέοντος ὀλίγος μετὰ ῥητίνης τερεβινθίνης. μίγνυται δὲ καὶ μαλάγμασι διαφορητικοῖς καὶ ἀνέμοις ρησιμῶς. καίεται δὲ καὶ ὁπῖσται καὶ φόγνυται καὶ διαλύεται ὡς λίθωνος. ἀρμύζει τὴν αἰσθάνην πρὸς τὸ καὶ τὸ λευγαίου. τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς σκευαζόμενον χρίσμα ἐν τῇ στείᾳ συστάλην, θερμαίνει καὶ μαλάττει ἰσχυρῶς καὶ φλογίους μύσται καὶ βαρὺ καὶ χρωπτικὸν κατέστηκεν.

Περὶ βδέλλου. Κεφ. πα.

Βδέλλιον οἱ δὲ μάδελλον, οὗ δὲ βολχρὸν καλοῦσι. δάκρυον ἐστὶ δένδρου σαρακηνικοῦ. δοκιμον δὲ ὅταν αὐτὸ τῇ γούσει πικρὸν, διαγρῆς, τωρεκολλῶδες, λιπαρὸν διὰ βάθους καὶ ἐν μάλα κτην, ἀμυγρῆς ζύλων, καὶ ῥυπαρίας, ἐν ὧδες ἐν τῇ θυμιάσει, ἐοικὸς ὀνυχ. ἐστὶ δὲ καὶ ἕτερον ῥυπαρὸν καὶ μέλαν, ἀδρόβελλον, παραδωδες, κομιζόμενον ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς. φέρεται δὲ ἀπὸ τῆς πέτρας, ξηρὸν, ῥητινώδες, ὑποπίλον, δευτερεύον τῇ διωάμει.

δοκίμ

δολοῦται δὲ μηνύμενον κόμμι·
 τὸ δ' ὅτι πικρὸν ἔχει ὁμοίως περὶ
 νει τὴν γεῦσιν, ἐν τῇ τῇ ὑποδυ-
 μιᾷ, ἔχει ἡ τὸς εὐωδίας ἐστὶ. Δύ-
 ναμιν δὲ ἔχει διερχομένην, μα-
 5 λακτικὴν, διὰ λυκτικὴν, βεργα-
 κικὴν καὶ σκληρὴν καὶ ὑδροκικὴν,
 ἐν δὲ ἐν πικρῷ αὐτοῦ ἀποσομοῖ
 καὶ τὴν μύτην περὶ τὴν ἐμύρον καὶ
 ὑποδυμνύμενον, ἐφέλκεται δὲ
 καὶ τὰ ἐμύρα καὶ πᾶσαν ὑγρασίαν,
 10 θρύπτει δὲ καὶ λίθους πικρομέ-
 νους, καὶ οὖρα ἀγρίων, βληχκοῖς τε καὶ
 θηλειῶν τοῖς, ὡφελίμως δίδω·
 ἄγρατον δὲ καὶ περὶ ῥήγματα,
 σπασμάτα, καὶ πλεονεξίας πόνον καὶ
 διαδρομὰς πνευμάτων· μίσγε-
 15 ται δὲ καὶ μαλάγματα τοῖς ἀρ-
 μόζοις περὶ τὰς σκληρίας καὶ
 δέσεις τῶν νεύρων· κατεργάζεται
 δὲ κοπιόμενον, παρερχομένου οἴ-
 νου ἢ ὑδατος θερμοῦ.

Περὶ λιβάνου. Κεφ. πβ.

20 Λιβάνος θύνηται μὲν ἐν ἀραβίᾳ
 τῇ λιβανοφόρῳ καλουμένῃ, περὶ
 τὴν δ' ὅτι ἄρβρον καλεῖται σελόνι-
 ας, στρογγύλος φυσικῶς ἐστὶ δ' ὁ τοῦ
 τοῦ ἀπομυκνός τε καὶ θλασθείς
 ἐν δόθει λιπαρὸς, ἐπιδυμιαθείς δ'
 25 ταχέως ἐκκαυόμενος. ὁ δ' ὅτι ἐν δίκῳ
 ὑποκίρρος τε ἐστὶ, καὶ πελὶς τὴν
 χροῖαν, γίνε· δ' καὶ τὴν ἐπι-
 πλεονεξίαν στρογγύλος· τέμνοντες γὰρ
 αὐτὸν εἰς τετραγώνια ῥήματα καὶ
 βάλλοντες εἰς κεράμεια, κηλίσκων
 ὥς

Adulteratur gummi, sed ita vi-
 tium non perinde gustui a-
 maritudinem representat, nec
 usque adeo suffitionibus odo-
 ratum. Calfacit & emollit du-
 ritias, & turgentia guttura, hu-
 midasque hernias discutit, cum
 ieiuna saliva dilutum: vulvae
 spiracula laxat appositu & suf-
 fitu, & partus humiditates-
 que omnes extrahit, calcu-
 los potu comminuit, vrinam
 mouet tussientibus & a ser-
 pente percussis, vtilissimè da-
 tur: valet ad rupta, vulla, la-
 terum dolores, & discursantes
 spiritus: malagmatis inferitur,
 quæ contra duritias & neruo-
 rum nodos profunt: contusum
 resolvitur affuso vino aut aqua
 calida.

Thus. Cap. LXXXII.

Thus in ea gignitur Arabia,
 quæ thurifera cognominatur.
 Primatū tenet i eo genere ma-
 sculū, stagonias appellatū, sua-
 pte natura rotundū: tale autē
 indiuiduum est, candidū, cū
 frangitur, intus pingue, in suffi-
 tu statim ardens. Indicum ve-
 rò fulvescit, & colore liuet, sed
 rotundum industria facit: nam
 in quadrangulares for-
 mas dissectū fictilibus versant,
 e iij donec

DIOSCORIDIS

donec rotunditatē contrahat: verūm huiusmodi thus tēpore flauescit, quod atomū aut syagrū appellāt. Secundū locū habet Arabicū, & ī Smilo nascēs, quod aliq. copiscū vocāt, min⁹ multò & fuluius. Est & genus aliud, cui amomita cognomen est, alioqui cādidum: quod dū mollitur, mastiches more digitiscedit. Adulteratur in itinere, pini resina & gūmi, quod facile deprehēdi potest: siquidē suffitū gūmi flammā nō eiaculatur, & resina in fumū euanescit, thus verò statim ardet: idē maleficiū odor prodit. Ad calfaciendū & astringēdū pollet, oculorū caliginē discutit, caua vlcera cōplet & ad cicatricem perducit cruenta vulnera glutinat, infrenatq; cūctas sanguinis eruptiones, etiā si cerebri membranis effluat: vlcera quæ cacoēthe vocantur, & sedis & reliquarum partiū permulcet tritū cū eo & lacte linamentū: formicantes verrucas inter initia, impetiginēsq; ex aceto & pice illitū, tollit: ambusta igni pñionēsq; cū fuillo adipe aut anferino, & vlcera ī capite manātia cū nitro, si infricetur, fanat: paronychiis cū melle auri- bus fractis cum pice, medetur:

ἕως αὖ ὑπελάθει τὸ στρογγύλον
ζῆμα. χροῖν δὲ ὁ τοιοῦτος ξαν-
δοῦται, ἄτομος ἢ σύσχυρος καλε-
ῖται. δευτέρου δὲ ὁ ἀραβίας καὶ ὁ
ἐν σμύλῳ, ἐν ἔνιοι καπσίον καλεῖ-
ται, μικρότερον καὶ κριρότερον ὄν-
τα. λέγεται δὲ τις καὶ ἀμωμίτης,
ἄλλως μὲν λευκός· ἐν δὲ τῷ μα-
λάσσει ἐν διδύμῳ ὡς μασίχη. δο-
λοῦν δὲ πᾶς λίβανος τῇ σπιτύνῃ
ῥητίνῃ μεσοδεύμενος, καὶ κόμ-
μι. ὑπερὸς δὲ ὅστις ἢ διάχρωσις. 10
τὸ μὲν γὰρ κόμμι οὐκ ἐμπολοῦται
συμμιόμενον, ἢ δὲ ῥητίνῃ εἰς κα-
πνὸν ἐκτυφῶνται. ὁ δὲ λίβανος
πὸς ἐξάπτεται. διηλοῖ δὲ καὶ ἡ ὀσ-
μή τὸ τοιοῦτον. Διῶνται δὲ διερ-
μαίνεν, εὐφειν, ἀποκαθαίρειν τὰ ἐς
ἐπισποτουμένα ταῖς κόραις, καὶ
τὰ κοῖλα τῶν ἐλκῶν πληθεῖν
καὶ ἀπουλοῦν, κολλᾶν τε ἐν-
ναιμα τραύματα, αἰμορραγίαν
τὴν πᾶσαν, καὶ τὴν ἐκ μύτης
καὶ ἐπὶ χεῖρ· παρηγορεῖ καὶ τὰ 20
περὶ δακτύλιον καὶ τὰ λοι-
πὰ μέρη κακοῦ ἐμμοτος λεί-
ος, σὺν γάλακτι, καὶ τὰς ἐν
ἀρχῇ μυρμηκίας καὶ λειχί-
νας, (ὧν ὅστις καὶ πείσῃ κατα-
χρίσμενος αἶρει, καὶ τὰ πνεύ- 25
ματα δὲ ἔλκεα καὶ χύματα ἰά-
ται σὺν εἰσι χροίῳ ἢ χυμῷ
ἀχρῶος δὲ σὺν νίτρω σιῶμα-
νος ἰᾶται. παρωνυχίας τε σὺν μέ-
λιτι, ὧτων θλάσεις σὺν πείσῃ·

ad

ἄλλοις

παρὲς δὲ τὰ λοιπὰ ἀλγύματα τῶν
 ὠπών, (ὡς οἶνον γλυκεῖον ἐγχέμε-
 νος, μασοῖς τε τὸν ἀπὸ τοῦ κέν-
 τρου φλεγμῶντος συν κίμωνια καὶ
 ῥοδινὰ καὶ ἀρχιμύδρον ὡφείλει μί-
 γρυνται δὲ καὶ τοῖς παρὲς ἀφ' ἑαυ-
 τῶν φλέγμασι, καὶ τοῖς σπληνικαῖς
 φαρμάκοις, αἰμοπιοῖσι τε ὡφε-
 λεῖ πρὸς μύδρον * μαριόδης δὲ ὅτι
 πρὸς μύδρον ὑπὸ τῶν ὑγαιανόντων,
 παλίων δὲ μετ' οἶνον ποθεῖς καὶ
 κτείνει. κλέεται δὲ λίβανος ἐπ'
 ὀσάκου καὶ θαρσῦ τεθῆς, ὑφα-
 πτόμυδρος τῶν ἡνδρῶ ἀναφθάνει ἀ-
 πὸ λύγης, ἀρχὴς αὖ ἐκκαῖ * δὲ δὲ
 μὲν τὴν τελείαν καὶ σπληνικήν.
 ζεῖν πνὶ ἀρχὴς αὖ ὁσέων τῶν ἡνδρῶ
 ἐκ κατεφθόνηται. ἐννοῖ δὲ ἀπει-
 θέτοι τῶν ἡνδρῶ ἀγγείων χαλ-
 κουῶν, κοίλων καὶ μέσων τε βημῶ-
 νος, παρὲς ἐκκαῖ τῶν λιγνύος, ὡς
 ὑποδείξωμεν ἐν τῶν ἀπὸ ἀδάλης
 λίβανος λόγων. οἱ δὲ, εἰς ὧν ἡνδρῶ
 τρεῖς βάλανους καὶ ἀπειπλάσσον-
 τες πηλῶν, καὶ σπληνὶ καὶ μύδρῳ. φώ-
 γνυ * ὅ ἐπ' ὀσάκου καὶ σπληνὶ καὶ ἀ-
 πτόμυδρον διαπύρων, ὡς αὖ ἐκκαῖ
 πνὶ πεμφολυγίης, μὴ δὲ λιπαρίαν
 πνὶ αὖ αἰμίδου ἀνίη. ἀρπύεται ὅ
 ἐν ὑγροῖς μὴ κατὰ καὶ μύδρον.

Πρὶ Φλοιὸν Λιβάνου. Κεφ. πγ'.

Φλοιὸς δὲ λίβανος διαφείρεται ὁ
 παρὲς καὶ λιπαρὸς καὶ ἐνὸς, ὡς
 σφατος, λεῖος καὶ μὴ λεπτοφ-
 ῶν ἢ ὑμῶν δὲ δολοῦται δὲ μύ-
 ρον

ad reliquos auriū dolores cum
 dulci vino iufunditur, inflam-
 mata à partu mammae cum ci-
 molia & rofaceo magna vtili-
 tate perungitur, additur ad ar-
 teriæ viscerū nq; medicamen-
 ta, prodest sanguinis excrea-
 tioni potum: sed in secunda va-
 letudine haustum infantiā mo-
 uet, & largius cum vino po-
 tum interficit. In fictili mun-
 do thus crematur, flagrante
 glebula succensum à lucerna,
 donec exuratur: post perfe-
 ctam vstionem operire oportet,
 vsque dum restinguatur:
 sic enim in cineres non redi-
 gitur. Aliqui ollulam æneo va-
 se cauo circa medium perfor-
 rato cingunt ad excipiendam
 fuliginem, vt in eius mentio-
 ne mox ostendemus. Alij cru-
 do fictili luto oblitō, & in for-
 nacem indito, cremant. Ficti-
 li etiam nouo viuacibus pru-
 nis torretur, dum non ampli-
 us bullet, aut pingitudinem
 vaporémve emittat. facile en-
 nim comminuitur quod peru-
 stum non est.

Thuris cortex. Ca. LXXXIII.

Praefertur thuris cortex cras-
 sus, pinguis, odoratus, re-
 cens, leuis, minimè scaber, sine
 membranis. Adulteratur ad-
 e iij misto

DIOSCORIDIS

misto pini aut nucis eius cortice, sed horū index ignis est: si quidem reliqui cortices suffiti nequaquā incenduntur, sed sine odore fumum eructant: thuris verò cortex ardet, & cū odoris fragrantia vaporem eiaculatur. Thuris modo vritur, & vis eadem quæ thuri, sed validior alstringentiórque. Quare potu cruētis excreationibus, vuluis fluxione laborantibus in pefso confert, ad cicatrices oculorū, & caua fordēsque efficax est. tostus scabris lippitudinibus auxiliatur.

Māna thuris. Ca. LXXXIII.

Manna thuris probatur candore, micarum frequentia, & puritate. Vim habet eandem quam & thus, sed inualidiusculam. Sunt qui cribrata pini refina, ac polline, aut cortice thuris contusi adulterant: sed hæc igne deprehenduntur. Neque enim æquē suffitu aërium vaporem, sed fuliginosum & impurū expuit, & permistum suaueolentiæ halitus virus habet.

Thuris fuligo.

Ca. LXXXV.

Fuliginem thuris sic facito: Forcipicula, lucernis accensas singulatim thuris glebas, in novam fictilem ollam cōcauam impo-

γινώσκοντες αὐτῷ φλοιῷ εὐερίνου ἢ πινύνου ἐλέγχος δὲ καὶ τούτων τὸ πῦρ οἱ μὲν γὰρ λοιποὶ θυμιαθῆντες οὐκ ἀνάπτονται, καὶ πινύζοντες δὲ δίχα ἐνωδίας ἐκτύφονται ὁ μὲν τῷ λίθαινον φλοιῷ ἀπὸ τῆς καίεται δὲ καὶ οὕτως ὡς λίθανος. Δύναμιν ὅτι ἔχει καὶ ὁ λίθανος ἐνβρῆτες δὲ καὶ ἐν πικράτερος. ὁ δὲ πῶς δὲ, αἰμοπικροῖς μάλλον ἢ καὶ ῥινοῖς ἀμύδι ἐν πρὸς δέ τῳ πικρῷ καὶ πρὸς οὐλῶν ἐν δὲ θαλαμῶν, καὶ κοιλώματα καὶ ῥυπαρίας φωχθεῖς δὲ καὶ πρὸς φρεσθαλμῶν ποιῇ.

Περὶ Μάνης Λιθάνης. Κεφ. πδ'. 15

Μάνη δὲ λίθανος δοκιμὸς ὅταν ἡ λευκὴ καὶ καθαρά ἐν χόνδρῳ. Διύαμιν ὅτι ἔχει καὶ ὁ λίθανος, ὅταν πικρῶς ὅτι μάλλον μίσγεται ὅτι ἐν τοῖς δοκίμοις ἐν τῇ πινύνῃ σπινθῆρῶν καὶ γύριν, ἢ φλοιῶν λίθανος καὶ κεκομμένου ἐλέγχῃ καὶ ταῦτα τὰ πῦρ. ἔτε γὰρ καὶ ἴσον καὶ ἴσότητος θυμιαθῆσεται ἀερίζοντι τῷ αὐτῷ, ἀσβολώδει δὲ καὶ οὐ καθαρόν, ἢ τε ἐνωδία μικτὴ ἔχει τὴν ἀποθοράν.

Περὶ Αἰθάλης Λιθάνωτος. 25

Κεφ. πε'.

Αἰθάλην ὅτι λίθανος πικρὸς ὅταν καὶ εὐδὲ καὶ ἔνα χόνδρον τῷ λίθαινον ἀπὸ πρὸς λύχρον, ἐπιτίθει εἰς κοῖλον λοπάδιον ἐστράμνον χαμῶν.

ἡμιόν' εἴτα περικάλυψον χαλκω-
 μα ἐγκοικιον, τεβημιμύον κατὰ
 μέσον καὶ ἐσμηγμύον ἐπιμελῶς,
 * ἐπιπίθει τε κατὰ τὸ ἕτερον ἀν-
 τὴ * μέρος ἢ ἀμφοτέρω λιθάσεια
 ἔχει τεβηδακτυλίσια παρὰ τὸ
 διαφανέειν εἰ καὶ ὅτι καὶ ἵνα χρώ-
 ρα ἢ ὡς πεπιδέναι * ἐτέρω χρό-
 νου * αἰ. παρὰ τὸ τὸν περὶ τὸν
 χρόνον ἀποσβεθῶναι παντε-
 λῶς, * καὶ τὸ το ποίει, ἕως ἂν ἀν-
 10 τάρκη λιγνὴ δόξης συνηγορή-
 ναι. σιωχῶς μὲν τοι σπύργω ἐξ
 ὕδατος ψυχρῶς πελμασσετὰ ἐκ-
 τὸς μέρη τῶ χαλκώματος οὐτω
 ᾗδ' ὡς σκαθίζει πάντα λιγνὸς, μὴ
 ἔχον αὐτὴ πνευμῶδους ἐπεὶ ἀ-
 15 ποπίπτει διὰ τὴν κοφρότητα,
 μίγνυται τῇ τῶ λιθάνη ἀποδῶ.
 ἀπολήτης οὖν τὴν περὶ τὴν
 λιγνὴν ποίει τὸ αὐτὸ ἐφ' ὅσον ἀν-
 δοκῇ ἀναεῦθ' δὲ καὶ τὴν ἐν τῶ
 κέντρῳ λιθάνου ἀποδῶ ἰδίᾳ. Δύ-
 20 γαμιν δὲ ἔχει περὶ τὴν πικρὴν τῶν
 ἐν ὀφθαλμοῖς φλεγμαῶν, σαλπ-
 κινῶν μαζῶν, ἀνακαταπικρὴν ἐλ-
 κῶν, πικρῶν πικρῶν κοιλωμάτων,
 σαλπικὴν καρκινωμάτων.

25 Πρὶ Διγνός σκευά-
 στας. Κεφ. πς'.

Τὸν αὐτὸν ὃ βόπον σκευάζει καὶ
 ἐν τῇ σμύρῃ καὶ ἐν τῇ ῥητίνῃ, καὶ
 ἐκ τῆ σύρακος λιγνὸς ἀρμόζεις ὃ
 παρὰ τὰ αὐτὰ καὶ ἐν τῇ λοιπῶν ὃ
 σαρκῶν ὁμοίως τῇ λιγνὴν λάμ-
 30 γαν. Πρὶ

imposito: & areo vase in me-
 dio perforato, deterfa diligen-
 ter sorde, obtegito: alteram
 admoueto, ex altera eius par-
 te aut vtraque, subiectis qua-
 ternum digitorum altitudine
 lapillis, quod facilius perspic-
 queat, si vrantur: & qua locus
 capax fuerit, glebular alias sup-
 ponito, & anteà quàm pror-
 sus prior gleba restinguatur,
 aliam imposito: donec sufficiē-
 tem fuliginem videaris coëgisse.
 Continud tamen externæ
 aramenti partes spongia, aqua
 frigida madefacta, abstergan-
 tur: ita enim tepurato aris fer-
 uore, fuligo omnis inhærebit:
 quæ alioqui per leuitatem de-
 cidua, thuris cinerib⁹ admisce-
 tur. Dersa itaque fuligine, ci-
 nis cremati thuris seorsum sub-
 strahendus est. Idem opus, quod
 satisfactum tibi videtur, obeu-
 dum. Oculorum inflammatio-
 nes mitigat, fluxiones suspen-
 dit, vlcera purgat, caua explet,
 carcinomata fistit.

Fuliginis compositio.

Cap. LXXXVI.

Simili modo è myrrha, re-
 sina, styrace, reliquisque
 lachrymis, fuligo ex-
 cipitur, ad eadem
 conueniens.

Picea

DIOSCORIDIS

Picea & Pin^o. Ca.LXXXVII.

Pinus & Picea generi eide-
m ascribuntur, sed quandam fla-
gitat specierum distinctione,
arbores vulgè cognitæ: quarū
cortex astringit, prodest tritus
& illitus intertrigini, vlceribus
summū corpus occupantibus,
ambustisq; cum spuma argen-
ti & manna. Vlcera delicatu-
lorum acrimoniam recusant,
tium, cerato myrtino except^o,
ad cicatricem perducit: tritus
cum sutorio atramento serpē-
tia cohibet. suffitu partus & se-
cundas eijcit, potus aluum si-
sttit, vrinam mouet. Folia eo-
rum trita & illita inflammatio-
nes leniunt, vulnura ab inflam-
matione vindicant, trita autem
& decocta in aceto, feruen-
ti collutione, dentium dolo-
res mulcent: hepaticis vtilia
sunt, drachmæ pondere in a-
qua aut mulsa pota. Pineæ nu-
cis cortex & folia potu idem
præstant. Teda earum parti-
culatim secta si in aceto co-
quatur, & decocto dens col-
luatur, dolores leuat. Ex his e-
tiam fit spatha acoporum pes-
forumq; compositionibus ido-
nea. Quinetiam earum crema-
tarum fuligo ad librarij atra-
menti cōfectionem excipitur:

ΠΙΣΙ ΠΙΠΤΟΣ. Κεφ. πζ':
Πίπτος γινώσκοντες δένδρον ἐστὶ τὸ
ἄνω τῷ ῥύκῳ καὶ ἡ λεγόμενη πύ-
κη, εἶδει διαφέρειται· ἀμφοτέ-
ρων δὲ φλοιὸς σπιγμικὸς, ἀμειόζων
πρὸς τὴν παρασκευάσει λείος καὶ
ταπαινωτός, καὶ πρὸς τὰ ἐπι-
πέλαια τῶν ἐλκῶν καὶ κεκαυμένων
συνὴ λισσαγύρεω καὶ μάννη· ἀγαλ-
οθεὶς δὲ κινρωτῇ μυρσίνῃ, ἀπου-
λοῖ τὰ ἐπὶ τῷ βυρροῦ καὶ ὧν ἔλκεα
καὶ τὰ ἐρπυστικὰ ἐπὶ χειρὶ καὶ χαλ- 10
κῶν λείος, ἐμβεβυά τε καὶ δει-
τερα ὕδατος θυμιαθεὶς ἐκβαλλεῖ,
κοιλίαν τε ποθεὶς ἐφίσησι, καὶ ἡρε-
κινεῖ, καὶ τὰ φύλλα δὲ αὐτῶν κα-
ταπλάττειται λεία, φλεγμονὰς
παρηγορεῖ, καὶ τραύματα ἀφελ- 15
εῖντα διατηρεῖ, λειανθέντα δὲ
καὶ ἐλκυσθέντα ἐν ὅξει, ὀδονταλγίας
παρῶντι διακλυζέμενα θερμά·
ἀρμύζει δὲ καὶ ἡ πικρὸς τῶν φύλ-
λων ἑλκὴν μία συνὴ ὕδατι ἢ μελι-
κράτῳ πεδίσει. πικρὴ δὲ τὰ ἄνω 20
τὰ καὶ ὅπως σπρίλου φλοιὸς καὶ τὰ
φύλλα πεδίενται, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν δὲ
δαδίον χαλκῶν εἰς λεπτὰ καὶ ἐλ-
κυσθέντων συνὴ ὅξος, ὀδονταλγίας παρῶν-
ται, κρατικῶν συνὴ ἀφελεῖναι
καὶ τὸ πικρὸν ὀδοντος ὀδοντος, καὶ 25
αὐτῶν δὲ ἐξ αὐτῶν γίνονται εἰς ἀ-
κόπων σκευασίας καὶ πεσῶν ἐ-
πιθήσεις· ἡ δὲ ἐξ αὐτῶν λεγόμε-
νη καυμῶν, ἐκλαμβάνεται πρὸς
μέλαρος γαστρικοῦ κατασκευα-
σμένη

ea

πεισσε

παιδιῶν καὶ πατρὸς καλλιβλέφα-
ρα καὶ καινούς βλεφάρους -
ρους, πατρὸς τε πύλα
βλέφαρα καὶ ὄφ-
θαλμούς τε
κρύοντες.

5 Πρὶ Πιτιδων. Κεφ. πη.
Πιτιδὲς ὁ καλουῦν ὁ καρπὸς
τῶν πτύων καὶ τῆς πύλης, ὁ εὐρι-
στόμωρος ἐν τοῖς κήποις. Διὰ μὲν
δε ἔχειται, συνηκύν, θερμαίνουσιν
10 πασῶν βουβούσι δε βλεφάρων καὶ τοῖς
ὤφθαλμοις καὶ πάθεισι, καὶ εὐ-
ταὶ καὶ μὲν μέλιτος λαμβανόμε-
ναι. Πρὶ Στροβίλων. Κεφ. πθ'.

Στροβίλοι ὁ καὶ σαροῦ ἐστὶ μέ-
λιτος, ἢ μὲν γλυκεῖος καὶ σικυὶν σπέρ-
15 ματος πνιγμένοι, οὐρητικοί, ἀμ-
βλωτικοί τῶν ὤφθαλμων καὶ νεφρῶν
δριμυτήτων, παρηγορεῖ δὲ καὶ συ-
μμάχων δυνάμεις, μὲν αὐτὸς ἰσχυρῶς,
καὶ λαμβανόμενοι ἐξ ἑρέιδουσι
20 τε ἀτονίαν σώματος, καὶ τὰς τῶν ὀ-
φθαλμῶν διασπορὰς ἐξ ἀμβλωοισιν.
ἔλαιον δὲ οἱ στροβίλοι ἀπὸ δένδρων
παρὰ πᾶσι θλαδέντες ἐν γλυ-
κεῖ καὶ ἐν δένδρεσιν, ἀρμόζουσι πα-
λαιῶς βλεφάρων φθίσεις, καὶ τῶν ἐξ αὐ-
τῶν ὤφθαλμων ἐκείνων ἡμέραν λαμ-
25 βανόμενοι καὶ ἀπὸ τῶν πλῆθος βι-
βῶν. Πρὶ Σχίνου. Κεφ. ς'.

Σχίνος δένδρον γινώσκον συ-
πτικόν ἐλον καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ
καὶ τὸ φύλλον καὶ ὁ φλοιὸς πῶν κλά-
δων καὶ τῆς ρίζης ἰσοδυναμοῖ.
γίνε

ea circūlitionib⁹ efficacissimè
imponit, quibus palpebras or-
nat, coloréq; metiunt, callibre-
phara Græci vocāt: arrosi oculi
lorū angulis, callosis glabrisq;
genis, & collachrymationibus
opitulat. Pityides. Cap. 88.

Pityides appellantur pino-
rum piceaq; fructus, qui in co-
nis inueniuntur. Vim astricto-
riam habent, & aliquatū ex-
calfacientem: tussi & pectoris
vitiis auxiliantur, per se, aut ex
melle sumpti.

Strobili. Cap. LXXXIX.

Nuces pineæ cū Strobili re-
purgatæ mādūtur, aut cū passō
aut cucumeris semine bibun-
tur, vrinam ciēt: acrimonias in
renibus & vesica hebetāt, sto-
machi rofiones leniunt: datæ
cum portulacæ succo, virium
infirmatē roborant, corrupto-
rum quoq; humorū labem
obtundunt. Pineæ nuces inte-
græ recēter arboribus decer-
ptæ in passō frāguntur, & deco-
ctæ, vetustæ tussi ac tabitidini
conferunt, si quotidie ex eo li-
quore terni cyathi bibantur.

Lentiscus. Cap. XC.

Lentiscus nota arbor est, cui
toti vis inest astringendi: semi-
ni enim, folio, ramo, cortici, ra-
dicibusq; cognatæ insūt vires.

Liqua-

DIOSCORIDIS

Liquamentum autē ita fieri fo-
let: Folia, cortex & radix in
aqua coquuntur, & vbi abun-
dē cocta refrigeratāque sunt,
folia abiiciuntur: aqua denuo
coquitur, donec mellis habeat
crassitudinem. Lentiscus sua
sua astringendi dote, valet ad-
uersus sanguinis reiectiones,
alui profluvia, & dysenterias
in potu. Item contra eruptio-
nem sanguinis ē vulua, & e-
iusdem aut sedis prociden-
tia. In totum acaciae & hy-
pocistidis vicem repraesentat.
Idem facit succus ē tritis fo-
liis. Decoctum fotu caua ex-
plet, & fracta ossa ferruminat,
vuluae fluxiones sistit, nomas
arceat, yrinam pellit, motus dē-
tium collutione stabilit. Viren-
tes furculi calamulorum vice
dentibus repurgandis affri-
cantur. Fit ē semine
oleum, quod prodest
cūm quid adstrin-
gi opus est.

Lentiscus. Cap. XC.

Lentiscus resinam gignit,
quae lentiscina cognominatur,
& ab aliquibus, mastiche.
Pota utilis est sanguinem reii-
cientibus, & tussi veteri: sto-
macho auxiliatur, sed ructum
mouet. Additur in dentifricia,
&

ρίνη) ὃ καὶ χύσισμα ἐκ τῶ φλοιῷ,
καὶ τῆς ῥίζης καὶ τῶ φύλλων ἐπιμέ-
νων συνῶσαι ἐφ' ἡκανόν· εἴτα
μὲν τὸ ἐπιθῶναι τῶ φύλλον ἐπιπο-
μῶν, τὸ ὕδατος δὲ πάλιν ἐπι-
μῶν μίχρει μελιτώδους συνάσει-
ως· ποιεῖ δὲ εὐφρων πρὸς αἵματος
ἀναγωγὰς καὶ ῥύσεις κοιλίας καὶ δι-
σεντερίας πινόμενος, καὶ πρὸς τὰς
ἐκ μύθρας αἰμορροΐδας, καὶ πρὸς
πλῶσεις ὑστέρας καὶ δακτυλίαν καὶ
καθόλου ἀντὶ ἀκακίας καὶ ὑποκυ-
σίδος ἐνεστὶν ἀπὸ τοῦ χυμοῦ, καὶ ὁ χυ-
λός ὃ τῶν φύλλων ἐκδηθέντων
τὰ αὐτὰ ποιεῖ, καὶ τὸ ἀφ' ἡμῶν ὃ
αὐτῶν χατατλέμενον, τὰ ἀσυμ-
πλήρωτα πληροῖ, καὶ τὰ ἀπώρω-
τα πωρεῖ ὅσα, καὶ τὰς ἐκ μύθρας
ῥεύσεις σέλλει, καὶ τῶν νομῶν
ἀποστρεπτικὸν καὶ οὐρητικόν ἐστιν,
ἴσῃσι δὲ καὶ σειομέροις ὀδόντας
διακλυζόμενον. τὰ δὲ ξυλάεια
χλωρὰ ἀντὶ κελαμῶδων παγε-
βιόμενα τοῖς ὀδόντι σμύχει τέ-
τοις· γίνεται δὲ καὶ ἐκ τοῦ καρπῶ
αὐτοῦ ἔλαιον συπτικόν, ἀρμόζον
πρὸς τὰ σύψαως δειόμενα.
Πρὶ Ρήτινης ὀνίνης. Κεφ. σά'.
Γεννᾶται δὲ καὶ ῥήτινη ἐξ ὀν-
τῆς ὀνίνης κελαμῶν, ὥς ὅτι
δὲ μαστῆγι· χρῆσι μείνουσαι πρὸς
αἵματος ἀναγωγὰς, καὶ πρὸς
παλαιὰ βήχα πινόμεν· ἐστὶ δὲ
ὑσδόμαχος ἐρευνκτική· μύσους
δὲ καὶ σμήγμασι ὀδόντων.
καὶ

DIOSCORIDIS

has sequitur è picea & pineis
nucibus resina : Natura omni-
bus calfacere, mollire discute-
re, expurgare. tussi ac tabi cõ-
ueniunt per se, aut in eclegma-
te ex melle, vitia pectoris ex-
purgant, vrinam cient, cruda
concoquunt, ventrem emol-
liunt, palpebras commodissi-
mè replicant, lepras tollunt,
cum arugine ac lutorio atra-
mento, nitroque : auribus fa-
niem emanantibus cum mel-
le & oleo, item in pruritu ge-
nitalium vtilis malagmatis, a-
copisque admiscetur. La terũ
doloribus per se, illitu & ap-
posito auxilio sunt.

Resina aliã .

Cap. XCIII.

Liquida resina è pinu & pi-
cea, à Gallia & Hetruria con-
uehi solet, atque olim á Colo-
phone petebatur : hinc Co-
lophonix sibi cognomentum
vendicauit . A Gallia quoque
subalpina : quã vernaculo no-
mine loricem appellat inco-
la. Ea in linctu, & per se, ma-
gnopere prodest tussi veteri.
Colore inter se distant : liqui-
dem alia candida est, alia ole-
osa, alia mellei liquoris simi-
litudine, vt laringa . Cupressitis
etiam liquidã fundit resinam,
quæ

ἡ δὲ ἀφ' ἐθιμοῦν ἢ τε πευκί-
νῃ καὶ ἡ σφικτὶνῃ ἐστὶ δὲ πᾶσα ῥι-
πὴν, μαλακτικὴ, ὀσμωτικὴ, δια-
χυτικὴ, ἀνακαταρπτικὴ· βλεφάρων ἀφ-
μόλυστα καὶ φθίσεις, ἐν ἐκλικτοῖς
καὶ εὐαὶ ἢ μὲν μέλιτος, ἀνακα-
ταρπῶν καὶ τὰ ἐκ θώρακος ἐστὶ καὶ
ἐν πεπνυμένῃ καὶ πεπνυμένη, κοιλίαν τε
μαλακάζει ἐν τε ἀνακολλησεί βι-
βλῶν ἀφ' ἀμύγδαλῶν ἐν βρεφάροις, καὶ
πρὸς λειψέας συνὶ ἰσθμῶ καὶ
χαλκιδῶν καὶ νίτρον, πρὸς τὰ ἰ-
σθμῶν τὰ ὅσα συνὶ μέλιτι καὶ ἑ-
λαιῶν, καὶ πρὸς κνηστὶν αἰδοῖν. μί-
ζουσι δὲ καὶ ἐμπαλάσκει, καὶ μαλά-
σκει καὶ ἀκόπτι, καὶ πλεονεξίας
ἀλγύμασι βρογχίται καὶ εὐαὶ τῶν
ὀπχιζέειν καὶ ὀπχιζέειν.

Πρὶ Πιπίνης ὕδατος Πιπινί-
νης καὶ Πευκίνης. Κεφ. 57.

Τίνεσθ' ὅτι ῥιπὴν ὕδατος πινυνὴ καὶ
πυκνὴν κομιζόμενα ἀπὸ γαλίας
καὶ ὑψηνίας, καὶ ἀπὸ κολοφώνος πᾶ-
σαι ποτε κομίζετο. εἰδέναι καὶ ὅτι
ἐπ' αὐτῶν ἐστὶ κολοφώνια κλη-
θεῖσθαι καὶ ἀπὸ γαλατίας τῆς πρὸς
ταῖς ἄλπεσιν, ἣν ὀπχιζέας οἱ
δι' ἐπικοιλάσκειν ὀνομάζουσιν.
ἐξ ὧν πεῖσαι πρὸς ταῖς χροῖας
βήχας ἐν ἐκλικτῶν καὶ καὶ εὐα-
τῶν. διαφορὰ δὲ εἰς τῶν χρο-
ματι καὶ αὐτῶν ἢ μὲν γὰρ τίς ἐστὶ
λευκὴ, ἢ δὲ ἐλαφρὴ, ἢ δὲ μέλι-
τι ὅμοια ὡς πρὸς τὰς ἀλγύμασι· γίνεται
δὲ καὶ κνισσομένη ῥιπὴν ὕδατος.
ἢ πρὸς

ἢς τις ποιῇ πρὸς τὰ αὐτὰ. τῆς
 ῥύμ τοι ἐν αἰσ, ἢ ῥύμ ὅστ' ἐροβλή-
 νη καὶ ἐλατίνῃ, ἢ δὲ πευκίνῃ, ἢ
 δὲ πιτυίνῃ. ἐκλέγου δὲ πασῶν
 τῶν ἐν ὁρίεσσι τῶν καὶ δι' αὐτῇ καὶ
 μὴ καπνοῶν μὴ δὲ καύουσαν,
 κηρεῖ δ' ἢ δὲ καὶ εὐδρυπτον. δια-
 φέρε δὲ αὐτῶν ἢ πιτυίνῃ καὶ ἐλα-
 τίνῃ· εὐώδεις γὰρ εἰσι καὶ λεβα-
 νίζουσαι. κομίζονται δὲ διὰ φο-
 ρῆς ἐκ πιτυόσης τῆς νήσου, ἢ τις
 10 κείται κατὰ τὴν Ἰσπανίαν. ἢ δὲ
 πευκίνῃ καὶ ἐροβλήνῃ, καὶ κωπα-
 ελοτίνῃ, ἐν δέισιν ἐστὶ εἰσι, καὶ οὐχ
 ὁμοίως κέρχεται ταῖς διωά-
 μεσιν ὥς ἐκείναι. παραχρῆμα
 νοῦται δὲ πρὸς δοῦν καὶ ἐκείναι.
 15 ἢ ῥύμ τοι χιτίνῃ, ἀναλογεῖ τῇ
 δεσμινδίνῃ.

* Πρὸς λυγρὸς ῥητίνης. Κε. ε. δ'.

Καίεται δὲ πάντα ῥητίνῃ ὕδα-
 ῖν τετραπλασίονι ἀργεῖω καὶ τὸ
 20 ἑξήκοντο ὕδατος. δέει γὰρ
 χροῦ μὲν ἢ ῥητίνης, δύο ἢ τρεῖς ὅμι-
 λους ὕδατος βαλόντας εἰς ἀλγέον,
 ἢ ἴσιν ἐστὶ ἀνδράκων παρῶν, δι' ὧν
 ῥῶς κινουῦνται ἀρχεῖς ἢ ἀνοσμοί
 (ῥήνη) καὶ εὐδρυπτός καὶ καπνοῦς.
 καὶ ὥς τοῖς δακτύλοις ἐκινῶται.
 25 πῶν δὲ ὑδάτος εἰς κρημέου
 ἀργεῖον ἀκονίον, * ταχέστιν ἀπὸ
 σπον, ἀποπύθειται. γίνετ' ἢ ἐξ ὁ-
 ρῶς λευκῆ, δέει ῥύμ τοι πρὸς δι-
 κέειν πᾶσαν ῥητίνην τήκοντα,
 ἵνα χωρισθῇ τὸ ῥυπνὸν ἀπὸ τῆς
 καλῆς.]

que ad eadē pollet. Quæ verò
 aridarū generi ascribunt, quæ-
 dā ex pineis nucib⁹, aliæ abie-
 te, aliæ picea & pinu exierunt.
 Eligi debet lōgē omniū odo-
 ratissīma, trās lucēs, nō retorri-
 da, neq; diluta; quādā cera fa-
 ciem prabēs, & friabilis. Epi-
 cea & abiete resinæ cæteras
 antecedit. odorata enim sunt,
 atq; thus odore imitatur. Præ-
 stantiores à Pityusa insula defe-
 runt, quæ secūdū Hispaniā sita
 est. Sed q̄ ē picea, nucib⁹ pineis
 & cupressō manarūt, nihil ad
 illas, nec tātis viribus potiūtur.
 Veruntamen eorundem gratia
 quorū & illæ fumi solēt. Lenti-
 scina terebinthinæ respōdet.

Fuligo resinæ. Cap. XCIII.

Vritur resina omnis liquida
 in vase quadruplæ capacitatis
 ad humore, qui infunditur: ita
 que resinæ congrius, in duobus
 aquæ pluviæ coquit, subiectis
 lenibus prunis, resina assidue
 mouet, donec omnis odor ab-
 oleatur, & friabilis & retorri-
 da reddat, ac digitis cedat. Cæ-
 terū vbi rīfixit, in fictile non
 picatū, quod aconitū vocāt, id
 est non illitum, recōditur. Fiet
 etiam eximij cādorīs, si resina
 omnis eliquata præcolet, quò
 fœculenta sordes exernatur.

Vruntur

DIOSCORIDIS

Vruntur quoque sine aqua, pri-
mum lento igne : & vbi coire
coeperūt. maior carbonū stru-
es supponitur, & triduo citra
intermissionem discoquuntur,
vsque dum antedictas naturā
suar notas exuerint: mox, vt di-
ctum est, reponuntur. Aridas
vnius diei spatio decoxisse sa-
tis est. Vltā odoratis malagma-
tibus, & acopis, & vnguento-
rum colorationibus magnope-
re vtilis sunt. E. resina perinde
atq; thure fuligo excipitur, ad
circumlitiones idonea: quibus
palpebras fucant, & colorem
mentiuntur. Prodest glabris ge-
nis, collachrymationibus, ero-
sisq; oculorum angulis, ex ea
fit atramentum scriptorium.

Pix liquida. Cap. XCV.

Pix liquida, quam alij co-
num vocant, ē pinguisimis pi-
ni piceaeque lignis congrega-
tur. Optima est splendens, syn-
cera, laevis. Contra venena,
phthisin, purulentam excrea-
tionem, tussis, suspiria, & pe-
ctoris humores, qui difficile
extulsuntur, efficax est, ecle-
gmate cyathi mēsurā cū mel-
le dato. Tonillarum & vuē in-
flammationes, anginaeque, vtili-
ter perunguntur: purulētis au-
ribus infunditur cum rosaceo,

καίονται δὲ καὶ δι' ἡμέρας ὕδατος ἐπὶ
ἀνδράκων κήψας τοσούτον· ὁ-
ταν δὲ μέλλωσι* συσφύσθαι ἀνδρά-
ως καὶ πολλὰς ἀποδετέον τοῦ ἀν-
δραγας, καὶ ἐν τῷ αἵματι ἀδιδυμῶς
ἐφ' ἡμέρας καὶ νύκτας ἡμέρας, ἅ-
ρξιν ἀνὰ τὸ πρὸς τὸν μύλον ἰδίωμα
ἀπολίπωσιν, ἀποπίθουσι δ' ὡς ἐπὶ
ρηται. τὰς μὲν τοὺς ἐκείας ἀρκέσει
δι' ὅλης ἡμέρας ἐν τῷ αἵματι ἀπο-
πίθεται. ἐν τῇ ἡμέρᾳ δὲ καὶ αἱ κε-
καυμένα, εἰς τε τὰ ἐν ὥδῃ τῶν
μαλακμάτων καὶ ἀκοπῶν, καὶ εἰς
χρωματισμοὺς μύλων. ἐκ λευκά-
νης δ' καὶ λευκῆς ῥητίνης ὡς πρὶν ἐπὶ
τῷ λευκῷ, ἢ τῷ χρωματισμῷ πρὸς τε
καὶ ἐκ λευκῆς, καὶ πρὸς ἐκ λευκῆς
καυτῶν καὶ μύλων ἢ ἐκ λευκῆς, καὶ
δακρυόντας ἐκ δακρύων. γίνεσθαι δὲ
ἐξ αὐτῆς καὶ μέλαν ὅτι χρωματίζεται.

Πρὶ Πίσιος ὑγρῶς. Κεφ. σέ.

Πίσια ἢ μὲν ὑγρὰ. λέγεται ἐν τοῖς
καὶ ὡς καλοῦσι, συνάγεται μὲν
ἐκ τῶν λιπαρωτάτων ξύλων, πέν-
της καὶ πίπτος. ἐστὶ δὲ καὶ ἡ ἐκ
λουσα καὶ λεῖα καὶ κατὰ τὴν ποιεῖ
δὲ πρὸς δανόσιμα φάρμακα,
φθιστικὰ, ἐμπυικὰ, ἐκ τῆς ἀδ-
ματα δυσανάγωγα τῇ ἐν τῷ αἵματι
ὑγρῶν, ἐκ λευκῆς καὶ καυτῶν καὶ
δὸς μικτὰ μέλανος. ποιεῖ δὲ καὶ
πρὸς τὰς τῶν παριθίων καὶ πα-
φυλῆς φλεγμονὰς καὶ συνά-
γας διαχρωμῆν καὶ πρὸς τὰ
πυορροῦντα ὡς πρὸς τὸ δίδωται.

&

καὶ

5 ἢ πρὸς ἐπὶ τῶν δ' ἔργα τα σὺν
 ἄλλοις λείους κατὰ πλάσσομένῃ, κη
 ρῶ δὲ ἴσην μὲν ἔσται, λεπτοῦς ὄνυ-
 χας ἀφίστησι, φύματά τε ὑστέρας
 καὶ σκληρίας δακτυλίου διαφο-
 5 ρεῖ· σὺν κριθῶν δὲ ἐψηθεῖσα
 ὁλευρῶ καὶ πικρῶς οὐραῖ, χοιρέ-
 δας περιρρίσκει· μετὰ δὲ δειοῦ
 ἢ πίπτος φλοιοῦ ἢ πτύρην, ἐξπι-
 πτος ἐπέχει κατὰ χρομόν· μαν-
 νη δὲ καὶ κρωπῇ μὲν ἔσται, τὰς ὑ-
 10 πὸ φρεσὶς πικροκολλῶ, πρὸς τε
 τὰς ἐν ποσὶ καὶ δακτυλίων ραγά-
 δας ἀρμόζει κατὰ χρομόν, πλη-
 ρεῖτε τὰ ἔλκην, καὶ ἀποκαθαίρει
 σὺν μέλιτι, σὺν σαπίδι δὲ καὶ μέ-
 λιτι, ἀνδραγας καὶ σιπερόνας πε-
 15 ριχαίρει· μίγνυται δὲ καὶ
 σήπιδας χρυσίμους.

Πρὶ Πιστελαίν. Κεφ. 55.

Γίνε) δὲ καὶ πιστελαῖον ἐν τῇς
 πύσσι, χοιρέζομένῃ ἢ ὑδαλώδους
 οὐτ' ἐφίστα) ἢ τὸ το κατὰ πλάσσο
 20 ρὸς γάλακτι, καὶ ἐκλαμβάνε) δὲ
 ἐν τῇ ἐψηθεῖσά· πύσσι, καὶ σαπύ-
 μένῃ ἐν τῇ κατὰ πλάσσο, ὅταν ἐν τῇ
 ἀναφρομένῃ ἀμῶν ἡσθ) διαβρο-
 χον, ἐκθλίβε) εἰς ἀγγεῖον, καὶ τὸ
 25 γίμε) ἐφ' ὅσον ἂν χρῶγον ἢ πύσσι
 ἐψηθεῖσά· πύσσι δὲ πρὸς ὅσα καὶ ἢ ὑ-
 ρῶ πύσσι, σαπύ) δὲ καὶ ἄλωπε-
 κίας κατὰ πλάσσομένῃ μὲν κριθῶν
 καὶ ὁλευρῶ δὲ χοιρῶν δ' ὅσο καὶ ἢ
 ὑρῶ πύσσι, καὶ τὰ ἐπὶ τῇ κτύπῳ
 ἔλκην καὶ ἰώρας ἐπιχρομόν.

Πρὶ

& illiniē cū trito sale serpentii
 morib⁹: adiectaverò pari cera
 scabros vngues extricat, impe-
 tiginēsq; emēdat: vuluæ duriti-
 as ac sedis tubercula discutit:
 cū farināq; hordeacea et pueri
 ipubis vrina decocta, strumas
 rūpit: cohibet vlcera q̄ serpūt,
 cū pineo cortice, aut sulphure,
 aut furfuribus illita. Cæterū cū
 thuris māna & cerato pfūdos
 vlcerū sin⁹ cōglutināt, rimis se-
 dis & pedū, magno auxilio illi-
 nit: vlcera replet, & cum melle
 purgat: quin & cū vva passā, et
 melle carbunculos, & putrida
 vlcera emarginat, disrumpitq;
 erodētibus medicamētis, quas
 septas vocāt, pbē immiscetur.

Picinū oleū. Cap. XCVI.

E pice fit quod pisseleœon ap-
 pellāt, separato liquore aquo-
 so, qui supernatat pici, sicut fe-
 rum la cti. Nam expansa, quā-
 diu pix coquitur, supra corti-
 nam vellera pura madescent,
 acceptoque halitu eius expri-
 muntur in vas. Quas pix liqui-
 da, præbet vitilates, alopeci-
 as capillo replet cum farina
 hordeacea illitum, qui-
 bus & liquida pix me-
 detur iumētorum
 vlcera scabiēm-
 que emēdat.

f

Fuligō

DIOSCORIDIS

Fuligo liquida picis.

Cap. XCVII.

Fit hoc modo è liquida picē fuligo: In lucerna noua q̄ ellychnium habeat, nonnihil picis incendito, lucernāq; fictili vase in clibani speciem cōformato, superius in angustum fornicato, inferius perforato, vt clibanus esse solent, operito, & adoleri finito: consumptoq; liquore nouū infundito, quo ad sufficientem vsui fuliginem collegeris. Vis ei adstringēs, acrisq;. Vtui est ad pigmēta quib⁹ palpebras linunt & venustant, & ad circūlitiones. Item vbi glabris genis pilos restitui oportet, ad imbecilles lachrymōsqs; oculos, insuper ad eorūdem vlcera non inutilis est.

Pix arida.

Cap. XCVIII

Liquida pix decocta in spissam coit, quā vocant aliqui palimpissam: quo in genere quēdam visci modo lentescit, boscas cognominata: altera sicca est. Probat̃ pura, pinguis, odorata, subrufa, resinosa. Talis Brutia & Lycia, picis resinæque simul naturam habentes. Calfactoriam vim habet: dura emollit, pus mouet, tubercula pannōsque discutit,

vlcera

Πρὶ Λιγνός τῆς ἐξ ὕλης ποσῆς. Κεφ. 57.

Γίνεται δὲ καὶ λιγνὸς τῆς ὕλης ποσῆς οὕτως· εἰς λύχνον καμνὸν ἐλλυχνισμένον δοῦς τι ποσῆς, ἅλφι καὶ πομάσας τὴν λύχνον καμνὸν ἀγρίῳ καραμῶ κλισανοειδῇ, ἀνωθεν κλῖ ἀειφέρει καὶ σπῶν, καὶ τῶθεν δὲ τῆς μαῖας ἐρχεται καὶ ἀπὸ τοῦ οἰ κλισανοῖ, ἔα καίεσθαι, ὅταν δὲ ἀναλοθῇ τὸ σπῶν τὸν ὕλιν, ἄλλο ἐπὶ χεῖ, ἕως ἂν αἰσθαλώσῃς λιγνὴν ἀμύκη, καὶ χεῖ. Διῶαμιν δὲ ἔχει δριμύτην καὶ συπτικὴν. Χρηστον δὲ αὐτῇ, εἰς τὰ καλλισθένια, καὶ περὶ τοῦ μεμνηκότα βλεφαρος τειχεφύσσει δει, καὶ περὶ ἀδενέσεσσι καὶ σακρυρρόωσι ταῖς δὲ εἰς ἐλκῶς ὅμματα χρηστός.

Πρὶ Ξηρῆς ποσῆς.

Κεφ. 58.

Ἡ δὲ ξηρὰ ποσῆς, ἐξ ὁμοῦ τῆς ὕλης γίνεσθαι καλεῖται δὲ αὐτὴ ὡς ἐλκῶν παλμπισσα. γίνεσθαι δὲ αὐτῇ ἢ μὲν τις ἐξ ὁδῆς, βοσκὰς καλεῖται, ἢ δὲ ξηρὰ, ἐστὶ δὲ καλὴ ἢ κατὰ ῥα, καὶ παρὰ ἐν ὁδῆς τὴν καὶ ὑπόκλιβρος καὶ ῥηπινώδης. ταυτὴ δὲ ἐστὶν ἡ λιχιακὴ καὶ βρυπία δύο φύσεων ἐχούσῃ ποσῆς ἅμα καὶ ῥηπίνης. Διῶαμιν δὲ ἔχει δριμύτην καὶ μαλακτικὴν, πυστικὴν, διαφουρικὴν φυμάτων καὶ φυρέθλων, καὶ

ἐν πληρωτικῇ ἐλκῶν, μίγνυσι) δὲ
καὶ τρεῖς μαθηκοῖς χηνοῖς μωσ.

Πρὶ Ζωπίσσης. Κεφ. εθ'.

Ζωπίσσαν δὲ οἱ μὲν, εἶπεν τὴν
ἐκ τῶν παλίων ξυνομήλων ῥητίνην
μετὰ τῷ κηρῷ, καλουμένην ὡς
ἐκείνη ἀπόχυμα, οὗσαν διαχυ-
κὴν διὰ τὸ ἐν τῇ θαλάσσῃ βρέ-
χεσθαι· οἱ δὲ, τὴν πτυνίλῃ ῥητ-
νίλῃ ὡς τὸς ὀνόμασαν.

Πρὶ Ασφάλτου. Κεφ. ε'.

10 Ασφάλτος διαφέρει ἡ ἰουδαί-
κη τῆς λοιπῆς· ἐστὶ δὲ καλλὴ ἡ πορ-
φυρεοειδὴς σιλβουσα, αὐτὸς τῇ
ὁσμῇ καὶ βαρεῖα· ἡ δὲ μέλαινα καὶ
ῥυπόδης φάλλι. Διούτῃ καὶ
15 ἐν φοινίκῃ, καὶ ἐν σιδόνι, καὶ ἐν
βαβυλῶνι, καὶ ἐν ζακύνθῳ, γί-
νεται δὲ καὶ κτ'· τὴν ἀκραγαντί-
νων χείρην τῆς σικελίας, ὡς δὲ ἐν
πικρῷ μόνον ἔκρηταις, ὡς χεῖρ-
ται εἰς τὸν λύχνου αὐτῆς ἐλαίου,
20 καλουμένης αὐτὸ σικελὸν ἔλαιον,
παλαιόμωσι· ἐστὶ δὲ ἀσφάλτου
ὡς εἶδος.

Πρὶ Πισσάσφαλτος. Κεφ. ρά.

Καλεῖται δὲ τις καὶ πισσάσφαλ-
τος ἡ γυναικὴ ἐν ἀποκλωνίᾳ τῇ
πρὸς ἐπιδαύρῳ, ἡ τις ἐκ τῶν κεραι-
25 νίων ὁρῶν συγκαταφέρεται, τῇ τῷ
ποταμοῦ ῥύμῃ, καὶ ἐκβλάσεται
κτ'· ταῖς ἡίδωσι, βαλοειδῶς συμπε-
πνυῖα, ὁζουσα πώσσης μεμιμ-
νης ἀσφάλεται.

Πρὶ

vlcera replet, vulnerariis medi-
caminibus cōmodè permiscet.

Zopiffa. Cap. XCIX.

Zopiffam aliqui aiunt dera-
sam nauibus resinam cum ce-
ra, quam alij apochyma appel-
lant. Ea dissipandi naturam ha-
bet: quoniam marino sale ma-
cerata sit. Alij pineam resinam
hoc nomine vocauerunt.

Bitumen. Cap. C.

Bitumē Iudaicū ceteris an-
teponitur. Cuius probatio est,
vt purpuræ modo splendeat,
sitq; pōderosum, ac validū odo-
rem vibret. Nigrū autē & for-
didū, vitiosum est. Adulteratur
pice. Gignitur in Phœnice, Ba-
bylone, Zacyntho, & Sydone.
Liquidum inuenitur in Agra-
gantino Siciliae fontibus innā-
tans: quo vtuntur ad lucerna-
rum lumina, olei vice. Halluci-
nantur, qui id Sicilicū oleū no-
minant: nanq; liquidū bitumi-
nis genus esse constat.

Pissasphaltum. Cap. CI.

Nascitur in Apolloniatarum
agro circa Epidaurum, quæ pis-
sasphaltos appellatur. Ea Ce-
rauniis mōtibus deuoluta, im-
petu fluminis rapitur, aestuque
in littus expuitur, illic coacta
in glebas, mistam bitumini pi-
cem redolet.

f ij Naphtha,

DIOSCORIDIS

Naphtha. Cap. CIL.

Πη Νάφθα. Κεφ. ρβ.

Naphtham vocant Baby-
lonij, bituminis colamen, co-
lore cādidum: inuenitur etiam
nigrum. Vis ei ignium rapax,
ita vt ex spatio protinus in
eam transfiliant. Ad suffusio-
nes oculorum, & albugines
vtilis. Bitumen omne discu-
tit, glutinat, emollit, ab inflam-
matione tuetur: vuluarum pro-
cidentia, strangulationesque
olfactu, suffitu, impoſitu, emē-
dat: comitiales morbos suffi-
tum deprehendit, gagatæ lapi-
dis more: purgationes mulie-
rum cum vino, & caſtorio po-
tum elicit, tuſſim veterem &
anhelitem adiuuat, serpen-
tium morſibus, coxendicum
laterumque doloribus auxilia-
tur, datur coeliacis in catapo-
tio deuorandum, cum aceto
potum diſcutit ſanguinem cō-
cretum, dyſentericis cum pti-
ſana liquatum infunditur, di-
ſtillationibus ſuffitione mede-
tur, mitigat dentiū dolores obli-
litum, ceterum pilos incōmo-
dos ſiccū replicat, ſpecillo im-
poſitum: cōcaſtactum autem,
& cum farina hordeacea, ni-
tro & cera illitū, podagris, ar-
ticulorum doloribus, lethargi-
cisque prodeſt. Piſſaſphaltos
eadem,

Καλεῖται δὲ πρὸς τὴν νάφθαν, ὅτι
ἐστὶν ἡ βαβυλωνίᾳ ἀσφάλτης, ὡς
ἡδύμα, τῷ χρώματι λευκὸν· εὐ-
εῖσκεται δὲ καὶ μέλαν. Διῶμαιν
ἐχόν ἀρπακτικὴν τῷ πυρὸς, ὥς τε
καὶ ἐν διατήματι ἀπὸ πάντων τῶν
ὄψεσιν ὡς ὡς χροῖσι χροσμεύει
καὶ λευκώματα. Διῶμαιν δὲ ἔχει
πάντα ἀσφαλτος ἀφλέγματον.
κολλητικὴν, διαφροσητικὴν, μαλα-
κτικὴν, πικρὴν ὡς πύργος ὥστε
εὐκλεῖς καὶ ὡς ἐπιώσεις· ὡς ἐστὶν
μύνη καὶ ὡς ὡς ὡς μύνη καὶ ὡς ὡς
μυωμύνη· ἐλέγχει δὲ καὶ ἐπληκτικὴ
κοῦς ὡς ὡς μύνη καὶ ὡς ὡς
καὶ ὁ γὰρ πρὸς λίθος πύργος δὲ
μετ' οἶνον καὶ καστορεῖν ἐμμελὴ κα-
νεῖ καὶ βλεῖ χροῖας καὶ ἀσφαλ-
κοῖς καὶ δυαννοῖας βοηθεῖ, καὶ ἐξ-
πετῶν δὲ ἡμασι, καὶ ἰσίων πύργοις καὶ
πλευρῶν· δίδεται δὲ καὶ κοιλια-
κοῖς κατὰ πύργον, καὶ ἀρόμους αἰ-
ματος διαλύει σὺν ἡξεί πύργου·
ἐγκλύζεται καὶ ἐπὶ δυαννοῖς
καὶ σὺν πύργου τακείσιν, καὶ κα-
τὰ ῥόδους ὡς ὡς μύνη δὲ ὡς
πύργου, καὶ ὁδὸν τῶν ἀλγῶν πύ-
ργου ἀδείσιν ὡς ὡς ἀνακολ-
λῶ δὲ καὶ τείχεος ἡ ἡξεί διδ-
μυωμύνης· δὲ ὡς μύνη δὲ ὡς
ρήγει πύργου πύργου, καὶ ἀρ-
θρικῶν καὶ ληθαργικῶν σὺν
ὡμῶν λύσει καὶ ἐμμελὴ καὶ νύκτωρ κατὰ
πύργου· ἡ δὲ πύργου ἀσφαλτος
διῶμαιν

διδόναι ὅσα πῖσα καὶ ἄσφα-
τος μίχεται.

Πρὶ Κυπαρίσσι. Καθ. ςζ'.
Κυπάρισσος εὐφραίνει, ἡ χεὶρ τὰ
φύλλα ποδέντα μὲν γλυκεῖς καὶ
5 σμύρνης ὀλίγης, κινεῖ ρευματιζο-
μένη καὶ δυσουρίας βλάπτει. τὰ
δὲ σφαιρεία κοπέντα καὶ σὺν οἴ-
νω πρὸνδρα, ἀρμυρὰ πρὸς αἵμα-
τος ἀναγνώμην καὶ δυσεντέραν,
καὶ κοιλίας ρευματισμὸν, ὅς ἐστι πνι-
10 αὖ βλάπτει καὶ τὸ ἀφελήμα αὐτῶν
τὸ αὐτὸ πίνει· μαλάττει δὲ καὶ
σκληρίας κοπέντα μετὰ σίκου,
καὶ πελὺποδας τὸν ἐν μυκτῆσιν
ἰάται, ἐκβαλλει δὲ καὶ λευκαῖν-
τας ὄνυχας, σὺν ὅξϊ καὶ τε φλέ-
15 τα καὶ λειωθέντα μετὰ ξέρμαν,
τέλλει δὲ καὶ ἐντέρων κλάσας κα-
ταπλαθέντα. καὶ τὰ φύλλα δὲ
αὐτὰ πίνει· δοκεῖ δὲ καὶ κώωπος
διώκειν τὰ σφαιρεία μετὰ τῆς
κώωπος συμαθέντα. τὰ δὲ φύλ-
20 λα λεία καταπλαθόνδρα, τεύ-
ματα κολλᾷ· ἔστι δὲ καὶ ἰσχάμα,
σὺν ὅξϊ δὲ λειωθέντα, τεύχας
βλάπτει, καταπλαστέται δὲ καὶ
αὐτὰ καὶ σὺν ἀλφίτῳ πρὸς ἐρυ-
σπέματα καὶ ἑρπητας, ἀνδραγας,
25 καὶ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονάς,
κινεῖ δὲ μυχύτα, σωμαχόν κρε-
πύει ἐπιπρόνδρα.

Πρὶ ἀρκευδίδος. Καθ. ρθ'.

Ἐστὶν ἀρκευδὶς ἡ μὲν μικρὰ, ἡ δὲ
μεγάλη· δριμύτης δὲ ἀμφοτέρων,
διεσπ-

cadem, quæ pix & bitumen, si
misceantur, potest.

Cupressus. Cap. CIII.

Cupressus refrigerat, & a-
stringit. Cuius folia ex passō,
& exiguo myrrhæ pota, vesicæ
rheumatismis, & urinæ diffi-
cultati auxiliantur. Pilulæ au-
tem ex vino tusæ in dysente-
ria, alui fluxione, tussi, & or-
thopnoea, aut si reiiciatur san-
guis, conuenientissimè bibun-
tur: earum decoctum eosdem
præbet effectus: tusæ cum fi-
co duritias emolliūt, narium-
que polypo medentur: in ace-
to coctæ, & cum lupinis de-
trita scabros vngues eiciunt:
hernias intestinorum prolapsu
erumpentes illitu reprimunt.
Folia eadem præstant. Pilulæ
cum arboris coma suffitæ, cu-
lices abigere exislmanant. Fo-
lia trita & iposita, vulnera cō-
glutinant: sanguinem suppri-
munt, capillum ex aceto tin-
gunt, illinuntur per se, aut cum
pollenta ignibus sacris, vlceri-
bus quæ serpunt, carbunculis
& oculorum inflammationi-
bus, admota cū cerato stoma-
chum corroborant.

Iuniperus. Cap. CIII.

Iuniperi gñæ duo: altera maior
altera minor, vtræque acris est.

f iii Excal.

DIOSCORIDIS

Excalfacit, & vrinā mouet, ac-
censa serpētes fugat. Baccharum
nōnulla nucus iuglādis magni-
tudine nōnūquā grandescere,
aliae nucē Pōticā æquare inue-
niunt. rotūdæ, odoratæ, in mā-
dendo dulces, subamaræ, q̄ ar-
ceuthides etiā, id est bacca iu-
niperi, nominant. Modicè cālfa-
ciūt: & astringūt, stomacho vti-
les, cōtra pectoris vitia, tussim,
inflatōes, tormina, & serpētū
ictus efficacissimè bibunt: vri-
nā ciēt, vnde ruptis, cōuulsis, &
vulua strāgulatui subueniunt.

Herba Sabina. Cap. CV.

SABINA duorum ge-
nerum est. Vna foliis cupres-
so similis, spinis horridior,
grauiter olens, acris & fer-
uens: arbor est coactæ bre-
uitatis, quæ sese magis in la-
titudinem fundit: huius fo-
liis nonnulli pro suffitu vtun-
tur. Altera tamarici folio
similis est. Vtriusque folia no-
mas sistunt, collectiones il-
liti mitigāt, & cum melle ni-
gritis fordēsque repurgant,
carbunculos cum vino, po-
ta rumpunt, sanguinem per
vrinam eliciunt, partus ap-
posita extrahunt, & suffitu i-
dem præstant, vnguentis cal-
facientibus immiscentur, &
priuatim

διουρητικὰ καὶ θερμαντικὰ, συ-
μώμεναι τε θηρία διάκουσιν.
ὁ δὲ καρπὸς αὐτῶν ὁ μὲν τις κα-
ρύου μέγας εὐρίσκειται· δὲ κα-
ρύου πεντηκῶ ἴσος στρογγύλος τὸ
καὶ ἐνὸσθι καὶ γλυκύς ἐν τῷ δια-
μασθῆσαι, καὶ ὑπόπικρος, ἀρ-
κευθὶς χαλούμενος, θερμαντικὸς
μετρίως καὶ εὐπικρὸς, ἐν σφοδρῶς
πιπὼν πρὸς τὰ ἐν σπλάχνῳ καὶ βί-
χας καὶ πνευματώσεις καὶ σπύ-
ροις καὶ θηρία πνιόμενος· ἐπεὶ δὲ
καὶ οὐρητικὸς, ὁδὸν καὶ σπασμα-
σι καὶ ῥήγμασι καὶ ὑστερίαις πνι-
ζομένων ἀρμόζει.

Πρὶ Βράθυος. Κεφ. ρε.
Βράθυος, ἐννοί βαράθρον καὶ ἀστῆ-
ρι ὃ τῷ ἴσῳ εἶδη δύο. τὸ μὲν γὰρ αὐτῷ
ἐστὶ τοῖς φύλλοις ὁμοίον κυπαρίσ-
σιν, ἀκαθάρτες δὲ καὶ βαρυόσ-
μον, δριμύ, πυρωτικὸν κολοῦν ὃ
τὸ δένδρον καὶ εἰς σπάτος μάλ-
λον χέμενον. καὶ ὅτι τινες τοῖς
φύλλοις ἀντὶ θυμάματος. τὸ δὲ
ἕτερον μυρική τοῖς φύλλοις ὁμοίον.
ἀμφοτέρων δὲ τὰ φύλλα ἴσησιν
νομάς, καὶ φλεγμαῖς καταπλατ-
τόμενα παρὰ τὴν ἀποκαθάρσιν τὴν
μελανίαν συνάμμιξι κατὰ πλάσ-
σόμενα, καὶ τὰς ῥυτίδας καὶ ἀνδρα
καὶ ἀπὸ τῆς συνάμμιξιν ποτὶ τὴν
καὶ αἵμα δι' ἧτον ἄλγος, ἐμμενα
ἐν τῇ ἀσθί, παρὰ τὴν ἀσθί καὶ ἵπ-
θυμαθίαν, ὅθεν αὐτὸ ποιεῖ μίσιν
καὶ τοῖς θερμαντικαῖς χρίσμα-

σι,

στη δ' ἰσως δὲ τῷ γλευκίνῳ.

Πρὶ Κέδρου. Κεφ. ρς'.

Κέδρος δένδρον ὅτι μέγα, ἐξ ὃ
ἢ λεγομένη κεδρία συνάγει· καρ
πὸν δὲ ἔχει ὡς τῆς ἀφ' αὐτοῦ, * φέ
ρεται μέγας, μυρτα πρὸς ῥῆ.
Τῆς δὲ κεδρίας αἰεσι· ἢ παρ' αὐτὴν
καὶ διαγνῶς, βαρεῖα τῇ ὁσμῇ· ἀπο
χομένη δὲ καὶ σαλαγμούς· ὅτι
διαμένει καὶ μὴ διαχέμενη.
Δυναμὴν ὅτι ἔχει σπινθηρὸν μὲν τῶν
ἐμ-λύχων, φυλακτικὴν δὲ τῶν νε
κρῶν σωματίων· ὅθεν καὶ νεκροῦ
ζωὴν πνέει αὐτὴ ἐκάλει· καὶ ἰμά
τια· καὶ δέρματα φθείρει διὰ τὸ
θρῆσκον ὅτι πταμένως καὶ ξηραί
κην· ἐνδοτεῖ· ὅτι εἰς τε ὀφθαλμοὺς
καὶ ἐξ ὀφθαλμοῦ ὅσα ἐλκεύονται, καὶ λευ
κώματα, καὶ ὅλας σμύχει, συν ὅτι
διακλυζομένη, σκώληκας τὰς ἐν
ὧσιν κτείνει, ἢ χροὺς τὰς καὶ συριγμούς
παύει· σὺν ὅσῳ περ ἀφ' ἡμῶν ἐγ
χομένη, εἰς τε ἐμβρομάτα ὀδόν
των ἐν σαλαγείσιν, θραύει μὲν τὸν
ὀδόντα, παύει δὲ τὴν ἀλγὴν ὀδόντα,
συν ὅτι· ὅτι διακλυζομένη τὸ αὐτὸ
πιεῖ, πειριχιδέσιν δὲ αἰδοῖω
πρὸς τῆς συνήθους, ἀπὸ κινῶν ὅτι,
συνάγκων τε πείριχιδος ὅτι καὶ
πειριχιδέων φλεγμοναῖς βοηθεῖ,
φθείρει τε καὶ κρινῶς φθείρει πε
ριχιδέσιν, κατέστυ δὲ δὴν μασσι
συν ὅσῳ καταπλάσσομένη, ἀρῶ
ν, πρὸς τὴν λαβὴν θαλασσίᾳ πόσιν,
ἐν γλυκεῖ λαμβανομένη βοηθεῖ,
ὡφελεί

privatim gleucino.

Cedrus. Cap. CVI.

Cedrus arbor magna est, ex
qua picē colligunt, quæ cedria
vocatur: iuniperi modo bac
cas parit, baccarum myrti ma
gnitudine, rotundas. Cedria o
ptima est crassa, perlucida, gra
vis odoris: quæ dū effunditur,
guttatim nō dissipata coit. Cui
ea vis inest vt defuncta corpo
ra conservet, & viuentia cor
rumpat, quæ ex causa mortuo
rum vitam aliqui appellauere.
Vestimenta quoque, & pelles
eximia calfaciendi, & siccandi
dote, corrumpit: magni ad o
cularia medicamēta vñus, quip
pe illi oculis claritatem af
fert, albugines cicatricēsque de
tergit, instillata autem cum a
ceto vermes aurium necat, cū
hyssopi decocto infusa soni
tus sibilosque sedat, canis den
tium indita eos frangit, & do
lores leuat, idem facit cū ex
aceto colluitur: peruncto ante
coitū genitali abortiuum fieri
constat, angina· ea perungunt,
tonsillarum inflammationibus
auxilio est, lentes pediculósque
illitu enecat, cerasia moribus
cum sale imposita subuenit, cō
tra hausta leporis marini vene
na, in passio sumpta auxiliatur:

f iiii in

DIOSCORIDIS

in elephantia, aut linctu, aut
peruncione proficit: pulmo-
num vlcera purgat, & si cya-
thus eius sorbeatur, perfanat:
vermes & tinea subter indita
necat, & partus extrahit. Fit &
oleum, à cedria separatū, dum
coquitur, velleribus supra ha-
litum eius expansis, vt in pice.
Eiusdem ad omnia vsus: pri-
uatim vehemēter perunctum
scabiem quadrupedum, canū,
bouūque perfanat: inhaeren-
tes ricinos enecat, vlcera quæ
ex tonsura acceperunt, ad ci-
catrices perducit. Cedrides ce-
dri fructus vocantur. Calfa-
ctoriam vim habēt, stomacho
aduersantur, auxilio sunt tussi,
conuulsis, ruptis, stranguriæ:
mensesciunt, ex polline pipe-
ris poti: contra haustum le-
porem marinum in vino su-
muntur, serpentes fugantur,
peruncto ex adipe ceruino aut
medulla, corpore: in antido-
ta adduntur. Fuliginem, quo-
modo ex pice, congeri oportet,
quæ eandē, quam picea fuli-
go vim præbet.

Laurus. Cap. CVII.

Laurus quædam tenui folio
constat, altera latiore. Vtraque
excalfactoriâ naturam habet,
& emolliētē. Vnde decoctū
earum

ἀφαιεῖ καὶ ἐλεφαντῶντας ἐκλε-
χρόνους, καὶ θάλλει καὶ τὰ ἐν πνεύ-
μονι ἔλκυσ, καὶ ἰσχυρὰ ὅσον κύματος
ροφουμένη, σκωληκούς τε καὶ ἀσκαρί-
δας ἐγκλυζόμεναι φθείρει καὶ ἐμ-
βρυα κατὰ σπῆν. γίνεται δὲ καὶ ἑ-
λαιον ἐξ αὐτῆς χροὺς ὁμώνον ἀπὸ
τῆς κεδρίας δι' ἐλείου καθ' αἰωρεμένη
ἐν τῇ ἐλπίσει ὡς ἐπὶ τῆς πίστεως.
πυρρὸν περὶ ὅσα καὶ ἡ κεδρία. Σε-
ραπεία δὲ τὸ ἑλαιον ἰδίως καὶ τὰ
ἐπὶ τῆς δαπόδων ἰσχυρὰ καὶ κυν-
ῶν καὶ βοῶν ἀνδρῶν καὶ τῶν χρι-
σθίων, καὶ τὰς ἐκ αὐτῶν κρότω-
νας φθείρει, καὶ τὸς ἐπὶ τῇ κεφαλῇ
γεννηθῆναι ἐλκώσεις αὐτῶν ἐπου-
λοῖ. τὴν δὲ λιγρὴν συνακτέον ἰς
αὐτῆς ὡς ὅτε τὴν τῆς πίστεως δύ-
ναμιν ἐχρυσαν τῆς αὐτῶν ἐκείνη.
καδρίδες δὲ καλοῦνται οἱ ἐξ αὐτῆς
καρποί. Διὸ αἰμὴν δὲ ἐχρυσὶν Σε-
μαντικῶν, κακοσόμαχον, βοηθῶσι
δὲ βελή, σπασίμασι, ῥήμασι, τρα-
γουείας, καὶ ἐμμελῶς ὁμοιοῦσι με-
τὰ πεπόμενους καὶ πνέμεναι, καὶ
περὶ λαγῶν θαλασσίων πίσην αὐτῶν
οἶνον λαμβάνονται. διώκοισι καὶ
θελεία χροὺς καὶ σώματος αὐτῶν
ἐλαφρῶς σταπὶ ἢ μυελῶ, μίγνυνται
δὲ καὶ ἀντιδόχοις.

Πρὶ Δάφνης. Κεφ. ςζ.

Δάφνη, ἡ μὲν τις ὅστις λεπτὸς
φυλλος, ἡ δὲ, πλατυτέρα. Σε-
μαντικῶς δὲ ἀμφοτέρω καὶ μα-
λακτικῶς. ὅθεν τὸ ἀπὸ ἡμέρας
αὐτῶν

ἄν τῶν εἰς ἐγκυδίσματα τὰ πρὸς
 μήτραν καὶ κύτην ἀρμόζει. τὰ δὲ
 χλωρὰ τῶν φύλλων, ἡρέμα ὑποψύ-
 φει ὡς ἔει δὲ λεία καταπλαδέγ-
 νται, σπρηκῶν καὶ μελιτῶν πληθύνει.
 5 Δυνάται δὲ καὶ πᾶσαν φλεγμονὴν
 παρὰ τὴν συνὴν ἀλφίτῳ καὶ ἄρτῳ
 καταπλαδέσθαι, ποθὲν δὲ παρὰ
 νει τὸν στόμαχον, καὶ ἐμέτους κινεῖ.
 Αἱ δὲ διαφρίδες δεξιὰν πικρὰν τρεῖς
 τῶν φύλλων εἰς πύρεσιν οὐκ ἐκ-
 10 λήχοντα λεία συνὴν μελιτῶν καὶ γλυ-
 κέων, πρὸς φθίσην καὶ ὀρθόπνοιαν καὶ
 τὸν πρὸς τὴν ὥρα καὶ βρυματισμοῖς
 παύονται δὲ συνὴν οἶνον πρὸς σκορ-
 πιοπλήκτους, καὶ ἀλφουδὲς δὲ
 συμπύρεσιν. τὰ δὲ πρὸς τὴν ἀντι-
 15 ὀταλγίαν καὶ δυσκοίλιαν βρωθεῖ,
 συνὴν οἶνον παλαιῶν καὶ ῥοδίνῳ ἐγκυ-
 χεύοντα. μίγνεται καὶ ἀκόποις
 καὶ συγχρίσασθαι δεξιὰν πικρὰν καὶ
 διαφορικαίαν. ὁ δὲ φλοιὸς τῶν ῥι-
 ζῶν αὐτῶν, λίθους ἀρπύγης καὶ ἐμ-
 20 βρυα κτείνει καὶ ἡπατικαίαν ὡφεί-
 λει, περιόλου πλεονάζει συνὴν οἶνον
 ἐν ὧδε παρὰ τὴν ὥραν.

Περὶ Πλατάνου. Κεφ. ρή.

* Πλατάνος τὰ πρὸς τὴν φύλ-
 λων ἐκτείνετα ἐν οἶνον καὶ κατα-
 5 πλαδέσθαι, ἐλέγχει βρυματισμοῖς
 καὶ κουφίζει δὲ καὶ τὰ οἰσθήματα
 καὶ φλεγμονάς. ὁ δὲ φλοιὸς ἐκτείνε-
 ται ὡς ἐστὶν ὀδονταλγίας ἐστὶν ἀνάλυσ-
 μα. τὰ δὲ σπασμὰ χλωρὰ συνὴν οἶ-
 νον ποθὲν ἀλφίτῳ καὶ ἄρτῳ βρωθεῖ.
 ἀνα-

earū in muliebres infessus ad-
 ditū, vuluæ & vesicæ vitiis con-
 uenit. Virētia folia sensim sub-
 stringūt: illita quoq; ac tritave-
 sparū apiūmq; ictib⁹ opitulā-
 tur, eadē cum polenta, & pane
 illita inflammationē omnē mi-
 tigāt, sed pota stomachū effun-
 dunt, & vomitiones mouent.
 Lauri bacce magis, q̄ folia cal-
 faciūt: ergo in eclegmate trita
 cū melle vel passo profunt ta-
 bi, orthopnoæ, & omnib⁹ tho-
 racis rheumatismis: cōtra scor-
 pionū ictus ex vino bibuntur,
 vitiligines emaculāt. Succ⁹ bac-
 carū vtilissimē aurii dolori, &
 grauitati instillatur, cū vino ve-
 tere, & rosaceo. In medicame-
 ta autē adiciūtur, quæ neruorū
 lassitudines reficiūt, acopa vo-
 cant: & ad vngueta, quæ calfa-
 ciūt, & discutiūt. Cortex radi-
 cis calculos rumpit, partus ne-
 cat, hepaticis prodest, tribus o-
 bulis in vino odorato potus.

Platanus. Cap. CVIII.

Tenerrima platani folia in
 vino decocta, mox illita, ocu-
 lorum fluxiones sistunt, tumo-
 res & inflammationes leuant.
 Decoctus cortex in aceto,
 dentes in dolore colluit. Viri-
 des pilulæ in vino potæ, ser-
 pētium morsibus auxiliantur:

exce-

DIOSCORIDIS

exceptæ autem adipe, igni ambusta sanant. infidēs foliorum pilularumque lanugo, oculos & aures offendit.

Fraxinus. Cap. CIX.

Fraxinus arbor nota est, cuius foliorū succus, & ipsa peruncta, aut ex vino pota, viperarum ictibus auxiliatur. Corticis cinis ex aqua illitus lepras eximit. Ligni ramenta, scobemq; potu perniciem afferre tradunt.

Populus. Cap. CX.

Potus albę populi cortex vni-
ciæ vnius pondere, ischiadicis
ac vrinę stillicidio prodest. Ab-
ortium fieri tradunt, si cū mu-
lino rene bibatur. Folia quoq;
cū vino post purgationes po-
ta, idem præstare produntur.
Tepens foliorum succus vti-
liter aurium dolori instillatur.
Pilulæ, quæ primo foliorum
partu exiliunt, illitæ cum mel-
le, oculorum hebetudini me-
didentur. Memoria prodiderūt,
corticem albę populi, & ni-
grę particulatim casum, & ful-
cis stercoreatis mandatum, om-
ni tempore anni edules fun-
gos proferre.

Macer. Cap. CXI.

Macer ex Barbaria aduehi-
tur, cortex flauescens, crassus,
gustu

ἀνδιφθέντα δὲ σέασι, πνεύμα-
σι θρασυτέροις. ὁ δὲ χυρὸς τῶν φύλ-
λων καὶ τῶν σπαιείων, ἀκολυ καὶ
ὄψιν ἐμπύων λυμάνειται.

Περὶ Μήλιας. Κεφ. ρθ'.

Μήλια δένδρον ὅστις γινώσκον, 5
οὗ τ' φύλλων ὁ χυλὸς καὶ αὐτὰ συν-
οίγω πινόμενα, καὶ καταπλάσσε-
ται ἐν χυρὸν καὶ τοῖς κοινδοῖς. ὁ δὲ φλοιὸς
καὶ κατὰ χυλὸν καὶ μὲν ὕδα-
τος, λίαντος ἀφίστησι. τὰ δὲ τορ-
νεύματα τῶ ἐύλου πεδύνται, φα- 10
σιν αὐτὸν περὶ καὶ εἶναι.

Περὶ Λεύκης. Κεφ. ρθ'.

Λεύκη τῆ δένδρου ὁ φλοιὸς πο-
δεῖς ὅσον οὐγγία μία πηλιδος. ἰσ-
χάδης ἀφ' ἧς καὶ τραχηνοείας. ἰ-
σορεῖται δὲ καὶ ἀτόκιος εἶναι, 15
δεῖς μὲν ἡμῶν νεφρῶν. καὶ τὰ φύλ-
λα δὲ πινόμενα μετὰ καδαρισ-
σιν οἶνον, τὸ αὐτὸ δρᾶν λέγεται.
ἀφ' ἧς καὶ ὠτὸδολίας ὁ χυλὸς τῶν
φύλλων χυλὰς ἐν σαζόμυθος. τὰ 20
δὲ κατὰ τὴν ἐκβλάστησιν τ' φύλ-
λων σπαιεῖα λίαν μετὰ μέλιτος
ἐγχυόμενα, ἀμειλυνώπας δερα-
πύει. ἐνιοὶ δὲ ἰσορεῖται τὸν φλοιὸν
τῆς λεύκης καὶ τῆς αἰγίρου τμη-
θέντα εἰς λεπτὰ μεγέθη καὶ σπα- 25
θέντα περὶ αἰσὶς κεκοπείσμεναις,
ἐν παντὶ καμῶν μύκητας ἐδωδι-
μοις φύειν.

Περὶ Μάκρας. Κεφ. ρθ'.

Μάκρας, φλοιὸς ἐστὶ κομιζόμενος
ἐκ τ' βαβαρίας, καὶ ἐκ αἰθρίας, παχὺς
εὐφών

συφῶν ἰκανῶς κατὰ πλὴν γεῦσιν
παίνεται διὰ πρὸς αἵματος πύ-
σιν καὶ δυσεντερίας καὶ κοιλίας
ρευματισμὸν.

*Περὶ Πτελέας. Κεφ. ρβ'.

5 Πτελέας τὰ φύλλα καὶ οἱ
ἀκρίμους καὶ ὁ φλοιὸς συπι-
κά. ποιεῖ δὲ τὰ φύλλα πρὸς
λέσσαν λεία συνὸς ἐπιπλατ-
τύμους, καὶ τραύματα πολλὰ,
μᾶλλον δὲ ὁ φλοιὸς ἀντὶ ἐπι-
10 δέσμου περιειλουμένους. ἔσθ' ἂν γὰρ
ἰκανώδους. ὁ δὲ παχύτερος
φλοιὸς συνὸν οἶνον ἢ ὑδατί* πο-
θεῖς οὐγγίαις α'. πλεονάζει, ἄρει
φλέγμα. καὶ τὸ ἀφέψημα δὲ
τῶν φύλλων ἢ τοῦ φλοιοῦ τῶν
35 ριζῶν καταπλούμενον, ἄτακ-
μα ποιεῖ τὰ χύματα. τὸ δὲ ἐν ταῖς
φύσιν κατὰ πλὴν πρὸς τὴν ἐκ-
βάσιν εὐερισκόμενον ὑγρὸν,
σίλβει πρὸς πωπὸν ἐπιχειρόμενον.
ξηρανόμενον δὲ τὸ ὑγρὸν τοῦτο,
20 ἀναλύεται εἰς θινεῖα κωποποιε-
δῆ. λαχναίνεται δὲ τὰ φύλλα
τῶν φύλλων ἐν ὕδατι εἰς πρὸς-
σηήματα.

Περὶ Σαπρότητος ξύλων.

Κεφ. ργ'.

25 Ἡ δὲ ἀπὸ τῶν παλαιῶν ξύλων καὶ
πρὸς τὴν σαπύδα συνιστάμενη ὥς
πρὸς δάκρυον καταπλούμενη, ἀνα-
καταέρει καὶ ἀπυλῶν ἔχει. τὰ δὲ
ἐρπυσσιν καὶ ἐπὶ τῇ σινὶ ἴσθ' ἀνίστα
φουεῖται καὶ οἶνον, ἐν ὁποίῳ τὸ
καὶ δέσσει.

gustu perquam astringens: qui
contra cruentas excreatones,
dysenterias, & alui fluxiones
bibitur.

Vlmus. Cap. CXII.

Vlmi & folia & cortex &
rami, vim habent spissandi. Fo-
lia trita ex aceto ad lepras ef-
ficaciter illinuntur, vulnera glu-
tinant, sed multò magis cor-
ticipis tilia, si fasciæ loco intor-
queatur: nam in lori morem
flecti potest. Crassior cortex
in vino aut aqua frigida vicia-
tim potus, pituitas trahit: fra-
cta ossa celerius solidescunt,
si decocto foliorum corticis
aut radicis foueantur. Humor
in folliculis enascens prima ger-
minis eruptione, cuti illitus ni-
torem inducit, faciémq; splen-
didiorē præstat. Qui dum
siccatur, in animalia abit, quæ
culicum formam gerunt. Fo-
lia cum tenescunt cocta, o-
lerum more ad obsonia vsur-
pantur.

Lignorum marcor.

Cap. CXIII.

Ex caudicibus lignisque ve-
teribus caries congeritur, quæ
farinæ modo illita, vlcera pur-
gat, & ad cicatricem perducit:
serpentina cohibet, si cum pari
aniso & vino subacta, linteisq;
impo-

DIOSCORIDIS

imposita illinatur.

Populus nigra. CXIII.

Populi nigrae folia cum aceto illita, magna vtilitate podagricis doloribus illinuntur. Resinā populus fundit, quæ in malagmata additur. Semen potiū ex aceto comitialibus vile est. Lachrymā populorum cōmemorāt, quæ in Padum amnem defluat, durari, ac coire in succinum, quod electrum vocant, alij chrysophorum. Id attritu iucundum odorem spirat, & aurum colore imitatur: tritum potiūque stomachi ventrisq; fluxiones fistit.

Harundo. Cap. CXV.

In harundinū genere quedā nastos id est farctior, vocat, ex qua sagittæ factitari solēt. Alia fœmina, qua tibiariū ligulas efficiūt. Alia φ fistulis addicta sit, syringias: cui multū iest carnis, crebris cicta geniculis, ad librū cōscriptionē accōmodata. Alia crassā, cōcaua, apd amnes nascēs, q̄ a qbusdā cypria, ab aliis donax appellat. Alia phragmites seu vallatoria, gracilis, cādicās, vulgo cognita: cui⁹ trita radix p se, aut cū bulbis suis illita, spicula aculeosq; corpe extrahit: luxata lūborūq; dolores cū aceto mulcet. Virentia folia

καθεύτα ἢ λεία κατὰ πλάσσομένη.

Περὶ Αἰγείρου. Κεφ. ριδ'.

Αἰγείρου τοῦτο τὰ φύλλα μετ' ὅξους καταπλατύνεται, ποδαγρικήs ὀδυνὰς ὠφελεῖ. ἢ δὲ ἐξ αὐτῆs ῥητίνη μύζυται μαλάγμασιν. ὁ s κατὰ τοῦ δὲ μετὰ ὅξους πινόμενος, ἐπιπλητικούς ὠφελεῖ. ἰσορεῖται δὲ ὅτι τὸ ἐξ αὐτῶν δάκρυον κατὰ τὸν ἡεταῶν ποταμὸν καταχέμενον, πηγνύται ἢ γίνεται τὸ καλὸν μέλιον ἡλεκτρον. 10 ἴσως δὲ ὡς ἡ χρυσοφόρον ἐν ὧδὲs ἐν τῇ παρατείλει καὶ χρυσουίδης τῷ χρόματι, ὅπερ πινόμενον λείον, σιμάχου καὶ κοιλίας βεῖμα ἴσται.

Περὶ Κηράμου. Κεφ. ριε'. 15

Κηράμων δὲ ὁ ὕμν πρὸς καλεῖται) νασός, ἐξ οὗ τὰ βέλγη γίνεται. ὁ δὲ πρὸς ὄνυξ, ἐξ οὗ αἱ γλῶτται τοῖς ἀνθρώποις κατασκευάζονται. ἄλλος ὃ σπειρίτης πολύσαρκος, πυκρόντατος, εἰς βίβλιογραφίαν ἐπιτίθεται. ὁ δὲ πρὸς παχὺς ἢ κοῖλος παρὰ ποταμοῖς ἐνὸς ὕδατος, ὅς καὶ δοναξ καλεῖται, ἵσως πικρὸν δὲ ὑπερβολικὸν καὶ ἔντονον φεαγμίτης, * λεπτός ἵσται λευκός, πᾶσι γαστρίμοις, οὗ ἢ ῥίζα καταπλασθεῖται. 20 σαλεύει, καὶ κατ' ἐαυτὴν ἢ συν βελβόις, ἐπισπᾶται σιόροσπας ἢ ἀκίδας. συν ὅξει δὲ σπέρματι ἢ ὀσφύος ἀλγῆματα παρηγορεῖται. τὰ δὲ φύλλα χλωρὰ κοπέντα ἢ 25

tusa &c

ἢ

ἢ ὀπιπτεύοντα ἐρσιπλάτῃ τε καὶ
ταῖς ἀλῆας φλεγμοναῖς ἴσται. ὁ δὲ
φλοιὸς δλωπεκίας θεραπεύει καὶ
ἢ μετ' ὄξος καταπλασθεὶς. ἢ δὲ
ἀνθήλῃ τ' χαλάμων ἐμπιστεύουσα
εἰς τὰς ἀκουάς, κωφωσιν ἐργάζει.
δύναται ὅτι αὐτὰ καὶ ὁ κύριος
λεγόμενος χαλάμος πεινῇ.

Περὶ Παπύρου. Κεφ. ρις'.

Πάπυρος γινώμενος ὅτι πάση,
ἀφ' ἧς ὁ χάρις καταπενάζει,
10 εὐχρηστὴ δὲ πρὸς τὴν ἐν ἰατρει-
κῇ χρῆσιν· πρὸς ἀναστόμωσιν συ-
εργῶν σκευαζομένη διὰ τοῦτο, καὶ
ἀντιμετώπιον τὴν ὄχρην ἐκρεάσας.
σεναλῶν καὶ καθευδῶν, ἐμπι-
πλαται ὑπεράσας, καὶ ἐξοιδόουσα
15 διανοήσας τὰς συεργὰς· ὅχει δὲ τι
ἢ ρίζα αὐτῆς καὶ τριόφιμον· δια-
μασώμενοι τοῦ αὐτῆν οἱ ἐν αἰ-
γύπτῳ ἀποχρησίζουσι ἐμπιστεύοντες
τὸ διαμασσημα. χρῆσιν ὅτι καὶ ἀ-
πὸ τῶν αὐτῶν καὶ δὲ κακῶν ἐμὴν
20 πάπυρος ὅχει τριόφως δύναμι-
νομάς ἐπέχον τὰς ἐν σῶματι καὶ
παντὶ μέρει· βέλῃ πον δὲ ὁ χάρις
καὶ δὲ τὸ τοιοῦτον.

Περὶ Μυρίκης. Κεφ. ρις'.

Μυρίκη δὲν δὲν ὅτι γινώμε-
25 μον παρὰ λίμνας καὶ τοῖς σα-
σίμοις ὑδασι φλούμενοι, κατὰ τὴν
ὁδὸν ἀπὸ τοῦ φέρεσθαι βρωδὸς
κατὰ τὴν σύστασιν. Γινώσκται
δὲ πρὸς ἐν αἰγύπτῳ καὶ σεία ἡμε-
ρος καὶ τὰς ἀλῆας ὁμοίαν τῇ ἀλῆα.
καρπὸν

tusa & imposita ignibus sacris
medentur, & cæteris inflama-
tionibus. Corticis cinere per-
unctæ cum aceto alopecie fa-
nantur, paniculæ lanugo si au-
res intrauerit, exfurdatur. Eundē
effectum implet harundo quæ
cypria dicitur.

Papyrus. Cap. CXVI.

Papyrus qua chartæ fiūt, nul-
lis non cognata, præcipuæ in
medicina utilitatis, ad laxandas
fistulas: madefacta lino inuol-
uitur, usque dum inaruerit. cō-
stricta enim atque immissa in
hiatū, humore cōpletur, & in-
tumescente fistulas aperit. Ha-
bet nescio quid alimēti radix,
itaq; Ægyptij eā mandunt, fuc-
cum tantū deuorantes, & man-
sam expuunt. Iplis radicibus
pro ligno utuntur. Crematæ
papyri cinis depascentia vlce-
ra cum omnium partium, tum
oris maximè, cohibet: ve-
rum melius id combusta char-
ta præstat.

Myrica. Cap. CXVII.

Myrica seu tamarix arbor
vulgo cognita est, cū apud pi-
gras, & stagnantes aquas ena-
scatur, fructū quasi florē ferens
compage muscosum. Ægyptus
Syriæque alteram gignunt mi-
tiore, syluestri cætera similem.

Fructum

DIOSCORIDIS

Fruſtum parit gallæ proximū,
inæqualiter aſtringentē guſtu:
quo conueniēter vtimur vice
gallæ in medicaminibus ocu-
lorū orisq;. Datur cruētā ex-
creationi in potu, & coeliacis,
& cōtra profluvia fœminarū,
regium morbū, & phalangio-
rū morſus: illitus tumores inhi-
bet. Cortex in eoſdē vſus adhi-
betur. Decoctum foliorū cum
vino potum, lienem abſumit:
ad dolorem dentium in collu-
tionibus ſalutare, & mulieribus
fluxioni vuluæ opportunis in
deſeſſionibus, phthiriaſi lendi-
busque circumfuſum prodeſt,
abundantiam fœminarū ſiſtit
impoſitus arboris cinis, potu-
rios calices è caudice lienofiſ
moliuntur, quò datus in his po-
tus proficiat.

Erica. Cap. CXVIII.

Erica frutiſoſa arbor, my-
ricæ ſimilis, longè minor: cu-
ius flore apes reprobum mel
efficiunt, tam flos quàm co-
ma ſerpentium iſtibus illitu
medetur.

Acacalis. Cap. CXIX.

Acacalis fruſtus eſt naſcen-
tis in Ægypto fruticis ſeminis
myricæ quadamtenus ſimilis:
cuius aqua in qua maduerit,

καρπὸν φέρουσι ἐμφερῶς κικλίδι,
ἀνωμαλῶς σύφοντα καὶ πλεῖν γεῦ-
σιν· ἀρμόζοντά τε ἀντὶ κικλίδος
εἰς τὰ σωματικὰ καὶ ὀφθαλμικὰ,
καὶ περὶ αἵματος πύσεις ἐν πο-
τῶν, καὶ κοιλιακῶς καὶ ροικαῖς γυ-
ναῖξιν, ἰκτέρω τε καὶ φθλαγγιδή-
κταις· οἱ δὲ ἡμάτα τε στέλκει κατὰ
πλασθεῖς. καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αυ-
τὰ ποιεῖ τῶν καρπῶν. τῶν δὲ φύλ-
λων τὸ ἀφ' ἑλίου σικυὶ οἶνον πο-
τεῖν, ἀπλῶνα τῆς καὶ ὁδονδαλίας
κοινῶς διακλυζέμενον, ἐγκάθισ-
μας τε ροικαῖς, καὶ πείγμα τῶν
φθειρέας καὶ κόνιδας ἡγυῶσιν ἐ-
πιθήσειν, καὶ ἢ ἀπὸ τῶν ἑλίων τέ-
φρα περὶ στέψαι, βέουσιν ἐν μύ-
τρᾳ στέλλει. κατὰ σκευάζουσι δὲ
ἔμποι καὶ κύλικας ἐν τοῦ σπέρματος
αἵς ἐπὶ τῶν ἀπλωικῶν χεῖρας
ἀντὶ πυθελίων, ὡς τοῦ δὲ αὐτῶν
πόματος ὁφθαλμῶτος.

Περὶ Ερείκης. Κεφ. ρη'.
Ερείκη, δένδρον ὅτι δαμνῶδες
ὅμοιον μυρίκη, μικρότερον δὲ πε-
λῶ, οὗ τῶν ἀνδρῶν μύστιται χεῖ-
ρας, μέλι ἐργάζονται οὐ σπου-
δαῖον· ταύτης ἡ κόμην καὶ τὸ αἶ-
δος κατὰ πλασθεῖς, ἐς πτετῶν
δύματα ἰσθται.

Περὶ Ἀκακάλιδος. Κεφ. ριβ'.
Ἀκακάλις δάμνου καρπὸς ἐ-
στὶ ἡγονωμῶδου ἐν αἰγύπτῳ, ἐπι-
κὰς κατὰ τι τῶν μυρίκης καρ-
πῶν· οὗ τὸ ἀπόβρογμα μύστου
ταῖς

ad

τα κολυβείοις τοῖς πρὸς ὀξύδωρ-
κίαν ἀρμόζουσιν.

Περὶ Ράμνου. Κεφ. ρκ'.

Ράμνος δάμνος ὅτι πρὸς φαρ-
μοὺς φύλμας ῥάβδους ἔχων ὀρ-
5 θῆς καὶ ὀξύας ἀκάνθας ὡς πρὸ
ἢ ὀξύακανθα, φύλλα μικρά, * ὑ-
πομυκη, ὑπολίπαφα, μαλακά. ἔ-
σι δὲ καὶ ἑτέρα * λευκότερα. καὶ
τείτη μελάντερά ἐχρουσα τὰ φύλ-
λα, καὶ πλατύτερά σὺν τῷ ἡρέμα
10 ἐρυθρανέει, ῥάβδους μακράς πη-
χρὸν ὡς πέντε, μᾶλλον ἀκανθώ-
δεις, ἥτις δὲ στερεὰ καὶ ἐπάκμοις
ἔχει τὰς ἀκάνθας, καρπὸς δὲ πλα-
τὺς, λευκός, λεπτός ὡς θυλακάκης,
ἑοικώς * ἀσπράγγῳ. ποιεῖ δὲ πα-
15 σὼν τὰ φύλλα πρὸς ἐρισπύλα-
τα καὶ ῥήπτας καταπλασόμε-
να. λέγεται δὲ καὶ κλῶνας ἀν-
τὴς, θύρας ἢ θυεῖσι πρὸς στέν-
τας, * ἀποκρούειν τὰς τῶν φαρ-
μάκων κακουργίας.

20 Περὶ Ἀλίμου. Κεφ. ρκβ'.

Άλίμος δάμνος ὅτι φραγμί-
της, ὁμοιος ῥάμνῳ οὐκ ἔχων ἀ-
κάνθας. φύλλα δὲ ὕψους παρ-
πλήσια, πλατύτερά, μὲν τοι φύ-
ται ἐν παρὰ θαλάσσιος καὶ φραγ-
25 μοῖς. λαχαρεύεται δὲ αὐτῆς τὰ
φύλλα ἐφ' ὧμα εἰς βρώσιν. τῆς
δὲ ρίζης < α. ὀκτὴ ποιεῖται
συν μελικάρτοι, ἀπὸ σματα, ῥήγ-
ματα καὶ σφόδρις πρὸς ὕναι καὶ
γάλα κατασπῆ.

Περὶ

ad collyria additur, quæ ad ex-
citādā oculorū aciē cōueniūt.

Rhamnus. Cap. CXX.

Rhamnus fruticat in sepibus
ramos ferēs rectos & aculeos
in acutæ spinæ modum, foliis
paruis, oblongis, suppinguibus,
teneris. Alterum ei genus can-
didius. Tertium nigrioribus la-
tioribûsque foliis constat, &
quadamtenus rubentibus: cu-
ius rami quinūm ferè cubitorū
longitudinem implent, spino-
siores quidē sed infirmioribus
minûsq; rigentibus aculeis. Fru-
ctum adit latum, candidū, te-
nuem, follicularij specie, verti-
cillo similem. Omnium folia
igni sacro, & serpentibus vlce-
ribus, efficaciter illinuntur. Fa-
ma est ramos huius valuis fe-
nestrisve impositos, veneficia
depellere.

Halimus. Cap. CXXI.

Halimus frutex est sepimen-
tis idoneus, similis rhamno, si-
ne spinis, foliis oleæ, sed latio-
ribus: nascitur in sepibus &
maritimis. Folia decoquuntur
ciborū gratia. Radix, conuulsa,
rupta, tormināque mitigat,
drachmæ pōdere in aqua
mulsa pota: eadem
lactis vberta-
tem facit.

Paliurus.

DIOSCORIDIS

Paliurus. Cap. CXXII.

Paliurus frutex cognoscitur aculeatus, dur⁹, cuius semē pin-
gue & fuliginosum inuenitur:
quod potū tufsi opitulatur, ve-
ficæ calculos cōminuit, serpen-
tiū ictibus aduerfatur. Folia &
radix astringentiam vim habēt:
quorum decoctū potu aluum
fistit, urinā trahit, contra vene-
na & serpentium morsus au-
xiliiatur. Radix recentia tubercu-
la, tumorésque omneis di-
fcutit, trita & imposita.

Acuta spina. Ca. CXXIII.

Acuta spina, quam pyram
aut pityanthen aliqui vocant:
arbor est pyrastro similis, spi-
nosa valde & minor, baccas
profert myrti, plenas, rubras,
fragiles, & intus nucleum: ra-
dicem multifidam, altè descen-
dentem. Huius baccæ potu
aut cibo, alui profluvium, &
abundantiam fœminarum fi-
stunt. Radix illita aculeos &
spicula extrahit, abortum fie-
ri tradunt, si ter radice ven-
ter, aut sensim feriat, aut
perungatur.

Rubus canis Ca. CXXIII.

FRUTEX est arboris in-
star, rubo longè maior: fo-
lia fert multò latiora myrto,
robustius

Περὶ Παλιούρου. Κεφ. ρλβ.

Παλιούρος γυμνός ἐστι θάμνος,
ἀκανθώδης, σκερὲς, οὗ τὸ σπέρμα
λίπαρόν ἐστι λιγυρῶδες εὐείσκητον.
ὅσῳ πινόμενον βελὴν ἀρήγει, καὶ τὸς
ἐν κύσει λίθους ἀρῶσκει, καὶ πρὸς
ἐρπετῶν δόνηματι πειθεῖται. τὰ δὲ
φύλλα καὶ ἡ ῥίζα συσπικνῶν, ὡς τὸ
ἀφελήματα ποδῶν, κοιλίας ἰσχυ-
ρῶς, οὗ ὅτε ἀγχι καὶ θανάσι-
μοις καὶ θηριοδόνεσι βρονθεῖται, δια-
φορεῖ δὲ πάντα τὰ παρόμοια
φύματα καὶ οἰδήματα ἢ ῥίζα,
λῶα ἐπιπλασθέντα.

Περὶ Ὀξυακάνθους. Κεφ. ρλγ.

Ὀξυακάνθαοι ὅτι πνεῖναν οἱ ὅτι
πυτυανθὴν καλεῖσθαι, δένδρον ἐστὶ πα-
ραπλήσιον ἀρχαῖον, μικρότερον
δὲ καὶ ἀκανθώδες ἄγαν καρπὸν ὃ
φέρει μύρτω ἐμφερῆ ἀδρόν, ἐρυ-
θρὸν, εὐδρυπτόν, ἐνδοθεν πυρρὴν
ἔχοντα, ῥίζαν πολυρρῆν καὶ βαθεί-
αν. τοῦτο ὁ καρπὸς διαέρροισιν ἰσχυ-
ρῶς, καὶ τοῦτο γυναικείον πινόμενος
καὶ ἐπιτόμιος, ἢ ὅτι ῥίζα καταπλα-
σθέντα λεία, σκόλοπος καὶ ἀκίδας
ἐπαπῶται. ἰσχυρεῖται δὲ διωκόμε-
ται τὴν ῥίζαν, καὶ ἐν βωσὶν ἐργάζε-
ται τὴν κοιλίαν πονηρῶς τοῖς πλε-
χθεῖσιν ἢ χειροτέροις.

Περὶ Κυνοσβάτου. Κεφ. ρλδ.

Κυνοσβάτον οἱ δὲ ὀξυακάνθαν
καλεῖσθαι θάμνος ὅστις βάτῳ πολλῷ
μείζων, δένδρῳδης· φύλλα φέ-
ρει πολλὰ πλατύτερα μυρσίνης,
ἀκαθ-

25

ἀκμῶδες ὃ δὲ τὰς ῥάβδους ἰσχυροῖς, ἀνδρῶν λευκῶν, καρπὸν ἐπιμένει, περιῶν ὁμάς ἐνικότα, ἐν τῷ πεπαιγμένῳ πυρρῶν, τὰ δὲ ἐν τῷ ἱερῷ δν. ἵησι δὲ κοιλίας ὁ καρπὸς ἐν ἑσέσι· διχα τοῦ ἐν αὐτῷ ἐεισόδους καὶ κοιλίαν γὰρ τῆς ἀρτηρίας τὸ ἀποζεννύμενον ἐν αἵνῳ καὶ πηρόμενον.

Περὶ Κυσσίου. Κεφ. ρκβ.

Κύσσιος δένδρον ὅτι δὲ τὰς ῥάβδους φύλλα ἔχον ὁμάς παρὰ πλάτος, παλαπτερά δὲ καὶ μαλακώτερα καὶ χλωρότερα· αὐτῇ λευκῇ βρυόδν, ἐν ὁδῷ σπέρμα μέλας ὁμοιον τῷ τῆς ἀκτῆς. γηνῶται δὲ ἀείρη ἐν τῇ ἀσκάδῳ
 15 λονι καὶ κανόπῃ. Διῶαμιν δὲ ἔχει τὰ φύλλα ἐν πικρῇ ὁδῷ διαμαρομένην τὰ ἄφθας ἰσχύει, καὶ τὰς ἄλλας πυρρῶς φλεγμονὰς καταπλαθέντα ἀφελεί, καὶ ἀνδραχά· τὸ δὲ ἀφέλημα αὐτῶν πυρρῶν
 20 εἰκασίων καταπύλημα, ξανδίον δὲ καὶ πείρας σπυρίου χυλῶ τὰ φύλλα κῆα βραχύντα καὶ ἐγγεῖδέντα. τὸ δὲ αὐτὸς ἐπιπλαθέν τῷ μετόπῳ λείον μετ' ὅζοις, κεφελήγας παύει· τὸ δὲ σκευάζον
 25 μύρον ἐξ αὐτῆς χερίσμα κύσσιον δερματικὸν γίνεται καὶ μαλακτικὸν νεύρων.*

Περὶ Φιλλυρίας. Κεφ. ρκγ'.

Φιλλυρία δένδρον ὅτι ὁμοιον χύπρῳ καὶ μέθος, φύλλα δὲ ὁμάς, ὁμοία,

robustis circa ramos spinis, flore candido, fructu oblongo, nucleo oliuæ simili: qui per maturitatem fuluescit, & flocculos intus continet. Fructus exemptis interioribus floccis arefactus, aluum sistit: feruefacti enim in vino, mox poti, arteriam infestant.

Ligustrum. Cap. CXXV.

Ligustrum arbor est oleæ foliis circum ramos similibus, latioribus, mollioribus, & colore viridioribus: flore candido, muscoso, odorato: semine sambuci, nigro. Optimum nascitur in Canope & Ascalone. Folia astrictoriam vim habent: quare commaducata vlcerebus oris medentur, illita feruidis inflammationibus, carbunculisque profunt, decocto eorundem igni ambusta fouentur capillum ruant trita folia, quæ in radicularum succo maduerint. Flos ex aceto fronti illitus, capitis dolorem sedat. Cyprinum oleum quod ex eo fit odoratum, excalfacit, emollitque neruos: si quæ feruētī natura prædita sint, assumat.

Tilia. Cap. CXXVI.

TILIA arbor est ligustri magnitudine, foliis oleæ, g nigrio-

DIOSCORIDIS

nigrioribus & latioribus, fru-
ctu lentifci, nigro, subdulci, ra-
cematim cohærente, asperis na-
scitur. Huius folia astringunt:
ad eadem vtilia ad quæ olea-
ster, cum astrictione est opus:
maximè ad oris vlcera, com-
manducata, aut si decocto col-
luantur: pota vrinam ac men-
ses cient.

Cistus Cap. CX XVII.

Cistus, què aliqui citharon,
aut cissaron vocant. ramifolus
frutex est, sed improcerus, fo-
liosus, saxosis locis nascens, fo-
liis rotundis, acerbis, hirsu-
tis. flos masculo vt mali pu-
nicæ, foeminae albet. Vis a-
stringens: vnde flores in vino
austero bis in die poti, profunt
dysentericis, & nomas per se
illiti cohibent, vetustati vlce-
rum, & igni ambustis cum ce-
rato medentur.

Hypocistis. Cap. CX XVIII.

Hypocistis, orobethron, aut
cytinus à nonnullis cogno-
minata, iuxta cisti radices na-
scitur, floris punici similitudi-
ne. Quædam rufa, altera her-
bacea, tertia candida. Liqua-
tur acaciæ modo. Aliqui ta-
men exiccant, fractamque ma-
cerant, & incoquant, reliquâ-
que vt in Lycio prosequitur.

Vires

ας ὁμοίαι, πλατύτερα δὲ καὶ με-
λάντερα, καρπὸν δὲ ἔχει χρίνον ἐμ-
φερὴ, μέλανα, ὑπόλευκα, ὡς ἐν βό-
βισι κέικοντες, ἐν βάρεσι δὲ τίποις
ἄλλοις. ταύτης τὰ φύλλα, εἴθε
ὡς ἀρχιδαία ποιῶντα. πρὸς τὰ
εὐφροσύνης δόματα, μάλα τὸ τοῖς
στομαχοῖς ἐλκεσι διαμάσθημα καὶ
διὰ κλύσιν τὸ ἀφ' ἡμῶν, καὶ π-
ρόνυμον δὲ οὖρα καὶ ἐμμένα ἀγει.

Περὶ Κίστου. Κεφ. ρκζ.

Κίστος, ὃν ἔτι καὶ κίσταρον ἢ κίσ- 10
σινον καλοῦσι. θάμνος ὅστις ἐν πε-
τρώδεσι τίποις φύλλοις, πολύ-
κλιδος, φυλλώδης, οὐκ ὑψηλός,
φύλλα ἔχων ἀειφύων, σφυγὰ, δα-
σέα. ἀνθὶν ὡς ἀφ' ῥοιδῶν, ἐπὶ δὲ τῷ
θήλειος λευκά. Διούριον δὲ ἔχει 15
στυπτικὸν· ἔθεν τὰ ἀλθὴν* λεῖα π-
ρόνυμον δις τὴν ἡμέραν ἐν οἴῳ ἀν-
στηρῶν, δις τε ντελείας ἀρμόζει, καὶ
αὐτὰ δὲ κατὰ πλάσιντα, νομας
ἐφίστησι, σὺν κηρωτῇ δὲ πνεύμα-
τι καὶ παλαιὰ ἐλκεῖα ἰάται. 20

Περὶ Υποκισίδος. Κεφ. ρκν.

Φύεται δὲ πρὸς τὰς ῥίζας τοῦ
κίστου ἢ κερμαθίου ὑποκισίς. ὥς
ὄντων δὲ ῥόβινθρον, ἢ κύπρος κα-
λουμένη, ὁμοίον τι καὶ πρὸς ῥοιδῶν,
καὶ τὸ μὲν αὐτοῦ κίρρον· τὸ δὲ 25
χλωρόν, τὸ δὲ λευκόν· ὅσον χυλὶ-
νόν ὡς ἀφ' ἡ ἀκακίας. ἔτι δὲ ἐν-
εργαντὶς αὐτῶν, καὶ θλάσαν-
τες, βερίχοισι τε καὶ ἐφοισι, καὶ τὰ
ἄλλα πνεύματι, ὡς ἐπὶ τῷ λυκίου.

Διούριον

Διῶαμιν δὲ ἔχει τὴν αὐτὴν τῇ
ἀκακίᾳ, συπικωτέραν δὲ καὶ ξη-
ραντικωτέραν, ποῖσιν παρὲς κοι-
λιακοῖς, δυσεντερικοῖς, αἰμο-
ποικοῖς, ῥοιῶν γυναικείων πνο-
μῶν καὶ ἐντερίῳ.

- Περὶ Λαδάνου. Κ. φ. ρ. κθ.
Ἔστι δὲ καὶ ἕτερον εἶδος κίστου, κα-
λούμενον ἴσπ' ἐλίων λῆδον, θά-
μνος κατὰ τὰ αὐτὰ φύς, ὁμοῦς τῷ
κίστῳ, μακρότερον δὲ τὰ φύλλα
ἔχει καὶ μελάντερον, λιπαρείας
πνικτὸν κατὰ τὸ ἔαρ ἐπὶ πώμῳ, καὶ
οὗ φύλλον ἢ διῶαμιν συπικνῶ
κατέστηκα πιεῖν παρὲς ὅσα καὶ ὁ
κίστος γίνεταί, δὲ ἐξ αὐτοῦ τὸ λεγό-
μενον λάδανον, τὰ φύλλα καὶ αὐ-
τὰ νεμόμεθα αἰ αἶρας καὶ οἱ τσά-
ροι. τὴν λιπαρίαν ἀναλαμβάνου-
σι τῷ πύρρῳ γινώσκουσιν, καὶ
τοῖς μικροῖς περὶ πλάττοιν ἐν ἑλ-
λίδι τὸ πυρρῶν ἐξ ὧν, ὡς ἀ-
φαιρούμεν ἐκίττοι, καὶ ἀπὸ τῶν
ἐνταῦθα ἀπλάσσονται μαζίδας.
ἔνιοι δὲ καὶ ὀρνίθια ἐπιείρουν
τοῖς θάμνοις καὶ τὸ περὶ πλάττον
αὐτοῖς λίπος ἀποξύναντες ἀνα-
πλάσσουν. κράττερον δὲ ἔστιν αὐτῶν
ἐν ὧν, ὑποχλωρον, ἐν μάλα
κτόν, λιπαρὸν, ἀμεινοχρόν* ἱάμα-
τος ἢ ἱαφαρείας, ῥητινώδης τοι-
οῦτον δὲ ἔστι τὸ ἐν κύπελλον ῥη-
νόμενον, τὸ μὲν τοῖς ἀραβικοῖς καὶ
λίβυκῶν ἐν τελέεσσι. Διῶαμιν
δὲ ἔχει συπικνῶ, θερμαντικῶν,
μαλα-

Vires acaciæ habet, verum ali-
quanto magis ficit, & astringit.
Prodest dysentericis, cæliacis,
sanguine excreantibus: fœ-
minarum profluuium & pota &
indita.

Ladanum. Cap. CXXIX.

Est & alterum cisti genus, le-
don à nonnullis appellatum,
frutex simili modo nascens,
longioribus foliis & nigriori-
bus: quæ verno tempore quid-
dam contrahunt pingue. Fo-
liorum vis astringens, ac eos-
dem quos cistus effectus præ-
bens. Fit ex eo quod ladanum
dicitur. Siquidem cum cisti
frondes pascuntur capræ, hir-
cique, pinguitudinem conspi-
cua barba carpunt, & suo len-
tore villosis cruribus adhæ-
scentem reportant: quam de-
pectentes incolæ, colantés-
que cogunt in offas, & ita re-
condunt. Alij verò attractis fi-
niculis, insidentem fruticibus
lentorem abstergunt, conglo-
merantque in ladanum. Maxi-
mè probatur odoratum, subui-
ride, facile mollescens, pingue,
quod arenas non collegit nec
squalore oblitum est, resinofum
quale in Cypro gignitur. Ara-
bicum verò Libicumq; vilius.
Natura ei spissandi, calfaciendi,
g ij mol,

DIOSCORIDIS

molliendi: ora venarum pate-
facit, capillum fluentem con-
tinet: addito vino, myrrha, &
myrteo oleo: cicatricibus de-
corem reddit, cum vino illi-
tum: medetur aurii doloribus,
cum hydromelite aut rosaceo
infusum: fuffitu secundas ei-
cit, pefsis immiftum vuluæ du-
ritiem sanat, in medicamen-
ta quæ dolorem tufsimque fi-
niunt, & malagmata vtiliter
inferitur: aluum fiftit cum vino
vetere potû, & vrinam ciet.

Ebenus. Cap. CXXX.

Ebenus optima habetur æ-
thiopica & nigra, nullos habes
venarû difcuffus, factitiî cor-
nus læuore: cum frangitur den-
fa apparet, mordens gultu, at-
que leniter astringens. Suffi-
tur iucundo odore fupra car-
bones: fine fumî tædio. Recēs
autem ad ignē prolata, ob pin-
guitudinē accenditur, & trita
ad cotē rufefcit. Altera eft in-
dica, internatis fegmētis cādī-
cātibus, & modicē fuluis, item
frequētibus maculis: cæterum
prior, bonitate antecedit. A-
pud quofdam fefamina, aut spi-
nea ligna confimilia pro ebe-
no vaneunt: quod difcernitur
ex eo, quod fungofa funt, & in
purpureas affūlas refoluuntur,

nihil

μαλακτικὴν, αἰσθησιμὴν πικρὴν ἴση-
σι ὅ τας ῥέουσας τείχας, μὲν οἶ-
νον καὶ σμύρνην καὶ μυρσίαν ὕδατος, οὐ-
λας τε ἐν ποσὶ περὶ τὰς πύλας μετ'
οἶνον κατὰ χεῖρας ἰσχυρῶς, καὶ ὡς παλιν-
ας μὲν ὑδρομέλιτος, ἢ ῥοδίνης ἐν-
χέμενον δεξαμένην ὑποδυμένην ὅ
δὲ καὶ παρὰ δευτέρων ἐκβολὰς, καὶ
σκληρίας δεξαμένην, τὰς δὲ μὲν ὡς
ἐν ποσὶ μὲν, καὶ τὰς αὐτὸν ὑ-
ποδύουσι καὶ βλαχέας καὶ μαλὰ γυμνασι-
χρηστέως μίγνυται· κοιλίαν τε
ἴσῃσι συνὸ οἶνον παλαιῶν περὶ ἐστὶ
δὲ καὶ οὐρητικόν.

Περὶ ἐβένου. Κεφ. ρλ.

Ἐβένος κρατίζει ἢ αἰσθησιμὴν
καὶ μέλαινα, καὶ μὴ ἔχουσα κηρί-
δας, ἐμφερὴς, κέρατι εἰσραφμένῃ
τῇ λευότητι, διαδοεῖται δὲ πυκνῇ,
δικτικῇ ἐν τῇ γένεσι καὶ ὑποδύ-
ουσα· τεθεῖσα τε ἐπ' αἰθρᾶ-
κων μετ' ὑποδίας καὶ δίχα κα-
ποῦ ἐκδυμνωμένη, ἢ ὅ παρὰ σφα-
τος διὰ τὴν λεπταίαν, αἰσθησιμὴν
συνεὶ παρὰ σφαιρεῖται, τεθεῖσα ὅ
ἐπ' ἀκόντι, ὑποκρίσας γίνεται.
Ἐστὶ δὲ τις καὶ ἰνδικὴ, ἔχουσα δια-
φύσεις λευκάς, καὶ κηρίδας, καὶ σπῆ-
λους ὁμοίως πυκνοῖς· πολλὴν βύ-
πῃαν ἢ παρὰ τῇ ἐννοίᾳ δὲ τὰ σπῆ-
μινᾳ ἢ ἀκαθάρτα ἐξύλα ἐμφερῆ ὄν-
τα, αὐτὰ ἔβένου πολλοῦσι· διαγι-
νώσκειται ὅ ἐν τῇ χαλνᾷ τ' εἶναι,
καὶ κατὰ ὁρίδας μικρὰς ἀπολύε-
σθαι ἐκ πορφυρέως τοῦ χρώματος
μυδιῶ

μηδὲν δὲ δεικνύον * ἐχούσας ἐν
 τῇ γούρῃ, ἢ ἐν τῇ θυμιάσει ἐυώ-
 δος. Διωκόμεν δὲ ἐχει, σμηκτικὴν
 τῶν ὀποκοτωμάτων τὰς κόρας,
 * ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς τὰ παλαιὰ βού-
 5 ματα καὶ φλυκτῖδας· εἰ δὲ τις ποίη-
 σαι ἐξ αὐτῆς ἀκόγιον θέλῃ το εἰς τὰ
 κολλύρια, βύβρον ἐνδύσει. κατε-
 γάζει δὲ εἰς τὰ ὀφθαλμικά τὰ πο-
 ρευμάτων ἢ ῥημάτων, βρεχόμε-
 νον ἐν οἴνῳ ῥῶν ἡμέραν καὶ νύκτα·
 10 εἴ τ' ἀγνοίῃσιν ὀπταλμίας καὶ εἰς
 κολλύρια ἀναπλαστομένων. ἐνίοι
 δὲ προτείνουσιν διηδοῦσιν αὐτὰ,
 εἴθ' ἔστω τὸ λιγυρὸν περὶ σπιγνῆς δὲ
 αὐτῇ οἴνου ὕδατι ῥέον. καίεται
 δὲ ἐν ὡμῇ γύστρα ἕως αὐτὸν ἀνδρα-
 15 καῶν, καὶ πηλῶν ὥς ὁ κακαμμέ-
 νος μόλις βόσκει, ἀρμόζει δὲ τὸ τοι-
 οῦτον πρὸς ξηροφθαλμίας.

Περὶ Ῥόδων. Κεφ. ραά.

Ῥόδον ἰσχυρὴ καὶ εὐφει, τὰ
 δὲ ξηρὰ μάλλον. γυλίζειν δὲ
 20 δὲ τὰ ἀπαλὰ ἀποφαλλίσαν-
 τας τὸν ὄνυχον καλούμενον, ὅπερ
 ἔστι τὸ λευκὸν τὸ ἐν τῷ φύλλῳ,
 τὸ δὲ λιγυρὸν ἐκδιλίσκειν καὶ τεί-
 λειν ἐν σιῇ, ἐν σιῇ ἀρχὴς οὐ
 συσφῆ, οὕτω τὸ ἀποπιδεῖσθαι
 25 εἰς τὰς ὀφθαλμικάς περὶ γί-
 σεις. ξηραίνεται δὲ τὰ φύλλα
 ἐν σιῇ συνεχῶς σφρόμβια ἵνα
 μὴ ἐυρωπιάσῃ. ποιεῖ δὲ τῶν ξη-
 ρῶν ἐκδιέντων ἐν οἴνῳ τὸ ἀπό-
 θλιμμα, πρὸς ἀλγῆμα κεφαλῆς,
 ὀφθαλ-

nihil mordacitatis in gustu, nec
 redolentiae in suffitu praeferen-
 tia. Caliginem oculorum ab-
 sterget, ad veteres destillatio-
 nes pustulasque mirum in mo-
 dum pollet: Si quispiā facta ex
 eo coticula collyriis utatur,
 melius proficiet. Ad oculorum
 medicamenta efficax est, si sco-
 bes ramentave vino Chio die
 noctūque macerata, in colly-
 ria digerantur. Nonnulli prae-
 trita ipsa excolant, reliquaue
 eundem in modum peragunt.
 Alij pro vino aqua utuntur.
 Vritur in fictili nouo, donec
 in carbones redigatur. Laua-
 tur plumbi vlti modo, & ita
 siccis scabrisq; lippitudinibus
 conducit.

Ροφα. Cap. CXXXI.

Rosa refrigerat & astringit,
 sed sicca multò magis. Succus
 recētibus foliis exprimitur, de-
 fectis forfice vnguibus (sic ap-
 pellantur candidae foliorū par-
 tes) reliquum in pila premi &
 teri debet in vmbra donec co-
 gatur, & ita ad oculorum cir-
 cumlitiones recundi. Siccatur
 etiamnum folia rosarum, cōti-
 nuò versata, ne muceāt, ne ve-
 situs in iis infideat. Aridis rosis
 & in vino decoctis expressus
 liquor, facit ad dolores capitis,
 g iij aurium,

DIOSCORIDIS

aurium, oculorum, gingivarū,
sedis, recti intestini ac vulvæ,
penna illitus aut infusus. Eadē
sine expresseione tusa, præcor-
diorum inflammationibus, hu-
midis stomachi vitiis, igni sa-
cro illini prodest: ficcis ac tri-
tis femina asperguntur. Misce-
ri solent vulnerariis antidotis,
atque compositionibus quas
antheras vocant. Folia vruntur
in calliblephara. Flos qui in
mediis rolis inuenitur, sicca-
tus, gingiuarum fluxionibus
efficaciter inspergitur. Capita
pota citam alium, & cruentas
reiectiones sistunt.

Rosei pastilli. Cap. CXXXII.

Pastilli quos rhodides vocāt,
hac ratione conficiuntur: Ro-
farū viridiū, quæ nullo antea
humore madefactæ extabue-
rint, drachmæ quadraginta, In-
dicæ nardi drachmæ decē, myr-
rhæ drachmæ sex, tritæ digerū-
tur in pastillos, q. triū obolorū
pondus equet: siccatiq; in vm-
bra, in fictili nō picato, atq; ob-
turato recodūt. Alij adiciūt co-
sti drachmas duas, iridis Illyricæ
toridæ, & vinū Chiū cū melle
miscēt. Mulierib⁹ moniliū vice
collo circūdato vsui sūt, ad re-
tundendū graue sudoris virus.
Trius etiā vtuntur ad illitiones

ῥοδαλίων, ὧτων, οὐλῶν, δακτύ-
λων, ἀπενδυσιένων ἐντέρεω, κή-
τρεω, πνεῦμα ἐν χροῖον καὶ προσ-
κλυζήμον. αὐτὰ δὲ δίχα τοῦ
ἐκδιδύμει, κοπέντα καὶ ἐπι-
πλασθέντα, ποιεῖ πρὸς ὑποχρῶ-
ν δριῶν φλεγμονὰς, καὶ τομάχου
πλάσθον καὶ ἐρισπύλατα ξηρὰ δὲ
λεία παρὰ μνηστῆρας παρὰ σπέν-
δον καὶ ἀνθρακῆς καὶ τραυματικῆς ἀν-
τιδότῳ μίγνυται. καί τε δὲ καὶ
εἰς κελλιδέφαρα. τὸ δὲ ἐν μέσσοις
τοῖς ῥόδοις εὐεισιόμνητον αὐτῶν
παρὰ οὐλῶν ῥευματικῶν ξηρῶν
παρὰ σπένδον ποιεῖ. αἱ κεφαλὰ
δὲ ποτὶ σπένδον, κοιλίαν ῥέουσιν καὶ
ἀμαρτῶν ἀναγωγῶν ἐπέχουσιν.

Περὶ Ῥοδίδων. Κεφ. ρλβ. 13

Καὶ αἱ λεγόμεναι δὲ ῥοδίδες,
σπένδον τὸν τρέπον τοῦτον ῥό-
δων χλωρῶν ἀνθράκων μεμαρ-
μῶν < μ. ναρδὸν ἰνδικῆς. < ἰ.
σινδύνης < ε'. λεία ἀπλάσσε-
ται εἰς προχέτους τελοβολαίους. 20
καὶ ἐν σπένδον ξηραίνεται, καὶ ἀπὸ πί-
πτεται εἰς κεραμῶν ἀγγεῖον ἀκό-
νιτον σπένδον μόνον. ἐννοῖ δὲ
παρὰ σπένδον καὶ κόσμω < β'. ἱρε-
ως ἰλλυρικῆς τὸ αὐτὸ μίσγοντες
καὶ οἶνον χῶν μετὰ μέλιτος, χεῖ- 25
σις δὲ αὐτῶν ὄσπιν, ἐπὶ γυναι-
κῶν σπένδον μόνον τῷ τετρα-
κῶ ἀπὸ ὀσμῶν ἀμειλίχουσαι τὴν
τῶν ἰδριῶν δύσωδιαν. χεῖ-
ται δὲ καὶ λεία ἐν διαπλασμα-
τι καὶ

ἢ συγχύσασθαι μετὰ τὸ λυγρὸν,
καὶ μετὰ τὸ ξυρχνδύμῳ, ἀπὸ
κλύουται ὑγρῷ.

Περὶ Λυκίου.

Κεφ. ραγ.

- 5 Λύκιον, ὃ ἐν τοῖς πελάγεσιν κα-
λῶσι, δένδρον ὄντι ἀκανθώδες. ῥά-
βδος ἔχον τεύχεα ἢ ἢ μείζο-
νας· περὶ αὐτὰ φύλλα πύξω ὁ-
μοία πυκνά· καρπὸν δὲ ἔχει ὡς
10 πῖπλον μέλαν, πικρὸν, πυκνόν,
λείον· ἢ τὸν φλοιὸν δὲ ὠρεῖν, ὁ-
μοίον τῷ διεσπιννυμένῳ· ῥίζας δὲ
πολλὰς, παλαιὰς, ξυλῶδεις. Φύ-
ττα δὲ πελείου ἐν κατωπαδικῇ
ἢ λυκίᾳ, ἢ ἐν ἄλλοις τόποις πολ-
λοῖς. τραχὺ δὲ φιλεῖ χραεῖα. χυ-
15 λίζεται δὲ τὰ φύλλα συν τοῖς ῥά-
βδοις θλασθέντων ἢ βραχύντων,
ἐφ' ἡμέρας, εἴθ' ἐψηθέν-
των, ἢ τὸν μὲν ξύλων ῥιπποδύων,
τὰ δὲ ὑγρῷ πάλιν ἐφορμῶν με-
20 χρὶ μελιτόδοις συστάσας. δολῶ-
ται δὲ ἀμόργης τῇ ἐψήσει ἅμα
μυρμιδύνης, ἢ ἀψινθίου χυλίσμα-
τι ἢ βοεῖα χολῇ, ἢ τὸ μὲν ὀπνηρό-
μυον ἀφροδὲς ἐν τῇ ἐψήσει ἀ-
φρών, ἀπὸ τοῦ εἰς τὸ ὀφθαλμικόν·
τὸ δὲ λιπὸν εἰς τὰ ἀγὰ χυλίσμα-
25 νευται δὲ ἢ ἐν τῷ καρπῷ ὁμοίως
χυλίσματι ἐπιπερυνθῶν ἢ ἡλια-
ζομύων. ἐστὶ δὲ καλλίστον τὸ χυλό-
μυον λύκιον, καὶ κατὰ τὴν σέ-
σιν τὸν ἀφρὸν ἐνερευθῆ ἔχον, ἔξα-
σιν μέλαν, διαρυσθὲν δὲ κερρὸν
ἀβρῶν.

& diapasmata, quæ sunt ad su-
diores coercendos, ita ut à bai-
neis inarescant corpora, dein
frigida aqua abluantur.

Lycium. Cap. CXXXIII.

Lycium, quod aliqui pyxa-
canthan vocant, arbor est spi-
nosa, ramis trium cubitorum,
aut longioribus: foliis buxi,
densis: fructu piperis, nigro,
læui, amaro, densoque: corti-
ce pallido, non dissimili lycio
madefacto: radicibus multis,
obliquis, lignosis. Nascitur plu-
rimum in Cappadocia, Ly-
tia, & plerisque aliis locis. As-
pera loca amat. Succus ex-
trahendi ratio hæc est: Rami
cum radiculis tusi & antè per
multos dies macerati coquun-
tur, tum abiectis lignis iidem
liquor, donec mellis crassitu-
do fiat. Adulteratur id lycium
adiecta decoctioni amurca,
aut absinthij succo, aut felle
bubulo. Innatans spuma in-
ter coquendum exempta, ocu-
lorum medicamentis additur:
reliquo ad aliavtuntur. Simili
modo fit lycium, semine ex-
presso & insolato. Optimum
quod vri potest, restructum-
que rubentem spumam osten-
dit, glebis extrinsecus nigris,
intus, cum fregeris, rufis odo-
g iiij re

DIOSCORIDIS

re minimè viroso, cum amari-
tudine adstringēs, crocino co-
lore (cuiusmodi indicum est)
ceteris præstantius atque effi-
caciū. Lycium adstringit, ca-
liginem oculorum discunt, ge-
narum scabiem, pruritus, vete-
rēque fluxiones sanat: facit ad
purulentas aureis, exulceratas
gingiuas, tonsillas, labiorum
fissuras, sedis rimas, attritusque
illitum: coeliacis, dysentericis,
potum inditumque conuenit:
datur sanguinem excreatibus
& tussi, ex aqua: contra rabio-
si canis morsus in catapodio
deuoratur, aut in aqua bibi-
tur: si auos facit pilos: reduuiis
vulceribus quæ serpunt aut pu-
trent, medetur: foeminarum
profluuiā appositum sistit: ra-
bioforū ictibus ex melle po-
tum, aut vice catapotij deuo-
ratum, auxiliatur. Tradunt In-
dicum fieri lycium, ex frutice
lōchitide appellato: ea spinarū
generi ascribitur, ramos rectos
habēs ternū cubitorū longi-
tudine, maiorēsve, rubo crassi-
ores, à radice numerosos. Fra-
ctus cortex rubescit, folia oleæ
similia. Herba ī aceto decocta
proditur lienis inflammationib⁹
& regio morbo mederi, & foe-
minarum purgationes elicere.

Asseue-

ἀβρωμον, σύφον μὲν πικρίας χρο-
ματι προκῶδες, οἷον ἴσται τὸ ἰνδι-
κόν, διαφέρον τῷ λοιπῷ καὶ δυναμι-
κώτερον. Δύναμιν δὲ ἔχει συπι-
κνῆν, καὶ τὰ ἐπιποιοῦντα τῇ κόρῃ,
καθαίρει, ἰσχυράσεις δὲ τὰς ἐπὶ τῇ
βλεφάρῳ, καὶ κνησμῶν καὶ παλαιῶν
ρεύματα θεραπεύει· περὶ δὲ καὶ
πρὸς ὅτα πυορροοῦντα, παλί-
θυμα, ἔλα εἰλκωμένα, καὶ διεφθρα-
γῶτα χεῖλη βαρύνει ἐν δακτυλί- 10
οις, καὶ πνεύματι ἐπιχειρόμα-
νον ἀμύζει καὶ κοιλιῶν καὶ δυ-
σεντερικῶν, πινόμενον ἐν ἐκλυζέ-
μῳ. διδοῖ δὲ καὶ αἵμοποικίς,
καὶ βήτικος σὺν ὕδατι καὶ τοῖς ὑπο-
λυωπῶντος κυνὸς διαχρίσει, ἐν χα- 25
ταποτίῳ ἢ σὺν ὕδατι ποτὲν· ξαν-
θίζει τὸ καὶ τείχεαι· παρουνήας
τὲ καὶ ἔρπητας, καὶ σπινθόνας ἰά-
ται· ἴσται καὶ ῥοιῶν γυναικείων προ-
σιτέμενον· βονθεῖ δὲ καὶ λυσοδίν- 20
κτοῖς ποτὲν μὲν γάλακτος, ἢ ἀντὶ
καταποτίου λαμβανόμενον. Λέ-
γεται δὲ τὸ ἰνδικόν· λυκίον γίνεσθαι
ἐνθάδε, τὸ λεγόμενον λοχίτι-
δος· ἔστι δὲ εἶδος ἀκρότης, βάθους
ἐχούσης ὁρτὰς βιπύχεις ἢ καὶ με- 25
ζοῖς· πολλὰς ἀπὸ τοῦ πυθμένος,
παχυτέρας βάτου φλοῖος ῥαγεῖς
ἐνρευθῆς. τὰ δὲ φύλλα ὅμοια ἐ-
λαίῳ, ἢς ἢ πᾶσα ἐν ὀξείᾳ ἐψηθεῖσα
καὶ ποτιζομένη, ἰσχυρεῖται φλεγμο-
νας σπληνὸς, καὶ ἰκτερον ἰάσθαι,
καὶ κατάρσεις γυναικείας ἀγεῖν 30

καὶ ὡμὴ δὲ λεῖα ποιεῖται, τὰ
 αὐτὰ ποιῶν παρὰ δὲ τοῦ τοῦ δὲ
 σπέρματος μύτρα δύο ποιεῖται,
 ὑδατώδη καὶ ταύρει, καὶ θανάσι-
 μοις βοιωθεῖ.

§ Πρὶ Ἀκακίας. Κεφ. ρλβ'.

Ἀκακία φύει ἐν αἰγύπτῳ ἄκα-
 θα δὲ ὅτι δένδρῳ δῆς, θαμνοει-
 δῆς, οὐκ ἔρδοφυς, αὐτὸς ἐχρυσται
 λευκόν, ἢ ἢ καρπὸν ὡς ὅτι φέρμον
 ἐν λοβίσις κείμενον, ἐξ ἧς καὶ ἐκθλί-

10 βεῖται τὸ ἐχρυσμα ἐκρυσταίνον*
 ἐν σπινθί, μέλαν γὰρ ἐν τῷ πεπεῖρα
 καρπῷ, ὑπόκιστον ἢ ἐν τῷ ὡμῷ.
 ἐκλέγῃ δὲ τὸ ἡγέμα ἐκκρίνον, ἐν δὲ
 δεσ, ὡς ἐν ἀκακία χρυλίζουσι δὲ
 πίνες τὰ φύλλα σπινθί καρπῷ.

15 καὶ κόμμι δὲ ἐν τῷ ἀκάνθῳ γίν-
 νάται. Λαύαμιν δὲ ἔχει σπιν-
 κῆς, πυκνὸν, ἀμύζῃ δὲ ὁ χρυ-
 λὸς περὶ τὰ ὀφθαλμοὺς καὶ ἐρυ-
 σπείλατα, ἔρπηται, γὰρ δὲ λα, πτε-
 ρύγια, τὰ ἐν τῷ σωματικῷ,

20 καὶ περὶ ὤσεις ἢ ὀφθαλμῶν κα-
 νίσησιν, ἐπέχει δὲ καὶ βουδὶ γυν-
 αικείων, καὶ ταῖς περὶ ὤσεις δὲ
 τῆς ὑστέρας ἐλλεί, κοιλίαν τὴν
 βέουσαν ἐπέχει πινόμενος, καὶ ἐγ-
 κλυζόμενος* μελάνει δὲ καὶ πεί-

25 ρας. πλωπύται δὲ καὶ εἰς τὰ
 ὀφθαλμοὺς, περὶ ὤσου μὲν ὡ-
 στατος ἀποχρυσταίνον τὸ ἐπιπάρῃ
 ἀχρὺς ἐν καὶ ἀρὸν ἐπιπάρῃ τὸ
 ὑδαρὸς καὶ ἢ πῶς ἀνακαμψαῖν εἰς
 πρὸς χύλους. καὶ ἐτα δὲ ἐν ὡμῷ,
 χρῶμα

Assueverant etiam crudam in
 potu, eisdem effectus præsta-
 re. Semen cyathio dimidio po-
 tum, pituitam expurgare, vene-
 nis quoque auxilio esse.

Acacia. Cap. CXXXIII.

Acacia in Ægypto nascitur
 spina instar arboris, frutico-
 sa, non se in rectum attollens.

Florem habet candidum, &
 semen lupino simile in folli-
 culis, ex quo succus expres-

sus siccatur in vmbra, niger ex
 maturo semine, subrufus ex

viridi. Eligatur modicè rufus
 & odoratus, vt in hac arbore

esse potest. Aliqui expriment
 ex foliis, & semine succum.

Manat & gummi ex ea spina.

Vis ei ad spissandum, refrige-
 randumque efficax. Succus o-

culorum medicamentis utilis:
 valet ad ignem sacrum, vlcera

quæ serpunt, perniones, ptery-
 gia, & oris vlcera: prociden-

tes oculos reprimat, mensium
 abundantiam sistit, prociduam

vulvam cohibet: citam sup-
 primit, aut potus aut subter in-

ductus: capillos denigrat. La-
 uatur oculorum medicamen-

tis, trito in aqua, innox effuso
 quod concreuerat, donec pu-

ra extet aqua: & ita cogitur in
 pastillos. Vritur etiam in cruda

fidelia,

DIOSCORIDIS

fidelia, donec fictile fornaci-
bus percoquatur: torreturque
in carbonum halitu perflata.
Spinæ decoctum solutus artus
fotu committit. Praefertur eius
spinæ gummi, quod in vermi-
culorum speciem cotrahatur,
& vitri modo perluceat, ligni
expers: proximum est candi-
dum: sordidum verò ac resino-
sum inutile. Cutis meatus ob-
fruit, & medicamentorū qui-
bus admiscetur, acrimoniā he-
betat, ambustis ex ovo illitum,
pustulas non patitur erūpere.
Alterum acaciæ genus in Cap-
padocia Pontoq; provenit. Æ-
gyptiæ spinæ similitudine, loge
min⁹, tenerius, humile: aculeo-
rum vallo munitur, folia habes
rutæ. Semē lenticula minus fert
autumno, in oculis connexis,
ternū quaternū mēe capaci-
bus. Succus eius adstringit, vi-
rib⁹ inferior, & ocularib⁹ me-
dicamentis inutilis.

Amurca. Cap. CXXXV.

Armuca (expressæ oliuæ re-
cremētum) decocta in cupreo
vase ad crassitudinē mellis ad-
stringit, ceteros præbens lycij
effectus. Insuper dentium do-
lori & vulneribus, cū aceto vi-
no aut mulso commodē illinit:
addit in medicamēta ocularia,

χρύσα κτ' κροσσὸς ἐν χαμίω· ὁ-
πῶται δὲ ἐπ' ἀνθρώπων ἐκρυ-
σσωμένον, τὸ δὲ τῆς ἀκακίας ἐ-
μα καταντλήμενον, ἄρδρα κλυ-
μὲν ἰσχυροί. Τὸ δὲ κόμμι τ' ἀκα-
κίας διαφέρει τὸ σκληροκόμμι, ὡς
λίγον, διαυγές, ἄβυλον, εἴτα τὸ
λευκόν· τὸ δὲ ῥητινώδες ἔχει ῥυπα-
ρόν, ἄχρηστον. Διωκόμεν δὲ ἔχει
παρεμπλαστικόν, ἀμβλωπικόν,
δριμύτιον φαρμάκον οἷς μίγνυσι.
Πτερυγιά τε καὶ ἐξ ὀφθαλμίων
ἔσται κατὰ χροῖον μετ' ὁδοῦ.
Φύεται δὲ καὶ ἑτέρα ἀκακία ἐν
καππαδοκίᾳ καὶ πόντῳ, παρεμφέ-
ρεσσα τῇ αἰγυπτίᾳ. ἑλάνθων μὲν
ταὶ παραπολὺ καὶ χαμαίβλος, καὶ
τρυφωτέρα· πεπλεγμένης δὲ ἀ-
κακίας πολοπέδης, φύλλα ἔχει
σχηματῶ ὅμοια· τὸ δὲ σπέρμα
ἐν ἑλλήκοις συνιζευμένῳ οἷς, τρι-
χόεις ἢ τετραχόεις, ἑλάνθων
φακοῦ, σύφει δὲ καὶ αὐτὴ χυλίζο-
μένη σύμπασα, πολλὴν ἡπὶ τῇ
διωάμει κατέστεικται, εἰς τὰ ὀφ-
θαλμικὰ ἀνεπιτήδεος ἵστα.

Πρὶ ἀκακίας. Κεφ. ρλζ.
Αμύρην καποσάθμην ὅστις ἐλάνθας
τ' ἐκλυθισμένης, ἢ πρὶ ἐ-
ψιδείσας ἐν χαλκῷ κρυφίῳ μέρῳ· μελιώ-
δης συστάσεως, σύφει· πύσσα πρὸς
ἂ καὶ τὸ λυκίον, ἐν πελασσοῦ δὲ καὶ
πρὸς ὀδονταλγίας καὶ βράσματα,
ἐπ' ἡρομένη μετ' ὄξους ἢ οἶνου ἢ αἰ-
γομέλινος· μίγνυσι· καὶ ὀφθαλμικῶς
&

&

καὶ

καὶς διωόμεσι καὶ ἐμπολασκαῖς·
παλααικὴν τε βελπίων γίνε'· ἐξ
κλυσιμῆς τε ἔδρα καὶ αἰδαίου καὶ μὴ
πρασινῆς εἰλωμενῆς· ὅθεν καὶ ἡ πρὸς
ἐκείνους καὶ ἡ τὸν ἐφ' ἑαυτοῖς
5 ὁδόντας συνὸν φασκίνων ἐκείνους
ἀγχι μὴ πῶς συνείστω, καὶ
ἀπὸ πλάσσει· ἡ δὲ τὸν καὶ πινῶν
σὺν θέρμῳ ἀφ' ἑαυτοῦ καὶ χαμαὶ
λέοντος καὶ ἀχρὸς μὴν θέρμῳ.
ἡ δὲ ἀπὸ πινῶν καὶ ἀπὸ φασκίνων πο-
10 θραϊκῆς καὶ ἀπὸ θρηπικῆς ὡφελῆ,
θέρμῳ καὶ πινῶν· ἐξ ἑαυτοῦ
καὶ εἰς κώδιον καὶ ἐπὶ πινῶν
ἐπὶ τῷ ὕδατι πινῶν σέλλει τὸ ὄγκον.

Πρὸς Ἀγν. Κεφ. ρα'.

Ἀγνὸς ἢ λυγρὸς δάμνός· ὅθεν δὲ γ-
15 δρῶδης, παρὰ ποταμοῖς βαρύνει
τε τὸ πινῶν καὶ χαρὰ δρῶδης φασκί-
νος, ὅθεν δὲ ἔχων διδραμόντας,
μακρὰς φύλλας· ὅθεν καὶ ἐλαίας,
ἀπαλάττωρα δὲ. τὸ δ' αὖθις ἢ
μὴ πινῶν συνὸν ἀποπερφυρί-
20 ζοντι· ἡ δὲ περφυροῦ φέρει, ἀπὸ
μαὶ δὲ ὡς πινῶν, διωόμεν καὶ ἔχει
θερμῶν πινῶν, συπλινῶν. ὅθεν καὶ πινῶν
αὐτὸ πινῶν, βροχῶν θρηπικῆς
καὶ πινῶν, ὅθεν πινῶν καὶ
τασσῶν καὶ γάλα, καὶ ἐμμενῶν αἰ-
25 ρει πινῶν ὅσον < α. πινῶν
συνὸν οἶνον· ἐκείνους δὲ καὶ γινῶν. α-
πὸ πινῶν δὲ καὶ κεφαλαῖς καὶ ἐπὶ
φασκίνων. τὸ δὲ ἀπὸ πινῶν τὸ πινῶν καὶ
τὸ ἀπὸ πινῶν, εἰς ἐκείνους
ταυτὰς ἀπὸ πινῶν διωόμεν,
καὶ

& meatus inductu suo obstru-
entia. Vetustate meliorem fie-
ri constat. Utilliter infunditur
fedis, genitalium, ac vulvæ ex-
ulcerationi. Si verò cum om-
phacino recoquatur ad mellis
crassitudinem, cariosos dentes
extrahit: iumentorum scabiem
cum decocto lupini, & chamæ-
leote illitu sanat. Cruda & re-
centi amurca podagras articu-
lariosque dolores foueri, utillif-
simum: peruncta in villosa pel-
le, & hydropicis imposita, tu-
moris molem reprimat.

Vitex. Cap. CXXXVI.

Vitex siue lygos frutex est in
arborem assurgens, nascitur in
fluminum ripis, asperisq; locis,
ac torrentium alueis: ramos ge-
rit lōgos, fractu peruvicaces: fo-
lia oliuæ sed molliora. Duo ge-
nera eius, vna harum albū flo-
rem mittit cum purpureo: alte-
ra tantū purpureum, & semen,
ut piper. Excalfactorias vires
habet, & adstrictorias. Semen
eius potum venenatis ictibus,
aquæ quæ cutem subiit, lienos-
isque auxiliatur: lac euocat,
menfes ciet, drachmæ pōdere
in vino potum: geniturā exol-
uit, caput tentat, & soporē af-
fert. Decoctū herbæ & seminis
in defensione, mulierib; vulvæ
malæ

DIOSCORIDIS

malo opportunis opitulat, itē
inflammationibus: purgationes
mouet semē cū pulegio potū,
etiā suffitu vel appositu: capitis
dolorem dissoluit illitū, instilla-
tur cū aceto & oleo capiti in
lethargo & phrenitide. Folia
suffitu aut substratu fugant ve-
nenata: illita quoq; serpētium
morsibus auxiliantur: testitū du-
ritias cum butyro & foliis vi-
tium emolliunt: rimas sedis se-
men cum aqua illitū mitigat,
& cum foliis medetur luxatis,
vulneribusq;. Virgā qui manu
teneat dum iter facit negat in-
tertriginē sentire. Agnū, quasi
dicas castū, vocāt Græci, quo-
niam matronæ in thesmopho-
riis Atheniēsiū castitatē cu-
stodientes, foliis huius cubitus
sibi sternūt, & lygon quasi vi-
men, propter inuictam ferē ra-
morum flexilitatem.

Salix. Cap. CXXXVII.

Salix vulgō nota est: cuius
femen, folia, cortex & succus
spissandi vim habent. Trita fo-
lia cum exiguo pipere & vino
pota, ileosis subueniūt: sumpta
per se & cum aqua præstant
mulieribus ne concipiant. Sa-
lignum semen in potu sangui-
nem expuētibus prodest: cor-
tex eosdem præbet effectus.

Corticis

καὶ φλεγομαῖς ἀρήγει πιδέν δὲ
μετὰ ἡλίου καὶ ὑποδυμιαδέν
τὸ σπέρμα καὶ ποροσθέν, καὶ δαρσιν
κινεῖ τὴν δὲ καὶ κεφαλῆς κα-
ταπλαστέωρον, καὶ ἐπὶ ληθαργί-
κων τε καὶ φρενιτικῶν ἐμβέχεται
συνὸς καὶ ἐλάω. καὶ τὰ φύλλα
ὑποδυμιαδέν τε καὶ ὑποσποννύ-
μενα, θηρία διόκη, καὶ κατὰ πλάσ-
σόμενα ἐπὶ τῇ θηριοδύκτων βοή-
θει, σκληρίας τε διδύμων μετὰ
βιττέρου καὶ φύλλων ἀμπέλου μα-
λάττει, βραχύδας τε τὰς ἐν σακτυ-
λίῳ συνὸς ἐπιπλαδέν τὸ
σπέρμα πρὸς τὴν συνὸς τοῖς φύλ-
λοις, σπέρματα, τραύματα ἰᾶται.
διόκη δὲ καὶ καλυψήθειον εἶναι ἐν
ὁδοιπορείαις παρατεταμένων. εἰ
πὺς ῥάβδον αὐτῆς παρὰ χεῖρα
κρατῆναι, ἀνόμεσται δὲ ἄγρος, διὰ
τὰς ἐν τοῖς θεσμοφορείοις ἀγρευέ-
σας γυναικας, εἰς ὑπέρφωρα χεῖρ
διδῶν αὐτῇ, λύρος δὲ διὰ τὸ πρὸς
τὰς ῥάβδους αὐτῆς ἔυτονον.

Πρὶς ἰτέας. Κεφ. ελζ'.

Ἰτέα δὲν δρον ὅτι πᾶσι γυνώ-
κειμον, ἔο καρπὸς καὶ τὰ φύλλα
καὶ ὁ φλοιὸς καὶ ὁ χυλὸς, συπι-
κνύει καὶ δυνάμειν ἀρμόζει τὸ
φύλλα λεῖα μετὰ ὀλίγου πεπέ-
ρους καὶ οἶνου πιδέντα εἰλεώδεις,
καὶ εἰ αὐτὰ δὲ συνὸς ἐπὶ ληθαργί-
ται, ἀσπληνίσαν κατὰ ῥάξιν. ὁ δὲ
καρπὸς ποδείει, αἰμοπηθικὸς ὁ φ-
λοιὸς καὶ ὁ φλοιὸς δὲ τὰ αὐτὰ δρᾷ.
καὶ εἰς

ῥαεὶς δὲ καὶ φουραδεὶς ὅξει, τύλας
καὶ ἥλας ἀγρὶ καταπλαθεῖς. ὁ δὲ
ἐκ τῶν φύλλων καὶ τῶν φλοιῶν χυ-
λὸς, ἐν καλύφῳ ῥόας θερμανθεὶς
μετὰ ῥοδίνῳ, ὡταλγίας ἀρῇσι. καὶ
τὸ ἀφέψημα δὲ αὐτῶν, κατὰ-
τλημα ποδάρους ἀρεσκόν· σιμῇσι
δὲ καὶ τῇ πυρρᾷ λαμβανέται δὲ καὶ
ὁ πὸς ἐξ αὐτῆς ἐντεννομήσου τῶ
φλοιῶν καὶ τῶν ἀνδρῶν, ἔστω γὰρ
ἐνυρίσκειται συνεσώς. Διῶμα δὲ
ἔχει σμηκτικὴν τῶν ἐπισκοποῦν-
των τῆς κόρας.

- Πρὶ Ἀργελαίας. Κεφ. ρλθ.
Ἀργελαία καὶ ἐντοὶ κόπνον κα-
λοῦσιν, οἱ δὲ, αἰθιοπικὴν ἐλάαν.
ἔχει φύλλα συπτικὰ, λεῖα δὲ κα-
ταπλαθεῖντα, ἐφεκτικὰ ὅσιν ἐρυ-
σιπελάτων, ἐρπύτων, ἐπιφυκτι-
δων, ἀνδρῶν, νομῶν, παρυν-
χίων, ἀσχετικὰ ἐρρῶν,
συνὴ μέλιτι καταπλασθῆντα,
ἀνακαθαίρει δὲ καὶ τὰ ῥυπαρὰ
ἐλκῃ, διαφορεῖ καὶ φύγεθλα καὶ
φλεβμοναί, συνὴ μέλιτι καταπλα-
θεῖντα, καὶ δέρμα κεφαλῆς ἀπο-
σπᾶδεν, παρὰ κολλᾷ ἴσται δὲ καὶ
τὰ ἐν σώματι ἐλκῃ καὶ ἀφθῆας δια-
μασθῆντα, καὶ ὁ χυλὸς δὲ αὐτῆς καὶ
τὸ ἀφέψημα, τὸ αὐτὸ ποιεῖ ἐπε-
χει δὲ καὶ αἰμορραγίαν, καὶ ῥοῦν
ζυμωκείον προσθήμενος ὁ χυλὸς
καὶ τὰ ἐν ὀφθαλμοῖς σιφυλώ-
ματα, καὶ φλυκταίνας. ἔπι δὲ ἐλκῃ
καὶ παλαιὰ ῥεύματα σέλλει.

διὸ

Corticis cinis admisto aceto
maceratus, illitu clauos & cal-
los tollit. Ex foliis & cortice
succus cum rosaceo in calyce
punci calfactus, auriū dolori-
bus auxiliatur. Decocto corū
podagras foueri vtilissimum:
furfures purgat in corpore. Ex
cipitur succus qui manat ex ea
cū floret, excilo cortice: in pla-
ga enim cōcretus humor inue-
nitur, qui ad purgāda, quæ ob-
stant oculis, suā vim præbet.

Syuestris olea. Ca. CXXXVIII.

Syluestris olea, quam Latini
oleastrū appellant, alij Æthio-
picam oliuam, folia astringūt:
trita autem & imposita ignem
sacrum, vlcera quæ serpunt: e-
pinyctidas, carbunculos, redu-
uias nomāsque cohibent: cru-
stas emarginant cum melle il-
lita. Quinetiam fordida vlcera
repurgant: inflammationes
panōsque cum melle imposi-
ta discutunt: cutem à capite
vulsam conglutināt: oris vlcera-
ribus, & priuatim infantium,
cōmanducata medentur. Suc-
cus & decoctum eisdem ha-
bēt effectus: sanguinis eruptio-
nes, ac muliebre profluuium,
admotus succus inibet: vix o-
culorū, pustulisq; prodest, vlce-
ra & veteres defluxiones sistit,
quapro-

DIOSCORIDIS

(quapropter in collyria additur.) ad genarū erosiones perquam vtilis. Exprimitur succus tufis folijs, affuso vino aut aqua, siccatusque sole in pastillos digeritur: sed longē validior ad recondēdum succus habetur, qui cum vino quā cū aqua expressus est. Auribus subuenit, siue vlcerentur, siue pus effluat. Folia conueniēter coeliacis cum farina hordeacea illinuntur: vruntur cū floribus folia, vt spodij vicē cinis prestet, in cruda olla, obliro ore futo, vsque dum figlinū percoquatur: restin ctāque vino & rursus subacta, eodem modo vruntur, postremo cerusā modo elota coguntur in pastillos. Huiuscemodi cinerē in medicamentis oculorū constat spodio non cedere, sed eisdē viribus præditū esse putandū est.

Olea. Cap. CXXXIX.

Foliorum fatiux olea eadē vis intelligitur, sed aliquātō in ferior: vnde ocularibus medicamentis ob suam mitiorem vim conuenientior est. Sudor ligno virenti accenso manans, illitu sanat lichenas, furfures et & scabiem. Oleaginum semen illitū medetur furfuribus, & vlceribus quæ depascūt vorātq: quod

διὸ καὶ μνηῖτα κολλυείοις παρὰ τῶν βλεφάρων διατίθεται. ὁ δὲ καὶ κόπτεται, χαλίζοντας δὲ δεικνύειν τὰ φύλλα, καὶ ἀειχρόντας οἶνον ἢ ὕδωρ ἐκθλίβειν, καὶ ἐξηράνοντας ἐν ἡλίῳ ἀναπλάσσειν, ἐστὶ δὲ εὐποτέρως, ὁ δὲ τὸ οἶνον ἐκθλίβειν μύρος, καὶ εἰς ἀπόδεσιν μάλλον τὸ δὲ ὕδατος ἀρμόζει, ποιεῖ δὲ καὶ πρὸς ὅσα πυρρῶνται καὶ εἰλικυμῶνται. τὰ δὲ φύλλα καὶ ἐπὶ κοιναῖς ἐνδετεῖ καταπλασόμενα οὐδὲ μνηῖται, καίεται δὲ τὰ φύλλα μετὰ τῶν ἀνθῶν, καὶ ἀντὶ τοῦτο λαμβάνεται ἐν χύτρεα ὡμῇ ἀεὶ πλεονάζουσα πηλῶ τι σόμα μέχρις ὁπλήσεως τῆς κεφαλῆς. ἔπειτα κατασβέννυται οἶνος, καὶ πυρρῶνται πάλιν οἶνος, ὁμοίως καίεται. εἴτα παλιν ὥς τὸ λιμνίδιον καὶ ἀναπλάσσειν. δοκεῖ δὲ ἡ τοιαύτη χρῆσις, μὴ λείπεσθαι τὸ σποδίον εἰς τὰ ἐφθαλμικὰ ὅθεν καὶ τὸ διδάμιν ὁμοίως ἰσχυρόν. 10

Περὶ Ἐλαίας. Κεφ. ρλβ'. Διδάμιν δὲ τὰ αὐτὰ καὶ τὴν ἐρυθραίαν φύλλα, λείπειν δὲ τῇ διδάμιν ὅθεν πρὸς τὰ ἐφθαλμικὰ καὶ μάλλον ἀρμόζει διὰ τὸ ἐπιχέεσθαι. τὸ δὲ ἐκ χλωρῶν τῶν ἔυλων κεκομμένων ἐκχυρῶν ὕδρων, πίνουσα καὶ ὕδατος καὶ λιχμῶν καὶ παρρηγόμῶν ἰσχύει καὶ ὁ καρπὸς δὲ αὐτῶν καταπλασθεὶς, πίνουσα καὶ νομαίς δεῖν πένει. τὸ δὲ 15

τὸ δὲ ἐντὸς τῆ πυρλῆος μετὰ
ἐλάτος καὶ ἀλεύρου, λεπτέρους ὀ-
νυχας ἐκπνέεται.

Πρὶ Κολυμβάδων ἑ-
λαίων. Κεφ. ρμʹ.

Ἐλάσαι κολυμβάδας κείσαι κατὰ
πλάθειται, πνεύματα ἐν ἑῷ
σι φλυκταίνουσιν, καὶ ῥυπαρὰ ὃ ἑλ-
κη καὶ αἰμασιν. ὁ δὲ ἐν τῇ ἀλμυρῇ
χυλὸς αὐτῇ διακλυζόμενος, οὐλα
ἐλλή, καὶ ὀδόντας στρομεύους κρα-
τύνει. ἔστι δὲ ἡ ῥὲ ὑποκίρρος καὶ
περὶ σφατος ἐλάαια, δυσκοίλους, ἐν
ἐύμαχος· ἡ δὲ μέλαινα καὶ πύρι-
ρος, ἐν διὰ φθορος καὶ κακὸς μα-
χος, ὁ φθαλαμῶς τε ἀνεπιτήδειος
καὶ κεφαλαλγῆς, φευγίσαι δὲ καὶ
ἡ κατὰ πλάθειται, νομῶς ἴσησι, καὶ
ἀνδραχας περὶ ῥήπει.

Πρὶ Ἐλαίου ἀγρίας ἑ-
λαίας. Κεφ. ρμʹ.

Τὸ δὲ ἐν τῇ ἀγρίας ἐλαίας ἑ-
λαίου, διὰ κλυσιμα ἔλκους μὲν δῶσι.
ἡ κατὰ πλάθειται ὑποπύλων ὀδόντων
ἐστὶ, πυρία τε δὲ ὁ ὑπὸ θερμανο-
μένων καὶ διακλυζόμενων ἐπιτήδει-
ος ἔλκους ῥευματιζόμενοις. δεῖ δὲ
ἔριον μικρὴν περὶ πέντας ἀπο-
κρίνειν εἰς τὸ ἐλαίου, καὶ περὶ σφί-
ας τοῖς ἔλκους ἄχρῃς ἀνλευκὰ φα-
νῇ. Πρὶ Δακρυῆς ἐλαίας αἰ-
διοπικῆς. Κεφ. ρμʹ.

Τὸ δὲ δάκρυον τῆς αἰδιοπικῆς
ἐλαίας, εἰσὶν ὅπως σκαμμένης.
ἐγκρίνον, ἐν μικρῶν σαρόνων
συγκρί-

quod autē intra nucleum est,
ex adipe & farina scabros vn-
gues excutit.

Colymbades olea.

Cap. CXL.

Colymbades tritæ & ambi-
tis illitæ pustulas gigni pro-
hibent, sordida vlcera purgāt,
muræ fuceus collutas gingi-
uas contrahit, & motus den-
tium firmat. Oliua flaua & re-
cens stomacho vtilior est, ven-
tri difficilis: nigra autem &
matura corruptioni opportu-
na est, stomacho aduersatur,
oculis non conuenit, capitis
dolorem mouet, arefacta illitu
depascentia vlcera fistit, & car-
bunculos emarginat.

Oleum syluestris oliuæ.

Cap. CXL I.

Oleum syluestris oliuæ gin-
giuis putri vligine laboranti-
bus colluitur, detium mobili-
rates stabilit, calfacti fotus gin-
giuis fluxione laboratibus vti-
lis est: lanam enim specillo cir-
cumligatam oleo madefacere
oportet, & gingiuis admouere,
donec albæ spectentur.

Lachryma æthiopica
olea. Cap. CXLII.

Lachryma quæ æthiopica o-
lea stillat, scāmonio similis qua
dāten⁹ est, fulua stillis exilibus
cōstās,

DIOSCORIDIS

constās, mordax: quæ autē am-
moniāci aut gūmi similitudinē
refert, colore nigricās, nec gu-
stu mordēs, superuacua est. No-
strates olea, oleastriq̃, similem
lachrymā sudāt, quæ cōmodē
ad oculorū hebetudines illini-
tur: cicatrices albuginesq̃ illi-
tu emēdat, vrinā & mēses ciet,
cauis dentiū impressa ad dolo-
res efficax est: inter venena scri-
bit: partus pellit, lepras & impe-
tigines sanat. Appellatur autē
æthiopica & agrestis olea.

Quercus. Cap. CXLIII.

Quercus omnis adstricto-
riam vim habet, præsertim li-
ber qui cortici & ligno in-
tercedit: quinetiam tunica pu-
tami glandis subiecta. De-
coctum ex iis datur dysente-
ricis, coeliacis, sanguinem ex-
creantibus. Trita in pefso, fœ-
minis fluxione vulgē laboran-
tibus subiicitur.

Glandes. Cap. CXLIII.

Glandes eisdem effectus
exhibent: vrinam ciunt, capi-
tis dolorem & flatu in cibum
sumptæ pariunt, resistunt esi-
tata venenatorum ictib⁹. De-
coctum earū & corticis cum
lacte vaccino potum, prædest
contra toxica: intrita crudæ,
inflammationes illitu leniunt:
ad duritias

συγκείμενον, δνητικόν τὸ δὲ ἐ-
μοιον κόμην καὶ ἀμμωνιακῶ, με-
λανίζον καὶ οὐ δνητικόν, ἀγχεῖον.
φίξει δὲ τὸ τοῦτον καὶ ἡ παρ' ἡμῶν
ἐλαία, καὶ ἡ ἀγριελαία· πικρὴ δὲ
πρὸς ἀμεινωπῶν καὶ οὐλας καὶ
λευκώματα ἐγχεῖσθαι σμῆ-
χει, οὐδ' αὖτε καὶ ἐμμῆλαι κηεῖ, καὶ
πρὸς ὀδόντων πόνους ἐνεργεῖ, ἐ-
πιθέμενον εἰς τὸ βροῦμα ἀναχρᾶ-
σθαι δὲ καὶ ἐν τοῖς φθαρτικοῖς·
ἄγει δὲ καὶ ἔμβρυα καὶ λειψύδας
δεσποῦν καὶ κέσσαν. καλεῖται δὲ
αἰθιοπικὴ ἐλαία καὶ ἀγριελαία.

Περὶ Δρυός. Κεφ. ρμγ.

Δρὺς πᾶσα συπιπλύνει καὶ
διώκει, μάστιγι δὲ αὐτῆς εὐ-
φει τὸ μεταξὺ τοῦ φλοιοῦ καὶ τοῦ
πρὸς ἐμῶν ὑμῶν εἰδὲς· ὁμοίως καὶ
τὸ πρὸς τῇ βαλάνῳ ὑπὸ τὸ κέ-
λυφος. δίδεται δὲ τὸ ἀφέψμα
αὐτῶν, καρμιακοῖς καὶ δυσεντε-
ρικοῖς, καὶ αἰμορροϊκοῖς· καὶ
ἐν πρὸς τοῖς λεῖον πρὸς σίσειται βοῖ-
καὶς γυναιξίν.

Περὶ Βαλάνων. Κεφ. ρμδ.

Καὶ αἱ βάλανοι τὰ αὐτὰ πικρῶ-
σιν· εἰσὶ δὲ καὶ ἔρηπικα, καὶ κεφα-
λαλγῆς, βιβρωστικὰ, καὶ πνευ-
ματῶσαι ἀρμύρασι δὲ πρὸς τὰ
ιοβόλα ἐπιθῆναι, καὶ τὸ ἀφέψμα
δὲ αὐτῶν καὶ τὸ φλοιὸν βρωθεῖ
τοξικῶ μὲν γάλακτος βροῖον πνέ-
μενον, ὡμαὶ δὲ καταπλαθεῖσαι
λεῖαι, φλεγμονὰς παρηγορεῖσαι
συν

συνὴ ἑαπὶ δὲ χοιρεῖα ταειχ-
 ῖα, πορὶς κακοῦδεῖς σκληρίας, καὶ
 πορὶς πυρρηνόμυρα ἑλκῶ ἀρμό-
 ζουσι τὸ χυρὸς τετρα δὲ τὸ δρυῖων
 αἰ φρίνται τῇ δυνάμει εἰσίν.

5 Πρὶ Φηροῦ καὶ φρίνα.

Κεφ. ρμϛ.

* Καὶ ἡ φηρὸς καὶ ἡ φρίνα εἰσὶν
 ὄντα δρυὸς, ἐνικότα ἐν ῥῆϊ. τῆς
 ῥίζης δὲ τῆς φρίνας ὁ φλοιὸς ἐλκ-
 δεῖς συνὴ ἑαπὶ ἄχρῃς οὗ τακ-
 10 ρὸς ῥήνται, καὶ ἐπιπλαθεῖς νύ-
 κτα ὀλῶ, τοῖς καὶ μελάνει πορ-
 αποσμηχθεῖς καὶ μελάνει γῆ. ἀρ-
 μόζει δὲ τὰ φύλλα παύτων, κο-
 πέντα λεία οἰδύμασι, καὶ τὰ ἄπο-
 να δὲ μέρη κρατῶν.

15 Πρὶ Κασάνων. Κεφ. ρμϛ.

Αἱ δὲ σαρδαναὶ βάλαροι, αἵ πε-
 νὲς λόπιμα καὶ κάρσανα καλοῦσιν, ἡ
 μότα ἡ διὸς βαλάνους, εὐφροται
 καὶ αὐταὶ, τῶν ὁμοίων εἰσὶ δρυα-
 καὶ, καὶ μάστις οἱ μεταξὺ τῆς
 20 σαρκὸς καὶ τῆς λέπτους φλοιῶ. ἡ δὲ
 σαρξ καὶ τοῖς ἐφήμερον πεπωκό-
 σιν ἀρμόζει.

Πρὶ Κηκίδων. Κεφ. ρμϛ.

Κηκὶς καρπὸς ὅστις δρυὸς.

ἡ μὲν τις ὀμφακίτις καλεῖται
 25 μικρὰ καὶ κοινολώδης, σιβα-
 ρὰ, ἀτρυπητὸς ἡ δὲ τις λεία,
 καὶ κοῦφι καὶ τετρημυδὴ. ἐμ-
 λέχασται δὲ δὴ τῷ ὀμφακί-
 30 τινι, ἐνεργέστερον οὖσαν. ἀμ-
 φότερα δὲ σύφοισιν ἰκανῶς,
 καὶ

ad duritias quas coëthe vo-
 cant, & malefica vlcera cum
 falsa axungia conueniunt. Il-
 ligenæ glandes viribus quernas
 antecellunt.

Fagus & ilex.

Cap. CXLV.

Fagus & ilex quercus gene-
 ri assignantur, & cōsimile mu-
 nus obeūt. Illigenæ radicis cor-
 tex cum aqua coctus, dū mol-
 litus intabescat, & tota nocte
 illitus, denigrat capillos, prius
 cimolia terra purgatos. Folia
 omnium tusa & trita tumori-
 bus prosunt, & imbecillas mē-
 brorum partes corroborant.

Castaneæ. Cap. CXLVI.

Sardianæ glâdes, quas aliqui
 castaneas, aut lopima, aut glâ-
 des Iouis appellant, adstrin-
 gunt, similēsque effectus præ-
 bēt: præsertim tunica quæ car-
 nem & corticem media inter-
 cursat. Caro his qui ephemerū
 biberunt, conueniens est.

Galla. Cap. CXLVII.

GALLA fructus est quer-
 cus. Aliqua omphacitis appel-
 latur, parua quidem sed tu-
 beroſa, solida, nullo foramine
 peruia. Altera plana, leuis, per-
 forata. Eligi debet omphaci-
 tis, quæ efficacior est. Vtrius-
 que vis vehemēter astringere.

h

Tritæ

DIOSCORIDIS

Trita excrementa in carne,
fluxiones gingivarum & vuæ,
atque oris ulcerationem co-
hibent. Nucleus dentium ca-
uernis inditus dolorem sedat.
Crematæ carbonibus donec
igne flagrent, & vino aut ace-
to aut acida muria extinctæ,
sanguinem supprimunt. Deco-
ctum quibus insidere expedit,
efficax est, & contra vulvas
procidentes, fluxionesque. Ca-
pillis denigrant, aceto aut a-
qua maceratæ dysentericis co-
liacisque cum vino aut aqua
trita conuenienter illinuntur,
aut bibuntur: obsoniis addi
debent, aut integræ in aqua
præcoqui, in qua nonnihil ex-
coquendum est, quod his as-
fectibus conferat. In summa,
his vtendum ad adstringenda,
aut siccanda quæ opus sunt.

Rhus. Cap. CXLVIII.

Rhus quæ obsoniis asper-
gitur, ab aliquibus erithros ap-
pellata, semen est coriarij fru-
cticis, sic vocati, quoniam co-
riorum infectores co vtunt, ad
inspissandas pelles. Arbuscula in
petris nascens, binum ferè cu-
bitorû altitudine foliis oblô-
gis, subrubetib*, i ambitu ferra-
tis, acino vuarû graciliû defo,
magnitudine

χὲ τέλλοισι λείπει τὰς ὑποσφρα-
σεις, ρευματισμούς τι οὐλῶν καὶ
κυνίδος, καὶ τὰς ἐν στόματι ἄφ-
θας. τὸ δὲ μέσον αὐτῶν, βροχίμα-
τι ὁδόντων ἐπιτίθεν, παύει τὰς
ὁδύνας. γίνονται τε καὶ ἰσχυ-
μοι καί τισι ἐπ' ἀνδράκων μέ-
χρι πυρρώσεως, καὶ κατὰ σκεῶν ἐ-
σαι ἢ οἶνον ἢ ὕξις ἢ ὑξάλμην. τὸ δὲ
ἀπόζημα αὐτῶν ποιεῖ καὶ πρὸς
ἐγκλίσιμα, πρὸς πλῶσις ὑπε-
ρεσ, τῆς ρευματισμοῦ. μελάνισι 10
δὲ καὶ τριχας, ἀποβραχέεται ὕξις
ἢ ὑδατὶ. ἀρμόζουσι δὲ καὶ κοιλιακοῖς
καὶ δυσεντηκοῖς ἐπιπλάττονται
οἶνον ἢ ὑδατὶ λείπει καὶ πρὸς ὕ-
ποσις τὸ πρὸς σφίμασι καὶ τὸν ὑ-
δατὶ, εἰς ὃ μέλλει τι ἐλθεῖν τὸ
ἀρμόζον πρὸς αὐτοῦς καὶ κα-
τόλου ὅπου δὲ εὐφραῖ ἢ εἴηται ἢ
ἀναξήρεται, παραλαμβάνεται
δεῖ τὴν χρῆσιν αὐτῶν.

Πρὸς Ρόδος. Κεφ. ζμυ. 20

Ρὸς ἐπὶ τὰ ὄψα, ὃν ἐννοίᾳ ἐρυθρὴν
καλεῖται, καρπὸς ὅστις τὸ καλὸν
βυρσοδελικῆς ρόδος, ἢ τις ὡνομά-
σθαι ἐκ τῶν βυρσοδελικῶν αὐτῇ
χρῆσθαι, εἰς τὸ εὐφραῖν τὸν δερματῶν. 25
ἐστὶ δὲ ἀνδρῶν * φυλόμυρον ἐν
πέτραις ὡς δὲ πικρὸν ἐφ' ἑ φύλλα
ἐπιπλέκει, ὑποδρά. τὸ πρὸς ἐφ' ἑ
ἐν τῇ τελευτῇ πρὸς τοῦ δὲ. καρ-
πὸς δὲ ἐξ ὅσων ἐστὶν, πικρὸς,
καὶ

10 κτ' τὸ μέγεθος τερεβινθίου, ἐπὶ
 πλατυς, τὸ περικείμενον φλοιῷ
 δεῖ, ὅταν εὐχρηστον. Διὰ μὲν δὲ
 ἔχει τὰ φύλλα, ἐπιπικνὸν, περὶ
 15 καὶ δὲ τείχεος τὸ ἀφ' ἡμέρας, δι-
 σεν τεύχεος τε ὅταν ἐγκυσμα, καὶ
 πύμα, καὶ ἐγκύσματα, καὶ ὅταν
 πυρρῶν τῶν ἐγκυσμα, πτε-
 ρύμα, καὶ γαργαράνας ἐπέχει κα-
 20 ταπλασθήματα τὰ φύλλα, μετ'
 ὅρας ἢ μέλιτος, καὶ τὸ χύλισμα δὲ
 τῶν φύλλων ξηρῶν ἐφορῶν σὺν
 ὕδατι ὥστε τὸ λύκιον ἄξι συ-
 εάσει· μελιτώδους, ἀρμόζει
 25 περὶ ὅπου καὶ τὸ λύκιον, καὶ ὁ καρ-
 πὸς ὃ τὰ αὐτὰ ποιεῖ, ἀρμόζων ἐν
 περὶ σπλήνασι κοιλιακοῖς, δισεν
 τευχοῖς, ἀφ' ἡμέρας τε πτε-
 ρύμα, καὶ ταπλασθήματα, διὰ
 30 σματα, ἀποσύματα, περὶ ὅμα-
 τα γλῶσσης τὸ τε αὐτὸ πτε-
 ρύμα σὺν μέλιτι καὶ λευκὸν ῥοῦν ἰσ-
 σι, αἰμορροΐδας τὸ τεραπύς, καὶ
 35 δρυϊνοῦ αὐτῶντος λείν, ὅταν πτε-
 ρύμα, καὶ τῆς δὲ τὸ ἀπὸ βρέφια
 ἐφόρῳν πινύα, βέλτον πτε-
 ρύμα καὶ πινύα, φέρει δὲ καὶ κό-
 40 μι ὅταν ὁπότε τῶν βρώμασι
 τῶν ὁδόντων περὶ ὁπότεν.

25 Πρὶ Φοίνικος. Κεφ. ρμθ'.
 Φοίνις ἐν αἰγύπτῳ γίγεται.
 30 στυγνὰ δὲ μαστορεύσας τῆς
 καὶ τῶν ὁπότεν ἀκμῆς, παρεμ-
 35 φέρων τῇ ἀραβικῇ μυρεβαλάνῃ,
 40 πόμα

magnitudine terebinthi, qua-
 dātenus lato: cuius corticosa
 tunica perquā vtilis est. Folia
 vim habent adstringēdi, & aca-
 cie effectus prābent. Decoctū
 capillos denigrat, dysentericis
 infunditur, & in potus eorum
 infessisq; adiicitur, instillatur
 auribus purulentis. Gangrenas
 & pterygia cohibent folia ex
 aceto aut melle illita. Liqua-
 mentum fit ex aridis foliis, ad
 crassitudinem mellis in aqua
 decoctis, ad eadem, vt lycium,
 conveniens. Semen eisdem
 effectus exhibet: coeliacorum,
 dysentericorumq; obsonij in-
 spergitur: fracta, desquamma-
 ta, liuida que, illitum ex aqua,
 ab inflammatione vindicat: lin-
 guæ asperitates cum melle ab-
 stergit, cādida, forminarū pro-
 fluvia sistit, hæmorrhoidas sa-
 nat, cum querno carbone in-
 trito admotū. Aqua in quo se-
 men maduit decocta, cogitur,
 coitq; efficacior ipso semine.
 Gummi defert, quod dentium
 cauis imprimitur ad dolores fi-
 niendos.

Palma. Cap. CXLIX.

Palma in Ægypto gignitur.
 Ea medio maturitatis vigo-
 re, autumno decerpi solet.
 Arabici myrobalani similis,
 h ij pomatis

pomatis cognomine, colore
 viridi, & odore mali cotonei:
 quod si ad maturitatem per-
 venire finatur, phœnicoba-
 lanus fiet. Palma acerba est &
 adstringens: contra alui foe-
 minarumque profluvia, in vi-
 no austero bibitur: hæmor-
 rhoidas sistit, vulnera gluti-
 nat illitur. Phœnicobalani re-
 centes plus ficcis adstringunt,
 capitis dolorem afferunt, co-
 piofiores in cibo inebriant,
 ficciores sanguinem excrean-
 tibus, stomachicis, & dysen-
 tericis viles in cibo: illinun-
 tur cum cotoneo et cerato œ-
 nanthino vesicæ vitiiis. Cario-
 tæ, præsertim esu, faucium aspe-
 ritati medentur.

Palma Thebaicæ.

Cap. CL.

Thebaicarum decoctum
 potu æstuationem sedat, vi-
 res recreat cum hydromelite
 veteri sumptum: cibo idem fa-
 ciunt. Fit ex eis vinum ad ea-
 dem conueniens. Decoctum
 per se potu & gargarizatio-
 ne magnopere adstringit, &
 cohibet. Nuclei palmarum, cæ-
 terorum more, cremati in cru-
 do fictili, & vino relictis, ci-
 nere loto, spodij vicem effi-
 ciunt: miscenturque in calli-
 blephara.

πῶμα δὲ λέγεται, χλωρὲς τὸ
 χροῖμα, ἐμφθὴς κινδυνὸν καὶ τὸ
 ὀσμύνη· εἰ δὲ ἀφελήσῃ πεπαιγ-
 μένος, γίνεται φοινικόβαλανος.
 ἔστι δὲ στυφρὸς, συντεκνὸς, πινόμε-
 νος συνὸν οἶνον ἀυστηρῶς πρὸς διὰρ-
 ροίαν καὶ ῥοῶν γυναικείων· ἰσχυ-
 ρὸν δὲ καὶ αἰμορροΐδας, καὶ τραύματα
 κολλητὰ κατὰ πλάσσειν. αἱ δὲ φοι-
 νικόβαλανοι, συντεκνότεραι πυγ-
 χαίοισι τῶν ξηρῶν, κεφαλῆ αἰσ-
 θὲς εἰσι καὶ πλείονες βρωθεῖται με-
 δύσασθαι· αἱ δὲ ξηραὶ ὀφθαλμοὺς
 βλεφάρων ἀνοίξαι αἰμορροίας, στο-
 μαχικούς, δυσεντερικούς, καὶ τὰ
 ἄλλα κύστη, κατὰ πλάσσειν
 λέειν μετὰ κινδυνίου καὶ κερωτῆς
 οἶνον εὐκλῆς. μάστιγα δὲ αἱ καρπύ-
 πιδες ἐδιδόμηναι, ἀρτηρίων τρα-
 χυτήτας ἰόνται.

Περὶ φοινίκων θεβαϊ-
 κῶν. κεφ. ργ'.

Τῶν δὲ θεβαϊκῶν τὸ ἀφελήμα
 πρὸς ἀνὰ καὶ σώματα, καὶ τὰς δι-
 νάμεις ἀνακλῶν, καὶ τὸν δόρυ μέλιος
 παλαιὸν λαμβανόμενον· καὶ αὐτὸ
 βρωθεῖται, τὸ αὐτὸ πινέται, γίνε-
 ται καὶ οἶνος ἐξ αὐτῆς τὸ αὐτὸ διω-
 μένος τῷ καρπῷ καὶ κατὰ αὐτὸ πο-
 θέν τὸ ἀφελήμα αὐτῆς καὶ ἀγαθὰ
 γαριζόμενον ἰσχυρὸς σύμφυτος ἐλά-
 οἱ δὲ πυρρὲς τῶν φοινίκων, καὶ οἱ
 ἐν αὐτῇ γάρβια, κατὰ πλάσσειν καὶ τὰ
 πάντα εἴδη σεβέντης οἶνον πλύ-
 νον· καὶ ὡς ἀντίσποδα εἰς τὰ κα-
 λυπνέ-

10 ἀνελείφει χηστμεύοντι καὶ μὴ
 ἐμύτρως κελῶσι, πάλιν τὸ αὐτὸ
 γίνεται. Διῶαμιν δὲ ἐχρυσὶ συ-
 ππικῇ, παρὲμωλυσιν, πειοῦ-
 σαν πρὸς τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς φλυ-
 5 κτίδας, σφυλώματα, μύλφας
 συνάφδω· συνάφω δὲ ἐλλὰ-
 σι καὶ ἁπὸ σαρκώματα, καὶ ἁπου-
 λῆσιν ἑλκυσιν, ἐνδετῆσι δὲ μάλιστα
 οἱ ἀπὸ αἰγύπτιου, οἱ ἐκ τῶν χα-
 μαζίων φονικῶν.
 10 Πρὶ φονικῶς ἐλάτης. Κεφ. ς. γ. α.
 Φονιξ ὡς ἐννοιοι ἐλάτιν ἢ σπά-
 διν καλεῖσιν, πελαγίον μὲν ὅτι τῇ
 καρπῷ τῇ φονικῶν ἀκμῇ ἀνθίν-
 των. χροῖ δὲ αὐτῶ οἱ μυρεφοὶ
 εἰς τὰς τῶν κνέων ἐλπίδες τῶν αὐ-
 15 τῆς κρατῆς ἢ ἐνὶ ὤδης, σύφουσα,
 βαρεῖα, μεμυκῖα, λιπαρὸν ἔχουσα
 τὸ ἐν πῶς. Διῶαμιν δὲ ἔχει συππι-
 κῇ ἐρετῶσαν τὸν νεμόμενον τῇ ἐλ-
 κῶν, χαλασμός τῇ ἀφ᾽ ἑαυτῶν συνά-
 20 ρηεῖα μαλάσσει μὴ εἶσαι καὶ χα-
 ταπλασμασιν· ὠφελεῖ δὲ καὶ ὑπο-
 χρίσμα καὶ εὐμαχὸν ἀπνοεῖται,
 καὶ ὑπαπτικός διαθέσις, μισγυρῶν
 τοῖς ἀμύλῃσι τῇ καταπλασμα-
 των μελάνι· καὶ βίχας τὸ ἀφ᾽ ἐ-
 λκῶς αὐτῶ, σπινθόμενον συνεχρῶς·
 25 πρὶ ζόμβου δὲ νεφρίκοις καὶ τοῖς
 ἀπὸ κύστη καὶ σπλάγχνα ἀρμύζει,
 κοιλίαν τε καὶ ὑστέρα ῥευματιζο-
 μένῳ ἵσησιν, ἀπαλὴ δὲ συνῶν
 τῇ καὶ κηρῶ ὑπερθεῖσα, καὶ ἐα-
 θεῖσα ἡμέρας εἴκοσι, ἡμέρας ἰσθῶν.
 καὶ

blephara. Quod si nō iustā vsti-
 onē acceperit, denuo cremādi.
 Vini adstringendi habēt, & spī-
 racula cutis obductu suo clau-
 dūt: cōtra oculorū vuā & pu-
 stulas; palpebrarū defluuia, cū
 nardo effectū prēbet: corporis
 excrescētias cū vino reprimūt,
 vlcera ad cicatricē perducūt.
 Sed inter primas vtilis ex pal-
 mis humilibus Aegyptiæ.

Palma elate. Cap. CLI.

PALMA, quam aliqui
 elaten aut spathan appellant,
 fructus palmarum adhuc flo-
 rentium, inuolucrum est ca-
 lyxque, quo in spissamēta vn-
 guentarij vtuntur. Optima ha-
 betur odorata, adstringens,
 ponderosa, præclusa, intus pin-
 guis. Vis ei adstrictoria: sistit
 vlcera quæ depascunt, laxatos
 artus committit, trita misce-
 tur cataplasmatibus & malagma-
 tis: prodest præcordiis, im-
 becilli stomacho, & iocineri
 affecto, mista conferentibus
 cataplasmatibus. Eius decoctum
 subinde deterfum, capillos de-
 nigrat: datur bibendum con-
 gruē, renum, vesicæ, & visce-
 rum vitis: vuluæ ac ventris
 fluxiones sistit: scabiem cum
 resina, & cera sanat, si vigin-
 ti diebus recens apponatur.
 h iij Inuolu.

DIOSCORIDIS

Inuolutusque in ea elate fructus, quem suo amplexu fouet, elate etiam vocari solet, & ab aliquibus borassus. Adstringit, & spathe effectus prestat, non sic vnguentis expectit. Alba medulla, caudicis recens in cibo, aut decocta eade facit, quæ borassus.

Malū punicū. Cap. CLII.

Malum punicū omne boni fucci est, stomacho vtile, perexiguum sufficiens alimētum. Dulcia stomacho vtiliora habetur, sed aliquantulū in eo calorem gignunt inflationes pariūt, vnde in febris, abdicantur. Acida adstringūt, æstuanti stomacho auxilianī, & multò magis contrahunt, ac vrinā cient. Ora gingiuāsque lædūt. Vinosa verò mediā fortiuntur naturā. Nuclei acinorū acidi punici ī sole siccati, & obsoniis īsparsi, cōcoctiue, fluentē aluū stomachūq; sistūt. Cœlesti aqua madescūt, bibūturq; cōmodē sanguinē excreatibus: ad desensus dysentericorū, foeminarūq; fluxione vuluæ laborantiū vtilēs sunt. Expresus nucleorū succus coquit cū melle, ad oris, virilitatis, et sedis vlcera, nomas, reducias, & ea q̄ ī corpore extuberāt, auriū dolores, & nariū vitia:

ἢ ὁ περιεχόμενος δὲ ὑπὸ τῆς καρπῆς, ἐλάττη καλεῖται, ὑποὶ ἐνίων δὲ βόρασσος, ἢ αὐτὸς συμπλεκόμενος τῷ αὐτῷ δῶρ. τῇ σπάθῃ, χωρεῖς τὸ ἐν τοῖς μύελαις ἐν χρευσίας, ἢ τὸ ἐγκαρδίον δὲ τῷ περιεχόμενῳ καὶ αὐτὸ περιεσπαστὸν βίβωσι σκόρμυρον καὶ ἀποφόμυρον, ποιεῖ πρὸς ὅσα, ἢ ὁ βόρασσος.

Πρὶ Ρουῖς. Κεφ. ςϛ'

Ρόα πᾶσα ἐρύχμος, ἐυσομαχες, ἀπεφορῆς τοῦτων μὲν περὶ ἡ γλυκεία ἐυσομαχῶν τέρεσι, διεσπασίαν ποσὴν ἡλυνῶσι πρὸς σωμαχόν, καὶ πνευματῶσι, ὅταν ἐπὶ αὐτῷ τῶν πυρεσσόντων ὅταν ἀσθενῶς ἢ δὲ ἐξεία χλωσσυμύρω σωμαχῶ βονθεῖ καὶ ἐστὶ ἐλαττῶς κατῆρα καὶ οὐρανικῶν τέρεσι. ἄσχυρος δὲ, ἢ ἐν πηκεί. ἢ δὲ οἰνόδους μέστωι ἔχει διῶαμιν τῆς δὲ ἐξείας ὁ πυρελὺ ξηρανθεὶς ἐν ἡλίῳ, ἢ ὀππαχόμενος πρὸς σφίμασι καὶ σινεφόμυρος, κοιλίας καὶ σωμαχὸν ῥέυμα ἵσκησιν ἀποβραχεῖς δὲ ἐν ὀμβρῇ ὕδατι, αἰμοπτοῖκους ἀφελεῖ πινόμενος, ἢ εἰς ἔγκλησιματα δυσεντερικῶν καὶ ροϊκῶν ἀμύζει. ἐν χρευσίῳ δὲ τὸ ἀπόθλημμα τῶν πυρελῶν ἐν δὲ καὶ μὲν μάλιστα πρὸς τὰ ἐν σῶματι καὶ αἰδοίῳ καὶ ἐδρα ἔλκεα, καὶ πνεύματα τὰ ἐν δακτύλοις, νομᾶς τε καὶ ὑπόχως καὶ ὀδοντῶν καὶ τὰ ἐν μυκτῆρσι,

ἢ

ἢ

καὶ μάλα τῆς ὀξείας.

Πρὶ Κυτίνων. Κεφ. ργ'.

Τὰ δὲ ἄρθρη αὐτῶν καὶ κύβητοι
καλοῦνται, καὶ αὐτὰ συπτικὰ καὶ
ξηραντικὰ καὶ κατασπληνικά ἐσσι,
καὶ καὶ μὲν κολλητικὰ ἀρμόζον-
τα πρὸς τὴν ἰσχυρίαν. τὸ δὲ ἀφ' ἡ-
μα αὐτῶν ἔλκων πλάσθων καὶ
ὀδοντων σπειρομένων διάκλυσμα,
ἀνακλινόμενα τε ἐν τρεσικληκτοῖς
ἐν καταπλάσμασιν ἱσπερὺσι δέ
πινες, μὴ ὀφθαλμῶν παρ' ὅλων
τὸ ἔτος τοῦ καταπίνοντος τρεῖς κυ-
τίνες, ὡς ὅτι ἐλαχίστοις· χυλίζον-
τα δὲ ὡς ἡ ὑποκιδίς.

Πρὶ Σιδάων. Κεφ. ρδ'.

Καὶ τὰ λέπιδά τῆς ῥάας αὐτῶν
καὶ σίδια καλοῦσι συπτικὴν ἔχον-
τα καὶ αὐτὰ διώσκειν, πρὸς ὅσα καὶ
οἱ κύβητοι ἀρμόζουσιν. τὸ δὲ ἀφ' ἡ-
μα τῶν ῥιζῶν, ἐλμινδας ἀλατεί-
ας πρὸς ἐκπινάσκει καὶ ἀποκλείνει.

Πρὶ Βαλαυστίων. Κεφ. ρε'.

Βαλαυστίον ἐστὶν αὐτὸς ἀγρία
ῥοιάς, ἣ δὲ ἐστὶν αὐτῷ πλείονα
να εὐρίσκεται γὰρ καὶ λευκὸν καὶ
πυρρὸν καὶ ῥοδόχρουν* εἶοικα δὲ
κύβητι ῥοιάς, χυλίζεται δὲ ὡς ἡ
ὑποκιδίς. Διόσκειν δὲ ἔχει συ-
πτικὴν, πρὸς αὐτὴν καὶ ἡ
ὑποκιδίς καὶ ὁ κύβητος.

Πρὶ Μυρίνης. Κεφ. ρς'.

Μυρίνη ἡ ἡμερὴς, πρὸς τὴν
δακτύλον χερσὶν, ἡ μαλακία τῶν
καὶ ἀρμόδιω τέρε, καὶ ταύτης
μυρίων

tia : praesertim acidorum.

Cytinus. Cap. CLIII.

Huius flores cytini vocan-
tur: qui adstringunt, ficcant, co-
hibent: sanguinolenta glutināt,
quas punicum, praestat vitlita-
tes: humida gingiviarum vitia
mobilesq; dentes decocto col-
luuntur, herniam prolapsu inte-
stini erumpentem cataplasma-
te repellunt: memoriae tradit,
qui tres, quā minimos cytinos
deuorauerit, nullā eo anno lip-
pitudinem passurum: eliquatur
hypocistidis exemplo.

Malicoriū. Cap. CLIII.

Malicoriū, asperū est mali pu-
nici putamē, qđ aliqui fidiō ap-
pellāt. Id spissādi vim habet, &
quos cytini, praebet vsus. Deco-
ctū radicis potu latas vētris vi-
neas pellit, & easdē euocat.

Balaustiū. Cap. CLV.

Balaustium sylvestris punici
flos est, cytino similis, cuius cō-
plura genera reperiuntur: cā-
didū, fuluum, colore rosaceo.
Succus ex eo exprimit, hypo-
cistidis modo, cui adstrictoria
vis inest, eadem faciēs, quę hy-
pocistis, & cytinus.

Myrtus. Cap. CLVI.

MYRTVS fatua ni-
gra vitior est medicinae quā
candida, & in hoc genere
h iij multo

DIOSCORIDIS

multò magis mótana: semé ta-
men imbecillius parit . Vis &
myrti & feminis adstringit. Se-
men viride aut aridum in cibo
datur sanguiné excreatibus, &
vesicæ erosionib⁹. Succus viré-
tibus baccis expressus eosdè ef-
fectus exhibet: stomacho utilis,
urinâ cit: pdest cōtra phalāgij
morsum, & scorpionis ictus in
meros: feminis decoctū capillū
tingit, ius decocti in vino vlce-
ra in extremis mēbris nata sa-
nat, oculorū inflāmationes illi-
tum cum polline polētā lenit,
cōtra ægilopas illinitur, crapu-
lam arcet p̄sumptum vinum,
quod feruēfacto aliquantū ei⁹
femine exprimitur: aliās enim
acorem cōtraheret. Præstat idē
feminis effectus. Vtile procidē-
tiæ vuluarum in defesionibus,
sedis vitiis, & foeminis fluxio-
ne vuluæ laborantibus: purgat
furfures, vlcera capitis manan-
tia, atq; eruptiones papularū:
fluentes capillos continet. Ad-
ditur quoque in medicamēta,
quas liparas vocant, vti oleum
quod ex folijs eius factum est.
Decoctum foliorum ad defes-
siones balnearū cōuenit, & cō-
tra laxatos artus, & malè folide
scētes. Eo fracta ferruminatio-
ni repugnātia vtilissimè fouēt,
vitili-

μαλλον ἢ ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς καρπῶν
ἀπονώτρων ἐχει. Δυνάμεις δ' αὐτῆς
καὶ τῆ καρπῆς ἐν πικρίᾳ. δίδωσι δὲ ὁ
καρπὸς χλωρὸς τε καὶ ξηρὸς ἐκ τῆς
μυρῆς αἰμοποιοῦν καὶ τοῖς σακκοῖς
μυροῖς τῆς κυστῆς. καὶ ὁ ἐκ τῆς χλωρῆς
δ' αὐτῶν ἐκθλίβειν των χυλὸς, τὰ
αὐτῶν πιεῖν, ἐνδομαχος ὢν καὶ ἐρη-
λικοῖς ἀρμόζων, φαιαδμοδόνικοις
καὶ σκορπιόπληκτοις σὺν οἴνῳ. καὶ
τὸ ἀφέψημα δὲ τῆς καρπῆς βλάπτει 10
τείχεας ἐμφθέρεις δ' σὺν οἴνῳ, καὶ
καταπλαθεῖς, τὰ ἐν ἀκρωτηρίοις
ἐλκεσι δεξαμένη· μετὰ πάλης δὲ
ἀλφίτου καταπλαθεῖς, φλεβο-
μας τὰς ἐν ὀφθαλμοῖς παρηγο-
ρεῖ, καὶ πρὸς αἰγίλωπα δὲ ἐπι- 25
πλάπτεται, καὶ ὁ ἐξ αὐτῆς δὲ γινό-
μενος οἶνος ἐκθλίβειντος τῶν καρ-
πῶν, καὶ ἐπὶ πρὸν ἀφεψηθέντος,
ὀξίζει γὰρ ὁ μὴ οὕτω σκευασθεῖς,
ἀκράτατος ὅστις πρὸς πινόμενος,
πρὸν πρὸς ὅσα καὶ οἱ καρπὸς, ἐγ- 20
καδίσματα τε, μύττας, πρὸς πλά-
σεις, καὶ σακτυλίας, καὶ ροικαῖς ἀρ-
μόζει, σμύχει δὲ καὶ πίπτει.
καὶ ἀχόρεας, καὶ ἐξανθήματα,
τείχεας τεινέουσιν ἐπὶ χειρὶ μένυ-
ται δὲ καὶ λιπαρεῖς, ὡς πρὸς καὶ 25
τὸ ἐκ τῶν φύλων αὐτῆς σκευα-
ζόμενον ἔλαιον. καὶ τὸ τῶν φύλων
δὲ ἀφέψημα, εἰς τε τὰ ἐγκαθί-
σματα ὑπὸ μύζῃ, καὶ πρὸς τὰ χα-
λαρά, καὶ ἀσυμπύκνωτα ἀέρηα καὶ
πρὸς ἀσυμπύκνωτα κατὰ γόνατα,
ἀφελίμως

- ὁ φθίμωος κατατλήεται, σμύχει
 δὲ καὶ ἀγνός, καὶ πρὸς ὅτα πυρρ-
 ῶντα ἐγχυματίζεται, καὶ μελα-
 σμοὶ τε γῶν, καὶ ὁ ἐξ αὐτῶν ὃ γυ-
 λὸς τὰ αὐτὰ ποιεῖ· αὐτὰ δὲ τὰ
 5 φύλλα λεῖα καταπλασθέντα ἐν
 ὕδατι, ἀρμόζει τοῖς κατὰ τὴν
 σμύχει, καὶ ῥευματιζομένοις τοῖσι
 πᾶσι καὶ κοιλιακοῖς· ἡ δὲ ὁμφακίνη
 γὰρ ἢ ῥοδίου ἐλίου καὶ οἶνον μεμι-
 γνένον, καὶ ἔρπυσσι, καὶ ἐρισπέλασι,
 10 διδύμων τε φλεγμοναῖς καὶ ὀπι-
 νυκτίσι καὶ κοινυλῶμασι· ἐν ᾧ δὲ
 λεῖα παρουνχίας καὶ πτερυγίαι,
 ρηστίμως καταπλάττεται, καὶ κα-
 τὰ τὴν μαρμάριον καὶ μύρτιον, καὶ
 ἐπὶ καρδιακῶν ἐλάει τὰς ἰδρῶ-
 15 τας· κεκαυμένα δὲ καὶ ὁμαλὰ με-
 τὰ κηρωτῆς, πνεύματα καὶ πτε-
 ρύγια καὶ παρουνχίας ἰσχύει. γυ-
 λίζεται δὲ τὰ φύλλα παραχρῶ-
 μίου οἶνου παλαιού, ἢ ὕδατος
 ὁμβρίου, καὶ ἐκθλίβεται. ἢ δὲ
 20 ρηστίσι αὐτὰ προσφάτω ὄντες, ἐν-
 ρανθεῖς γὰρ εὐρωπῆ καὶ ἀδυνατεῖ.
 Περὶ Μυρτιδανίου. Κεφ. ρνζ'.
 Τὸ δὲ μυρτιδανίον λεγόμενον ἐ-
 στί φασὶν ὅτι ἀνθρώπου καὶ ὁ χυλῶ-
 δης καὶ ὁ μώρως οἶον ἐκ ρηστίων πε-
 25 ρεῖ τὸ ἢ μυρσίνης φρέγγον· εὐφρα-
 δὲ μᾶλλον ἢ μυρσίνης ἀποτίτε-
 ται δὲ κοπὴν καὶ μύρον οἶνον ἀνισ-
 ρῶν ἀναπλασθέν τε εἰς τρυγίους,
 ἐν σκιᾷ ξηραίνετε, δραστηκότερον
 δὲ ὅτι τε καρπὸν καὶ τὸ φύλλον,
 μύρον

vitiliginem emendat, purulen-
 tis auribus infunditur, & ca-
 pillos denigrat. Succus eadem
 efficit. Trita folia, & ex aqua
 illita humidis vlceribus, & par-
 tibus omnibus fluxione labo-
 rantibus, coeliacisque profunt:
 & admisto omphacino oleo,
 aut exiguo rosaceo cum vino,
 ad vlcera serpentia, ignem fac-
 rum, testium inflammationes,
 epinyctidas, & condyloma-
 ta. Arentium foliorum fari-
 na vtiliter inspargitur parony-
 chiis, pterygiis, & contra ala-
 rum feminumque perfusiones:
 cardiacorum sudores cohibet.
 Folia cruda seu cremata cum
 cerato, ambustis, paronychiis,
 pterygiisque medentur. Expri-
 mitur foliis succus adfuso ve-
 tere vino aut aqua caelesti, cu-
 ius recentis vsus est: nam exic-
 catus planè cariem sentit, &
 vires amittit.

Myrtidanum. Cap. CLVII.

Myrtidanū dicitur, adnatum
 inæquabile verrucosum intum-
 escensq; & concolor: quod
 perinde quasi man^o myrti cau-
 dicæ amplectitur. Magis q̃ myr-
 tus adstringit: tufum addito au-
 stero vino reponit, coactūq; in
 pastillos ficcatur in vmbra: mul-
 tō efficacior, & folio & semine,
 cera-

DIOSCORIDIS

cerato, pefsis, infefionibus, cataplafmatis admiftum, vbi adstringendum aliquid eft.

Cerafia. Cap. CLVIII.

Cerafia aluo vtilia funt, fi viridia fumantur: eadem ficcata, illa fiftunt. Gummi quod cerafi refudarunt, cum vino diluto tuffi vetuftę medetur: colorem cõmendat, vifum exacuit, appetentiã inuitat: idem ex vino potum calculofis auxilio eft.

Siliquæ. Cap. CLIX.

Siliquæ recentes ftomacho aduerfantur, aluum foluunt: eadem ficcata fiftunt, ftomachõq; vtiliores fiunt. Vrinam ciunt, fed præcipuè, quæ vina-
ceis coniuntur.

Mala. Cap. CLX.

Folia, flores, & germina cū omnis mali, tum maximè cotoneæ adstringunt. Pomis acerbis adstringendi vis ineft: maturis verò longè fecus. Ex iis verna bilem gignunt, nervos omneis lædunt, inflationes pariunt.

Cotonea mala.

Cap. CLXI.

Cotonea ftomachovtilia, vrinã cient: verum tofta mitiora habetur. Profunt coeliacis, dyfentericis, purulenta extufiõtib; cholericis, præfertim cruda.

Mace-

μυρόμυρον κηρωτῆν καὶ πικροῖς, ἐγκαθάρσας τε καὶ καταπραΰνας τοῖς σφόδρα δερμάτοις.

Περὶ Κερασίων. Κεφ. ρη'. 10

Κεράσια καὶ ἀντὰ τὸ χλωρὰ λαμβανόμενα, ἐν κοιλίᾳ τυγχάνει ξηρὰ ὅ ἴσησι κοιλίαν. τὸ ὅ καμνὸν κερασίον, ὅνχα χροῖαν ἵαται λαμβανόμενον μὲν κράματος, εὐχροῖαν τε καὶ ὀξυδορκίαν καὶ ὀρεξὴν ποιεῖ ὁφθαλμοῖς καὶ λιθιῶντας μετ' οἴνου πινόμενον.

Περὶ Κερατίων. Κεφ. ρηθ'.

Κεράτια χλωρὰ καὶ λαμβανόμενα, κακοστόμαχα τυγχάνει, καὶ κοιλίας λυπηρὰ, ξηρανθέντα ὅ ἴσησι κοιλίαν, εὐστομαχῶς τε ὄντα καὶ διουρητικὰ. μάλιστα δὲ τὰ ἐν τῶν σφυγμῶν συνπιεζόμενα.

Περὶ Μυλέας. Κεφ. ρε'. 15

Μυλέας πάσις τὰ φύλλα καὶ τὰ ἄνθη καὶ οἱ βλαστοὶ, σφόδρα μάλιστα δὲ τῆς κυδωνίας, καὶ ὁ καρπὸς ἐν ὥρᾳ μὲν στυπτικὸς καὶ ὀξεστικὸς πεπαιθεὶς δὲ οὐχ ὁμοίως. τὰ δὲ τῶν ἑσπερίων ἀμυγδαλῶντα μύλα χοληποῖα, ἄνθη τὰ τῶν νευρώδων παντὶ ἐμπνευματωτά.

Περὶ Κυδωνίων μύλων.

Κεφ. ρεθ'. 20

Τὰ δὲ κυδωνία, εὐστόμαχα, ὀξυπικρὰ, ὀππιδέντα δὲ περὶ σπινέτα γίνεται, χηρῶς κοιλιακοῖς καὶ τὸ δυσεντερικοῖς καὶ ἐμπνυκοῖς καὶ χολειῶσι μάλιστα ὠφέλιμα καὶ τὸ

5 καὶ τὸ ἀπόβρεγμα δὲ αὐτῶν ἀ-
 μίξῃ τοῖς στόμαχον ἢ κοιλίαν βου-
 μάζοντο τοῖς ἐν ποτῶν. ὁ ὕψυχλος
 ὁ μὲν αὐτῶν καμψανόμυθος, ἐξ-
 οπποτικοὺς ὠφελεῖ. τὸ δὲ ἀφ' ἡ-
 5 μα, περὶ σκληρυία δακτυλίου, καὶ
 ὑσέρας περὶ πῶσει. τὰ δὲ ἐν τῷ
 μέλιτος, καὶ αὐτὰ μὲν οὐρητικὰ.
 τὸ δὲ μέλι τιμὴ αὐτῶν ἀναλαμ-
 βάνεται δι' αἰμὴν· σερρωπικόν, ὃ
 καὶ συπικόν γίγεται. τὰ δὲ συ-
 10 τῶ μέλιτι ἐξόμυθος, ἐν στόμαχα
 μὲν καὶ εὐστομα, ἢ πόν δὲ σερρω-
 πικὰ. τὰ δὲ ὁ μὲν καταπλάσμα-
 σι μίγνυται περὶ σερρωπὶ κοιλί-
 ας, στόμαχου ἀντιστοπὴν, καὶ πύ-
 ρωσιν, μαστοὺς φλεγμαίνοντας,
 15 σκληρυίας ἐκ μέρω μύθους, κονδυ-
 λώματα. Γίνεται δὲ καὶ οἶνος
 ἐξ αὐτῶν κοπτομύθων καὶ ἐν-
 θριβομύθων, περὶ διαμονὴν μ-
 γουμύθου τοῖς ἰσ'. ἐξέσαις τοῦ γυ-
 λοῦ μέλιτος ξέστου ἐνδὸς ἐπεὶ ἐξί-
 20 ζει· ἀρμύζει δὲ περὶ τὴν εἰρημέ-
 να πάντα, καὶ* χρίσματα δὲ ἐξ αὐ-
 τῶ σκευάζονται τὸ καλομύθον μύ-
 λινον, ἢ χρώματα ὁπόταν συπι-
 κοῦν ἐλάνον δειντομύθου. ἐκλέγε-
 σθαι δὲ δεῖ τὰ ἀκνηδινὰ, μικρὰ δὲ
 25 ὅτι καὶ περὶ φερὴ καὶ ἐν ὁδῷ ταῦ-
 τα. τὰ δὲ λεγόμενα στρούθια καὶ
 μεγάλα ἢ πόν ὅτι εὐχρησται. τὰ δὲ
 αὐτῇ αὐτῶν ἐκείνη καὶ χλω-
 ρὰ καταπλάσματος εὐδεται,
 περὶ τὸ εὐ λείως χρίσιν ἐχόντα,
 καὶ

Maceratorum liquor commodè
 in stomachi aut ventris fluxio-
 nibus, potui datur. Succus cru-
 dorum assumptus orthopnoi-
 cis salutaris est. Decocto fo-
 uentur vulva, & sedes si proci-
 dant. Cotonea quæ melle con-
 diuntur, vrinam mouent: mel
 autem sibi constringentem il-
 lorum vim, & inspissantem ad-
 sciscit. Quæ cum melle coquun-
 tur, stomacho atque ori gra-
 tiora sunt, sed minus inspissant.
 Cruda cataplasmatibus adiun-
 untur, ad cohibendam aluum,
 aut si stomachus æstuet, aut
 in vomitiones effundatur, ad
 mammarum inflammationes,
 præduros lienes, & condylo-
 mata. Fit vinum ex ipsis tuis ex-
 pressis: sed quod perdureret,
 quindecim sextariis succi vnus
 mellis adiungitur, alioquin in
 acorem degenerat. Prodest ad
 omnia, quæ dicta sunt. Fit & o-
 leum ex iis, quod melinum vo-
 cauimus, quo vtimur quoties
 adstringenti oleo est opus. Eligi
 oportet vera, quæ sanè sunt ro-
 tunda, parua & odorata: quæ
 verò Struthia dicuntur, magna
 quidè sunt, sed mins vtilia. Flos
 & viridis & fucus cataplas-
 matis imponitur: iis cōueniēs,
 quæ adstrictionem desiderant,
 inflam-

DIOSCORIDIS

inflammationibus oculorum,
reiectionibúsq; sanguinis. Cō-
tra citam aluum, & mensium
impetus, in vino bibitur.

Melimela. Cap. CLXII.

Melimela ventré molliunt, &
ab eo animalia expellūt, stoma-
cho negotiū exhibēt, Aestuosa.
Ea multis dulcia malavocátur.

Epirotica mala.

Cap. CLXIII.

Epirotica mala, quæ Latine
orbiculata dicūtur, stomacho
vtilia: sistunt aluum, vrinās e-
uocant, malis tamen cotoneis
inualidiora.

Syluestria mala.

Cap. CLXIII.

Syluestria mala familia sunt
vernīs, & adstringunt. Sanè in
hunc vsum immatura omnia
opus sunt.

Perfica mala. Cap. CLXV.

Perfica poma matura tam
stomacho, quàm ventri vtilia
sunt. Acerba aluum cohibent,
sed sicca vehementius. Deco-
ctum è ficcis alui stomachiq;
fluxiones sistit.

Armeniaca. Cap. CLXVI.

Armeniaca, quæ à Latinis
præcocia dicuntur, minora
sunt supradictis, & stomacho
vtiliora.

Medica

ἢ πρὸς ὀφθαλμῶν φλεγμονὰς, ἢ
πρὸς αἵματος ἀναγωγὰς, κοιλίας
τὴν ῥέυσιν ἢ ἐμμηρίων φορὰν ἀρ-
μόζει μὲν οἶνον πινόμενα.

Περὶ Μηλίμων. Κεφ. ρξβ'.

Τὰ δὲ μελίμυκα κοιλίαν μα-
λάσσει, ἢ διὰ τὴν ἐκπύουσαν κα-
κοσύμηναν, καὶ οὖσα πικρὰ κα-
λεῖται ὅτι ἀπὸ πτηνῶν γλυκύμυκα.

Περὶ Ἡπειρωτικῶν μή-
λων. Κεφ. ρξγ'.

Τὰ δὲ ἡπειρωτικὰ λεγόμενα, 10
ῥωμαῖσι δὲ ὀρθικουλάδα, εὐσ-
μάχα, κοιλίας σπληνικὰ, οὖρον
περὶ κλητικὰ, ἀπὸ πτηνῶν μάλιστα
τῶν κωδωνίων ὄντι.

Περὶ ἀγριομήλων.

Κεφ. ρξδ'.

Τὰ δὲ ἀγρία ὅμοια τοῖς ἐκκοῖσι
εὐφροντα. Δεῖ δὲ περὶ τὰ εὐφ-
ρὰς χεῖροντα, ἀποστέρειν ἀπα-
σι χεῖροντα.

Περὶ Περσικῶν μήλων. Κεφ. ρξε'.

Τὰ δὲ περσικὰ μύλα εὐσώμα- 20
χα, εὐκοιλία τὰ πέπυρα. τὰ δὲ ἐ-
νωμα, σπληνικὰ κοιλίας, ξηρανθέν-
τα δὲ, ἢ στεγνωτικώτερα γίνονται.
ἢ τὸ ἀφ' ἑνὸς δὲ αὐτῶν ξηρῶν
λαμβάνοντες, σόμαρον ἢ κοι-
λίαν ῥευματιζομένην ἴσθιν.

Περὶ Ἀρμενικῶν. Κεφ. ρξς'.

Τὰ δὲ μικρότερα καλούμενα
δὲ ἀρμενικὰ, ῥωμαῖσι δὲ περσι-
κόμια, εὐσώμα καὶ ἄλλα τῶν προ-
ειρημένων εἰσιν.

Περὶ Μη-

Περὶ Μηδικῶν. Κεφ. ρξζ'.

Τὰ δ' ἢ μηδικὰ λεγόμενα ἢ περ-
σιχαὶ ἢ καθ' ὁμοίαν, ῥωμαῖστ' δὲ
κίτρινα, πᾶσι γινώσκοντα· φυτὸν γάρ
ἔστι καρποφόρον δι' ὅλου τοῦ ἐ-
5 τοῦ ἐπαλήθεως. αὐτὸ δὲ τὸ μύ-
λον ἐπιμυκεῖ, ἐρύπτει δὲ μύρον,
ῥιζοῖσιν τῇ ῥιζῇ, ἐν ᾧ δὲ μετὰ
βάρους, πέραμα ἔχον ἀπὸ ἑτοι-
κός. Διυάμην δὲ ἔχει πύρην ἐν
οἴῳ, αὐτὴν ῥιζὴν συνασμίμοις, κοι-
10 λίαν τὴν ὑπάρχον, διὰ κλύσμα τέ-
ῃσι πρὸς ἐννοδίαν εὐματός τὸ
ἀφ' ἡμῶν καὶ ὁ γυλὸς ἀπὸ τῶν βι-
βρώσκειται ἢ μάστιγα ὑπὸ γυναι-
κῶν πρὸς τὴν κίαντα· φυλάττειν
δὲ καὶ ἰμάτια δοκεῖ, ἄβρωτα ἐ-
15 πιπυζέμενα κισσίοις.

Περὶ Ἀπίου. Κεφ. ρξή.

Ἀπίου δὲ πολλὰ εἶδη, πᾶσαι
δὲ σύφοισι· ὅθεν εἰς τὰ ἀποκρυ-
πτα καὶ ταπλάσματα ἀρμόζουσι.
τὸ δ' ἀφ' ἡμῶν αὐτῶν ἐκμανθεῖ-
20 σῶν, καὶ αὐτὰ λαμβανόμενα ὡ-
μαί, κοιλίαν ἐξῆσσι· βλάπτουσι δὲ
ἐσθιόμενα τὸν νῆστες.

Περὶ Ἀχράδος. Κεφ. ρξθ.

Ἡ δὲ ἀχράς εἶδος ἔστιν ἀγρίη
ἀπίου, βραδέως πεπαιγμένη-
25 γη. Διυάμην δὲ ἔχει, συππι-
κωτέραν ἀπίου· ὅθεν πρὸς τὰ
αὐτὰ ἀρμόζει. εὐφει δὲ καὶ τὰ
φύλλα αὐτῆς. ἢ δὲ ἐκ τοῦ ξύλου
αὐτῶν τέφρα, βοῶντι ἐναργῶς
τοῖς ὑπὸ μυκήτων πτηνέμοις.
φασι

Medica mala. Ca. CLXVII.

Medica mala Persicæ aut
cedromela, quæ Latini citria
vocant, nemini non cognita.
Arbor ipsa omnibus anni tem-
poribus pomifera, aliis deci-
duis, aliis subnascentibus. Ma-
lum oblongum est, rugosum,
colore aurum imitans, cum
grauitate odoratum, semen ha-
bet pyri. Id in vino potum ve-
nenis resistit, aluum mouet, o-
ris suauitatem commēdat, de-
cocto eius colluto, aut suc-
co: estur in malacia mulieri-
bus: vestiariis impositum ab
erosionis vitio vestes vindica-
re existimatur.

Pyra. Cap. CLXVIII.

Pyrorum multa genera, quæ
tamē omnia adstringunt: pro-
inde adduntur conuenienter
in repellētia cataplasmata De-
coctum ē ficcis & cruda ipsa
aluum sistunt: ieiunos esitata
lædunt.

Achras. Cap. CLXIX.

ACHRAS pyrastri ge-
nus est, quod tardissimē ema-
turefcit. Vim pyro adstrin-
gentiorem habet, & ad ea-
dem conuenit: stringunt eti-
am eius folia. Ligni pyro-
rum cinis efficaciter his auxi-
liatur, quos fungi strangulant.
Aiunt

DIOSCORIDIS

Aiunt fungos, si fyluestria py-
ra cum eis coquantur, inno-
xios fieri.

Mespilus. Cap. CLXX.

Mespilus, quæ à nonnullis a-
ronia vocatur, spinosa arbor
est, folio pyxacanthæ: fert po-
mum suauē, exiguo malo non
dissimile, tribus intus osicu-
lis: qua ex causa id nonnulli
tricotcon appellauere. Tarde
maturefcit, esu adstringit, sto-
macho gratum est, aluumque
supprimit.

Altera mespilus.

Cap. CLXXI.

Alterū mespili genus in Ita-
lia nascitur, quod aliqui seta-
nium, alij epimelida vocant.
Arbor foliis mali, sed minori-
bus: pomum fert rotundum
esui aptum, vmbilico latio-
re: quod adstringit, feroque
maturefcit.

Lotus arbor. Cap. CLXXII.

Lotus arbor est vastę magni-
tudinis, ferēs baccā pipere ma-
iorē, dulcē, cibis grata, sto-
macho facilē. Aluū sistit baccis. Ra-
mētōrū ligni decoctū siue po-
tu, siue infusione dysentericis
ac foeminis fluxione vuluæ la-
borātibus, auxilio est: rufat ca-
pillōs, citam aluum cohibet.

Cornus.

φασὶ δὲ πνεῖς ὅτι καὶ σωε-
πὶς ἀρχαῖα μύκησιν, ἀελαβῆς
αὐτὴν γινέσθαι.

Περὶ Μεσπίλων. Κεφ. ρθ.

Μέσπιλον τὸ δένδρον, ὃ παρ'
ἐλλοῖς ἀρῶνία καλεῖται, ἀκανθῶ-
δες ὄντι, ὁμοῖον τοῖς φύλλοις πυ-
ξακάνθης, καρπὸν φέρον μικρὸν μύ-
κω ὁμοῖον ἡ δυν, ἔχοντα τρία ὁ-
σάκρια ἐνδοθέν, ἀφ' ὧν καὶ τέττα-
κον πνεῖς αὐτὸ ὀνομάζουσιν. βρα-
δέως πεπαιγμένον, εὐφραίνει δι-
ερωσμένον, εὐσώμαχόν τε ὄντι
καὶ κοιλίας στεγνωτικόν.

Περὶ ἑτέρου μεσπίλου.

Κεφ. ρσθ.

Μεσπίλη δὲ καὶ ἑτερεῖν ὄντι εἰ-
δος ἐν ἰταλίᾳ θηρώνωμενον. ὃ ἐπὶ
ἐπιμηλίδι καλοῦσιν. οἱ δὲ στα-
νὸν ὀνομάζουσιν. δένδρον ὄντι μύ-
κω ἑμπερές τοῖς φύλλοις ὅτι μι-
κρότερον. ἔχει δὲ καρπὸν καὶ τοῦτο
σπογγύλον, βρώσιμον, πλάτνυ-
χοντα τὸν πυθμῆνα, ὑποσύφον-
τα, πεπαιγμένον βραδέως.

Περὶ Λωτοῦ. Κεφ. ρσθ.

Λωτὸς τὸ δένδρον, φυτὸν ὄντι
εὐμύκηθες, καρπὸν δὲ φέρει μέγιστον
πεπέρως γλυκύν, βρώσιμον * εὐ-
σώμαχον, κοιλίας στεγνωτικόν. τῶν
δὲ περιμάρτων τῶ εὐλού τῶ ἀφ-
ήμα πινόμενον καὶ ἐκλυζόμενον,
βρωθεῖ δυσεντερικοῖς καὶ γυναιξὶ
ροϊκάς. ξανθίζει δὲ καὶ πείχας, καὶ
ἐπὶ χειρὶ γαστέρα ρεῖουσιν.

Περὶ

Περὶ κρανίας. Κεφ. ρογ'.

Κρανία δένδρον ὄντι ἀδρόν, καρπὸν φέρον ὡς ἐλαίας, ὀπιμύκη, χλωρὸν τὸ πρῶτον, πεπαιγμένον δὲ ξανδόν, ἢ κρησίδῃ, ἐδωδιμον, σύφοντα, ἀρμόζοντα πρὸς κοιλίας ῥύσιν καὶ δυσεντερίαις, στυπτικόν καὶ εἰς ἔλκεα, καὶ εἰς βρώσιν, καὶ ἀλυσέμεν ὡς ἐλαία. ὁ δὲ τῶν χλωρῶν φύλλον ἰχθὺς κατόμανον, ἀρμόζει πρὸς λευχίαις κατὰ χρομόνους.

Περὶ οὖων. Κεφ. ροδ'.

Οὖα τὰ μικρίζοντα καὶ μήπω πέπυρα, τρυφέντα καὶ ξηρανθέντα ἐν ἡλίῳ, σαλπικὴ γίνεται κοιλίας ἐδωδιμον, καὶ τὸ ἐξ αὐτῶν δὲ ἀφαιρεῖν ἀλεσθέντων ἀντὶ ἀφίπων λαμβανόμενον, καὶ τὸ ἀφέλκεα δὲ αὐτῶν πυνόμενον, τὸ αὐτὸ ποιεῖ.

Περὶ Κοκκιμυλίας. Κεφ. ροε'.

Κοκκιμυλία δένδρον ὄντι γρόμιον, οὗ ὁ καρπὸς ἐδωδιμος, κακοσμός, κοιλίας μαλακτικός. τῶν δὲ στυκτικῶν καὶ μάστιγα τῶν ἐν διαμαστικῷ ὕδατι μόνον ὁ καρπὸς ξηρανθείς, εὐστόμαχος καὶ κοιλίας σαλπικός. τὸ δ' ἀφέλκεα τῶν φύλλον ἐν οἴνῳ σκευαζόμενον καὶ ἀναρραγείνόν, κινίδι καὶ ἔλαι καὶ παίδωμα βουμπιζόμενα σέλιξι. τὰ αὐτὰ δὲ παρέρχει καὶ ὁ τῶν ἀγροκοκκιμύλων καρ-

Cornus. Cap. CLXXIII.

Cornus dura arbor est, baccas ferēs oliuæ modo oblongas, quæ primū virent, dein per maturitatē rubescunt, aut cere colore repræsentant. In cibo adstringūt, proflunio alui atq; dysenteria salutare, siue in edulto, siue in defruto exhibeātur. Muria, vt oliuæ, condiūtur. Sanies, quam virētia folia torrendo refudarunt, impetigini conuenienter illinitur.

Sorba. Cap. CLXXIII.

Sorba colore m luteum referentia prius, quàm maturefcent, dissecata & sole siccata manduntur, aut aluum sistunt. Eadem est functio molitorum farinae, si polentæ loco sumatur: quod & decoctum eorum in potu præstat.

Prunus. Cap. CLXXV.

Prunus arbor est nota, cuius pomum estur: sed stomachum male habet, aluum molit. Syriaca pruna, & præcipuè, quæ Damasci gignuntur, exiccata stomacho utilia sunt, aluum adstringunt. Folia pruni in vino decocta collutione, & gargarizatu vnam, gingivas, & tonsillas fluxione laboranteis repri-munt. Præstant idem syluestriū pruno

DIOSCORIDIS

prunorum baccæ, post maturitatem exiccata: cum sapa verò decoctæ, stomacho vtiliores redduntur, aluûmq; magis adstringunt. Gummi prunorû agglutinat, potû in vino calculos cõminuit: ex aceto quoq; illitum, lichenas infantîû sanat.

Arbutus. Cap. CLXXVI.

Arbut⁹ siue vnedo arbor est cotoneæ malo non dissimilis, tenui folio: cuius fructus pruni magnitudinem implet, nullo intus nucleo: huic menacylo cognomē est: maturus aut flauet, aut rubescit, in esu acerosus, stomacho aduersatur, capitisq; dolorem mouet.

Amygdalæ. Ca. CLXXVII.

Amygdalæ amaræ radicum tritarum decoctum vitia cutis in facie corrigit: illitæ nuces idē munus præstant, menses admotæ ciunt, capitis dolori auxiliatur, illitæ fronti aut temporibus cum aceto vel rosaceo: epinyctidas sanant ex vino, itē putrescentia vlcera, & quæ serpunt, & morsus canum cum melle: earum autem esu dolores finiuntur, aluum emolliunt, somnum faciunt, vrinam ciēt, cõtra sanguinis reiectiones cū amylo assumentur, renû vitiis, & pulmonû inflammationibus

καρπὸς, ἀπέτερες ξηρανθεὶς· ἐψηθεὶς δὲ μετὰ ἐψήματος, ευσμαχότερος ἐστὶν ἐπὶ τῆς κοιλίας γίνεται. τὸ δὲ κόμμι τῆς κοκκιμυλίας, ὅτῃ κολλητικὸν, λίθων θρίπτικόν πνύμενον σὺν οἴνῳ· σὺν ὅξει δὲ ἐπιχειρόμενον, λειχηνῶν τὰς ἐπὶ παιδίων διεσπύει.

Περὶ Κομάρεω. Κεφ. ροζ'.

Κόμαρες δένδρον ὅτῃ, παρὰ τοῖς κυδωνίαι, λεπτόφυλλον, καρπὸν ἔχον ὡς κοκκιμύλου μέγεθος, ἀπὸ ῥυμιον· μεμάκναι χαλαροῦ μένον· πεπαισγμένα δὲ ἐσπινκίρον ἢ ἐρυθρόν, ἐδιδόμενον ἀρχαῖοις, κακοστόμαχον δὲ καὶ κεφαλῆς.

Περὶ Ἀμυγδαλῆς. 15

Κεφ. ροζ'.

Ἀμυγδαλέας πικρὰς ἢ ῥιζὰς ἀψηλιδεύσας λεία, ἐφ' ἧς τὰς ἐν προσώπῳ ἀπυκαθαίρει καὶ αὐτὰ τὰ ἀμυγδαλὰ κατὰ πλάσσειντα, τὰ αὐτὰ ποιεῖ, προστιθέμενα ὅτῃ· γὰρ κατὰ μύδια, καὶ κεφαλῆς βλάπτει κατὰ πλάσσειντα μετώπῳ ἢ κροτάφοις μετ' ὅξους καὶ ῥοδίνης, καὶ περὶ ἐπιπυκνίσεως σὺν οἴνῳ· περὶ δὲ σπινθῆρας καὶ ἐρεπτιδας καὶ κυρτόδοντα, σὺν μέλιτι· ἐδιδόμενα δὲ ὅτῃ ἀνθρώπων κοιλίας μαλακτικὰ, ὑπνωτικὰ, οὖρον καὶ πρὸς αἵματος ἀναγωγὴν μετὰ αἰσίου· λαμβανόμενα περὶ νεφρετικῶν καὶ πεπτικῶν σὺν

ex

σὺν

συνὸν ὕδατι πινόμενα ἢ ἐκλειχρό-
 μωνα συνὸν ῥητίνῃ τρεβινθίνῃ· δύ-
 σουνεῖται δὲ καὶ λιθώσι, συνὸν γλυ-
 κεῖ βοηθεῖ, καὶ ἡπατικοῖς καὶ βηξὶ καὶ
 κώλου ἐμπνευματώδεσι, συνὸν μέ-
 λητι καὶ γαλακτικῇ ἐκλειχρόμενα, κα-
 ρύου πονηκοῦ τὸ μέγεθος· ἐστὶ δὲ
 καὶ ἀμείδωτα παροξυσμωδόμενα
 ὅσον ἐ. ἢ ζ'. κτείνει δὲ καὶ δρόπε-
 • κας βρωθέντι συνὸν πνι. τὸ δ' κόμ-
 μι αὐτῆς εἶσθαι καὶ διεμαίνει, καὶ
 10 βοηθεῖ πρὸς αἵματος ἀναγωγῇ
 πινόμενον· συνὸν ὅξει δὲ ἐπιχειρό-
 μενα, λειχρῶς ἐπιπολεῖς αἰ-
 ρει· ἰάται καὶ βῆχα χροῖον μετὰ
 κρόματος πεθύν, λιθώοντας δ' ὁ-
 φελεῖ συνὸν γλυκεῖ πινόμενον, ἢ δὲ
 15 γλυκεῖα καὶ ἐδάδιμος ἀμυγδα-
 λή, καταπολὺ ἡστων ὅτιν ὥς πρὸς
 ἐνεργείαν τῆς σπινθῆς. καὶ αὐτὴ
 δὲ λεπτωπικῇ, οὐρητικῇ, βρω-
 θέντα δὲ συνὸν τῷ λέπει τὰ ἀ-
 μύδαλα χροῖα, σωμαχρῶ πλά-
 20 θον ἀποκαθίστησι.

Πεὶ Πισακίων. Κεφ. ροθ'.

Πισακία τὰ μὲν γυνώμενα ἐν-
 σுவεία, ὁμοία σπορίλοις, ἐν σόμα-
 χῃ, ἐπὶ νόμω δὲ καὶ πινόμενα ἐν
 οἴνῳ λεία, ἐρπετοδύκτοις βοηθεῖ.

25 Πεὶ Καρύων βασιλικῶν.

Κεφ. ροθ'.

Κάρυα βασιλικῇ, ἃ ἐννοῖ περ-
 σικὰ καλοῦσιν, ἐπὶ νόμῳ, δύσπε-
 πτα, κακοσόμαχα, χροιοῖα,
 κεφαλαγῇ, βήουσιν ἐναρτία.
 καὶ
 καὶ

ex aqua in potu aut eclegma-
 te cū refina terebinthina dan-
 tur: calculosis difficilique; vrinæ
 in passio auxiliantur, & illinctu
 cum melle, & lacte hepaticis,
 tussi, & inflationibus coli, nu-
 cis auellanae magnitudine: qui-
 nis septenisve præsumptis ebie-
 tatē non sentiunt potiores: vul-
 pes si cum quadam efca eas
 vorauerint, emoriuntur. Gum-
 mi eius calfacit, & adstringit:
 reiciētibz sanguinē, potum
 auxilio est: impetigines quæ
 summū corpus occupant il-
 litum cū aceto tollit: tussi ve-
 tustæ cū diluto vino potū me-
 detur: calculosis cū passio bibe-
 re prodest. E nucibz græcis, dul-
 ces cibo idoneæ, sed multo mi-
 nus valēt in remediis, q̃ amaræ:
 attamen extenuant, vrinā ciunt,
 recetiū cum suo putamine, hu-
 mida stomachi vitia emédant.

Pistacia. Cap. CLXXVIII.

Pistacia, quæ cōstat in Syria gi-
 gni, pineis nucibus similia sunt,
 & stomacho amica: trita cū vi-
 no cōtra serpētium iētus pro-
 sunt, siue edantur, siue bibātur.

Nux iuglans. Ca. CLXXIX.

Nuces iuglades, quas nōnulli
 Perficas vocant, sunt difficiles
 cōcoctu, stomacho inutiles, bi-
 liosa, capitis dolore inferētes,
 i tussien-

DIOSCORIDIS

tusfientibus inimicæ, & vomituris ieiunis in cibo apte. Cum ruta verò & ficis præsumptæ, & à summo cibo, venenis resistunt: nec minus si à veneni hauflu comedantur: largius esitratæ tineas latas pellunt, illinuntur mammarum inflammationi, abscessibus, luxatiffique, cum mellis exiguo, & ruta: cum cepa autem, sale & melle, canis hominisque mortui proficiunt: tormina, cum calyce suo perustæ, & umbilico admotæ, sedant. Putamen combustum tritumque in oleo, & vino, infantium capite peruncto, nutrit capillum, alopecias replet. Siftunt menses nucleis vsti, si triti ex vino admoveantur: iidem è veteribus, illiti carbunculis, gangrenis, & agilopiis medentur: alopecias commanducati, & impositi præsentis sunt remedio. Nucibus tufis oleum exprimitur. Recentibus stomacho innocentiores sunt, vtpote suaviore: itaque allio mistæ eximunt acrimoniam. Liores in corpore illitu tollunt.

Nuces auellanæ.

Cap. CLXXX.

Nuces auellanæ, quas & leptocarya vocant, stomacho infestæ

χρήσιμα ὅτι βιβρωσάμενα πρὸς ἐμέτας τῆς ἐλπίδας ἀσέμων φαρμάκων ἐστὶν ἀντιφάρμακα, * πρὸς ἐρωθέντα καὶ ὀπιθερωθέντα, σὺν ἰσχύος καὶ πυκνῶν πλεονασμῶν βρωθέντα, πλατέαν ἕλκυντα ἐκπνέουσι, ἐπιπλάσσει δὲ καὶ μαρσὶς φλεγμαίνουσι, καὶ ὑποστήμασι καὶ σφύσμασι σὺν ὀλίγῳ μέλιτι καὶ πυκνῶν μὲν ὅτι κρομμύς καὶ ἄλλος καὶ μέλιτος, πρὸς κυνώδνητα καὶ ἀνδροπρόσθηκα ποιῇ πυρωθέντα ὅτι σὺν τῷ καλύφει, καὶ ἐπιτεθέντα τῷ ὀμφαλῷ, σφόδρα πύξι. τὸ δὲ λέπτυνον καὶ ἐν τειρωθέν ἐν οἴῳ καὶ ἡμῶν, παλαιοῖς ὀπιχρῖσθαι, καλλίτερον ὅστι, καὶ δὴ ὁ πεκίας διασώζει. καὶ ἐμμελῆ ἵσθαι τὸ ἐν τῷ αὐτῷ λέσθαι καὶ ἐν σὺν οἴῳ πρὸς ἐρωθέντων τῶν δὲ παλαιῶν χαρῶν τὰ ἐν τῷ καταπλαθέντα, γαγγραινας καὶ ἀνδρα καὶ ἐν αἰγίωπας καὶ ἀλωπεκίας μαρσινθέντα καὶ ὀπιτεθέντα ἰάται σιντόμω. * γίνεται δὲ καὶ ἐν λαίον ἐξ αὐτῶν κοπιωμένων, καὶ ἐκ δελφινῶν. τὰ δὲ χλωρὰ, ἢ ἥτον κακοσμάχα, γλυκύτερον ὄντα. διὸ καὶ τοῖς σοροδέοις μίγνυται πρὸς τὸ τῷ δειμύτητα πειλαρεῖν. αἶρει δὲ καὶ πλινύματα κατὰ πλαθέντα

Περὶ Καρύων πονητικῶν.

Κεφ. ρπ'.

Τὰ δὲ πονητικὰ ἄνθρωποι λεπτοτέρη καλὸν σπιν, ἐστὶ κακοσμάχα

χρῆ, καὶ αὐτὰ δὲ λεῖα συνὲ μελι-
κράτῳ πινόμενα, βίῃ καὶ παλαιᾷ
ἰσχύϊ φρενέτι δὲ ἐδιδόμμενα συνὲ
πεπύρεϊ ὀλίγῳ κατάρρουν πεπύ-
ρει· ὅλα δὲ καὶ πάντα λεῖα μετὰ ἀ-
3 ζουγγίου ἢ σέσατος ἀρκείου, ἀλω-
πέκας ἐπιχειρῶντα διασώζει.
Φασὶ δὲ ἔγνοι ὅτι μετὰ ἐλαίου τὰ
κελύφῃ κεκαυμένα καὶ λειοτε-
τεῖντα, γλαυκοφθάλων παι-
δῶν μελαίνει τὰς κόρας ἐπιβρε-
10 ροῦ τοῦ τοῦ βρέγματος.

Περὶ Μορέας. Κεφ. εἴς.

Μορέα ἡ συκαμνέα, δένδρον ἐ-
στὶ γυμνόν, ἥς ὁ καρπὸς λυγρὸς
κοιλίας, οὐδαρὸς, κακοσμάχος.
καὶ ὁ ἔξ* αὐτῆς δὲ γυλὸς τὰ αὐτὰ
15 δὲ ἐξ* ἐφωθεῖς ὃ ἐν χαλκώματι ἢ
ἡλιαθεῖς, συμπικνότερος γίνεσθαι.
γυλὸς δὲ αὐτῷ ὀλίγου μέλιτος,
ποιεῖ περὶ ρεύματα καὶ νομάς καὶ
παείδματα φλεγμαίνοντα. ὁπλίσ-
νε) δὲ καὶ ἡ διώμας αὐτῶ παρ-
20 μείσσης συμπικνέας ὁστῆς καὶ κηκί-
δος καὶ σμύρνης καὶ κρόκου* ἐπὶ δὲ καὶ
μυρίνης καρποῦ καὶ ἰείδος, καὶ λι-
θανωτῶ. τὰ δὲ ἄλλα μόρα ἐκ-
ρεῖ κοπέντα, ἀντὶ τοῦ τοῖς ὄφιοις
μύζνται, καὶ κοιλιακοῖς ὀνύχισιν. ὁ
25 τὸ ῥίζης ὃ φλοιὸς συνεφωθεῖς ὕδα-
τι καὶ ποθεῖς κοιλίαν λύει, καὶ πλά-
τειαν ἑλμυνδα ἐκτρέφασει, καὶ
τοῖς ἀκόνιτον πεπωκόσι βοηθεῖ. τὰ
ὃ φύλλα λεῖα συνὲ ἐλαίῳ κατα-
πλάθοντα, πνεύματα ἰσχύου,
ἐφῃ-

sta sunt: ipsa tamen trita, & in
aqua multa pota, tussi veteri
medentur: tosta & cum exiguo
piperis potę destillatione con-
coquunt, crematarū cinis cum
axungia aut adipe vrsi perun-
ctus alopecii capillum reddit.
Aiunt nonnulli vsta earū puta-
mina, & in cineris speciem re-
data, cum oleo, cæriorū octu-
lorū pupillas infantibus deni-
grare, perfuso sincipite.

Morus. Cap. CLXXXI.

Morus arbor nota est, cuius
fructus aluū soluit, stomacho
inutilis est, & facile corruptio-
nē sentit. Hoc idē præstat mo-
ri succus: decoctus autē areo
vase atque insolatus, ad strigen-
tior redditur. Facit ad fluxio-
nes, nomas, & tonsillarum in-
flāmationes, addito mellis exi-
guo. Sed inolefcit vis eius, adie-
cto scissili alumine, galla, cro-
co, & myrra: item myricæ ses-
mine, iri, & thure. Immatura
mori poma siccātur, tusaq; aci-
norū rhois vice obsoniis mi-
scētur, vt coeliacos iuuēt. Radi-
cis cortex decoctus in aqua &
potus aluum resoluit, latas ven-
tris tineas excutit, his quoque
auxiliatur qui aconitum hau-
serunt. Folia trita ex aceto il-
lita, ambustis igni medentur,

i ij tin.

DIOSCORIDIS

tinguntque capillū, vitiū & fici
nigræ frōdibus simul coctis in
aqua cœlesti. Succus foliorum
cyathi mēsurā potuscōtra pha-
langiorum morfus auxilio est.
Feruefacti corticis & foliorū
iure dentes aptissimè in dolo-
re colluuntur. Radix circiter
messēm incisa, factō in ambi-
tu scrobe, succum emittit, qui
postriedicē cōcretus inueniri so-
let. Is in dolore dentium effi-
cax est: tubercula discutit, &
aluum purgat.

Sycomorus. Ca. CLXXXII.

Sycomorū aliqui etiā sycami-
nū, id est, morū vocāt, cuius
fruct⁹ sycomorū etiā propter
inefficacem gustū appellatur.
Arbor est magna, fico similis,
frōdosa, multo lacte abūdāsfo-
lius mori, pomū ter aut quater
anno fert, nō ramis vt ficus, sed
caudice ipso, caprifico nō dif-
fimile, dulcius grosfis, sine gra-
nis interiorib⁹: quod nō matu-
rescit, nisi vngue aut ferro scal-
patur. Nascitur plurimū in Ca-
ria, Rhodo, locisq; nō multi tri-
tici feracibus: vbi prouētu fœ-
cundo restibiliq; iuuamentum
adfert, cū annonæ caritas pre-
mit. Pomum aluo vtile est, sed
per quā exilem præbet ali-
monia. Stomacho aduerfatur.

Succus

ἐκκρίνεται δὲ ἐν ὁμοείῳ ὕδατι,
ὡς ἀμπέλου καὶ συκῆς μελάν-
της φύλλοις, βλάπτει τείχεα. ὁ δὲ
χυλὸς τῶν φύλλων, φλογισθὴν-
τος ἀρήρει, ποθεῖς κυάθου πλη-
θους. Ἐφλοιοῦ δὲ καὶ τῶν φύλλων τὸ
ἀπόζημα, διάκλυμα ἐνδετόν
ἔστιν ὁδονδαλγίας. ὁ πίνεται δὲ
σπεί τῶν πυραμυτῶν τῶν ῥίζης πε-
ριουχθείσας καὶ ἐκκοπέσας, ἐν-
είσεται ὅτι τῇ ὑπεραίᾳ, ὁπίπα-
ρος τις ὅς περὶ τε ὁδονδαλγίας
ποιεῖ καὶ φύματα διαφορεῖ καὶ
κοιλίαν καθαίρει.

Περί Συκομόρου. Κεφ. ρπβ.

Συκομόρον, ἔστι καὶ τὸ το-
σούτων κέρας, καλεῖται δὲ
καὶ ὁ ἄνθρωπος αὐτῆς καρπὸς συκῆ-
15
μόρον, διὰ τὸ ἄγονον τῆς γέν-
σεως. Δένδρον δὲ ἔστι μέγα, ὅ-
μοιον τῇ συκῇ, πολύκομον σφό-
δρα, τοῖς φύλλοις ὅμοιος μορέα,
φέρει δὲ καρπὸν τοῖς καὶ τετρα-
20
κίς τοῦ ἔτους, οὐκ ἀπὸ τῶν ἀκρε-
μόνων ὥς ὅτι τῆς συκῆς, ἀπὸ δὲ
τοῦ στελέχους ὁμοιον ἐκτενέω. γλυ-
κύτερον ὁλωμένων, οὐκ ἔχοντα δὲ
κεγχραμίδας· μὴ δὲ πεπαιγμέ-
νον δῖχα τοῦ ἐπιχεινέωσαι ὀνυ-
3
χι ἢ σιδήρῳ. Φύεται δὲ πανταχοῦ
ἐν καίᾳ καὶ ῥόδῳ, καὶ ἐν τοῖς
οὐ πολυπύρεσι τόποις· βρονθεῖ δὲ
ἐν ταῖς σιτοδείαις, διὰ τὸ διλυε-
κὲς τῷ καρπῷ. ἔστι δὲ ευκοίλιος ὁ
καρπὸς, ἀγροφος, κακοσμάχος.
ὁ πίν-

ὁ πίπτει τὸ δένδρον τὸν καρ-
ποφόρησαι νεαρόν, τὸ φλοιὸν ἐξέπι-
πολὸς λίθω θλασθέν· βασιτέρεον
τὸ θλασθέν, οὐδὲν ἀνίστη. συλλέ-
γεται δὲ σπέρμα ἢ εἰς τὸ δέν-
δρον, καὶ ξηρανθέν ἐν ἀπαλλα-
σθέν ἐν ἀγρίῳ ὁσρανίῳ, ἀποπί-
πεται. Δουάμην δὲ ἔχει ὁ ὅπας
μαλακτικὴν, κολλητικὴν τραυ-
μάτων, διαφορικτικὴν τῶν δυσπε-
πτιῶν, πίνεται ἢ ἐν συγχέῃ πρὸς
10 ἔρπετων δύνματα, ἐκσπέρωμέ-
νοις σπλῆνας, σωμαχίου τὸ δὲ γή-
ματα, ἐν φελίῳ, ταχέως δὲ τε-
ξηροποιεῖται ὁ ὅπας.

Πεὶ Σύκου ἐν κύπερῳ.

Κεφ. ργ.

15 Γίνεται δὲ ἐν κύπερῳ εἰς
διαφέρειν, πτελέει τὸ οὔσα, συχα-
μίνω τὰ φύλλα εἰσὶν, τὸν δὲ καρ-
πὸν καὶ τὸ μέγεθος κοκκινύλον,
ἐν γλυκύτερον, τὰ δὲ ἄλλα πάντα
ἴμοια τοῖς περὶ ἐρημίοις.

20 Πεὶ Σύκων. Κεφ. ργδ'.

Σύκα πέπτερα τὰ ἀπαλά, χακο-
σόμαχα, κοιλίας λυπηρὰ, ῥαδίως
ἢ ἐξ αὐτῶν ψευματισμὸς ἵσταται.
ἐξ αὐτῶν καὶ τῶν ἰδρωτῶν περ-
κλήνῃ ἀδία ἢ ἐν σβεστικῇ περ-
25 μασίῃ. τὰ δὲ ξηρὰ τρισμα, τρι-
μασίῃ, διψικώτερα, ἐν κοιλίᾳ,
ἀδία τὰ ψευματισμὸς σωμαχίου
ἐν κοιλίᾳ βέλγῳ δὲ ἐν ἀπτερίᾳ
καὶ κύσει καὶ νεφρίῃ οὐδετα, ἐν
τοῖς ἐν μακρονοσίᾳ κακορροσίᾳ
ἐν

Succus primo vere tenera ar-
bore, anteq̃ fructū ferat, eximi
tur, lapidis īctu summo cortice
desquamato: si enim altiore
plaga violetur cortex, nihil ef-
fluet. Spōgia aut vellere lachry-
ma excipitur, quæ ficcata & in
pastillos coacta fictili vase re-
ponit̃. Vis succi emollit, vulne-
ra cōglutinat, discutit collectio-
nes cōctioni repugnātes, bibi-
tur etiā aut illinitur cōtra ser-
pentiū morsus, duratos lienes,
stomachi dolores & p̃frictio-
nes. Celerrimè teredinē sentit.

Ficus Cyprea.

Cap. CLXXXIII.

Gignitur & in Cypro arbor
genere distans, quæ cum sit vl-
mus, prædita tamē est foliis fy-
comori, fructu pruni magnitu-
dine, multo dulciore, supradic-
tis cætera similis.

Fici. Cap. CLXXXIII.

Fici maturæ recentes stomachum lædunt, aluū soluunt: sed
facile cōtracta ab eis fluxio fi-
stitur. sudorē euocant papulās-
que, sitim sedant, calorē restin-
guunt. Siccis natura exalfaci-
endi, vires alunt, sed sitim ma-
gis stimulant, aluo vtilis, rheu-
matismis ventris & stomachi
contraria: gutturi autem, arte-
ria, renibus, vesicæ, & iis quos
i iij longa

DIOSCORIDIS

lōga valetudo decolorauit, an-
helatoribus, hydropicis, comi-
tialibus aptissimā: feruefacta
cū hyssopo & pota, thoracem
purgat: tulsī veteri, diuturnisq;
pulmonū vitiis conueniunt, al-
uum molliunt tusa cū nitro &
cnico, dein manducata. Deco-
ctum arteriā & tonsillarū in-
flātionib⁹ gargarizatu pro-
dest. Cum hordeacea farina ca-
taplasmatis miscētur, & in mu-
liebres fots cum foenogracō
& ptisana. Ceterum cum ruta
coctę torminibus infundūtur.
Coctę illitęq; duritias discuti-
unt, parotidas & furunculos
emolliunt, panos ad matura-
tionem perducūt, maximē ni-
tro, iri aut calce addita. Crudę
si cū antedictis tundantur, ea-
dem efficiunt: cum malicorio,
pterygia purgant: cum atra-
mento futorio, deploratis fe-
rē tibiarum fluxionibus, & ca-
coethicis vlceribus medentur:
quin & cum vino decoctę ad-
dito absinthio & hordeacea fa-
rina, vtilissimē hydropicis illi-
nuntur. Cremata cum cera-
to fanant perniones, prurigi-
nes, sonitusq; si crudę teran-
tur, & sinapi liquorēq; aliquo
exceptę auribus instillantur.
Tā syluestris, quā satiuę fici
lacteus

καὶ ἀδριατικοῖς καὶ ἐπιληπτικοῖς
καὶ ὑδρωπικοῖς ἀναισθεῖται δὲ
καὶ τὰ ἐν θώρακι ἀπορροῖται· ἀφ-
μύζει δὲ καὶ παλαιὸς βήξι, καὶ
τοῖς πνεύμονα χρονοῖς πά-
θεισι, κοιλίαν τε μαλακαίει κο-
πέντα μετὰ νίτρου καὶ κρόκου ἐ-
πίσχυμα. τὸ δὲ ἀφελήμα ἀντῶν,
πῶς πρὸς ἀρτηρίαν καὶ παλινδρῶμα
φλεγμοναῖς, ἀφμύζει εἰς ἀναγρ-
γάεισμα, καὶ εἰς τὰς ὀμφί-
σεις δὲ μίγνυται, καὶ εἰς γυναι-
κείας πνεύας μετὰ τήλεως ἢ πιν-
σάνης. συν πηγάων δὲ ἀφελή-
μῶν, σφόδρῶν ὅσιν ἐγκυσμα κα-
ταπλαττομένη καὶ ἐφθὰ λεία,
διαφορεῖ σκληρείας, παραπίδας.
δοσολογίας μαλακαίει, φύλακα πε-
πάνην, καὶ μᾶλλον συν ἱερίδι ἢ
νίτρω ἢ ἀσβέσω. καὶ ὁμὰ ὅ κο-
πέντα συν οἷς εἴρηται, τὰ ἀν-
τὰ δρᾷ· συν σιδήρῳ δὲ ῥοιᾷς, πτε-
ρύγια ἀναισθεῖται· μετὰ χαλ-
κάνθου δὲ τὰ ἐν κήμαις ῥευμα-
τικὰ, δυσλαδίη καὶ κακοήθῃ ἰᾷται.
ἐπίσχυμα δὲ ἐν οἶνω καὶ μίγνυται
ἀντῶν καὶ κριθῶν καὶ ἀλευρῶν, ὑ-
δρωπικοῖς ὁφθαλμοῖς καταπλαττέν-
ται· κακῶν μῶν δὲ μίγνυται κη-
ρωτῇ, χυμέτλας ἰᾷται, λεία ὅ ὁ-
μα συν νάπτῳ ὑγρῶ ἀναισθεῖται
καὶ ἐντενέται ἐν ὕδατι, ἢ χυμῶ
καὶ κλισμοῖς δεσπύει. Ὁ δὲ ὁ-
πὸς τῆς ἀγρίας καὶ τῆς ἡμέρας συκῆς,
πικρῆς

πικτικός ἔστι γαλακτος ὥσπερ ἡ
 πτύα λυεῖ· καὶ τὸ πεπηγὸς ὥς
 περ τὸ ὄξος ἑλκτικὸς τῶν σωματικῶν
 καὶ ἀνατομικῶν κοιλίας τὸ λυ-
 πτικός, καὶ ὑστερὸς ἀναχαλαστι-
 5 κός, μετὰ ἀμυγδαλοῦ λεῖου πι-
 νούμενος, καὶ ἐμμελίων ἀγῶρος
 περσέεις συν ὄσῳ λευκῷ, ἢ
 κηρῷ τυρρηνικῷ· ποδαγρικοῖς τε
 καταπλάσματος χρῆσιμος με-
 10 τὰ πηλοῦ ἀλευρου καὶ ὕδατος·
 σιμῆχει δὲ λέπτες καὶ λεηγῶ-
 νας, ἐφελκεις, ἀλφουδς, ἴσους, ἀ-
 χῶρας συν ἀλφίτῳ· καὶ σκορ-
 ποπλήκτοις, κτ' τῆς πληγῆς ὅπ-
 τι ζόμυρος, καὶ ἰσθόλοις, καὶ κυνοδύ-
 κτις βοηθεῖ· καὶ ὀδονταλγίας ὅ-
 15 φηγεῖ εἰς ὧν ἀναλκιδεῖς, καὶ εἰς τὸ
 βρῶμα ἐπιπιδέμενος. καὶ μυρμη-
 κίαν αἶρει, σέαπι πᾶσι πλάσθης
 τῆς ἐν κύκλῳ σαρκός.

Περὶ Ἀγρίας συνκῆς. Κεφ. ρπέ.

Τὰ αὐτὰ δὲ καὶ ὁ χυλὸς ποιεῖ
 20 τῶν ἀπὸ τῆς ἀγρίας συνκῆς ἀπα-
 λῶν κλάδων, ἡνίκα αὐτὸν ἔγῃ οἱ ὄσι,
 μύπη τὸ ὀφθαλμοῦ βεβλασηκό-
 τος, κοπιόμενοι· καὶ ἐμβλίσον, καὶ ὁ
 χυλὸς ξηραίνόμενος ἐν σκιᾷ ἀπο-
 τίθεται λαμβάνεται δὲ καὶ εἰς ἕ-
 25 κωπικὸς δυνάμεις, τὸ ὅπως καὶ ὁ
 χυλός. αἱ δὲ κρᾶσαι βοείοις κρέα-
 σι καὶ ἐξομῶμαι ἐνέλητα πᾶσι
 πείσσι, καὶ τὸ γάλα δὲ λεπτικώτερον
 ἐν τῇ ἐξέσει κινεῖται, ἀντὶ τῆς
 σπῆς αὐτῆς παρὰ σκευάσει.

Περὶ Ὀλίω.

lacteus succus coaguli modo
 lac contrahit, cōcretumq; di-
 soluit, vt acetū: exulcerat cor-
 pora, meatus aperit, soluit al-
 uum, vulnā recludit cum detri-
 ta nuce grēca potus, menstrua
 ciet cum luteo· oui appositus,
 aut Tyrrhenica cera: podagri-
 corū cataplasmatīs cum farina
 foenigræci & aceto vtilis: le-
 pras, lichenas, vitilignes, vitia
 cutis in facie, psoras, vlcera in
 capite manantia, cum polenta
 expurgat. instillatus plage, per-
 cussis a scorpione, venenatorū
 ictibus & rabiosi canis mor-
 bus auxiliatur: prodest dētium
 dolori lana exceptus, & cauis
 corū additus: verrucarū infor-
 mationes tollit cū adipe, cir-
 cumlita in ambitu carne.

Ficus sylvestris. Ca. CLXXXV.

Hoc idem præstat succus è
 teneris ramis sylvestris fici, qui
 lacte prægnantes, silente adhuc
 oculo, tuli exprimuntur, & sic-
 catus in vmbra reponitur. Et
 lac & succus imponuntur ex-
 ulceratoriis medicamentis. De-
 cocti cum bubulis carnibus
 ramuli ficulni, faciem afferunt
 decoctionem. Lac efficiunt
 quod magis soluat, si inter co-
 quendum ficulneo furculo spa-
 thæ loco moueatur.

i iiij Grosi

Grosfi. Cap. CLXXXVI.

Grosfi, quæ erinei nonnullis vocantur, coctæ illitæ strumas nodosq; omneis emolliunt: crudæ formicas, verrucas & thymos, nitro farinâq; additis, tollunt. Folia eadem possunt, illita cum sale & aceto vlcera in capite manantia, epinyctidas, & furfures sanât: iis ficosæ ex-tuberationes, & genarum scabritia perfricantur. Nigræ ficus foliis cauliculisque candidæ vitilignes perunguntur, faciunt ad canum morsus, & vlcera quæ ceria, id est fauos, vocant. Grosfi cum sylvestris papaueris foliis ossa extrahunt, furunculos cum cera discutiant, cōtra muris aranei morsus, & scolopendræ venena, cum eruo & vino illitæ, auxiliantur.

Lixiuum ficus.

Cap. CLXXXVII.

Fit ex cinere ficæ tã sylvestris q̃ satiuæ lixiuū, crematis ramorū cauliculis: quod subinde macerari opus est & inueterascere, siquidē inter caustica intelligit. Gāgrenis pdest: nāq; expurgat & cōsumit, quæ excrescūt: eōq; sic vtendū est: Spongia afsidue hoc lixiuo imbuta superponitur. Interdum dyesentericis,

&

Περὶ Ὀλυνθίου. Κεφ. ρπς'.

Οἱ δὲ Ὀλυνθοί, ὡς δὲ πηγὴν ἔχοντες χαλκίμοι, ἐφθοῖ καὶ ἀπὸ αἰνῶν, πᾶσαν συστροφὴν καὶ χοιρεῖδας ἐκμαλᾶσθαι, ὁμοί δὲ μυρμηκίας καὶ θύμοις, συνήττωσι καὶ καταπλάθοντες καὶ ἀλεύρω ἀνέχονται, καὶ τὰ φύλλα δὲ τὰ αὐτὰ συνανταί, συνὲς δὲ καὶ ἀπὸ καταπλάθοντες, ἀχάρας, ἀπύρεα καὶ ἐπιπυκνίσεις ἰόντες παρὰ τὴν εἰσάγειν δὲ αὐτοῖς καὶ τὰ συνκώδη καὶ τραχέα τὰ βλεφαρῶν, καὶ λεύκα καὶ καταπλάθοντες τοῖς τὰ μελάνης συνκῶς φύλλοις ἢ τοῖς κλάδοις, ποιεῖ καὶ πρὸς τὰ κυνόδοντα σὺν μέλιτι, καὶ πρὸς τὰ κνέια. ἀνδρῶσι δὲ οἱ Ὀλυνθοί καὶ ὅσα, συνὲς μίκανος ἀχάρας φύλλοις, δὲ θηλάς τε συνὲς κηρὸς διδάξουσιν: συνὲς ὁρῶν δὲ καὶ οἶνον καταπλάθοντες, πρὸς μυρμηκίας δόγματα καὶ σκολοπενδρας ἀνέχουσιν.

Περὶ Κορίας τῆς συνκῆς.

Κεφ. ρπζ'.

Γίνεται δὲ καὶ κορία ἀχάρας συνκῆς καὶ ἡμέρας καίνων τὰ κλάδων ἐκ τῆς τέφρας πολύβορον δὲ αὐτῷ δὲ ποιεῖ καὶ παλαιὸν ἀρμύζην δὲ καὶ πρὸς τὰ χανθίκα, καὶ γὰρ τρανέμενα ἀνακαταίρει καὶ καὶ ἀνελίσσει τὰ πτελέα. καὶ ὅσα δὲ αὐτῇ δὲ ἀπὸ γόνου βρέχονται συνκῶς καὶ ἐπιπλάθοντες, ἐφ' ὧν δὲ καὶ ἐκλύζοντες ὡς ἐπὶ δυσεντερικῶν καὶ πρὸς

20

25

20

καὶ παλαιῶν ῥυμάτων, καὶ κόλ-
πων ὑποπόμων καὶ μεγάλων χα-
δαίρει γὰρ καὶ κολλᾷ καὶ σαρ-
κοῖ, καὶ συμφύει τοικίως τοῖς
ἐν αἵμοις, καὶ ποτίζεται δὲ παρὰ
5 αἵματος ἐκ τῶν ῥυμάτων καὶ πώ-
ματα, ῥήγματα, ἀσπίσματα,
συνὺδατος κυάθου παρὰ σφα-
τως διηλισμένη καὶ ἐλαίου μι-
γρῶτος ἐλίχου, κοιλιακοῖς τε καὶ
δυσεντερικοῖς, καὶ ἐκ τῶν
10 κυάθου παλῆδος βουδῆ διδόμε-
νη καὶ τοῖς νεφικοῖς δὲ καὶ ἀσπί-
σμασι, σύχρυστα ἀρμόδιον συν-
ελαίω, ἐξ ῥῶτας κινούσῃ, καὶ παρὰ
γύψου πύσιν καὶ φελαγγίων δι-
γρήματα πίνονται παρὰ χροσὶ δὲ τὰ
15 αὐτὰ καὶ αἱ λοιπαὶ κονίαι, μά-
λισα δὲ ἢ δρυῖν* συππικὰ δὲ ἐί-
σι πάντι.

Πρὶ Πρῶτας. Κεφ. ραή.

Πρῶτα δένδρεα ὅσιν ἐν αἵ-
γύπῳ, καρπὸν φέρειν ἐδωδύμον,
20 ἐκ τῶν μαχρῶν* ἐφ' οὗ καὶ τὰ λεγό-
μενα κρανοκόλαπτα φελαγγία
εὐείσκειται, μάλισα δὲ ἐν Θε-
βαΐδι. Διούαμιν δὲ ἔχει τὰ φύλ-
λα λεῖτα ἐκ πάλαιον ἐκ τῶν
αἰμορροῦσιν ἰσθῶν. τὸ τοιοῦτον δὲ ἰσθ-
25 ροῦσιν πινεῖ ἐν τοσούτοις, ἀναμετ-
κὸν εἶναι, μετατρέψαν δὲ εἰς αἵ-
γύπτον, ἀλλοιωθῆναι καὶ ἐδωδι-
μον γινέσθαι.

Πρὶ Ἰβερίας. Κεφ. ραθ'.

* Ἰβέρια ἡ τοὶ καρδαμαντικὴ ἔχει
τὰ

& in fluxiones vetustas, & sin-
cuniculatim exedētes, magnōf-
que, infillari cōueniet. Etenim
purgat, cōglutinat, carne replet
& oras cōmittit, nō secus atq;
emplastra q̄ cruētis vulneribus
iniiciunt, ξενema vocāt. Bibitur
ad discutiendū sanguinē cōcre-
tū, & cōtra præcipationes, ru-
pta, cōuulsa, cum cyatho aque
recenter colatum: addito olei
exiguo, celiacis dysentericis p̄
se cyathus dat^r prodest: neruo-
rū vitiis, cōuulsionibus com-
modē illinitur ex oleo, utpote
quod sudores moueat: aduer-
sus gypsi potum, & phalāgiorū
morlus bibi. Hæc eadē p̄stant
reliqua lixiuia, præsertim quer-
num: omnia tamē adstringunt.

Persea. Cap. CLXXXVIII.

Persea arbor est, in Ægy-
pto, fructum ferens cibo ido-
neum, stomacho vitilē: in quo
phalangia cranocolapta nomi-
ne inueniuntur, præsertim in
Thebaide. Arida folia in fari-
nam redacta, illitu sanguinis
eruptiones sistunt. Arborem
hanc prodiderūt aliqui in Per-
sida exitiosam esse, translatam-
que in Ægyptum, mutata na-
tura in cibos receptam.

Iberis. Cap. CLXXXIX.

Iberis siue cardamantica,
folia

DIOSCORIDIS LIB. I.

folia habet nasturtij, vere vi-
rentiora: caulem cubitalem,
aut minore: in incultis nasci-
tur, ætate lacteum florē pro-
mit, quo tempore efficacior
est. Radices duas nasturtio si-
miles habet, calfaciētes & ad-
urentes: ipsæ enim ischiadi-
cis cum falsa axungia empla-
stri modò viles, quaternis
horis alligatæ, vt dein
in balneas descēda-
tur, & postea o-
leo cum lana
locus per-
ungatur.

τὰ φύλλα παρόμοια καρδία-
μων, ἐν ἔασι ἐνθαλάσσια, μύ-
κος δὲ ὅσον πηχυαῖον ἡ ἑλαττον·
φύεται δὲ ἐν ἀλωερήτοις τό-
ποις, διέρεται δὲ γαλακτικὸν ἀν-
δρος περιβάλλει, καὶ τότε ὅττι δρασ-
τικώτερον. ἔχει δὲ δύο ρίζας πα-
ρομοίας καρδίαμων, θερμαντικὰς
καὶ χυμωτικὰς· αὐτὰι γὰρ ἀραδαὶ αἱ
ρίζαι περὶ ἰσχυαδικούς, συνὲς λί-
ποις υἱοῦ τεταειγχυμώρου, ὥς
ἐμπλαστῶδες γινέσθαι κατὰ πλά-
σμα μέχρις ὥστεν τετράγωνον, ἑ-
πτὰ ἐν βαλανείῳ ἐμβιβάζε-
σθαι, καὶ ἐλάω μετ' ἐλίου τοῖς
τόποις ὁπλίσσεται.

PRIMI LIBRI
FINIS.

Pedaniij

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΒΙ-
ΒΛΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ.

ΠΕΔΑ-

15