

DIOSCORIDIS

Herba in totum stomacho inimica, acris: vehementissimè aluum ciet, in cibo cocta. Coquitur propter acrimoniam cum pingui carne.

Beta. Cap. CXLIX.

Beta duorum generum est, è quibus nigra coquitur cum lentacula, ut ventrè fistat: quod magis radice eius prestatur. Cadida aluo utilis est. Vtraque tamen propter nitrosum humorem: quem habet in se, noxij succi est. Unde succus earum cum melle narium indit, caput purgat, aurium doloribus auxiliatur. Decoctum radices & foliorum, furfures len-desque; deterget, perniones fotu mitigat. Crudis foliis vitiligines, nitro antea perfrietas: alopeciarum inanitates, scapello prius exasperatas atque depascetia vlcera, illini prodest. Eruptionibus popularum, igni sacro, am-bustisque, cocta medetur.

Portulaca. Cap. CL.

Portulacæ vis adstringit: capitis doloribus, inflammationibus oculorum, ceterisque, cum po-lenta imponitur: ardoribus stomachi, sacro igni, vesicæ doloribus, auxilio est: commanducata, dentium stupores sedat: stomachi & intestinorum aestuationem, fluxionesque mulcet:

renes

ἄλλη δὲ ἡ πῖα, κακοσόμαχος, δει-
μῖα, κοιλίας λυπητικώτατι ἐφθὰ
βρωθεῖσα. συνέχουσι δὲ αὐτῇ ἐ-
νιοὶ διὰ τῶν δριμύτητα τὰ λεπ-
τὰ τῶν κριῶν.

Περὶ τεύτλων. Κεφ. ρμθ'. 5

Τεύτλων διττὸν ὄντι, ὃν τὸ μὲν
μέλαν σκληρώτερον κοιλίας σὺν
φακὶ ἐλπίδεν· καὶ μάλλον ἡ ρίζα.
τὸ δὲ λευκὸν ἐυκοίλιον. ἀμφοτέ-
ρα δὲ κακόνημα διὰ τὸ ἐν αὐ-
τοῖς νιβώδες. ὅθεν ὁ χυλὸς αὐτῶν 10
καταδέρει κεφαλὰ ῥινὶ ἐγγερόμε-
νος μὲν μέλιντος, καὶ ἀταλγίας ἀ-
φελεί. τὸ δὲ τῶν ριζῶν καὶ τῶν
φύλλων ἀφ' ἡμῶν, πτύρων καὶ κο-
νίσων σκλητικόν, καὶ χυμὸς τῆς
περιττικῆς καταπληροῦμενος. 15
μοῖς ὃ τοῖς φύλλοις καταπλάσ-
σιν δειῖ ἀλοῖς περιεκινηθεῖν
τας· καὶ ἀλωπεκίας κατακνηθεῖ-
σας, καὶ τὰ νεύματα ἔλκην. ἐφθὴ
ὃ ἐξαρθήματα καὶ πνεύματα καὶ
ἐρεσιπέματα ἰᾶται. 20

Περὶ ἀνδράχνης.

Κεφ. ρν'.

Ἀνδράχνη διώαμιν ἔχει συ-
πτικὴν· καταπλωσμένη δὲ μὲν
ἀφ' ἑπτὰ καὶ ὀκτὼ ἀλγήμεσι καὶ ἐ-
φθαρμένων φλεγμοναῖς καὶ ταῖς ἀλ- 25
λας· καὶ σιμάχου πυρῶσσι καὶ ἐ-
ρισπείλασι, καὶ κύστεως ἀλγίμα-
σι βρωθεῖ· βρωθεῖσα δὲ αἵμα-
διαν καὶ σιμάχου καὶ ἐπύρων
πύρωσιν καὶ φευματισμὸν περιττικῆς·
νεφρὲς τε

γεφροῖς τε δακρυόεις καὶ κύστιν
 ἐνδιαιτῆσι καὶ τὰς περὶ συ-
 οισίας ὁμὰς ἐκλύει· παρὰ πλε-
 σίας δὲ καὶ ὁ χυλὸς αὐτῆς ἐνερ-
 γεῖ πικροκύστις καὶ ἐν πυρετοῖς ποι-
 5 ὶν· καὶ περὶ ἐλμινθας σφογγύ-
 λας, αἵματός τε πύσιν καὶ δυσεν-
 τερίας, καὶ περὶ αἰμορροΐδας καὶ
 αἰμορραγίας, πελνέφους γινόμε-
 νη· καὶ περὶ σπινθὲς δάγματα, καὶ
 εἰς τὰ ὀφθαλμικὰ δὲ χροσίμως
 10 μύγνυται, ἐγκλυσμένα τε ὅτι ἐντέ-
 ρων βρευματιζομένων· ἢ * δαξομέ-
 νης μήτρας· καὶ περὶ τὰς ἐξ ἐγ-
 χαύσεως κεφαλῆς αἰματὶ σπινθί-
 νῳ ἢ ἐλαίῳ ἐμβρεγμα· περὶ τε
 τὰ ἐν κεφαλῇ ἐξανθήματα, σπιν-
 15 θῶν σπινθίμα περὶ τὰ αἵματα ὅ
 σπινθίζοντα, σπινθίτῳ κα-
 ταπλαστομένῳ.

* Περὶ Ἀνδράχνης ἀγρίας.

Κεφ. γα.

Ἀνδράχνη ἀγρία ἔχει αὕτη
 20 πλατύτερα φύλλα πρὸς τὰ ὀ-
 ἀνδράχνης καὶ δασέα φύλλα ἐν πε-
 τρώσει τόποις· ἔστιν ὅτε καὶ ἐν κή-
 ποις, φύλλα ἔχει ὅμοια ὕαια, μι-
 κρότερα δὲ πολλὰ, πελνέουα δὲ καὶ
 ἀπαλὰ, κυκλῖα ἐνυδρὰ, ἀπὸ μι-
 25 ας ῥίζης πολλὰ ἐπὶ γλῶ κεκλιμέ-
 να, μακροτέρη ὅ ὑψωμα καὶ γλί-
 σσα καὶ ὑψώματα· Διῶαμιν δὲ
 ἔχει θέρμαντικὴν, δριμύτην, ἔκω-
 πικὴν, χοιράδων διαφροτικὴν σὺν
 ἀξουγγίῳ καταπλαστομένη.

Περὶ

renes & vesicam adiuvat, etiā
 si erosionē sentiant: veneris im-
 petus exoluit: succus epotus si-
 mili effectu prodest, in febrīb⁹
 valēs. Contra teretes vētris ti-
 neas, cruentē excreationē, dy-
 senteria, hæmorrhidas, & pro-
 fluvia sanguinis, percocta effi-
 cax est. Item contra seps mor-
 fus. Ocularibus medicamentis
 vilissimè commiscetur, intera-
 neis fluxione laboratibus, at-
 que vulvarum erosionibus, in-
 funditur: contra dolores, quos
 æstus excitauit, caput ex rosa-
 ceo & oleo fouetur: eruption-
 es papularum in capite, cum
 vino emendat: vulneribus quæ
 ad syderationē spectant ex po-
 lenta illinitur.

Andrachne sylvestris.

Cap. CLI.

Andrachne Sylvestris parvis
 est foliis & latiorib⁹ q̃ portula-
 ce hirsutis. Nascitur i petrosis,
 est qñ & in hortis, folia oleæ,
 sed minora multo. Verū plu-
 ra, tenuioraq; cauliculis rubri-
 catibus ab radice vna frequēti
 b⁹, inclinātib⁹ in terrā. Hi māfi
 in succū facile solui^t tenacē li-
 quore cū quodā salis gustu. Fa-
 cultas eius calfacere acré vim
 obtinēs, & exulcerās strumis il-
 linitur cū axungia vt discutiatur.
 Aspa-

DIOSCORIDIS

Asparagi. Cap. CLII.

Corruda siue syluestris asparagus vulgaris est notitiæ. Huius cauliculi in cibo cocti ventrē emolliunt, urinā cient. Radicis decoctū contra vrinę difficultatē, regium morbū, renū vitia, & coxendiciū cruciatus, in potu proficit: cū vino autē, phalāgiorum moribibus auxiliatur. Si decoctū succus super dente cōtineatur, eius dolori medetur. Semen potū ad eadē valet. Canes, vt aiunt, si decoctū bibāt, emoriuntur. Asparagū etiā nasci prodiderūt, arietis cornibus contulis, atque defossis: quod, quātum equidē sentio, planē à veritate abhorret. Attilis autē asparag⁹ multis ramis fruticat, foliis fœniculi, lōgis, numerosis: radice rotūda, grandi, spongiā habente. Huius teneri cauliculi triti in vino albo, renū dolores sedant. Aflus autē coctusve, vrinę stillicidiū, difficultatēq; ac dysenterias, mitigat. Radix cum vino aut aceto cocta, luxatos art⁹ mulcet. Decocta cū ficis aut ciceribus sumpta, regiū morbū sanat: coxendicis cruciatus strāguriāmque leuat. Alligata radix, aut haustū eius decoctū, conceptum adimit, & sterilitatem adfert.

Plan-

Περὶ ἀσπάραγου. Κεφ. ςνβ.

Ἀσπὰραγος πετραῖος ἢ μυρ-
καιῶν γένος, οὗ τὸ χαυλίον ἐ-
κινδύνει, καὶ βρωτὸν, κοιλίαν μελάσ-
σει καὶ οὐρὰ κινεῖ. τῶν δὲ ῥιζῶν τὸ
ἀφελήμα πινόμενον βοηθεῖ δι-
5 σουρεσίῃ, ἰκτερικαῖς, νεφρικαῖς,
ἰσχυδαῖς. φθαλαγμοδύκτοις δὲ
μετ' οἴνου ἀφελόμενον. καὶ ὁδον-
ταλγοῦσι δὲ κρατουμένῃ τὸ ἀφελή-
ματος ἐπὶ τῷ πονοῦντι ὁδον-
10 τῇ. πικρὴ δὲ πρὸς τὰ αὐτὰ καὶ
τὸ σπέρμα πινόμενον. φασὶ δὲ καὶ
τοὺς κύνας πόοντας τὸ ἀφελή-
μα αὐτῶν ἀποθνήσκειν. ἔνιοι δὲ
ἰσχυρισαν ὅτι ἐὰν τις χριεὺς κέ-
τα συγκόλλας κατορύξῃ, φέρεται
ἀσπὰραγος. ἐμοὶ δὲ ἀπίθανον.
15 Ο μύρτοι ἀσπὰραγος οὗτος,
δάμνος ὅτι πολὺ κλάδους, φύλ-
λα ἔχων πολλὰ, μακρὰ, ὁμοία
μαραθῶν. ῥίζα στρογγύλη μεγά-
λη, ἔχουσα κόνδυλον. οὗ πινος τὸ
χαυλίον λεομήνον μετὰ οἴνου
20 λευκοῦ, παύει φρενίτιδας. ἐφθός
δὲ ἢ ὁππὸς λαμβανόμενος, παύει
σφαγγοεῖας καὶ δυσουείας, καὶ
δυσεντερίδας. ἢ δὲ ῥίζα αὐτῆς ἐλ-
θείσα ἐν ὕδατι ἢ οἴνῳ, παύει σφέ-
ματι. ἐφθὴ δὲ μετὰ σύκων καὶ
25 ἐρεβίνθων λαμβανόμενῃ, ἰσχυ-
κτεσιν. καὶ παύει ἰσχυδα καὶ
σφαγγοεῖαν. πρεσβυτέρῃ δὲ καὶ
τὸ ἀπόζημα αὐτῆς πινόμενον, παύει
ἀτόκον καὶ ἄγονον.

Περὶ Ἀργε-

Περὶ Ἀργυρώσου. Κεφ. ςγγ.

Ἀργυρώσου διπλὸν ἔστι τὸ ῥιζὶ
μικρόν· τὸ δὲ μείζον ἔχει ὃ τὸ ῥι
μικρὸν φύλλα στενότερα καὶ μι
κρότερα, καὶ μαλακώτερα καὶ
λειότερα καὶ λεπτότερα· καυλίω
δὲ ῥωνιοὶ δὲ καυλίω αὖς ἐπὶ
τῷ ῥιζί, αὖθις ὡς αὖ· τὸ δὲ σπέρ
μα ἐπ' ἄκρων τῶν καυλίων. Τὸ ὃ
μείζον ἐυνέστερον, πλατύφυλλον,
λαχανώδες· καυλὸς δὲ ἐπὶ τοῦ τε
ῥωνιόδους, σπυρίδος, ὕψος πήχε
ως, ἐκ μέσου μέχρι κορυφῆς σπέρ
ματι πεπεσμένος λεπτός· ῥίζαι
δὲ ὑπείσιν ἀπαλαί, διασπείσαι, λευ
καί, πάχος δακτύλου· ῥιζὸν αὖ
ὃ πρὸς τοῖς τέλεισι καὶ φρασίμοις
καὶ ἐν ἰσχυροῖς τόποις· ἐυχερότερον
δὲ τὸ μείζον. Διῶαμιν δὲ ἔχει
τὰ φύλλα ξηραντικὴν, συπτικὴν·
ἔστιν καὶ χαταπλάσσειν αὖ πρὸς
πάντα τὰ κακοῖσι καὶ ἔμφαντι ὄν
τα ῥευματικὰ καὶ ἀκαθάρτα ἔχει
ἀρμόζι· ἔχει ὃ καὶ αἰμορροΐαν, νο
μῶς, ἀνδραγας, ἔρπητας, ὀπνηκ
τίδας ἀπουκοῖ καὶ ἔλκη χροῖα καὶ
ἀνώματα, καὶ τὰ χειρῶν ἰά
ται, καὶ κόλποις παροκκολλᾷ· καὶ τὰ
κυνόδικτα καὶ πνεύματα φλε
γμοναί, παρωτίδας, φύγεθλα,
χοιρῶδας δὲ καὶ ἀγίλωπα συν
ἄλσιν ὀπιπλάσσειν αὖ φελεί. ἔ
φθον δὲ τὸ λάχανον μεθ' ἄλσιν
καὶ ὄξοις λαμβανόμενον, δυσεν
τερικοῖς καὶ κοιλιακοῖς ἀρμόζει.

δίδο-

Plantago. Cap. CLIII.

Duo plantaginis genera: mi
nor folia habet angustiora, mi
nora, molliora, lauiora, & te
nuiora: cauliculo anguloso in
terram inclinato: floribus pal
lidis: semine summis caulibus
emicante. Altera maior, latior,
virentiorque, latis constans fo
liis, oleracei generis: cuius cau
lis cubiti altitudinem petit, an
gulofus, subruber, à medio ad
verticem tenui semine circun
datus: radicibus nititur tene
ris, hirsutis, candidis, digitum
crassitudine æquantibus. Na
scitur in lacunosis, sepibus, &
locis humidis. Multò vtilior ma
gna est. Vim habent folia exic
catoriâ, constringentem: quare
omnib⁹ malignis vlceribus, &
fluxioni opportunis atque ele
phanticis, fordidiſq; illita pro
sunt: profluvia sanguinis, vlcera
quæ serpunt, epinyctidas, car
bunculos, nomâsque cohibet:
vetera vlcera & inæqualia ci
catrice obducunt, chironia fa
nant, sinus conglutinant: mor
sibus canis, ambustis igni, inflâ
mationibus, panis, parotidibus,
strumis, ægilopiis, illita cum fa
le profunt. Coctum cum ace
to & fale olus, dysentericis, cœ
liacisq; sumptum subuenit.

Datur

DIOSCORIDIS

Datur & in locum betæ cum lenticula coctum. Et ad aquam inter cutē cui leucophlegmatia nomen est, datur & herba decocta post aridas epulas, sic ut media antecedit: comitialibus & suspiriosis data proficit. Foliorum succus, colluta subinde oris ulcera, purgat: cum cimolia aut cerusa igni sacro medetur: fistulis infusus prodest, lippitudinibus & aurium doloribus idem succus instillatur. Additur quoque in oculorum collyria. Gingivis cruore suffusis, & sanguinis reiectionibus, potu confert: clystere dysentericis infunditur, contra tabem datur in potu, aduersus strangulationes vuluæ in vellere subiicitur, etiam si vulua fluxione laboret. Semen ex vino potum, alui fluxiones & sanguinis excretaiones sistit. Decocta radix & manducatu, & collutione, dentium dolores sedat: eadē cum foliis, ulceribus renum & vesicæ in passio datur. Ferunt treis radices cum tribus vini cyathis, & pari aquæ modo, tertianis auxiliari: & quatuor, quartanis. Sunt qui radices gestamine, discutiendis strumis vantantur.

Lauer seu

δίδεται δὲ καὶ μετὰ φακῆς ἀντὶ στυγλῶν συνεφόμενον, καὶ πρὸς λευκοφλεγματῶν μετὰ τὸ ξηροφαγεῖν, μέση δίδεται ἢ πρὸ ἐφθῆ. ποιεῖ δὲ καὶ ἐπιπλητικοῖς, καὶ ἀσθματικοῖς διδόμενῃ. ὁ δὲ χυλὸς τῶν φύλλων, τὰ ἐν σῶματι ἔλκην ἀνακαταίρει συνεχρῶς διακλυζόμενος. (ὡς δὲ κιμωλία ἢ ψιμμιδίον, ἔσται τὰ ἐν εὐσπύλατα· σύειγρὰς τε ἔγκλυζόμενος ὠφελεῖ, καὶ πρὸς ὀνταλγίας καὶ ὀφθαλμίας ἐσταζόμενος ὁ χυλός. καὶ κολληθείς μισρομέρος, καὶ πρὸς οὖλα αἵματος ὀνταλγίας, καὶ πρὸς αἷμα ἀνέχοντας πονόμενος· καὶ πρὸς δυσεντερικούς ἐγκλυζόμενος, πίνεται) δὲ καὶ πρὸς φθίσιν καὶ πρὸς ὑστερίκας πνίγας πρὸς ἴσθμιν ἐν εἰρή, καὶ ὑτέρῃ ρευματιζόμενῃ. καὶ ὁ καρπὸς δὲ πονόμενος μετ' οἴνου, τὸς τῆς κοιλίας ρευματισμούς καὶ πνύσεις αἵματος ἐπεχει. ἢ δὲ ῥίζα ἀφεψηθεῖσα καὶ διακλυζόμενῃ καὶ διαμασσωμένῃ, ὀνταλγίας παύει· πρὸς δὲ τὰ ἐν κύσει ἔλκην καὶ νεφροῖς δίδεται ἢ ῥίζα καὶ τὰ φύλλα μετ' ὀνταλγίας. φασι δὲ ῥίζας τρεῖς ποδῶν σὺν οἴνῳ κωάδων τελεῶν καὶ ὕδατος ἴσου, τεταύρω βορθεῖν. τεταύρω δὲ τέσσαρας ῥίζας. ἐνιοὶ δὲ καὶ ἐν δέσματι χερσὶν τῇ ῥίζῃ πρὸς χειρᾶδας καὶ διαφορεῦσιν.

Παρεὶ Σίγας

Περὶ Σίῳ. Κεφ. ρηδ'.

Laur seu fium.

Σίον τὸ ἐν ὕδασι οὐρείσκειται

Cap. CLIII.

ἐν τοῖς ὕδασι θαμνίον ὄρθον, λι-
παρὲν, φύλλα ἔχον πλατέα ἰπ-
ποκρίνῳ ὅμοια, μικρότερα δὲ
καὶ ἀρώματιζοντα. ἅψ' ἐδίομε-
να ἐφ' ἑαυτὰ τε καὶ ἐν λίθοις θρύ-
πτει καὶ ἐκκρίνει· οὐρά τε κινεῖ,
καὶ ἔμβρυα καὶ ἔμβρυα ἄγει, δι-
σεντετικοῖς τε χηρίσμα βρωθέν-
τα. Κρατέως δὲ ἰσορεῖ πρὸς αὐ-
τοῦ οὐ πῶ· πῶα θαμνοειδὲς ὀλί-
γη ἔχουσα φύλλα περὶ φερῶν μεί-
ζονα ἡ δὲ ὀσμὴ, μέλαινα, παρυγ-
γύζοντα ἐν ζώμῳ.

Sion in aquis inuenitur, fru-
tice pingui, recta, foliis latis, o-
lufatro similibus, sed minorib-
us, & odoratis. Quæ cruda co-
ctaque esu, calculos rumpunt,
atque excernunt: vrinas cient,
menses & partus extrahunt, dy-
sentericis in cibo auxiliatur.
De fío Crateuas tradit, herbâ
esse fruticis specie, pauca folia
ferentē, rotūda, maiora quàm
menthæ, nigra, & ad erucam
accedentia.

Περὶ Σισυμβείου. Κεφ. ρνέ.

Sisymbrium. Cap. CLV.

Σισύμβειον (οἱ δὲ ἔρπυλλον

Sisymbrium (alij serpillum

15 ἄγριον καλεῖσιν) ἐν χέρσις φύει,
ἔοικε δ' ἡ δὲ ὀσμὴ κινπαύῳ, πλατυ-
φυλλότερον δὲ καὶ ἐν ὠδὲ σερρον, σε-
φανοματικόν. Δυνάμει δὲ ἔχει
θρῆμα πικρὸν ἀφ' ὁμοῦ δ' ὡς πρὸς σραγ-
γυεῖας καὶ λιθιάσεις. τὸ πρῶμα
20 αὐτὸ οἶνον πινόμενον· καὶ σρόφας καὶ
λυγμοὺς παύει. τὰ δὲ φύλλα ἐπι-
πλάσσει· πρὸς κεφαλῆς ἰσάν· ἵπ-
π' κροτάφον καὶ πρὸς τὰ πρὸς πρὸς
τε σπικῶν πηλῆας καὶ μελιτῶν.
ἴσησι δὲ καὶ ἑμῆτοις ποθέν.

Sisymbrium vocant) in solo in-
culto nascitur, menthæ hor-
tensis similitudine, odoratis,
latiore folio. Inferitur coronis.
Calfaciendi vim habet: con-
tra stillicidia vrinæ, calculos-
que, semen ex vino bibitur, tor-
mina & singultus sedat. Folia
in capitis dolore, fronti aut tē-
poribus illinuntur: item con-
tra vesparum apiūmque ictus.
Vomitiones potu cohibet.

Περὶ Ετέρου σισυμβείου.

Alterum Sisymbrium.

Κεφ. ρνς.

Cap. CLVI.

Σισύμβειον ἑτερον, οἱ δὲ, καρ-
δαμνίον, οἱ δὲ, καὶ τοῦτο σίον
καλεῖσιν. ἔνδρὸς ὅτι πῶα, κα-
τὰ τὰ αὐτὰ τῷ σίῳ ὅμοιον.

Alterū sisymbrij genus, quod
alij cardaminā, alij fion appel-
lant. Ea herba riguis gaudet, &
eisdē in locis, quibus fion pro-
p uenit:

DIOSCORIDIS

uenit: quæ ided nonnullis cardamina nominatur, quod gustu cardamum, id est nasturtiū, representet. Folia primum rotunda prodeunt, adulta erucæ modo finduntur. Id excalfacit, vrinæ mouet, crudū estur, purgat lentigines, cutisq; vitia in facie, noctibus impositū, matutinisque detractum.

Crithmum. Cap. CLVII.

Crithmum, seu potius, vt alii, crithamon, fruticosa & vndique foliosa herbula est, cubiti altitudinem ferè petès. Nascitur in maritimis, & petrosis: foliis pinguibus, numerosis, albicantibus, veluti portulacæ, latioribus, & longioribus, salso gustu, flores candidi sunt, & semen, ceu rorimarini, odoratum, molle, rotundum, quod siccatum rumpitur: habet intus tritici modo nucleum: radices digiti crassitudine, tres aut quatuor, grati odoris & iucundi. Radix, semen, & folia incocta vino, potu vrinæ difficultati & regio morbo auxiliantur: mentes cient, estur crudum coctūve in olere, seruatur etiam in muria.

Coronopus. Cap. CLVIII.

Coronopus oblonga herbula est, per

καρδαμίνην δ' ἐνίοι λέγουσι, διὰ τὸ εἰκέναι καρδάμω τὴν γεύσιν. φύλλα ἔχει τὸ ῥῆμα πρῶτον περὶ φερῆν, ἀνδρομήμα δ' ἐξί-
ζεται ὡς τὸ τοῦ εὐζώμου. ἐστὶ δὲ θερμαντικόν, οὐρητικόν, βιβρώσκειται δὲ καὶ ὁ μὲν, ὅπου καὶ παύσει ὁ καὶ φακοῖς, καὶ ἔφην κατὰ πλά-
θέντα δι' ὅλης τῆς νυκτὸς, ἔωθεν δὲ ἀποκλυδέν.

Περὶ Κεῖθμον. Κεφ. ρνζ'.

Κεῖθμον οἱ δὲ κρίταμον, θα-
μνῶδες ὅστι βοτάνιον, ἀμφιφύεις, ἀπὲ πῆχυν τὸ ὕψος. φύλλων ἐν περὶ ὥδεσι καὶ παρὰ θαλάσσις τόποις, φύλλοις ἀπὸ πλεονεπιτοῖς καὶ ὑπολευκοῖς, τοῖς τῆς ἀνδρά-
γης παρειακοῖς, πλατυτέροις ῥῆμα 19
τοῖ καὶ ἐπιμνησέρεσι, ἀλμυέ-
ζοισι δὲ πρὸς τὴν γεύσιν, ἀνδρὶ λευκῷ, τὸν δὲ καρπὸν ὡς πρὸς λιβα-
νωτίδος μαλακόν, ἐν ὥδῃ, στρογύλον, ὅς ἐστιν αἰεὶ δίσσεται καὶ ἐν ὥδῃ ὡς πυρρὸν ἔχει τὸ σπέρμα. 20
ρίζας δὲ δακτύλους τὸ πάχος, τρεῖς ἢ τέσσαρες, ἐν ὥδεσι, ἢ δέαις, δύναται δὲ ὁ καρπὸς καὶ ρίζα καὶ τὰ φύλλα ἐναφελμθέντα οἶνω καὶ σπινομῆμα, βουδένῃ διουσιενύσι καὶ ἰκτερικοῖς· κινεῖ καὶ ἡ κατὰ μὲν- 25
νια, λαχανεύεται ἐφ' ὅσον τε καὶ ὁ μὲν ἐδιδόμῃον, καὶ ταιριεύεται ἐν δῆμῳ.

Περὶ Κορωνόπουδος. Κεφ. ρνγ'.

Κορωνόπους πρόμνηκος βοτάνιον
κτ' 27

ἡ δὲ ῥίζα ἐστὶν ἰσχυρὰ καὶ πικρὰ
μαρτυροῦν τὰ φύλλα ἀλγυρὰ ἐν-
ταῖς καὶ τὸ τοῦ φθόνου ῥίζαν λεπτὴν
ἔχει, συπληρὴν, ἐπιπληρὴν πρὸς
κοιλιακοὺς πρὸς τὴν γένεσιν δὲ ἐν
5 χέρσιν τοῖς καὶ ἐν δάμασι καὶ
ἐν ταῖς ὁδοῖς.

Περὶ Σόγχου. Κεφ. ρηθ'.

Σόγχου δύο εἶδη· τὸ μὲν, γὰρ
ἔστι ἀγριοῦ ἔσπερον καὶ ἀκροῦ δὲ
σερῶν· τὸ δὲ, περὶ φερώσεων καὶ
10 ἐν δάμασι, χαλκὸς δὲ ὡς ἰσχυρὸς
ἐνίοτε καὶ ὑπερβολὸς φύλλα ἔχει
ἐν διασημάτων ἐρσιμὴν πλὴν
πρὸς ἐξέλιαν. δυνάμεις δὲ αὐτῶν
ἔστι συπληρὴ, μετρίως ὑπερ-
φουσι· ὅθεν σωματικὰ καὶ σωματι-
35 νων, καὶ φλεγμονῶν, καὶ ταπλάσ-
μῶν ἀρμόζουσιν. ὁ δὲ χυλὸς κα-
ταρροφικὸς, διηκτικὸς σωμα-
τικῶν καὶ ταπλάσμων, καὶ γὰρ κα-
τασπύει πρὸς ἐξέλιαν δὲ ἐν εἰρήνῃ,
δυσπληρὴ καὶ μὲν φλεγμο-
20 ναὶς βρογχίτι. ἡ δὲ πῶς καὶ ἡ ῥίζα
καταπλάσσει σκορπιόπληκτοις
ἀρήγει. ὁ δὲ ἔτερος σόγχος ὁ
καὶ περὶ φερώσεων, ἐν δάμασι ἔστι, καὶ
πλάτυφυλλος· τὰ δὲ φύλλα διε-
λε τὸν χυλὸν καὶ οὗτος δὲ τὰ
25 αὐτὰ ποιεί.

Περὶ Σέρως. Κεφ. ρξ'.

Σέρως διόσφιδος ἢ μὲν ἀγρία, π-
κρὴς ἢ καὶ καλὴ καὶ καλουμένη ἢ
δὲ πρὸς καὶ πλατυφυλλότερα,
καὶ ἐν σωματικῶν τῶν κνηστικῶν.
καὶ τῶν

est, per terram repens, filsis
folliis: coquitur in olerē: ra-
dicem habet tenuem, adstrin-
gentem, quæ in cibo coelia-
cis facit. Prouenit in aggeri-
bus, & locis incultis, & se-
cus vias.

Sonchus. Cap. CLIX.

Sonchi duo genera: sylue-
strior quidā est, & magis spinis
horret: alter teneritate quadā
mollescit, cibis expetitus, angu-
loso caule, inani, interdū rubē-
te: foliis in ambitu per interval-
la dissectis. Vtriusq; vis refrige-
rat, modicē adstringit: vnde æ-
stuantī stomacho & inflāma-
tionibus illiti profunt. Succus
eorū stomachi rofiones sorbi-
tione mitigat, lac elicit, in vel-
lere appositus sedis ac vuluæ
collectionibus opitulatur. Tā
herba quā radix illita vibratis à
scorpione ictibus subuenit. Al-
ter sonchus tenerior, arboris
instar, latis cōstans foliis: caule
in ramos exeunte folia distin-
guunt: sed ad eadem pollet.

Seris siue intybus.

Cap. CLX.

Seris duum generum est: al-
tera sylvestris, quæ picris & ci-
chorion vocatur: altera sativa,
latioribus foliis constat, sto-
macho quàm hortensis utilior.

p ij Quæ

DIOSCORIDIS

Quæ iterum in duas species di-
geritur: vna folio latiore pro-
dit, lactucarum simillima: alte-
ra angustiore est folio, & gu-
stu amara. Vtraque refrigerat,
& adstringit, stomacho vtilissi-
ma: aluû sistit cocta, si cum ace-
to adsumatur. Syluestres sto-
macho meliores: quandoqui-
dem æstuantem ipsum, & quæ
imbecillitas vexet, cibo leniû.
Cardiacis per se, aut cum po-
lenta, vtiliter illinuntur: poda-
gris, & oculorû inflammationi-
bus auxilio sunt. Herba cum
radice illita, percussis à scor-
pione subuenit, igni sacro cû
polenta medetur. Succus cum
cerusa, & aceto, valet ad illi-
tus eorum, quæ refrigeratione-
nem desiderant.

Chondrilla. Cap. C L X I.

Chondrilla, quâ aliqui cicho-
rion, alij serin appellant, caulê,
flores, & folia habet cichorio
similia: qua ex causa nonnulli syl-
vestris intubi speciê esse pñu-
tiarût, verûm tenuior tota est:
in cuius ramulis, gûmi masti-
ches simillimû tuberculo fabæ
inueniri solet: quod cû myrrha
tritû & linteo appositû, instar
oliæ, foeminarum menses tra-
hit. Tusa cum radicibus herba,
adiecto melle, diuiditur in pa-
stillos,

καὶ ταύτης δὲ διττὸν εἶδος ἢ
μὴ γὰρ τις ἔστι θριδακαθεσέρεα
καὶ πηλὰ φύλλος ἢ δὲ στερόφυλ-
λος καὶ ἔμψικρος. * πᾶσαι δὲ
συνπικαί, συκπικαί καὶ εὐτόμα-
χοι. ἰσᾶσι δὲ καὶ κοιλίαν ἐφθαί, 5
μετ' ὅροις λαμβανόμεναι. καὶ
μάστιχα αἱ ἀγλαί εὐτομαχό-
τεραι. βρωθεῖσαι γὰρ ἀπνοου-
τα σωμαχὸν παρηγοροῦσι καὶ χαυ-
σόμενον. καταπλαστέμεναι δὲ
συνὸ ἀλφίτῳ καὶ καδ' ἐαυταῖς 10
καρδιακοῖς εἰσι χρήσιμοι. ποδά-
γρας καὶ ἐφθαλμῶν φλεγμο-
ναῖς βρογχίτιον. ἢ δὲ πᾶσα καὶ ἡ ῥί-
ζα καταπλασθεῖσα, σκορπιονή-
κταις ἀγρήει. καὶ ἐρισπύλατα
συνὸ ἀλφίτῳ ἰᾶται. συνὸ ψιμ- 15
μίδιῳ δὲ καὶ ὅξει ἔστιν ὁ χυλὸς
αὐτῶν ἐπὶ χρεῖστος τῶν ὑψέως
δευδρίων.

Περί Κονδρίλλης. Κεφ. ρξά.

Κονδρίλλα, ἢ δὲ, καὶ τὸ πρὸς τὸν
εἶον καλεῖσθαι ἢ σέριδα, τὰ μὲν φύλ- 20
λα καὶ τὸν χαυλὸν, καὶ τὰ ἀνθη ἔχει
καυρίῳ ὅμοια. ἔδειν καὶ εἶδος αὐ-
τὸ τῆς εἰπὸν σπεισδος ἀγλαίας λε-
πτότερον δὲ τὸ ὅλον. ὡς δὲ τοῖς
κλωναρίοις αὐτοῖς εὐρίσκεθ' ὁ κόμ- 25
μι ὅμοιον μαστίχην, μέγιστοι κυ-
μαῖα. ἃ πᾶσα παρρησέθεντα μετὰ
σπινθὸς λεία, ἐν ὁδονίῳ, μέγιστος
ἡγάας, ἐμμιλω ἀγρῇ. ἢ ὅσα σὺν
τῇ ῥίζῃ κοπέται, εἰς προχόσκους
ἀναπλάσσειται μυγυμίδιον μέλι-
τος,

5 τοις, οἱ τινες διεξέντες καὶ νίβω μι-
 γρῦτες, ἀφ' οὗ ἀποσμήχουσιν. ἀ-
 νακολλᾷ δὲ καὶ τείχεα τὸ κόμμα
 καὶ ἡρίζα ὅτι πρόσφατος ποιεῖ εἰς τὰ
 αὐτὰ, βαπτισμένης εἰς αὐτὴν βελό-
 5 νης, καὶ παροπαρμένης ταῖς θρίξιν.
 ἀρμόζει δὲ καὶ παρὲς ἔχεις συν οἴ-
 νῳ παρομύρῃ. καὶ κοιλίαν ἴσησιν ὁ
 χυλὸς αὐτῆς ἐνδεὲς συν οἴνῳ καὶ
 πυρετῆς, καὶ κατ' αὐτόν. ἔστι δὲ καὶ
 ἕτερον εἶδος κονδρίλλης, φύλλον
 10 δὲ ἔχει σπείριον, ὡς ἑλκυστήριον, παρ' ὅ-
 κας, ὅτι γῆς ἐρωμύρον. καμλὸν δὲ
 ὁ ποῦ μεσόν· ῥίζαν δὲ λεπτήν, ἑ-
 πακμον, κόφιν, στρογγύλιν,
 ὑπόξανθον, ὁ ποῦ μεσόν. Διούα-
 15 μιν δὲ ἔχει ὁ καμλὸς καὶ τὰ φύλ-
 λα, πεπικνῶν. ὁ δὲ ὁ πὸς τειχεῶν
 τῶν ἐν βλεφάρεσι ἀνακολλητι-
 κός. φύεται δὲ ἐν γαστέρι καὶ ἐρ-
 γασίμοις χυδαίοις.

Πεὶ Κολοκύνθας. Κεφ. ρξβ'.

20 Κολοκύνθα ἐδώδεμος ὡμὴ κα-
 ταπλαθεῖσα λεία, οἰδήματα καὶ
 ἀποσμήματα πρᾶνῃ. τὸ δὲ ξέσμα
 αὐτῇ πιδίοις σπρίωνσιν, ὡφείμω
 καὶ βρέγματος καταπλασέ. ὁ
 καὶ πρὸς ὀφθαλμοῦ φλεγμονῆς καὶ
 25 ποδαργμῶς ὁμοίως. ὁ καὶ χυλὸς
 ξυσπιάτων θηλέωντων, παρὲς ὡτα-
 γίας κατ' αὐτὸν καὶ μετὰ ῥοδί-
 νου ἐργυματιζόμενος ὡφελεῖ· καὶ
 παρὲς καμσουμένην ὀφθαλμῶν
 ἐργυμῶνος ὡφελεῖ· ὅλως δὲ αὐ-
 τῆς ἀποζωοποιεῖς καὶ ἐκθληθείσης
 ὁ χυλός

fillos, qui nitro admisti vitili-
 gines emaculant. Gummi in-
 ordinatos pilos replicat: quod
 item tenera radix efficit, si in-
 tincta succo acus, pilis admo-
 ueatur. Contra viperas in vi-
 no pota proficit. Succus de-
 coctæ, in vino, aut per sese
 potus, aluum sistit. Aliud ha-
 betur chondrillæ genus, fo-
 lium ferens oblongum, cir-
 cumrosium, humi sparsum, cau-
 lem succo madentem lacteo:
 radice tenui, rotunda, leui, ve-
 geta, flavescente, succosa. Cu-
 ius & caulis, & folia conco-
 quendi vim habent. Succus in-
 commodos palpebrarum pi-
 los reflectit. Nascitur in latis
 & cultis.

Cucurbita. Cap. CLXII.

Cucurbita esui apta: cruda,
 trita illitu tumores, & absces-
 sus mitigat. Ramenta eius in-
 fantibus contra capitis ardo-
 rem, quam syriasin vocant, in
 fincipite illinuntur: oculorum
 inflammationes podagrasque
 refrigerant. Succus è ramen-
 tis tufis per se, aut cum rosa-
 ceo infusus, aurium doloribus
 auxiliatur: adustiones cutis in
 ardenti febre illitu adiuuat:
 totius feruifacæ, & expressæ
 p iij succus,

DIOSCORIDIS

fuccus, cum melle exiguo, & ni-
tro potus, aluum leniter refol-
uit. Vinum in cucurbitam re-
centem excavatam infusum, si
mistum sub diuo teneatur, po-
tu aluum leuigabit.

Cucumer satiuus.

Cap. CLXIII.

Satiuus cucumis aluo, & sto-
macho per q̄ vtilis habetur, re-
frigerat, corruptionē nō sentit,
vesicæ prodest, olfactu reuo-
cat, quos animus liquerit. Se-
mē modicē vrinā mouet: cum
lacte aut passo, vesicæ exulce-
rationibus subuenit. Illita cum
vino folia, morsus canū fanāt:
& epinyctidas, cum melle.

Pepones. Cap. CLXIII.

Peponis caro in cibis, vrinā
cit: inflammationes oculorum
illita fedat. Ramēta eius cōtra
adulstionem infantium, quam
syriasin vocant, sincipiti impo-
nuntur: fronti admota, oculo-
rum fluxiones auertūt. Succus
cum semine, adiecta farina, sic-
catus in sole cogitur in smeg-
mata, quæ faciem repurgāt, &
nitorem afferunt. Radix sic-
ca, & ex hydromelyte pota,
drachmæ pondere, vomitionē
mouet. Si quisquam moderatē
secundum cœnam vomere cu-
piat, geminis obolis sit cōtētus.

Samat

ὁ χυλὸς πινόμενος μετὰ μέλιτος
βραχέως καὶ νύκτα, κοιλίαν λύει καί-
φως. καὶ εἰ τις κοιλίαν αὐτῷ ὠ-
μῶν, ἔλκεας τὸ οἶνον καὶ ἐξαιδριά-
σας, καὶ ἑαύτας τὴν νύκτι, μα-
κάσει κοιλίαν κοίφως.

Περὶ ἡμέρου σίκκος.

Κεφ. εἰς γ'.

Σίκκος ἡμερὸς ἐν κοιλίᾳ, ἐν σέ-
μαχος, ψυκτικός, οὐ φθειρέμα-
νος, κύσει ἀμύδιος, ἀνὰ κτηνικὸς
λειποδυμῶν ὁσφρανόμενος. καὶ
τὸ σπέρμα αὐτῆς μεβρίως ἐρυπτικόν
ἀμύδιον συν γάλακτι ἢ γλυκύᾳ
παρὰ τὰς ἐν κύσει ἑκνώσεις. τὰ
δὲ φύλλα αὐτῆς συν οἶνῳ κατα-
πλαθέντα, κυνόδινκτα ἴστανται συν
μέλιτι δὲ ὀπνηκτικὰς.

Περὶ πέπωνος. Κεφ. ρεβ'.

Ἡ δὲ τοῦ πέπωνος σαρξ καὶ
αὐτὴ οὐρυπτικὴ ἐδιοκύνῃ κατὰ
πλαθεῖσαι ὅ ἐφ' ὅτα μοῦ φλεβίμο-
νας παρῶναι. τὸ δὲ βρέγμα αὐτῆς
σειδῶσι παιδίοις καὶ τὸ βρέγμα-
τος ἐπιτίθεται, καὶ ρευματίζο-
μένοισι ὀφθαλμοῖς αὐτὴ ἀνακο-
λήματος κατὰ τοῦ μετώπου. ὁ
δὲ χυλὸς συν τῷ σπέρματι μι-
γρὸς ἀλεύρω καὶ ξηραίνεις ἐν ἡ-
λίῳ, σμῆγμα γίνεταί ἐρυπτικόν καὶ
ρίζα ξηρὰ ποθεῖται συν ὑδρομέ-
λιτι < ἐλκῇ, ἐμέτοις κινεῖ. εἰ δὲ
τις παρὰ τὸς ἀπὸ δειπνοῦ ἐμέτους
δειλήσειεν, ἀρ' κίστισην ὀβολοὶ β'.
ὑγιάζει

ὑγιάζει δὲ καὶ κυεῖα κατὰ πλά-
θεῖσα μετὰ τῷ μέλιτος.

Περὶ Ὀρίδακος ἡμέτερον.

Κεφ. ρξξ.

Θείδαξ ἡμεῖς ἐν σόμαχος,
ὑποψυχουσα, ὑπωπικη, κοιλί-
ας μαλακτικη, γάλακτος κατὰ
παστικῇ. ἐν δὲ ἡμεῖς δὲ γίνετα
προφικωτέρεα. ἄπλυτος δὲ ἐ-
πιπονή, σωμαχικοῖς ἀμύζει.
τὸ δὲ σωμαχικὸν αὐτῆς πωρόμα-
νον, τοῖς σωμαχικοῖς ὀνηρώτοισι
βοηθεῖ. καὶ σωμαχικὸν ἀποσπ-
φει. αὐτοὶ δὲ σωμαχικοῖς ἐπι-
πονή. ἀμύζωσις εἰς σωμα-
χικῇ. τερνέοντα δὲ ἐν ἄλ-
μυ, ἐκκαμύσσει δὲ, ἔχουσι
τι παρεμύσει τῇ τοῦ χυλοῦ
καὶ τοῦ σωμαχικοῦ τῆς ἀγείας
Ὀρίδακος.

Περὶ Ἀγείας Ὀρίδακος.

Κεφ. ρξξ.

Ἡ δὲ ἀγεία Ὀρίδαξ ὅμοια τῇ
ἡμέτερον, καμύσει δὲ καὶ τοῖς
φύλλοις λευκοτέρεα, καὶ ἰσχυρό-
τεα καὶ τερνέοντα ὑποψυχουσα.
πικρὰ δὲ πρὸς τῇ γούσει, ὁμοίω-
ται δὲ κατὰ πᾶσαν τὴν δύνα-
μιν μυκητικῇ καὶ τῇ ὁπὲν αὐτῆς
ἐν τοῖς μίστροισι τῶν μυκητικῶν. κα-
ταίρει δὲ μέλι * ὁ ξυγκράτου ποθεῖς
ὁ ὅπως δύσιν ὀβολῶν ἐκκαμύσει κατὰ
κοιλίαν, ἀποκαταίρει δὲ
καὶ ἀρρεμα καὶ ἀχλὺν ποιεῖ καὶ
πρὸς ἐπιπονήσιν ἐγγυμνὴν σὺν
γυναικίᾳ

Sanat quoque illita cum melle
ulcera concreta in modum fa-
ui, quæ ceria vocant.

Lactuca. Cap. CLXV.

Lactuca sativa, quibus natu-
ra refrigeratrix inest, stomacho
grata habentur: somnū conci-
liat, aluū emolliunt, lac euocat:
verū decoctæ magis alūt, sto-
machicis illotas esse prodest. E-
potū semen, assiduas libidinum
imaginationes in somno, cō-
pescit, & veneri refragatur. Ip-
sæ verò frequentiores in cibo,
claritati oculorū officiunt: in-
flāminationibus, & ignib⁹ sacris
opitulatur, muria condiuntur.
Cū in caulē exierunt, vim quā-
dā nanciscuntur, succo aut lacti
sylvestris lactuca similem.

Lactuca sylvestris.

Cap. CLXVI.

Sylvestris lactuca sativa si-
milis est, sed longior caulis,
& candidiora folia, gracilio-
ra, & asperiora: amaro gustu
est, & viribus aliquantum pa-
paueri similis: vnde lacteum e-
ius succū aliqui meconio per-
miscuerūt. Aquam per aluum
elicit, potus in aceto mulso suc-
cus ad duos obolos: argema ca-
lignemq; repurgat, cōtra adu-
siones efficaciter illinitur, cū
p iij lacte

DIOSCORIDIS

lacte mulierū. In summa, somnum allicit: doloris leuamentū præstat, menses trahit, contra scorpionum, & phalangiorum ictus bibitur. Semen, nō aliter, quā satiuæ, libidinū imaginationes in somno amolitur, ac venerē arcet. Succus ad eadē valet, sed viribus infirmior. Repōnitur in fictili nouo lac eius antea, vt in aliis liquaminibus moris est, insolatum.

Gingidium. Cap. CLXVII.

Gingidiū, aliqui lepidion, in Syria, & Cilicia plerūque nascitur: herbulæ syluestri pastinacæ similis, tenuior, & amarior: radice parua cādicatē subamara. Olus hoc crudum, coctum, cōditūve estur magna stomachi vtilitate: vrinam cit. Decoctum ex vino potum vesicæ prodest.

Scandix. Cap. CLXVIII.

Scandix, syluestre olus est, amarum, subacre: quod crudū coctūve manditur, stomacho & ventri vile. Decoctum in potu, vesicæ, renibus, & iocineri confert.

Caucalis. Cap. CLXIX.

Caucalis, quam alij syluestre daucum vocant, cauliculo est dodrantali, aut maiore, subhirsuto: folijs apio similibus,

foeni-

γυναικείῳ γάλακτι. ἔστι δὲ καρδίου ὑποωπικὴ καὶ ἀνόδυνος, ἀγχι δὲ ἐμμένει, ποτίζεται δὲ καὶ πρὸς σκορπιόπληκτοις καὶ φάλανγιδήκτοις. τὸ δὲ σπέρμα ὥσπερ τὸ πῖς ἡμέτερον πιθὲν, δινεῖται μοῖς 5 καὶ σωσιόταν ἀποσφύρει. διδάται δὲ καὶ ὁ χυλὸς πρὸς τὰ αὐτὰ, ἀδυνέστερος μάλιστα. ἀποτίθεται δὲ ὁ ὅπσις ἐν κεραμοῖς ἀγχείοις πρὸς κλισζόμενος ὥσπερ καὶ τὰ λοιπὰ χυλίσματα.

13

Περὶ Γιγγιδίου. Κεφ. ρξζʹ.

Γιγγίδιον, οἱ δὲ λεπίδιον, φύεται πλεῖστον ἐν κιλίκῳ. τε καὶ σιναίᾳ βουτάνῳ σφυλίνῳ μὲν ἐοικὸς ἀγείῳ, λεπτότερον δὲ καὶ πυκνότερον· μίξιν ὑπόλευκον, πικρίζον. 15 λαχανεύει δὲ ὁ μὲν τε καὶ ἐφθύν, καὶ πατεργυθὲν ἐδίεται. ἔστι δὲ εὐστόμαχον· οὐρητικόν. καὶ τὸ ἀφέλημα αὐτοῦ πινόμενον μετὰ οἶνον κύσει χολήσιμον.

Περὶ Σκανδικῆς. Κεφ. ρξηʹ. 20

Σκανδική, καὶ τὸ τοῦ ἀγρίου λάχανον, ὑπόδριμν, καὶ ἑμπτυκρον, ἐδιδυμον· ἐφθύν καὶ ὁ μὲν ἐδιδόμενον, εὐκοίλιον καὶ εὐστόμαχον. τὸ δὲ ἀφέλημα αὐτοῦ κύσει χολήσιμον καὶ νεφροῖς πινόμενον καὶ ἡπάτι.

25

Περὶ Καυκαλίδος. Κεφ. ρξθʹ.

Καυκαλὶς, ἐννοεῖ δὲ δαύκον ἀγριον καλοῦσι, χαυλὶον ὅτι σπιδαιμαῖον ἢ καὶ μετρίον, ὑπόδυσυ. φύλλα ἔχον μαρσίδριον ὁμοίαν πάλιν-

πάλιν-

πολυαυτῇ, δασέα· καὶ ἐπ' ἄ-
κρου σιδήριον λευκόν, ὑψώδες.
λαχανεύεται δὲ καὶ τὸ τοῦ ὠμόν-
τε καὶ ἐφ' ὃν ἐδιόμβρον· ἔστι δὲ
διουρετικόν.

5 Πρὶ ἐνζώμῃ. Κεφ. ρο'.

Εὐζόμενον, τὸ τὸ ὁμὸν παλαιοῦν
βρωθὲν σπυροειδῶς παρορμῶ. καὶ
τὸ σπέρμα ὃ αὐτὸ τὸ αὐτὸ ποιεῖ.
ἔρρηκτικὸν ὑπάρχον καὶ πεπτικὸν καὶ
εὐκοιλίον. χεῖν;) Δὲ τῷ σπέρματι

10 π αὐτῶ καὶ εἰς τὰς ἀρ' οὐσίας ἀπο-
 τίθει) δὲ αὐτὸ πρὸς τὸ πλείον-
 να διαμεμεν χρόνον, ὅτε καὶ φερόν-
 τες καὶ γὰρ λακτι, καὶ ἀναπλάσσαν-
 τες τροφίσκους. Γίνε) δὲ καὶ ἄ-
 ρειον εὐχόμενος, μάλιστα ἐν τῇ κτ'
 75 ἥ ἐσπέρην ἐκρίνας τῶ σπέρματι
 καὶ ἀπὸ σπέρματος οὗ τινος ἀνθρώ-
 που χρόνον, ἐστὶ ὃ διεκρίνω πλέον
 καὶ διμῶτερον πολλῶ τῶ ἡμέρῃ.

Πρὶ Ὁκίμ. Κεφ. ροά.

Ωκιμον γνώριμον βιβρωσκόμα

20 ον πάλιν ἀμεινῶντες ὅτιν, ὅτι δὲ
κοιλίας μαλακτικόν, πνεύμα των
κινητικόν, ἐρηικόν, γάλακτος ὡς
κλητικόν· δυσμετάβλητον, κα-
ταπαύειν δὲ σὺν διόϊτε πα-
πείλῃ, καὶ ὁδόν καὶ ὅξιν, φλογμο-

25 νῶς βοηθεῖ, *καὶ δράκοντος θα-
λασσῆς καὶ σκορπίου πληγῇ· καὶ
ἐαυτὸ δὲ σὺν οἴνῳ χίψ, πρὸς ὀφ-
θαλμοῦν ὀδυμῆς, ὃ δὲ χυλὸς αὐτοῦ
ἀποκαθαίρει ἀχλεῖ τὰς ἐν ὀφ-
θαλμοῖς, καὶ τὰ εἴδηματα ξεραίνει.

fœniculi modo per extrema
multifidis, hispidisq; candida in
cacumine umbella, suauiter o-
lente. Crudum coctumve ole-
rum modo estur, urinā mouet.

Eruca. Cap. CLXX.

Cruda eruca venerem largiore cibo concitat. Semē eodem effectu prodest: vrinam cit, concoctioni prodest, alio perquā commodata. Semine ad cōdimēta vtūtur: quod, vti in longum tempus asseruetur, adiecto lacte aut aceto, digerunt in pastillos. Gignitur etiamnum syluestris eruca, maximē in Iberia, quæ occidentem spectat: cuius semine pro sinapi incolā vtuntur. Vrinam vehementius pellit, multō satiatia acrior.

Ocimum. Cap. CLXXI.

Ocimum vulgò cognitum.

Id copiosiore cibo oculorum
aciē hebetat, aluum mollit, spi-
ritum mouet, vrinam pellit, lac
euocat: agrē tamen cōficitur.
Illitum cum polline polentæ,
aceto & rosaceo, pulmonum
inflammationibus auxilio est:
draconis marini, & scorpio-
nis ictibus per se prodest: &
cum vino Chio oculorum dol-
oribus. Succus visus caliginem
abstergit, destillatiōes exiccat.

DIOSCORIDIS

Semen potum conuenit atram
bile gignentibus, difficili vring,
inflatisq; naribus haustu, subin
de mouet sternutameta: quod
idem herba efficit, sed oculos
premi necessum est, cū sternu-
tamentū vrget. Sunt qui in ci-
bis abdicandū censeant: quan-
doquidem manducatum, & in
sole positum, vermiculos cre-
at. Aphri autem adiiciunt, si fe-
riantur à scorpione, qui oci-
um ederint, nullo conflicta-
ri dolore.

Orobanche. Cap. CLXXII.

Orobâche cauliculus est, sef-
quipedalis, & interdū maior,
fubruher, hirsutus, tener, sine
folio, pinguis: flore subalbido,
aut in luteum vergente: radice
digiti crassitudine, & cum ari-
ditate flaccescit caulis, fistulo-
sa. Hanc inter quædam legu-
mina nasci constat, & ea stran-
gulare: vnde orobanche sibi
cognomētum vsurpauit. Estur,
vt olus, cruda, & in patinis, as-
sparagi modo, decocta. Legu-
mentis addita, coctionem ac-
celerare creditur.

Barbula hirci. Ca. CLXXIII.

Barbula hirci, q̄ ab aliis co-
me vocatur, breui est caule: fo-
liis croci: radice longa, dulci,
supina: magno super caulem
calyce,

τὸ δὲ σπέρμα πινόμενον, ἀρμό-
ζει τοῖς* μέλαιναν χολῶν ἡντι-
σι καὶ δυσουερεῖσι καὶ πνευματικῆς
νοῖς ποιεῖ δὲ καὶ πᾶσι τοῖς ἀσθενέ-
σι καὶ ἡ πῆα δὲ τὸ αὐτὸ ποιεῖ, συμ-
πίπτει δὲ τοῖς ὀφθαλμοῖς δει-
κνόντες τὰ πᾶσι. φυλάσσειν-
τα δὲ πᾶσι οὐκ ἐδίδοιτο,
διὰ τὸ μασηθῆναι καὶ τεθῆναι ἐν ἡ-
λίῳ, σικωλίκῳ ἡντιαν λίαντες δὲ
περὶ σελήφασιν ὅτι οἱ φαρμακοὶ
αὐτὸ καὶ πλεονέκτες ὑπὸ σκασπῆς,
ἀποτοῖσι διαμέρισιν.

Περὶ Οροβάκης. Κεφ. ροβ.

Οροβάκη καυλίον ὅστις ὑ-
περυθρον ὡς διαπιδμαῖον, ἐ-
νίοτε δὲ καὶ μέζον, φύλλοις ὑπο-
λίπας ἐν, ἐν δασυ, τρυφῆρον ἀνθε-
σιν ὑπολευκοῖς ἢ κινδύοις κα-
χυμῆρον. ῥίζα δὲ ὑπερὶ δακτύ-
λου τὸ πάχος κατὰ τετραμῆρη
πρὸς πᾶσι τὰ καυλῆ ἐκαστά. 15
δοκεῖ δὲ φυόμενον ἐν ὀσπερίοις
ποτὶ πῆγην αὐτὰ ὅθεν καὶ πᾶσι
περὶ σελήφασιν ἐρηκῆ. λευκαῖς
δὲ καὶ ὁμῶς καὶ ἐφθόν, ἐκ λοπά-
δος ὡς ἀπὸ εὐαγρῶς ἐδιδόμενον καὶ
ὀσπερίοις συνελεῖν, τὰ χροῖα αὐ-
τὰ δοκεῖ ἐλθεῖν. 20

Περὶ Τραχυπώγωνος. Κεφ. ρογ.

Τραχυπώγων ἢ τετραπώγων,
οἱ δὲ, κόμην καλῆσιν, καυλὸς βρα-
χὺς φύλλα κρόκῳ ὁμοία ῥίζα μα-
κρά, γλυκῆς, * ὅπῃ δὲ τὰ καυλῆ
καλῶς 25

καλυξέ μῆλας· καὶ ἐξ ἁκρῆς καρπὸς
μέλας, ἀφ' ἧ καὶ τὸ ὄνομα ἔχον. ἔστι
δὲ ἢ πῶα ἐδωδιμος.

Πρὶ Ornithogάλῃ. Κεφ. ροδί.

Ornithogάλον χαμλίν ὅστις τευ-
5 φερὲν, λεπτὸν, ὑπόλευκον ὡς δι-
σπιδιμύλον, ὅνῃ παρὰ φύσιν
ἔχον, τρεῖς ἢ τέσσαρες ἀπαλάς·
ἀφ' ὧν ἀνθῆ ἔξωθεν μὲν βοτα-
νόδῃ, διανοιχθέντα δὲ γαλακτί-
ζοντα· καὶ μετὰ ξυῖον αὐτῶν κεφα-
10 λον ὡς καλῶς ἐν τῇ μεμυμένον
μετὰ αὐτοῦ συμποπιδύον ὡς με-
λάνθιον· ῥίζα δὲ βολβοειδής· ἐ-
κδομένη δὲ μὴ τε καὶ ἐφθῆ.

Πρὶ Ὑδν. Κεφ. ροδί.

Ὑδνον ῥίζα ὅστις περὶ φέρης, ἁ-
15 φυλλος, ἀχαμλος, ὑπόξανθος· ἔα-
ρες ὅρτυποι μὲν ἐδωδιμος δὲ ὅστις
ὁ μὴ τε καὶ ἐφθῆ ἐκδομένη.

Περὶ Σμίλακος.

Κεφ. ροδί.

Σμίλαξ κηπάνα, ἥς ὁ καρ-
20 πὸς λεῖψα· ὑπὸ ἐνίων δὲ ἀσπί-
ρατος καλεῖται· φύλλα ἔχει κισ-
σῶ ὅμοια, μαλακώτερα μὲν
τοῖς χαμλοῦς δὲ λεπτοῦς καὶ ἑλι-
κας περὶ πλεγμύρους τοῖς πα-
ρα κειμήλοις· σαμνίσι· ἀνθῶν
25 μύλας τὲ ἐφ' ἱκνῶν, ὡς τε καὶ
σπυροποιεῖσθαι· καρπὸν δὲ φέρει
ὁμοιον πῆλει· μακρότερον δὲ καὶ
ἐπιστημότερον ἐν οἷς σπέρματα
ὅμοια νεφελεῖς, οὐκ ἰσόχρεια·
ἐν μέσσοις δὲ ὑποπυεῖζοντα,
λαχανεύει

calyce, è cuius summo semen
nigrum depédet, vnde nomen
inditū est. Herba esui apta est.

Ornithogálū. Ca. CLXXIII.

Ornithogálū cauliculus est
tener candicans, tenuis, sesqui-
pedalis, tribus aut quatuor in
cacumine mollibus agnatis: à
quibus flores pdeūt, foris her-
bacei, & cum hiātes se pādūt,
lacteī vifuntur, inter quos dif-
fectum, cachryos modo, capi-
tulum emicat. Coquitur cū pa-
ne, vt melanthiū. Radix bulbo-
sa, cruda & cocta manditur.

Tubera. Cap. CLXXV.

Tubera rotūda radices sunt,
sine caule, sine foliis flauescen-
tes: vere fodiūtur, cruda & co-
cta eduntur.

Smilax hortenfis.

Cap. CLXXVI.

Hortenfis smilax, frutex, cu-
ius semen à nōnllis lobia vo-
catur: folia habet hedere, mol-
liora tamē: tenues caules, & ca-
preolos vicinis fruticibus cir-
cumuolutos: qui tantum ado-
lescunt, vt topiarias scenas re-
praesentare videant: siliquas foe-
nigræci pferit longiores & to-
rosiores, in quibus semina re-
num similia, sed inæquali colo-
re recluduntur: quæ quadā ex
parte fuluescūt. Siliquas cocta,
cum

DIOSCORIDIS

cta, cum semine in oleribus, asparagi modo estur. Vrinam ciet, & tumultuosa somnia facit.

Medica. Cap. CLXXVII.

Medica cum recenter prodit, foliis & caule trifolio pretenfi similis est: procedens vero folia contrahit, caules edes trifolij, & siliquas corniculorum modo intortas, in quibus semen lentis magnitudine depedit. Id siccatum, iucundi saporis gratia, conditaneo sali admiscetur. Viride, quibus refrigeratione opus est, illitu suffragatur. Herba tota pro gramine vtuntur, qui pecora alunt.

Aphaca. Cap. CLXXVIII.

Aphaca in aruis nascitur, altior lente, tenuibus foliis: siliquas lenticulam maiores fert, in quibus terna quaternave femina nigra, lente minora, continentur: quæ adstringendi vim habent: quare torrefacta, stomachi aluique fluxiones sistunt, si fresalentis more decoquantur.

Porum capitatum.

Cap. CLXXIX.

Capitatu porru inflatione facit, noxiu succu creat, tumultuosum somnu parit, vrinam ciet, aluo accommodat, extenuat, oculorum

λαχανεύει δὲ εἰς βρώσιν ὁ καρπὸς ἐφόδμος συν τῷ σπέρματι ὡς ἀπὸ ἑαυτοῦ οὐρητικὸς ὢν καὶ δυσόνητος.

Πρὶ Μηδικῆς. Κεφ. ρζ'.

*Μηδικὴ εἶκει μὲν ἀρπυνοῦς μὲν τριφύλλῳ τῇ ἐν χρεστοκοπίῳ· περὶ αὐτοῦ δὲ γενοφύλλοι τε γίνονται, καὶ τοὺς ἀντίστοιχους τριφύλλῳ ὁμοίους, ἐφ' οἷς τὸ σπέρμα περὶ σπέρματος φακοῦ τὸ μέγεθος ἐπεσφραμιμένον ὡς κεράπον. ὅσῳ ξηρανθὲν, μύρνεται ἡ δύσματος χάριν τοῖς ἀρπυνοῖς ἀλσί. χλωρὸν δὲ καταπλαθὲν ὠφελεῖ τὰ ψύχειας διόδια. ὅλη δὲ τῇ πᾶσι χρῆνται οἱ κτύωβοφοὶ ἀπὸ ἀρρώστιας.

Πρὶ Αφάκης. Κεφ. ρσ'.

Αφάκη θάμνιον ὅτι φυόμενον ἐν ἀερίαις, φακοῦ ὑψηλότερον, λεπτόφυλλον· τὰ δὲ ἐπ' αὐτῇ φύλλα μᾶλλον μείζονα. Συλάκη τὸ φακοῦ ἀπὸ κλεπτικῶν τῶν σπερματικῶν τοῦ ἑαυτοῦ μεγάλων καὶ μικρῶν φακοῦ. Διότι αὐτὴ δὲ ἔχει τὰ σπερματικά συντεκνωθὲν ἴσως καὶ βούμα κοιλίας καὶ τομάχου φρυγανίσματα καὶ ἐρεκτώματα καὶ ἐφόδμος ὡς περὶ φακός.

Πρὶ Πράσου Κεφαλωτῶ.

Κεφ. ρβ'.

Πρὸς τὴν κεφαλὴν τὴν φασαίδος, κακὸν χυμὸν, δυσόνητον, οὐρητικὸν, ἐν κοιλίῳ, λεπτοπικνόν, ἀμεινωπίας

ἑλυσσώπας ποικιλικόν, κατὰ μινίων
 ἄλγος, βλαπτικόν, κύστεως εἰλικω
 μύσις καὶ νεφρῶν· συνεψηθέν δὲ
 πτισάνην καὶ βρωθέν ἀνάγκη τὸ ἐκ
 δαυκατος· ἢ ὅ καὶ μὴ αὐτῷ ἐψηθεί-
 5 σα ἐν θαλάσῃ καὶ ὄξος, εἰς ἐκεί-
 σμα χρησιμεύει πρὸς μύσιν καὶ
 σκληρίαν ὑστέρας. ἀπογλυκαίνε
 ὅ καὶ ἀφυσότρον γίνε
 10 τερὸς ἔχον π καὶ εὐλαως ὁδὸν αἰ-
 μα ὁ χυλὸς αὐτῷ ἴσῃσι συνῆξι, καὶ
 μάστιγα τὸ ἐκ μυκθήσεων φρόμε-
 νον, μαλινῶς ἢ λιθωντῶ μισύτος.
 ἀφροδίσι τε παρρημαῖ καὶ πρὸς
 15 ἀντὶ ἐκλήκῃ, ποιεί καὶ πρὸς φθί-
 σις βρωθέν καὶ δαμάει δὲ καὶ τῷ ἀπτι-
 ρίαν ἐκτόμῳ ὅ τῷ πρὸς αἵματι
 βλαπτικόν ὁφθαλμοῦ γίνε
 20 αὐτὸ δὲ κατὰ πηλοσκόμῳ ὡφεί-
 λει. βοηθεῖ καὶ ὡσπλίσις ὁ χυλὸς
 καὶ ἡχοις, συνῶξι καὶ λιθωντῶ καὶ
 γάλακτι ἢ πρὸ δίνῳ ἐσπαγεί. αἰ-
 ρει δὲ καὶ ἰσθμοῖς τὰ φύλλα με-
 25 δέντα καὶ ἐπιφυκτίδας ἰαταί, ἐ-
 ράρας τὸ πειρήνται σὺν ἀλσιν
 ἐπιπλαπτόμενον, τὸ μὴ τῷ σπέρ-
 ματος < β. μ. μύτων ἴσων πο-
 θεῖται, τὰς χρονοῖς ἀναγῶας τῷ
 αἵματι ἐπὶ χροσιν.

Πρὶ

oculorum aciem hebetat, me-
 ses pellit, sed ledit exulceratam
 vesicam, renesque: cum ptisa-
 na verò coctum, esu pectoris
 vitia extrahit. Coma eius in a-
 qua maris, & aceto cocta, in
 defelsionibus, ad præclusiones
 vulvæ, & duritias, vtilis habet.
 Porrum bis aqua mutata co-
 ctum, tum frigida maceratum,
 dulcescit, & multò min⁹ inflat.
 Semen acrius est, & quandam
 adstrictoriā vim habet: quare
 succus cum aceto, addito thu-
 re aut manna, sanguinis profu-
 uia sistit, maximè si narib⁹ eru-
 pat. Venerem stimulat: contra
 omnia thoracis vitia tabémq;
 p delinctu efficax est: arteriā
 esu purgat, sed si assidue estur,
 visus obcuritatē inducit: sto-
 macho aduersatur. Succus ex
 melle potus, aut illit⁹, cōtra be-
 stiarū morsus auxilio est: ipsum
 quoque cum aceto aut thuris
 polline, lacte aut rosaceo, vti-
 liter aurium doloribus, & so-
 nitui instillatur. Varos tollunt
 folia illita cum vua rhois, qua
 ad obsonia vtuntur: epinycti-
 di medentur, crustas ex sale
 illita rumpunt, veteres sangui-
 nis reiectiones cohibent, si bi-
 nis drachmis, & æquali bacca-
 rum myrti pondere bibantur.
 Ampelopra-

Ampelopra-

DIOSCORIDIS

Ampeloprasum.

Cap. CLXXX.

Ampeloprasū stomacho magis aduersat, & plus porro ex-
calfacit: vrinam & menses ve-
hementius ciet. Id contra ser-
pentium morsus esse cōuenit.

Cepa. Cap. CLXXXI.

Cepa longa acrior est, quàm
rotunda, item flaua quàm can-
dida, & sicca quàm viridis, &
cruda quàm cocta, aut sale cō-
dita. Omnes tamen mordent,
flatus gignunt, appetentiā inui-
tant, sitim mouēt, & extenuāt:
fastidiū pariunt, & expurgant:
aluo vtilēs sunt. Ex detractis
purgamētis in oleum cōiectæ,
hæmorrhoidas, reliquosq; ex-
cretionum exitus referāt, sub-
ditæ pro balanis. Succus cum
melle illitus, oculorum hebetu-
dinibus, argemis, nubeculis, &
incipientibus suffusionibus au-
xiliatur: angine eodē perungū-
tur: suppressos menses pellit, ca-
put purgat naribus infusus: can-
nis moribus cū aceto, ruta, &
melle illinitur: cū aceto autem
perunctas in sole, vitilignes fa-
nat: & cū pari spodio, scabras
lippitudines fedat: varos cū sa-
le reprimat: contra calceamen-
torum attritus, cum gallinaceo
adipe vtilis est: citæ aluo pdest:
in

Πρὶ Ἀμπελοπρασου,

Κεφ. ρπ.

Ἀμπελόπρασον, χαλκισμαχό-
προν τῷ πρᾶσι, δερματικῶτε-
ρον δὲ καὶ ἐρηπτικώτερον κατα-
μύων ἀγων. ἐπιειδὴ τοῖς ὄ-
φιδος σκόμῳ ἀρμόζει.

Πρὶ Κεράμειον. Κεφ. ρπα.

Κεράμιον δριμύτερον τὸ μα-
κρόν τῷ σπογγίῳ, καὶ τὸ ξανθὸν
τῷ λευκῷ, καὶ τὸ ξηρὸν τῷ χλωρῷ,
καὶ τὸ ὠμὸν τῷ ὀπίῳ καὶ τριετηρεῖ. 10
ἐστὶ δὲ ἅπαντα δεικτικά καὶ πνευ-
ματωπικά. ὁρέξειος ἐκκλησίου, λε-
πιδιπικῆ, δι-λιδίου, ἀποδίου, ἀπο-
καταρπικῆ, ἐυκοίλια, ἀνασμο-
πικῆ ἐκκρίσεων τῶν τε διψῶν καὶ
αἱμορροΐδων, ἀντὶ βαλάνου δὲ 15
πρᾶσιδεταὶ λεπιδίντῃ καὶ εἰς ἐ-
λασον ἐμβληθέντῃ. ὁ δὲ χυλὸς ἐλ-
χιόμυρος σὺν μέλιτι βονδεῖ ἀμ-
βλυοπέσπῃ, ἀργέμοις, νεφελοῖς,
καὶ ἀργυροῖς ὑποχρίσθαι, καὶ συν-
αρχκοῖς διαρχιδεῖς. κινεῖ τε 20
καταμύωια καὶ ἄρει, ἐγχευτός τε
καταρπικός διὰ ῥινὸς κεφαλῆς.
κνωδόνικτις δὲ κατὰ πλάσμα
μεθ' ἁλὸς καὶ πηγμῶν καὶ μέ-
λιτος. σὺν ὄξει δὲ ἐν ἡλίῳ κα-
ταρχιδεῖς ἀλφουδὶ ἴσται. μετ' 25
ἴσου δὲ σποδίου ψωρεφθαλμῆ-
ας παύει, καὶ ἰόνδοις σὺν ἁλὶ
σέλλει. σὺν ὀρνιδείῳ δὲ σέαπ-
πες ἐκτεῖμαται ὑποδημάτων
χρήσιμος καὶ πρὸς ρεύσιν κοιλίας
καὶ

in

καὶ

ἢ δυσκοίαν καὶ σιγῆς, καὶ
 πυρορροαὴν ὧτα. * καὶ περὶ τὰς
 ἀπολήψεις τῶν ὑδατῶν τῶν ἐν
 τοῖς ὄσιν ἀρμόζει· καὶ περὶ ἀλω-
 πεκίας παρὰ τὴν βλάβην, τὰς ἁλόν
 γὰρ ἀλκυονίδος παρὰ τὴν ἀλείψαν τεί-
 χος. ἐστὶ δὲ τὸ κρόμμυον κεφα-
 λαλγὲς πλείον βρωστέον, ἐφθάνει δὲ
 οὐρετικώτερον γίνεσθαι. πλείον δὲ
 ἐπιτόμιον ἐν νόσοις ληθάργους
 ποιεῖ. τὸ το πίνυον ἐφθάνει καὶ χα-
 ταπλασθέν σὺν σαφίδι ἢ σύκω,
 φύματα πέπτι καὶ διαρρήσσει.

Πρὶ Σκορόδου. Κεφ. ραβ'.
 Σκορόδον τὸ μὲν, ἐστὶν ἡμερῶν
 καὶ κηπευτὸν, καὶ τὸ ἐν αἰγύπτῳ
 μονοκέφαλον ἔστιν, * χαλοῦσι δὲ
 15 τὰς ἐν αὐτῷ ῥίζας ἀλκιδας. * ἐστὶ
 δὲ καὶ ἀπὸ ἀργεῖον ὀφισκοδον χα-
 λοῦμενον. Διωάμιν δὲ ἔχει δρι-
 μεῖαν, θερμὰ πικρὰ, ἐκ κηπευτῶν
 φουσώδη, καὶ κοιλίας ταρακτικὴν,
 ξηρατικὴν σωματικῶν, διήκει πε-
 20 ητικῶν, ἐμπνευματώσεως ἀντι-
 ωπικῶν, καὶ ἐπιφανείας ὀμμάτων
 ἀμυλωτικῶν, βλεφαροσκόμων, * καὶ
 περὶ τοῦ ξηρισμοῦ τῶν ὑδα-
 τῶν ἀρμόζει, ἀρτηρίας λαμψύ-
 νης, καὶ βίχας χροίας παρηγορεῖ,
 25 ὡμὸν τε καὶ ἐφθάνει ἐπιτόμιον.
 φθεῖρας δὲ καὶ κόνιδας φθεῖρει
 σὺν ἀφελίματι ὀειγάνῃ πινόμε-
 νον· καὶ δὲ καὶ μέλιτι βρωστέον,
 ὑπὸ πᾶσι καὶ ἀλωπεκίας ἰατρὰ κα-
 ταρξέμενον· ἐπὶ δὲ τῇ δισωπικῶν
 σὺν

in auribus sonitū, ac grauitatē
 emendat: ad purulētas aureis,
 & eliciendā earūdem aquam,
 valet: alopeciae earū succo p-
 fricantur, qui celerius, quā al-
 cionium pilos euocat: largiore
 cibo cepa capitis dolores ciet,
 coctaq; vehemētius vrinā pel-
 lit: eos lethargicos efficit, q; va-
 letudinib; aduersis, vt etiā co-
 cta, plus æquo vescant: elixa, &
 cū falsisvuis, et fico illita, tuber-
 cula cōcoquit, & celerrimē rū-
 pit. Alliu. Cap. CLXXXII.

Allium quoddā satium atq;
 hortēse habetur, quod in Aegy-
 pto, singulari, vt porrum, capi-
 te cōstat, cuius nucleos aglitas,
 Græci nominant. Aliud est syl-
 uestre, quod Ophioscorodon,
 id est anguinū, vocant. Vis allij
 acris est: excalfacit, mordet, ex-
 ceruit, aluū turbat, inflationes
 facit, stomachum exiccat, sitim
 gignit, flatum permouet, sum-
 mam corporis cutem exulce-
 rat, aciem oculorū esu hebe-
 tat, cōuenit & cōtra aquarum
 mutationes, vocem clarificat,
 veterē tussim crudum coctū-
 ve lenit: potū autem cū origa-
 ni decocto, pediculos, & lēdes
 enecat: cremati cinis illit; fugil-
 lationib; cū melle, & alopeciiis
 cū nardino vngue, medetur:
 eruptiones

DIOSCORIDIS

eruptiones papularum cum o-
leo & sale sanat: vitilignes, li-
chenas, lentigines, vlcera capi-
tis manātia, lepras, & fufures,
cum melle eximit: cum thure,
& teda decoctum, dētium do-
lorem leuat, si in ore conuinca-
tur: contra venenatos muris a-
ranei morsus, cū ficulneis frō-
dibus, & cumino illinitur. Fer-
uefactæ comæ ius, foeminarū
defectionibus additū, mēses &
secundos partus extrahit. Alliū
eiusdē gratia suffitur. Factū ex
eo, & nigra oliua intritū, quod
myttoton vocant, esu cit vri-
nam, ora venarum patefacit,
hydropicis vtilē.

Scorodoprasum.

Cap. CLXXXIII

Scorodoprasum magnitudi-
ne porrum equat, qualitatum
porri, & allij particeps: vnde p-
miscuas sibi vires ex vtroq; vē
dicauit, effectus allij, & porri
præbens: inefficacius tamē. Co-
ctum, porri modo, dulcescit, &
in olerum vicem transit.

Sinapi. Cap. CLXXXIIII.

Sinapi hortēse, aliqui napi vo-
cāt. Eligi debet adultū, valde ru-
sum, nō magnopere siccū, sed
qd fractū internē virescat, &
veluti quodā succo madeat, cē
sūū colore: siq; dē recēs id genus
tēpestiūū

συν ναρδινω μύρω καὶ ἀλσὶ καὶ
ἐλαίῳ, ἔξανθήματα διεσπύει·
ἀφίστη δὲ καὶ ἀλφιδὸς καὶ λει-
χῆνας καὶ φακοὺς· ἀχρόες τε καὶ
πίπτει καὶ λέπρος· συν μίλητι
μετὰ δαδίου δὲ καὶ λιβανὸς τὸ ἐ-
ψιδεν, ὁδονταλγίαν διακατά-
μυμον ἐν τῷ στόματι κομφίζει·
μυραλῆς τὲ ὅστι κατὰ πλάσσεια
συν συκῆς φύλλοις καὶ κυμίνῳ.
τῆς δὲ κόμης τὸ ἀπόλειμα ἐξέ-
δησμα ἐμυλίων καὶ δευτέρων 10
ἀγρῶν· περὶ αὐτὸ δὲ καὶ ὑ-
πεθυμιάται. τὸ δὲ ἐξ αὐτῆς καὶ τῆς
μελαίνης ἐλαίας γινόμενον τέμ-
μα, χαλκήμυμον δὲ μύρετον, * οὖρε-
σιν κινεῖ καὶ ἀνασφομοῖ· χρῆσιμον
δὲ καὶ ὑδρωπικοῖς ὅστιν. 15

Περὶ Σκορδοπρασίου.

Κεφ. ρπγ'.

Σκορδοπράσον φύει ὡς πρέ-
σον μέγα, μετέχον τῆς τῶ σκόρ-
δου καὶ τῆς πρασίου ποιότητος·
ὅστιν καὶ τὴν διώκειν μικτὴν 20
ἔχει ποιοῦν ὅσα καὶ τὸ σκόρδον
καὶ τὸ πρέσον· ἀνεμυρόως μὲν
πολλοχαραίνεται ὅς εἰς βρώσιν ὡς
τὸ πρέσον ἐφόμυμον καὶ ἀπογλυ-
κευόμενον.

Περὶ Σινήπεως. Κεφ. ρπδ'. 25

Σίνηπι ἢ νάπτου, ἐκλέγου τὸ
μὴ κατὰ ξηρὸν καὶ κατὰ πύρρον,
ἀδέν, ἀλλ' ὃ δὴ θλαδέν, ἐνδο-
δέν χλωρόν καὶ οἷον ἐγγυλον.
γλαυκόν· πρὸς φατὴν γὰρ καὶ
ἀνμύον

ἀκμάων τὸ πρῶτον. δυνάται
 δὲ διεκμαίνεν, λεπτιώεν, ἐπι-
 σσάδαι, ἀποφλεγματίζεν δια-
 μασπιδέν. μηρίς δὲ ὁ χυλὸς ἀν-
 τὸ ὑδρομέλιτι, πρὸς ἀντιάδας
 5 καὶ τὰς χρονοῖς τραχύτητος τῆς
 ἀρτηρίας καὶ πυλῶδεις, ἀναμαρ-
 γαιζόμενος ἀρμόζει. πρὸς σα-
 ρδὴν δὲ τοῖς μυκτῆρεσι λείων, πῆαρ-
 μὸς κινεῖ. ἐπιληπτικοῖς τε βο-
 ηθεῖ καὶ ὑστερικῶς πνιγμένους διε-
 10 κρίρει· καὶ ἐπὶ λιθαργικῶν κα-
 ταπλάττεται ξυρηδείσος τῆς κα-
 φαλῆς. μυρὶ δὲ σύκοις καὶ ἐπιτε-
 δέν ἀρχιφονίξεως, ἀρμόζει πρὸς
 ἰσχυράδας καὶ σπληνίτας, καὶ κατὰ λου-
 εῖς πᾶν χρόνον ἀλγυναι, ὅπου
 15 μετάρην πὶ ἐν τῷ βάλαντος εἰς
 τὴν ἐμφάνειαν βουλόμεθα τῷ
 τῆς ἐπεροπαδείας λόγῳ. διεκα-
 πνεύει καὶ ἀλωπεκίας κατὰ πηλα-
 δὴν, πρὸς σπονν δὲ κατὰ ῥέρι, καὶ
 ὑπόπια αἶρει σὺν μέλιτι ἢ σέα-
 20 πῇ ἢ κηρωτῇ. σὺν ὄξϊ δὲ πρὸς
 λέπρεας καὶ λεγύνας ἀγρίους πε-
 ειργίεται· πίνεται δὲ καὶ πρὸς
 περὶ ὁδοῦ ἐκέρῳ. ὡς ἀλφίτα ἐπι-
 πασσύμενον τῷ πετῷ, ἐπιπασσι-
 καῖς τε ἐμπλάστοις καὶ ἰωει-
 25 καῖς μίγνυνται χροσάμω· δύσι-
 κοῖας τε καὶ ἥχρος λείων ἐπιπιδέ-
 μενον τῇ ἀκοῇ, μετὰ σύκῳ ὠφε-
 λεῖ. ὁ δὲ χυλὸς αὐτῷ σὺν μέλιτι
 ἀρμόζει, πρὸς τὸ ἀμβλυπίας καὶ
 τραχέα βλέφαρα ἐγχεζόμενος·
 χυλίζει

tempestium habetur. Ad cal-
 faciendū, extenuandū, extrahē-
 dum, efficax est. Ad eliciendam
 capitis puitam manditur: cō-
 tra præduros tonsillarū tumo-
 res, ac veterem callosamq; ar-
 teriæ scabritiē, succus ex aqua,
 & melle, conueniēter gargari-
 zatur: sternutamenta ciet, tritū
 & naribus admotū: comitiali-
 bus quoque auxiliatur. Fœmi-
 nas vuluæ strangulatu oppref-
 fas excitat: lethargicis, derafo
 capite, illinitur cum ficis admi-
 stum, donec rubescat locus, &
 ad coxendicum cruciatus im-
 positum, ad lienes, & omne ge-
 nus dolores confert, cum per-
 mutandæ valetudinis causā, ex
 alto vitia extrahenda sunt. A-
 lopecijs illitū medetur, faciem
 purgat, sugillata cum melle, a-
 dipe aut cerato rapit. Ferè im-
 petigines & lepræ, eo cum ace-
 to perunguntur: contra febri-
 um circuitus aridum bibitur,
 aut potui polentæ modo, in-
 spargitur: extrahētibus empla-
 stris, scabiemq; extenuanti-
 bus, vtiliter admisceri solet: tri-
 tum, grauitati aurium & soni-
 tui, cum fico impositum pro-
 deest. Succus ad hebetudines
 oculorum & genarum scabri-
 tias magna vtilitate illinitur.
 q Expres-

DIOSCORIDIS

Expressus recenti semine succus, in sole siccat.

Nasturtiū. Cap. CLXXXV.

Nasturtium optimum constat esse Babylonicum. Omnium semen est acre: excalfacit, stomacho aduersatur, aluum turbat, tincas excutit, lienem imminuit, partus exanimat, menses cit, venerem stimulat, sinapis & erucæ simile intelligitur. Lepras & impetigines absterget. Illitum cum melle, lienem extenuat, fauos expurgat, pulmonum vitia extrahit, forbitionibus incoctum. Serpantium venenis potum reficit, atque eas suffitu fugat: capillorū defluuia cohibet: carbunculos ad suppurationem perducit, & rumpit: coxendicibus cum polenta commodè ex aceto illinitur, tumores collectionesq; discutit, emittit furunculos, illitum cum muria. Herbarū ad omnia eadem effectus, licet minor.

Thlaspi. Cap. CLXXXVI.

Thlaspi, herbula angustis foliis, digitali longitudine, in terram versis, suppinguibus, in cacumine diuisis: binum dodrantum cauliculo, tenui, non sine adnascentibus ramis: fructu circa ipsum totum, ab extremo

χυλίζει) δὲ ἐπὶ χλωρὸν τὸ σπέρμα, καὶ τὸ ἀποθλίβειν ξηραίνει) ἐν ἡλίῳ. Πρὶ καρδάμ. Κεφ. ρσ'.

Καρδάμον καλλίστην μὲν εἶναι δοκεῖ τὸ ἐν τῇ βαβυλωνίῳ κάρδαμον. πῶς τις δὲ τὸ σπέρμα περιμαρῖν) ἰκόν) δριμύ, κακοστόμαχον, κοιλίας ταρασσόν, καὶ ἑλμινθας ἐκπύρασον, σπληνῶν μειῶν, ἐμβρυάφθισον, ἐμμηναίῳ κινῶν, συναισίων παρέρμων, εἰσὶ δὲ συνήπης καὶ ἐν ὥμα, ἀποσπῆχ' ἐλέσσης, ἰσχυρῶς) σὺν μέλει τὴν δὲ σπληνῶν ταπείνῳ καταπλαστέον, καὶ κνεία ἀποκαθαίρει, καὶ τὰ ἐκ σώματος ἀνάγει ἐκ τῶν φλόγων βροφίμασιν. ἐρπετῶν τε ὅτιν ἀπὸ φάρμακον πνιόμενον, θυμιατῶν δὲ ἐρπετῶν διώκει) τείχους τὴν βροσύνης ἐπέχει) καὶ ἀνδραγας περὶ ῥήθην πνοποιῶν) σὺν ὄξ' δὲ καὶ ἀλείπτεις καταπλαστέον, ἰσχυρῶς) ἀφελῆ καὶ οἰδήμασι καὶ φλεγμονὰς διαφορεῖ, δὲ διωκῶν) 20

τε ἐκ πυρὸς σὺν ἄλλῃ καταπλαστέον, καὶ ἡ πύα δὲ τὰ ὅντα ποιεῖ, ἑλαστον μὲν τοι δυνάται.

Πρὶ Θλάσσης. Κεφ. ρς'.

Θλάσσι βοτανίον) ὅτι σενὸν τοῖς φύλλοις ὡς δακτύλου μῆκος πεπλασῖεν) ἐπὶ τῆς γῆς, ἀκροχρῆσιν) ὑπολειπόμεναι, χαυλὸν δὲ λεπτόν) ἀνήσται διαπλάμναιον) ἀποφυάδας ὀλίας ἔχοντα, καὶ πρὸς ὅλον αὐτὴν κατὰ τὸν σπλάγχνον

ὑποπλάτυς ἐξ ἄκρ᾽ ἐν ᾧ σπρ-
 μάποι ἐμφερές καρδάμα, δισκο-
 ειῆς, οἷον ἐν τε διασπένον (ἐξ
 οὗ καὶ τὸ ὄνομα ἐρχεται) αὐτὸς
 δὲ ὑπολευκόν. ἐν ὁδοῖς καὶ ἐπὶ
 5 ποιχῶν, καὶ ἐπὶ θριγκῶν φύσιν ἔχει
 σπέρμα δριμύ, θερμαντικόν· χο-
 λῶν ἄνω τὴν καὶ τῶν κατὰ ἔσθην,
 ποσὴν πληθὺς ὀξύβλου· ἐγκλύ-
 ζεται δὲ καὶ πρὸς ἰσχυρὰ ἀγρῶν
 δὲ καὶ αἵμα ποσὴν, καὶ τὰς ἐν τῷ
 10 ἀποσάσεις ῥήγισι· κινεῖ δὲ καὶ
 καταμύωια, καὶ ἐμβρυα φθείρει.
 Ἰσορεῖ δὲ κρατέυας καὶ ἔτερον
 διδάσκει, ὅτι πηγὴ σπέρματος ὁ γυνή κα-
 λῶσι, πλατυφυλλον καὶ μεγαλόρ-
 ριζον· καὶ τὸ τοῦ δὲ μίσγεται τοῖς
 15 πρὸς ἰσχυρὰ διακλυσιμαῖς.

Πρὶ Δράκωνος. Κεφ. ραζ'.

Δράκων ἡ πόα πύχνης ἔχουσα
 ὕψος, ῥαβδόεις λεπτὰς, παρ' ἐκ-
 τερα δὲ τὰ φύλλα ὡς σπέρμα λεπ-
 τὰ, ἀπαλώτερα δὲ καὶ λευκότε-
 20 ρα· ἐπ' ἄκρ᾽ ἐν σκιάδιον κατὰ
 σπέρμα ἔχον αὐτὴν λεπτὰ, ταύ-
 τῃς ἡ πόα συνέφυται τῇ πρὸς ἰσχυ-
 ρὰ ἐν κατὰ πόα, ὅτι κατὰ
 πόα αὐτῆς ἐκείνης ἀντὶ πεπερεως
 μίσγεται τοῖς πρὸς σπέρμασιν.

Πρὶ Ερυσίμου. Κεφ. ρη'.

ΕΡΥΣΙΜΟΝ φύεται
 πρὸς τὰς πόλεις, καὶ οἰκόπεδα,
 καὶ κήπους, φύλλα δὲ ὅμοια
 ἐν ῥάμῳ ἀγρῶν ἔχει καυλὸν ἰ-
 25 σχυρὸν τῷ σπέρματι, αὐτὴν μισγεται τοῖς
 πρὸς ἰσχυρὰ.

extremo in latius se panden-
 te: semine nasturtij incluso lé-
 ticulae vasis effigie, nisi quod
 infringitur (vnde nomen ac-
 cepit) flos albicat. Nascitur in
 semitis, & sepibus, fossisque:
 Semen asperi gustus, excalsa-
 ciens: bilem vtrique extra-
 hit, potum acetabuli mensura:
 pdest ischiadicis infusum: san-
 guinem potu educit, internas
 suppurationes rumpit: menses
 ciet, sed partus enecat. Alte-
 rum thlaspi tradit Crateus;
 quod aliqui Persicó sinapi vo-
 cant, latis foliis, radicibus ma-
 gnis: vtile ischiadicorum in-
 fusioni.

Draba. Cap. CLXXXVII.

Draba herba ad cubiti alti-
 tudinem assurgit, tenues spar-
 gens ramos, & ex vtroque la-
 tere folia, ceu lepidij, sed mol-
 liora, & candidiora: in cacumi-
 ne verò sambuci vmbellâ ge-
 rit, cádidos flores habenté. Her-
 ba hæc cú ptisana coquitur, in
 Cappadocia maximè. Semen
 aridû p pipere obsoniis admi-
 scet. Irio Ca. CLXXXVIII.

Erysimon, Latini irioné vo-
 cāt, iuxta vrbes, rudera hortof-
 que nascit, foliis erucæ sylue-
 stris: cauliculis in lori modû lé-
 tis et obsequiosis: florib⁹ luteis;
 q ij filiquis

filiis in cacumine gracilibus, vt fœnogræco, corniculatis: femine nasturtij, exiguo vrentis gustus. Contra thoracis fluxiones efficax est, & si purulenta extusiuntur: regio morbo, & coxendicibus prodest: contra venena in delinctu cum melle datur: illinitur ex aqua aut melle vtiliter cæcis carcinomatibus, parotidibus, duritiis mammarum, & testium inflammationibus. In totum extenuat, & calfacit. Mitius multo ad clysteres fiet, si aqua madescat atque poreatur, vel linteo illigat, pincta farina oblitum perassetur.

Piper. Cap. CLXXXIX.

Piper in India nasci, breui
 arbore traditur: quæ inter ini-
 tia, prælongum fructum, velu-
 ti filiquam promit, quod lon-
 gû piper est: habet int^o aliquid
 tenui milio simile, quod tan-
 dem in perfectû piper euadit.
 Id autem suis tēporibus dehi-
 scens, pandensq; sese racemos
 emittit, grana ferētes qualia vi-
 demus. Ea acerba cādīdum pi-
 per faciūt, aptū ocularibus re-
 mediis, antidotis, & medicami-
 nibus, quæ cōtra venenata pa-
 rantur: theriaca vocant. Lon-
 gum verò vehemētius mordet,
 &

ἀκρων δὲ λοβοὶ κερατοειδεις, ἱ-
αχτοὶ ὡς πῆλιδος· οἱ δὲ σπερμά-
τια μικρὰ καρδία μιν παραπλή-
σια, πυρῶδη κατὰ τὴν γῆυσιν.
πεινώτα πρὸς δώδεκας βενυμα-
ποδον, ἐμπύους, βῆχας· ἵντε-
5 ἐν, ἰοχάδον, ὀκλειχόμενον σὺν
μέλιτι. πινεῖ) καὶ πρὸς τὰ θανά-
σιμα φάρμακα καὶ κατὰ αὐτοῦ με-
νον ἢ μεθ' ὕδατος ἢ μέλιτος, ὁφε-
λεῖ καρκινώματα κρυπτῶδη, σκλη-
εῖας, παρωτίδας, διδύμων καὶ
10 μαστῶν φλεγμονάς. λεπτύνει τὴν
καθόλου θερμαίνει· οἰκτερίζει ἐν
δὲ γίνεται εἰς τὰ ἐγκλύσματα,
ἀποθεραπείν ὕδατι καὶ φωχθῆν, ἢ
ὀφείδων εἰς ὀδοντινὰ καὶ ὀπτηθῆν
15 εἰς αὐτὰ σπληναδένεον.

Πρὸς Πέπερος. Κεφ. ρθθ'.
Πέπειε δὲν δρον ἰσορρεῖται φυ-
λάμουν ἐν ἡδίστα, βραχὺ, καρπὸν
δὲ ἀνίστοι, καταρχαίς μὲν παρ-
μήκη καὶ δαπὲρ λοβούς, ὅσῳ ὅτ'
μακρὸν πᾶσαι ἔχον τὸ ἐν τὸς 20
κρυφῶς παρὰ πᾶσιν, τὸ μέ-
λον ἐστὶν τῶν τέλειον πᾶσαι. ὁ-
περ κατὰ τὸς οἰκείους χαμενὺς
ἀναπλούμουν. βότρεις ἀνίστοι,
κόκκους φέροντας οἷους ἴσμεν.
τὸς δὲ, καὶ ὁμοφασίαις, οἱ π- 25
νεις εἰσι τὸ λευκὸν πᾶσαι, ἐν-
δεστωῖν μάλιστα εἰς τὰ ὀφθαλ-
μικὰ καὶ ἀντιδότους καὶ θηλει-
ακὰς διωμάειν. ἔστι δὲ τὸ μὲν
μακρὸν ὀπιτετυμῶν τῇ δύνει, καὶ

καὶ ὑπόπικρον, διὰ τὸ ἄωρον,
καὶ ἐπιήδειον εἰς τὰς ἀντιό-
τους καὶ θηριακάς θυνάμεις.
τὸ δὲ μέλαν ἥδιον καὶ δριμύ-
τερον τῷ λευκοῦ, καὶ ὑποσμώ-
5 τερον, καὶ μᾶλλον διὰ τὸ εἶ-
ναι ὤκειμον ἀρωματίζον, ἐν-
χρηστότερον τε εἰς τὰς ἀγρύ-
σεις. τὸ δὲ λευκὸν καὶ ὀμφα-
κίζον, ἀδυνέστερον τῶν παρει-
ρηθῶν. ἐκλέγου δὲ τὸ βαρύ-
10 τατον καὶ πλήρες, μέλαν, μὴ
σφόδρα ῥυτὸν, πρὸς σπασιν δὲ
καὶ μὴ πιτυρώδες. σφείσκειται
δὲ τι ἐν τῷ μέλανι ἄτρεφον, κε-
νὸν καὶ κοῦφον, ὃ καλεῖται βράσμα.
Διαιτῶν δὲ ἔχει κοινῶς θέρμαν
15 πικρὴν, οὐρητικὴν, πεπτικὴν, ἐπι-
σπαστικὴν, διαφορητικὴν, σπληνι-
κὴν, πῶν τῶν κόρας ἐπισκοποῦν-
των ἀρμόζει καὶ ῥίγας πλειοδικαῖς
πνέμενόν τε καὶ συγχροῦν.
καὶ θηριοδύκτοις ἀρήγει, ἀγει καὶ
20 ἐμβρῶν. δοκεῖ δὲ καὶ ἀτόκιον
εἶναι μετὰ συνοίσαν πρὸς σφί-
νδρον. βελί τε καὶ πᾶσι τοῖς
πρὸς θέρμαν, πᾶσι δὲ ἀρμόζει,
ἐντε ἐκλεπτικῶς καὶ ποτήμασι
λαμβανόμενοι. καὶ συνάγχει
25 ἀρμόζει διαχροῦν συνωμέ-
λιπ. καὶ εὐφους λύει πνέμε-
νον μετὰ δάφνης φύλλων ἀπα-
λῶν. ἀποφλεγματίζει δὲ συν-
σφίδι διαιμασύνει ἀνιδρωγόν
τε ὅτι καὶ ὑγρηνόν. καὶ ὀρεξίν κινεῖ.
πίει

& quoniam prius q̄ emature-
scat decerptū est, subamarum
relinquitur, antidotis & theria-
cis medicaminib⁹ expetitū. Ni-
grum verò, vtpote quod tépe-
stiuā maturitate collectum sit,
odoratum esse cōstat, candido
suauius, acrius, & ori gratius
necnon ad condimēta vtilius.
Sed candidū, & adhuc in acer-
bū vergēs antē dictis infirmius
est. Eligi oportet grauissimum,
plenū, nigrū, sine multis rugis,
recēs ac minimē furfurosum.
Inueniuntur etiamnum in ge-
nere nigri semina nutrimento
defecta, cassā, inania, minimi-
que pōderis quod vocāt bra-
sma. Vis omniū exalfacit, vri-
nā ciet, cōcoquit, extrahit, dis-
cutit, abstergit caliginē q̄ ocu-
lis obuerset. Piper, febrīū hor-
rorib⁹ circuitu repetētibus, si-
ue potu, siue illitu, subuenit: ser-
pentīū morfib⁹ auxilia, part⁹
extrahit, cōceptū adimere cre-
dit, statim à cōcubitu supposi-
tū: tussi, oibusq; pectoris vitiis,
siue eclegmate, siue potu, suc-
currit: angine eo & melle cōue-
niēter pungunt: potū cū recētī
b⁹ lauri foliis, tormina discutit:
cū vua passā māducatū, pituitā
à capite elicit: valetudinē tuet,
dolores finit, appetētiā mouet:
q̄ iii) cōco-

DIOSCORIDIS

concoctionē adiuuat, ad intin-
ctus esculentorum additū: stru-
mas cū pice discutit: vitilignes
ex nitro emaculat. Ficili no-
uo, vt lenticula, motū torretur.
Nō est huius arboris radix gin-
giber, vt aliqui existimauēre, si-
cuti paulō pōst ostēdem⁹. Nā-
que piperis radix costo similis
est, ora gustantiū accendit, sa-
liuam ciet. Hęc lienē reprimi-
t, cū aceto illita, aut pota: caput
etiam purgat, manducata cum
semine pedicularis herbæ, quā
staphidem agriam vocant.

Gingiberis. Cap. CX.C.

Gingiberis sui generis plāta
est, i Troglodytica Arabia ma-
gna ex parte nascēs: qua virēte,
ad multa, perinde atq; nos ru-
ta, vtūtur, & primis potibus &
eduliis admiscēt. Huius radi-
ces, cyperi modo, parue sunt,
candicātes & odoratæ, atq; pi-
per sapore imitantur. Eligi de-
bēt quę teredines nō nouerūt.
A multis tamen ob id cōdiunī,
q̃ celeriter cariē sentiāt, ac fi-
cilibus in Italiam asportātur.
Gingiberis cibo cōueniēs est,
& cū cōdimēto assumit. Excal-
factoriā vim & excoquentem
habet: aluū leniter emollit, sto-
machovtilis est, efficax aduers⁹
ea q̃ oculis caliginē offundūt.

In

πέσει τὸ συνεργεῖ μὲν ὁ μύρον ἐν
βάμμασιν. ἀναλκωσεν δὲ πύση
χοιρῶδες διαφορεῖ. σμύχει δὲ
ἀλφούς συν νίτρω· φώρηνται δὲ
ἐπ' ἰσθῶκε καὶ νῦν ἐπ' ἀνδράκων,
κινούμην ὅς φακί. ἢ ὅ ρίζα αὐτῆς
τῆς, οὐκ ἔστι ζηρίβρ καὶ δάσος ἔ-
ννοι ὑπελάβον, ὡς αὐτῆκα δηλώ-
σονται. ἔοικε μὲν τοι κόσμῳ ἢ τῷ
πεπτερέως ρίζα, θερμαίνουσα τὴν
γαστρίην καὶ ἰσθῶκα περσκαλουμένη.
ταπεινοὶ δὲ σπληνῶσιν συν ὕδατι καὶ
ταπασσομένη καὶ πνομένη· ἀπὸ
φλεγματίζῃ δὲ μετὰ σαφίδος ἀ-
γίας μασηθεῖσα.

Πρὸ Σηριβέρεως. Κεφ. ρς'.

Σηριβέρις ἰδιον ὅστις φυτὸν,
θινώμην ἐν τῇ περσκαλουμένη 15
καὶ ἀραβίᾳ πλείστον· οὗ ἔχον-
ται τῇ γλώτῃ εἰς πολλὰ καὶ δά-
περ ἡμεῖς τῷ πηγάῳ ἔχοντες εἰς
περσποπομοὺς καὶ ἐλῶματα μι-
γνῶτες. ἔχει δὲ ρίζα μικρά
ὡς τῶν κυπρίων, ὑπελευκα-πε 20
πέζοντα τῇ γαστρί, καὶ ἐν ὅ-
δῳ, σπληνῶσιν δὲ τὰ ἀτερδονίκα.
ὑπὸ ἐλίων μὲν τοι ταπεινέται
διὰ τὸ εὐσηπτον, καὶ διακο-
μίζεται καὶ αἰμοῖς εἰς ἰταλίαν.
ἐν ἔχοντι εἰς βρώσιν, λαμβά- 25
νεται δὲ μετὰ ταίριον. Διὰ
μιν δὲ ἔχει θερμαντικὴν, πεπτι-
κὴν, μαλακτικὴν κοιλίας ἐπει-
κῶς, ἐν σόμαρον. ποιεῖ καὶ περὶ
τὰ ἐπιστοτοιῦτα τῆς κόρας·
μύρον

μήνυσται ἢ ἀντιδόποις, ἢ κα-
τολὸν παρὶοικέ πως τῇ τε πε-
πύρεως διωάται.

Πρὶ τ' ὕδροπεπέρεως. Κεφ. ρς α'.

Ὑδροπέπερα φύεται μὲν μάλι-
στα παρὰ τὰ σίμοις ὕδασι ἢ ἐπι-
εικίσι ρείθροις· χαυλὸν δὲ ἄνισσι
ρονατόδῃ, σερῶν, ἀπὲρ ὃν μαρμα-
λαι καὶ φύλλα ἐοικότα ἡδυσμῶ,
μείζονα δὲ καὶ τρυφερότερα. καὶ
λευκότερα, δριμύτα ἐν τῇ γούσει
10 ὥσπερ τὸ πέπερα, οὐ μὲν ἄρωμα
πιζόντα καρπὸν δὲ ἔχει ἐπὶ κλω-
ναρίων μικρῶν ἐκφυόμενον παρὰ
τὰ φύλλα, συμμιγῆ καὶ βωβυάδῃ,
δριμυὴ καὶ αὐτὴν. Διωάται ὅτι ἔ-
χει τὰ φύλλα σὺν τῷ καρπῷ καὶ
15 ταπλαντομέρα, οἰδήματα καὶ χρο-
νίης σκληρίας διαφορεῖ· ὑπόπια
τ' ἀποκαταίρειν, ἐκρῶνέντα δὲ καὶ
κοπέντα, μήνυσται ἀπὲρ πεπύρεως
ἀλλοὶ καὶ παρὰ τὴν ἡμασι, ρίξας δὲ
ἔχει μικρὰν ἀρχήν.

20 Πρὶ πταρμικῆς. Κεφ. ρς β'.

Πταρμικὴ θαμνίνη ὅτι κλω-
νας ἔχον μικροὺς πολλοὺς, περὶ-
φύς, ὁμοίους ἀβροτόνῳ· ἀπὲρ οὗς
φύλλα ἐπιμικρὰ, ἐοικότα τοῖς τ'
ἐλαίας, πολλὰ, ὥσπερ ἄκρω δὲ ὥσ-
25 περ ἀνθεμίδος κεφάλιον μικρὸν.
ἀπειρετές, δριμυὴ καὶ ὁσμυή, ἐ-
ρεθιστικὸν πταρμικῆς ὅταν καὶ ὀνόμα-
σαι, διωάται δὲ κατὰ τὰ καυτομέ-
ρα τὰ φύλλα μὲν τ' ἀνθῶν ὑπό-
πια αἶρειν, τὰ δὲ ἀνθῶν, πταρμικῆς,
ἐνεργέστερα

In antidota addi solet. In sum-
ma piperis viribus respondet
Hydropiper.

Cap. CXCI.

Hydropiper apud aquas
nascitur, quæ stagnant, aut pi-
gro lapsu repunt: caulem ædit
geniculatum prædurum, mul-
tis alis concavum: folia men-
tha, maiora, molliora, candi-
dioraque, gustu piperis, acri-
citra tamen ullam odoris gra-
tiam: fructum acrem, in fur-
culis parvis, prope folia race-
matim coherentē. Folia cum
femine illita tumores veteres-
que durities discutiunt, fugil-
lata delent: quæ postquam in-
aruerunt, tusa pro pipere
in obsoniis admiscen-
tur. Radix parva,
nullius in medi-
cina momenti.

Parmica. Cap. CXCII.

Parmica exiguus frutex est,
furculos habēs paruos, multos,
& rotundos, abrotono nō dif-
similes: & circa eos folia oleæ,
longa, multa, & in cacumi-
ne capitulum, vti anthemidis,
paruum, rotundum, quod suo
acri odore sternutamentū ex-
citāt, unde nomen accepit. Fo-
lia cū floribus illita, fugillatio-
nes rapiūt. Flores sternutamenta
q. iiii effica.

DIOSCORIDIS

efficacissimè mouët. Nascitur in montibus & petrosis.

Radicula seu lanaria herba. Cap. CXCHL.

Struthium herba vulgò nota, qua purgadis lanis vtuntur, qui eas eluunt. Huius radix est acris: vrinam ciet: prodest tussi, iocinerosis, orthopnoeae ex melle sumpta, cochlearis menfura, aluum soluit. Eadem cum panace & capparis radice calculos frangit, & cum vrina exturbat, duritiâ lienis absumit: menses imposita trahit, partus efficaciter enecat. Cum polenta autem & aceto illita, lepras tollit: tubercula discutit, cum farina hordeacea & vino decocta. Miscetur & malagmatis, & ocularibus collyriis, claritatis causa. Sternutamenta mouet, per os purgat, trita cum melle, & naribus infusa.

Cyclamin⁹. Cap. CXCHIII.

Cyclamin⁹ folia habet hederæ, purpurea, varia, in quib⁹ supra infraq; albicât maculæ: caule nudo, quaternos digitos equâtes florib⁹ in eo purpureis, rofarû effigie: radice nigra, & ali quantum lata, vt rapum videri possit. Quæ cum hydromelite pota pituitâ aquamq; detrahit: menses

εναργέστατα κινεῖ. φύεται δὲ ἐν ὄρεσιν καὶ πετρώδεσι τόποις.

Πρὶ Σβηθίου. Κεφ. ρςγ'. Σπρούδιον γυναικῶν ὄζει, ὃ οἱ ἐπεισπνύται χροῖνται παρὰ καὶ δασύν τῶν ἐείων. οὗ ἡ ρίζα δὲ δειμῖα καὶ οὐρητικὴ· βουδεῖ δὲ ἡπατικοῖς βελῖν, ὁρδονοῖαις συν μέλιτι, κοχλιαεῖου πλῆθος λαμβανόμεν· κοιλίαν τὲ καθαίρει. συν δὲ πύλαι καὶ καρπάρως ρίζῃ ληφθέν, λίθοις ἐρύπτει, καὶ 10 ἐξουρεῖν ποιεῖ· καὶ σπληνῶν ἐσπέρωδρον τήκει· παρὰ τὸν δὲ ἐμῖαν ἄγει, καὶ ἐμῖαν φθεῖρε· ἐναργῶς. συν ἀλφίτῳ δὲ καὶ ὄζει καταπλάσσειν, λέπραν αἰρεῖ. Διαφορεῖ καὶ τὰ φύματα 15 συν ἀλείσει κριθῶν καὶ οἴνῳ ἐψηθέν. μίγνυται δὲ καὶ κολληεῖοις ὀξύτεραι καὶ μαλάγμασι· κινεῖ δὲ καὶ πλάρους. καὶ εἰς τὰς ρῖνας δὲ ἐγγερόωδρον λείπον μετὰ μέλιτος, καθαίρει διὰ 20 ματος.

Πρὶ Κυκλαμίνης. Κεφ. ρςδ'.

Κυκλάμιγος φύλλα ἔχει ὁμοία κισσῷ, πορφύρεα, πενίλα, κατωθὺν δὲ καὶ αἰσθύνει κινῆσιν ὑπολεύκοις· χαμυλὸν δὲ τετραδύκτυ. 25 λον, γυνὸν ἔφ' οὗ ἀνθ' ὁρδοῖται· παρὰ τὸν δὲ ρίζαν μέλιτι παρὰ πλῆθος, ὑπερπύλαι τῶν ἢ τις ποθεῖται μὲν ὑδρομέλιτος, ἄγει φλέγμα καὶ ὑδαρ κατὰ καὶ

καὶ ἔμμηνα δὲ κινεῖ πινόμενη καὶ
 προσθεμένη, φασὶ ὅτι αὐτὴ ὑπερβῆ-
 ῖ πρὶν εἶναι μὴν γυνή, ἐξαμβλω-
 τειν αὐτήν. ἔστι δὲ καὶ ὁξύτονον πε-
 ριαπινόμενόν πίνεσθαι πρὸς τὰ θα-
 νάσιμα μετ' οἴνου, καὶ μάλα κατὰ πρὸς
 λαγῶν θαλάσσιον· καὶ ἐρπετῶν ἐ-
 στιν αὐτὰ φάρμακον κατὰ πλάσσο-
 μένῃ μεθύσει τε οἴνῳ μιχθεῖσιν.
 καὶ δισκοῖς δὲ καὶ ἵκτερον βιδῶν δρα-
 χμῶν πλῆθος ποτίζειται, καὶ γλυ-
 κέος ἢ μέλιμιράτου ὑδατοῦς, κατὰ
 κλίνην δὲ δεῖ ἐν οἴκῳ θέρμερον πίν-
 νοντα, καὶ πλείοσιν ἱματίοις περι-
 βεβῆκεν ὅπως ἰδρώσει· ὅτι ἀποκριό-
 μινος ἰδρώς, χαλῶδης κύρισκεται
 τῇ χειρὶ. ἐγχυματίζειται δὲ καὶ ὁ γυ-
 νῆος αὐτὴ μετ' ἐλάτου εἰς τὰς εἴνας
 πρὸς κάρσιν κεφαλῆς καὶ τῶν θα-
 κιλίων ἐν ἐρίῳ προσθεῖναι πρὸς κο-
 μιδίαν περιπλομάτων· κατὰ χει-
 ρέντος δὲ αὐτῆς ἐπ' ὀμφαλῶς καὶ ὑ-
 πογαστρὶ, καὶ ἰσχίῳ, κοιλίαν μετὰ
 σφῆλαι καὶ ἐκβωσμεῖς ἐργάζεσθαι· καὶ πρὸς
 τὰς ὑποκεχυμένους καὶ ἀμβλυοπῆν-
 τας ὀφθαλμούς· ἐλκεῖ μινος ὁ γυνὴς
 σὺν μέλιτι ἀρμόζει. μίγνυναι καὶ εἰς
 τὰ φάρμακα ἔδραν δὲ πρὸς πρὸς
 σὺν ὄξει κατὰ χειρὶ μινος ὁ γυνὴς
 καὶ δισκοῖς, χαλῶδης δὲ ἢ ἡρίκα κοπιο-
 μένη καὶ ἐκβωσμεῖς, ἐλκεῖ μινος τῶ
 γυνὴς ἀρχὴ μετὰ τῶν συστάσεως.
 εὐπλῆς δὲ καὶ χεῖρα ἢ ἡρίκα καὶ ἐξαν-
 θήματα σελλῆς καὶ βράματα μετ'
 ὄξους καὶ αὐτὴν δὲ καὶ μετ' ἐλάτου
 ἰατρικῶς κατὰ

menes potu appositivē ciet.
 Tradunt si prægñans radicem
 transgrediat, abortum fieri.
 Partum appensa accelerat: con-
 tra venena, præsertim leporis
 marini, ex vino bibitur: illita
 contra serpentium ictus, reme-
 dio est: immista vino inebriat:
 regium morbum discutit, tri-
 bus drachmis pota, cum pas-
 so aut diluto mulsò. Sed opor-
 tet eum qui ebibit, multis ve-
 stibus contectum, loco calido,
 & à perfrictionibus tuto, re-
 cumbere, quò facilius exudet:
 ciecti autem sudores fellei co-
 lore inveniuntur. Succus eius ad
 purgandum caput, naribus in-
 funditur: ad deiicienda quoque
 alui excrementa, in vellere fe-
 di subiicitur: illito umbilico &
 imo ventre coxarum tenuis, al-
 uum emollit, & abortu efficit:
 suffusionibus, & retusæ ocu-
 lorù aciei, oblitus cum melle
 succus prodest. Medicamen-
 tis abortum inferentibus ad-
 miscetur. Succus cum aceto il-
 litus, prociduum sedem resti-
 tuit. Exprimitur tusa radice suc-
 cus, & ad mellis crassitudinem
 decoquitur. Radix cutem pur-
 gat, eruptiones papularum re-
 primit, vulneribus ex aceto
 per se aut cum melle medetur,
 lienem

DIOSCORIDIS

lienem absุมit: vitia cutis in facie, & alopecias emendat: eius decocto luxata, podagras, & capitis vlcuscula, pernio- nésque foueri congruum est: ipsáque in oleo vetere ferue- facta, illito oleo, vlcera ad ci- catricem perducit. Cauata ra- dix oleo expletur, & cinere fer- uenti imponitur, adiecto in- terdum Tyrrenicæ ceræ mo- mento, vt surigenti crassitudi- nem vnguentum cōtrahat, cū primis vtile pernionibus. Ra- dix, scillæ modo, concisa repo- nitur. Narrant ad amatoria af- fumi contusam, & in pastillos diuisam. Nascitur in vmbrosis, maximè sub arboribus.

Altera cyclaminus.

Cap. CXC V.

EST & altera cyclami- nus, quam cissanthemon aut cissophyllon vocant: foliis he- deræ, sed minoribus: geni- culatis caulibus, crassisque, circa vicinas arbores, capre- olorum modo, se voluen- tibus: flore candido, odora- to: acinis hederæ mollibus, lenti gustus, aliquantulum a- cris: radice superuacua: na- scitur in asperis. Huius acini, dradchmæ vnus pôdere poti- cum

ἰατρικῶς καταπλασσομένη ἢ ἀπὸ πλῆ-
να πίνει· ἀποκαθαίρει δὲ καὶ ἕρπ-
ην καὶ δὴ ὥπερίαι· ἐνδεύεται δὲ καὶ
σπέρματι καὶ ποδάγραν, καὶ
τὰ ἐν κεφαλῇ ἢ κύδιαι καὶ χυμ-
ατὰ τὰ ἀπὸ ψήματος αὐτῆς κατα-
πλοῦνται· αὐτῇ δὲ ἑλαίου πα-
λαιοῦ ἀναμιχθεῖσα, ἀπουλοῖ κα-
ταχρησμοῦ ἢ ἐλαίου, ἐγκοιταν-
δεῖται δὲ πλεονεῦται τῷ ἐλαίῳ, καὶ
πίσεται ἐπὶ θέρμοσποδιᾷ, προσ-
εμειχθεῖ· ἢ ἐνίοτε καὶ κυρὴ τυρρην-
νικῇ ἐλίζον, ὡς γλοιώδεις γινώσκται
κατὰ χρισμὰ ἀριστον χυμὸν ἰατρικῶς.
ἀπὸ πίσεται δὲ ἢ ῥίζα τμηθεῖσα
ὡς σπέρμα, ἰσορεῖται δὲ καὶ πρὸς
φίλβα αὐτὴν λαμβάνει· καὶ πρὸς
αὐτὰ καταδεύεται ἢ εἰς προχύ-
σιν· φύεται δὲ ἐν συσκότι· τίπτεται.
μάστιγα δὲ ὑπὸ τὰ δένδρα.

Περὶ ἑτέρας κυκλαμίνης.

Κεφ. ρςε.

Κυκλάμινος ἑτέρα, καὶ ἔνιοι
κισάνθημον ἢ κισόφυλλον κα-
λοῦσι· φύλλα ἔχει κισσῶ ἐνικότα,
ἐλάσσονα δὲ· χαμλοὺς παχέας ρο-
νατόδεις, σπειροειδοῦς τοῖς
παρσκεινέμοις δένδρεσιν ἐλικοῦ-
δῶς· ἀνθὴ λευκὰ, ἐνάσθη. καρ-
πὸς δὲ ὡς ῥάγες σαφυλῆς, ὁμοί-
ος κισσῶ, μαλακός, δριμύς ἐν
τῇ γούσει ἡρέμα, καὶ γλίγρος·
ῥίζα ἄχρηστος· φύεται δὲ ἐν πε-
χέσι χυεῖσι. ταύτης ὁ καρπὸς
ὅσον < μία τὸ πλεονεῦσαι πινόμενος
μετ'

μετ' οἴνου λευκοῦ κυάθων β' ἐπὶ
ἡμέρας μ', σπλῆνα τίθει δι' ἕξων
καὶ κοιλίας διαπανόμενον. πίνεται
δὲ καὶ πρὸς ὀρθοπνοίαν. καὶ τὰς ἐν
τοιαύτῳ καὶ τείρει ποτεῖται.

Περὶ Δρακοντίου.

Κεφ. ρςς'.

Δρακόντιον ἔχει φύλλα κισ-
σοειδῆ, μεγάλα, σπῆλοις ἔχοντα
λευκοῖς· καρπὸν δὲ ὀρθόν, διπ-
χυν, ποικίλον, θριβεῖν διαπόρ-
10 φερει τοῖς σπῆλοις, βακτηρίας τὸ
πάρχον· καρπὸς δὲ ἐπ' ἄκρον βο-
τρυώδης, χρῶματι τὸ μὲν πρῶ-
τον* χλωρόν, πεπανθεὶς δ' κρο-
κίζων, ἐπιδύκνων τὴν γέυσιν· ῥί-
ζα ποτὶς στρογγύλη, βολβοειδής,
15 ὁμοία ἀφ' φλοιὸν ἔχουσα λεπτόν.
φύεται ἐν συκίοις καὶ φραγμαῖς
καὶ αἰμασι. Δυναμὴν δὲ ἔχει
ὁ καρπὸς χυλιδεῖς καὶ ἐγγυμα-
πιδεῖς μετ' ἐλαίου εἰς τὸ οἶον, ὡ-
ταλγίαν παύειν· εἰς δὲ τὰς ῥίνας
20 πρὸς τὸ μένος ἐν εἰώ πολυποῦ
δυναμὴν κατὰ χυλιδεῖς δὲ τέλ-
λειν καὶ καρμινώματα. ποτὶν τὰς
δὲ ὄσων λ'. κόκοι μετὰ ὀξυκρά-
του ἐξαμυλωποισι· καὶ τὴν ὀσ-
μὴν δὲ φασι* μετὰ τὸν μαλασ-
25 μόν τῆς ἀνθρώπου ἀπὸ συνει-
λημμένων ἐμβρύων φαρμακὸν εἶ-
ναι. ἢ δ' ῥίζα θρυσαντικὴν ὄσιν, βοη-
θεῖ ὀρθοπνοίας· ῥήγματος, σπῆσ-
ματος, βηξί, κατάρρῳ* καὶ τὰ ἐν
πύρεσιν ὑγρὰ ἐυανάγκωα πίνει,
ἐφθῆ

cum vini albi cyathis duobus,
quadraginta diebus, lienē per
vrinam & aluum absumit. Ad
orthopnoeā bibitur. reliquias
à partu purgat.

Dracunculus.

Cap. CXCVI.

Dracunculus folio constat
hederaceo, magno, cādidis no-
tis insigni: caule recto, bicu-
bitali, verficolore, maculis res-
perlo purpureis, ita ut anguē
planē referat, baculi crassitu-
dine: fructus summo caule ra-
cematim cohæret, colore pri-
mum herbaceo, & cum ema-
turuir, croceo, gustu feruens,
mordaxque: radice aliquantul-
um rotunda, bulbosa, aro non
absimili, tenui obducta cor-
tice. Nascitur in sepibus vm-
brosis. Seminis succus cum o-
leo instillatus, aurium dolorem
mitigat: naribus etiam ex la-
na impositus, polypum abfu-
mit: carcinomata illitu fistit:
triginta eius grana, si in posca
bibantur, abortus inferunt: o-
dorem aiunt posteaquam flac-
cidi flores emarcuerūt, concep-
tus adhuc teneros enecare.
Radix excalfacit: orthopnoeis,
ruptis, vulsis, tussi, defullatio-
nibus, auxiliatur: humores pe-
ctoris excreatu faciles reddit,
fiue

DIOSCORIDIS

siue cocta tostaque cum melle, aut per sese edatur, siue farina eius ex melle delingatur: vinam pellit, venerem excitat, cum vino potato phagedenas vlcerum, & quæ cacoëthe vocantur, trita cum melle & bryonia alba, expurgat, & ad cicatricem perducit: collyria ex ipsa ad fistulas & eiicendos partus fieri solent. qui radice suas manus perfricuerunt, à viperis feriri negantur: illita ex aceto, vitilignes emaculat. Folia recentibus vulneribus, linamentorum vice, conuenienter imponuntur: decocta in vino pernionibus apposuisse prodest: caseus foliis inuolutus, à putredine defenditur. Succus radicis ad nubes, albugines, & oculorum caligines conuenit. Radix cruda coctave, ad sanorum vsus, pro olere recipitur: in Gymnesius insulis, quæ Baleares vocantur, coctam radicem cum melle multo, in conuiujs placentarum loco offerunt. Radix mæsisibus effoditur, lotaque frustatim conciditur, & lino traiecta, sicatur in vmbra, & ita reconditur.

Arum.

Περὶ Ἀρου.

ἐφθί τε καὶ ὁππῇ μετὰ μέλιτος καὶ χαρ' ἐαυτῷ βιβρωσκοῦν. 5
ἐπεὶ δὲ λεία συνὲ μέλιτι ἐκλείχεται. ἔστι δὲ οὐρητικὴ, ὁρμᾶς τε πρὸς σωκοσίαν ἐγείρει πνομῶν μετ' οἶνου· καὶ ἔλκεα χαλῶν καὶ 5
φαρμακωνικῶν μετὰ βρυωνίας λευκῆς συνὲ μέλιτι λεανθεῖσα ἀνακαταίρει καὶ ἀπουλοῖ. καὶ κολλύρια ἐξ αὐτῆς ἀσπλάγεται πρὸς σφειγγας, καὶ ἐμβρύων κομιδῶν. 10
φασὶ δὲ ὅτι καὶ εἰ διατεῖλει πρὸς τὰς χεῖρας τῇ ρίζῃ, ἀπὸ ἐχιδνῆς ἄδνηκτος μύρει· ἀποκαταίρει δὲ καὶ ἀλφειοῖς συνὲ ὄξει κατὰ χεῖρας εἶσαι. τὰ δὲ φύλλα λεία ὅπῃ τῶν νεοσσώτων ἀντὶ μύτων ἐπιπείμωρα ἀρμόζει· καὶ πρὸς χιμεῖλα 15
ἐψηθέντα ἐν οἶνῳ καὶ ἐπιτεθέντα· τυρὸς τε ἐνελκούμωρος τῆς φύλλοις, ἄσπητος διαμυρῶ, ὃ ὅ γινώσκος τῆς ρίζης ἀρμόζει πρὸς νεφελίαι, καὶ λευκώματα καὶ ἀχλὺς. 20
λαχναίνεται δὲ ἡ ρίζα καὶ πρὸς τὴν ἐν ὑγείᾳ χεῖρσιν, ἐφθί τε καὶ ὁμῇ ἐδομῶν· οἱ δὲ ἐν ταῖς γυμνήσι νήσοις, καλεσμένους ὅ καλεῖσθαι, ἐφθῶν ἢ ρίζαν μυγνῶν τις μέλιτι πολλῷ ἐν τοῖς σωδείωνοις, ἀντὶ πτελοῦσιν παρὰ 25
πιδέασιν. ἀποτίθεσθαι δὲ δεῖ τὴν ρίζαν ἐν πυρραμνῶν ὀρύξαντας καὶ πτωχῶντας καὶ κατατεμόντας. ἐνείραντας τε λίνῳ καὶ ἐνείραντας ἐν σκιδῶ.

Περὶ Ἀεϋ. Κεφ. ρςζ'.

- Ἀεϋ τὸ καλούμενον παρὰ σύ-
 ρεις λέφα, φύλλα ἀνίστην ὅμοια
 τοῖς τῷ δράκοντι, μακρότερα δ'
 5 καὶ ἀσπιότερα· χαμλὸν σπιδάμι-
 5 αῖον, ὑποπέφυεν. ὑπερεῖδ'· ἐφ'
 οὗ ὁ καρπὸς κροκίζων· ρίζα λευκὴ
 πρὸς τὴν τῷ δράκοντι, ἥ τις καὶ
 ἐδίδεται ἐφοδὸν ἢ πῶν οὖσα δρι-
 μεία. πειχέμεται δὲ τὰ φύλλα
 εἰς βρώσιν, καὶ κατ' ἐαυτὰ ξηρα-
 10 νύονται ἐφοδὸν ἐδίδεται. Δυνά-
 μιν δὲ ἔχει ἡ ρίζα καὶ τὸ σπέρμα
 καὶ τὰ φύλλα τὴν αὐτὴν τῷ δρα-
 κοντι. πικρὴ δ' ἡ ρίζα καταπλασ-
 σι μὲν* συν βολβί τω ἐπὶ πεδα-
 ρεῖων. ἀποτίθεται δὲ ὡς ἡ τοῦ
 15 δράκοντος, καὶ κατόλου βῆθ' διὰ τὸ
 μὴ λίαν δριμύ ἐδώδιμος.

Περὶ Αἰσαύρου. Κεφ. ρςη'.

- Αἰσαϋρον βῆθ' μικρὸν βοτά-
 νιον, ρίζαν ἔχον ὡς ἐλάας, ἔστι
 δὲ δεινότερα τοῦ ἄεϋ· ὅθεν
 20 ῥομάς ἴσπσι καταπλασσομένη
 κολλυεῖά τε πρὸς σείγγας ἐν-
 αργὴν ἐξ αὐτῆς γίνεται. φθεῖρεται
 δὲ καὶ αἰδοῖον παντὸς ζώου* ἐν-
 τεθεῖσα.

Περὶ Ασφιδέλου. Κεφ. ρςθ'.

- Ἀσφιδέλος φυτὸν τοῖς πλείστοις
 γινώριμον, φύλλα ἔχον πρὸς σπῶ
 25 μεγάλῳ ὅμοια· χαμλὸν δὲ λεῖον,
 ἔχοντα ἐπ' ἀκρὲς αἰδος καλὸν με-
 ρον ἀφθεῖκον. ρίζαι δὲ ὑπερσιν
 ἐπιμήκεις, στρογγύλαι, βαλαίοις
 ὅμοιαι,

Arum. Cap. CXCVII.

Aron, apud Syros lupha vo-
 citatum, folia emittit dracun-
 culi, sed longiora, & pauciori-
 bus distincta maculis: caulem
 suppurpureum, dodrantalem,
 pistilli specie, à quo croceum
 semen exit: radice dracunculi
 alba, quæ decocta estur, vtpo-
 te cum minus acris sit. Folia ad
 esum condiuntur, & arida per
 se, decocta manduntur. Radix,
 semen & folia, dracunculi vi-
 res habent. Priuatim radix ex
 fimo bubulo podagris illini-
 tur, & dracunculi more repo-
 nitur. In totum, ob mitiorem
 eius acrimoniam, in cibum ex-
 petitur.

Arifarum. Cap. CXCVIII.

Arifarum exigua herbula est,
 cuius radix oleæ magnitudine
 implet, longè maioris quàm a-
 ron acrimoniam: vnde illitu no-
 mas sistit. Fiunt collyria ex ea,
 ad fistulas efficacia. Illitu radi-
 cis, genitale animalis cuiuscū-
 que in perniciem agitur.

Hastula regia. Cap. CXXCIX.

Hastula regia vulgaris noti-
 tiæ est, foliis maioris porri: cau-
 le leui, ferente in cacumine
 florem, quem anthericon ap-
 pellant: radices subiacent ob-
 longæ, rotundæ, glandibus si-
 miles,

DIOSCORIDIS

miles, gustu acres, quæ exal-
faciunt: vrinæ & menses epo-
tæ ciunt: lateris doloribus, ru-
ptis, conuulsis & tussibus, dra-
chmæ pondere potæ ex vino,
medentur. Ea verò vomitio-
nes adiuuat, ludicri tali ma-
gnitudine commanducata: à
serpente demorsis datur aptif-
simè, verum trium drachma-
rum pondere, foliisque flori-
bus & radice ex vino, morfus
illinire oportet. Item vlcera
sordida & depascentia, mam-
marum quoque & testium in-
flammationes, tubercula, fu-
runculósque, decoctis in facie
vini bulbis, recentibus inflam-
mationibus ex poléta auxilia-
tur. Radicis succus adiecto ve-
tere vino dulci, myrrha & cro-
co decoquitur, fitque perquam
vtile oculis medicamētum: ad
purulentas aureis per se, & cū
thure, melle, vino & myrrha
tritum, prodest: in contrariam
aurem infusus, dentium dolo-
rem mitigat. Cinis è radice il-
litus, alopecias ad pilum re-
ducit. Oleum in excauatis ra-
dicibus igni decoctum, illitu
exulceratis pernionibus & am-
bustis igni, conducit: & surdi-
tati, instillatum in aurem, auxi-
liatur. Candidam vitiliginem,
linteo

ὁμοίαι, δριμύειαι καὶ τῷ γένει, καὶ τῷ
δύναμιν θρῆναι πικρά, κινῆσι δὲ καὶ
ἐρησι, καὶ ἐμμένα ποθεῖσαι· ἰατρικῇ καὶ
πλευρᾷ ἀγγήματα καὶ βήχας, καὶ
σπασμὸν ἀτά, καὶ ῥιζήματα < ἀ πλῆ
θος τῆς ῥίζης ἐν οἴνῳ πινόμενης. 5
πικρὴ δὲ καὶ εὐμεγέθης ὅσον ἀσρά-
γαλός βρωθείς· καὶ ἐρεπετοδύκτοις
διδόται ὠφελίμως ὅσον < γ'. τὸ
πλῆθος, κατὰ πλάτην δὲ δεῖ τὰ
δύγματα τοῖς τε φύλλοις καὶ τῇ
ῥίζῃ καὶ τοῖς ἀνθεσιν σὺν οἴνῳ καὶ τῷ
ῥυπαρῷ καὶ νεμόμεναι ἔλαιον καὶ μα-
σῶν καὶ διδύμων φλεγμονὰς καὶ φύ-
ματα καὶ δονθῆνας σπασμὸν ἀσρά-
γας τρυγὸς οἴνου τῇ ῥίζῃ, πρὸς δὲ
ταῖς περὶ σπᾶτοις φλεγμοναῖς μὲν
ἀλφίτου· δὲ χυλὸς δὲ ῥίζης περὶ
λαβῶν οἴνου παλαιῦ χυλικόος, καὶ
σπύργους καὶ κρόκους, συνελθόντων
ἐπὶ τὸ αὐτὸ, ἔρχεται γινεῖ ἐφθὰ
μοῖς φάρμακον· καὶ πρὸς ὅταν πυ-
ρρὸν γὰρ καὶ αὐτὸν καὶ σὺν λιβα-
νωτῷ καὶ μέλιτι καὶ οἴνῳ καὶ σπύργῃ
χλινθεῖς ἀμύγδα· ὁδονταλγίας
τὴ καὶ αὐτὴ ἐλχθεῖς ὁ χυλὸς τῷ
ἀντικαθάρσει ὡπῶ, πρὸς αὐτῇ καὶ
σα δὲ ἡ ῥίζα δὲ τέφρας ἐπιπασ-
σόμενης, δὲ ὡπεκίας δασύνει· ἐλ-
θεν δὲ ἔλαιον ἐν * κεκοιμημέναις
τῇ ῥίζῃ ἐπὶ πυρὸς, εἰλικρινέως
χμύετλος καὶ πνεύματα ἐπαλ-
φόμενον ὠφελεῖ καὶ * ὡταλγία-
σει βοηθεῖ ἐγγερόμενον εἰς τὸ οὖς.
ἀλφὸν τε λευκὸν περὶ αὐτῇ φέντα
ἐν

10

15

20

25



ἐν ὁδονίῳ ἐν ἡλίῳ, καταρξιαθεῖ-
σαι ἢ ῥίζα σκήχει. ὁ δὲ κερπὸς καὶ
τὰ αἴθνη κατ' ἐξοχῇ, σκολοπεν-
δρα καὶ σκορπίων ἀντιφάρμακόν
ἔστιν ἐν οἷνῳ πεποιητὸν κατεργή-
ται δὲ καὶ τὴν κοιλίαν.

Περὶ Βόλβου ἐδαδίου.

Κεφ. σ.

Βόλβος ἐδαδίος γυνώριμος πα-
ση ὃν ἐδαδιόμην· εὐσμάχρος, ἐνκοί-
λιος, πυρρός, καὶ ἀπὸ λεύκης κο-
μιζόμενος· ὁ δὲ πικρὸς, καὶ σκι-
λῶδης, εὐστομαχῶτερος, πικρι-
κός. πάντες δὲ δειμῆς καὶ διε-
μαστικοὶ καὶ πρὸς σπυροσίαν πα-
ρορμῶντες, τραχωόντες γλῶσ-
σαν καὶ παλιδίμα, πλούτσοφοι,
15 σαρκῶν ῥυνητικοὶ, ἐμπνευμα-
τουῦτες· ποιοῦσι δὲ κατὰ πλάσ-
μους πρὸς στέμματα, θλάσματα,
20 τοῖς καὶ τὰ ἐπὶ τῶν ὑδρωπικῶν
οἰδήματα καὶ κνηδόνητα, ὁμοί-
ως συν μέλιτι καὶ πᾶσι λείῳ
κατὰ πλάσσειντες ἐπέχρισιν ὑδρω-
πικῶν καὶ σωματικῶν ὀδυμῶν παύ-
σι καὶ πύτυρα καὶ ἄλγος ἀπο-
25 στήχουσι (καὶ ὅππῃ νίττω καὶ αἰ-
ερισί δὲ καὶ ὑπόπια καὶ ἰόνθοις,
καὶ ἑαυτῶν ἢ συν ὡοῦ λευκῶν,
καὶ φακοῖς συν μέλιτι ἢ ὄξει.
πρὸς δὲ ὥπων θλάσματα συν
ἀφίτῳ καὶ πρὸς θλάσεις ὀνύχων·
ἀφαι-

linleo antea perfrictam in so-
le, illita radix emendat. Semen
fioresque in vino poti, scolo-
pendrae & scorpionum vene-
nis, mirum in modum resistit:
alium purgant.

Bulbus esculentus.

Cap. C C.

Esculentus bulbus vulgo co-
gnitus, à nobis estur: stomacho
& aluo utilis rufus, & qui ex A-
phrica defertur. Amarus verò
& scillin^o, stomacho aptior est,
& concoctione adiuuat. Bulbi
omnes acrimoniā habent, ex-
calfaciunt: venerē stimulant, lin-
guā tonsillasq; exasperant, mul-
tum alimenti præbent, carnes
creant, inflationē parium duxa-
tis, fractis, articulorum dolori-
bus efficaciter illinuntur: spicu-
la extrahunt: gangrenas & po-
dagras ex melle aut per sese,
hydropicorū tumores, & can-
nū morsus cū melle & piperis
polline illiti cohibent: sudores
compescunt: stomachi dolores
mitigāt: furfures & vlcera quæ
in capite manant, cū tosto ni-
tro abstergunt, sugillata varo-
que per se aut ex oui luteo, &
lentigines cū melle vel aceto,
emendant: fractis auriculis un-
guibûsq; ex polēta medētur: ii-
dē calidis cinerib⁹ torrefactis,
tollunt