

DIOSCORIDIS

dem contra veneris infomnia
bibitur, siquidem ea prorsus
adimit, pota assidue aliquot
diebus, genitaléque infirmat.
Idem semen potum efficit.
Nymphæ nomen sibi vendi-
casse videtur, quoniam aquo-
sa amet. Plurima inuenitur in
Elide, in Anygro amne, & in
Bœotia Aliarto.

Nymphæ altera.

Cap. CXLIX.

Est & altera nymphæa, cu-
ius flos blephara dicitur, fo-
liis antè dictæ, radice alba,
scabra, flore luteo, nitente,
rosæ simili. Huius semen & ra-
dix, contra fœminarû proflu-
uia efficaciter ex vino nigro
bibuntur. Nascitur in Thessa-
lia, amne Peneo.

Androsaces.

Cap. CL.

ANDROSACES her-
ba est amara, tenues spargens
iuncos, sine foliis, folliculos
in capitulis habens: in quibus
semen continetur: gignitur in
Syriæ maritimis. Ea drachmis
duabus in vino pota, copio-
sam hydropicis vrinam ci-
et. Idem effectus est se-
mini pota, & herbæ
decocto: podagris
vtiliter illinitur.

Asplenium.

πίνεται δὲ ἡ ρίζα καὶ πρὸς ἐν-
εργουμένους, παραιτεῖται γὰρ τέττας,
ἀπνίαν τε ἐργάζεται αἰσίου
πρὸς ὁλίγας ἡμέρας, ἃ τις ἐν-
δελεχῶς πίνει. τὸ αὐτὸ δὲ ποιεῖ
καὶ τὸ σπέρμα πινόν. δοκεῖ δὲ δι-
νόμασθαι νυμφαίαν, διὰ τὸ ἐνυ-
δρον φιλεῖν τέτον. εὐρίσκεται δὲ
πολλὰ ἐν ἡλιδι ἐπὶ τῷ ἀνύρῳ πο-
ταμῷ, καὶ τῷ βοιωτίας ἐν ἀλιάρτῳ.

Πρὶ Νυμφαίας ἄλλης.

Κεφ. ρμβ'.

10

Γίνεται καὶ ἄλλη νυμφαία, ἥς
τὸ ἄνθος βλέφαρα λέγεται, φύλ-
λα ἔχουσα ὅμοια τῇ περὶ ἐρημιά-
νῃ, ρίζαν μὲν τοι λευκὴν καὶ τε-
ρεῖαν ἔχει, ἄθος μάλινον, σιλβον,
ὅμοιον ῥόδῳ. ποιεῖ δὲ ἡ ρίζα καὶ ἡ
τὸ σπέρμα πρὸς τοῦ γυναικεί-
ου ἐν οἴνῳ μέλανι πινόμενον. φύε-
ται ἐν τοῖς περὶ Θεσσαλίαν τό-
ποις καὶ τῷ πινενδὸν ποταμῷ.

Πρὶ Ἀνδρσακίαις. Κεφ. ρν'.

Ἀνδρσακίαις γίνεται μὲν ἐν συ-
εῖᾳ ἐν περὶ θαλασσίαις τόποις,
πῶς δὲ ἐστὶ λεπτή, λεπτοκαμφός,
πικρὰ, ἀφυλλος, θυλάκιον ἐπὶ τῷ
κεφαλῇ ἔχουσα στενὴν ἰκὸν σπέρ-
ματος. Δυνάμει δὲ ἔχει ποιεῖ-
σαι σὺν οἴνῳ < β. πολλὴν δόσιν, οὐρα 25
πολλὰ ἐπὶ ὑδρωπικῶν ἀγεῖν, καὶ
τὸ ἀφελίμημα τῆς πύας καὶ ὁ καρ-
πὸς πινόμενος, τὸ αὐτὸ ποιεῖν κα-
ταπλάσσεται δὲ καὶ ἐπὶ πεδου-
γικῶν ἀφελίμων.

Πεελ'

Πρὶ Ἀσπλύν. Κεφ. ργδ.

Asplenium. Cap. CLI.

10 Ἀσπλύν, οἱ δὲ σκολοπένδριον,
οἱ δὲ σπλύνιον, οἱ δὲ ἡμιόνιον, οἱ
δὲ πτερυξ, φύλλα ἔχει σκολοπέν-
δρα τῷ θείῳ ὅμοια, πλείονα
ἢ ἀπὸ μῖδος ῥίζης πεπεγμένον.
φύεται ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ πέτραις ἢ
ἀπὸ κοχλάκων παλισίαις. ὁ-
χρῶμα ἀνὰ τῇ ἀκρᾷ, ἐν τῇ μέσῃ
μῖδος ὡς τὰ τοῦ πολυπόδου, καὶ το-
ῦτον ὑπερβαίνει, καὶ διασπείρεται, ἀνορθοῦν
δὲ χλωρὰ. διὰ τὴν δὲ ἔχει τὰ
φύλλα ἀπορριπτόμενα συνὸς καὶ
πυρόμενα, ἐπὶ ἡμέρας μὲν σπλύν-
ιον τήκειν, δεῖ δὲ καταπλάσσειν
καὶ τὸν σπλύνιον τοῖς φύλλοις λεί-
οις συνὸς ὀνόβου, καὶ τῇ σπυρίδι.
15 καὶ λυγμῶν, καὶ ἰκτέρος, καὶ λίθου
τῶν ἐν κύσει θρύπτει. δοκεῖ δὲ ἀ-
τόκιος εἶναι καὶ ἐν αὐτῷ, καὶ με-
τὰ ἡμιόνου σπλύνιος πελαπομὴ
γινώσκουσιν, δὲ νύκτος φασὶ δειν-
ὸν πλὺν ὀρύσσειν ἀτόκιον.

Asplenium, aliqui scolopen-
drium vocant, alij splenion, a-
lij Hemionium, foliis est mul-
tis, scolopendræ animalis simili-
bus, ab radice vna prodeuntibus.
Nascitur in parietibus, fa-
xisq; filiceis, & opacis: nec cau-
lem, nec florem, nec semen ha-
bet. folia filiculæ modò diuidū-
tur, subter flavescentia hirsutaq;
supernè viridia. Vim hanc ha-
bent folia in aceto feruescēta,
vt per dies quadraginta pota,
lienem absūmāt: quibus etiam
contritis lienem ex vino illinī
oportet. Stranguriæ & regio
morbo prodest, singultū sedat,
calculos in vesica comminuit,
Cōceptum adimere creditur,
per sese aut cum muli liene ap-
pena. Tradūt noctu, silentie lu-
na, huius rei gratia effodiendā.

20 Πρὶ Ἡμιονίτιδος. Κεφ. ργθ.

Hemionitis. Cap. CLII.

Ἡμιονίτις, οἱ δὲ σπλύνιον,
φύλλον ἀγίνου ὅμοιον δρεκον-
τείῳ, μύρμιδος ῥίζαι δὲ ὑπερ-
σι πολλὰ, λεπταὶ οὐτε δὲ χρῶ-
μα, οὐτε καρπὸν. οὐτε ἀνθος
25 φέρεται. φύεται ἐν πετρώδεσι τό-
ποις, γευστὸν δὲ ἢ πῶς συ-
μπικνῶν τῶν συνὸς ποδῶν, τή-
κει σπλύνιον.

Hemionitis, quam aliqui
splenion vocant, folium emit-
tit dracunculi, lunæ modò in-
curuū, radicibus cohæret mul-
tis, tenuibus: nunquam flores,
neque semē, neque caulem gi-
gnit: in petrosis nascens, au-
stero sapore. Ea ex aceto pota
lienem absūmit.

Πρὶ Ἀνθυλλίδος. Κεφ. ργθ.

Antyllis. Cap. CLIII.

Ἀνθυλλίς διπλή ἢ μὴ
γδ

ANTYLLIS duplex est
A iiij quædā

DIOSCORIDIS

quædam enim lenti simillima,
foliis mollibus, rectis ramulis,
palmi altitudine: radice par-
ua, tenui. Nascitur in salis ter-
ris, & à sole illustratis, non in-
fuslo gustu. Altera est foliis ra-
mulisque aiugæ similis, hirsu-
tioribus tamé, breuioribus, &
asperioribus, flore purpureo,
odoris admodum grauis: ra-
dice cichorij. Pota drachmis
quatuor urinæ difficultati, re-
nibúsque plurimum prodest.
Tritæ, vuluæ pituitas emolliüt,
cum rosaceo, & lacte imposi-
tæ: vulneribus medétur. Quæ
autem aiugæ similitudinem
refert, præter alia, pota
cum aceto mulso co-
mitiales sanat.

Anthemis. Cap. CLIII.

Anthemidis genera tria, tan-
tum flore distátia: rami dodra-
tales, fruticosi, alis multis con-
caui: tenuibus foliolis, paruis,
numerosis: rotundis capitulis:
floribus in medio aureis, forin-
secus orbiculato ambitu cádi-
dis, melinis, aut purpureis, ma-
gnitudine foliorum rutæ: na-
scitur in asperis, & iuxta semi-
tas: colligitur vere. Vim habet
radices, flores & herba exalfa-
ciédi, extenuádiq;: potu, & in-
fessione, pellüt mēstrua, part^o,
urinām

ἡ φανῆ πικρὰ πλῆστα φύλλα ἔ-
χει καὶ κλωνία, σπιδαιμὲς ὑψος,
ὄρεθὰ δ' ἐν τῇ φύλλῳ μαλακὰ.
ρίζα δὲ λεπτή, μικρά. φύεται ἐν
ὕψαλμοις τίποις καὶ ἐν κλῖσις,
γενουμένη ὑψαλμος. Ἡ δ' ἐτέρη
χαμαιπίτυϊ τὰ φύλλα καὶ τὰ
κλωνία ὅμοια, διαστέρεται μὲν τα-
ῖς βραχύτεραις, καὶ τραχύτεραις, τὸ
δ' ἄνθος πορφυρεῖν, βαρυσπορὸν
ἰσχυρὸς· ρίζα ὡς σπιδαιμὲς κικλῶν.
Διόστωρ δὲ ἰσχυρὸς δυσουρεῖσι
καὶ νεφελικοῖς πυρομένη βουδέν,
παλῆδος & δ'. ἐν μαλακότητι
δὲ φλέγματα ἐν ὕδατι, κῆλαι,
συν ῥοδίῳ καὶ γάλακτι περσι-
τέμεναι ἴσθ' δὲ καὶ τραύματα.
ἡ δὲ τῇ χαμαιπίτυϊ ὁμοία, καὶ ἴσθ'
τ' ἄλλων καὶ ἐπληπτικὸς ἰσθ' τα-
συν ὀξύμεναι πυρομένη.

Πρὶ Ἀνθέμιδος. Κεφ. ςϛδ'.

Ἀνθέμις, οἱ δὲ λευκαῖς μεμον,
οἱ δὲ ἡρώδε μεμον, διὰ τὸ ἀνθέειν
ἐπὶ ἔαρος, οἱ δὲ χαμαί μεμον, 20
διὰ τὴν πρὸς τὰ μύλα ὁμοιότη-
τα τῇ ὀσμῇ, οἱ δὲ μελαῖς μεμον,
οἱ δὲ χρευσκό μεμον, οἱ δὲ χαλκίαν
καλοῦσι ταύτης εἶδη τεῖα ἀνθε-
σι μόνον διαφέρουσι κλώνες σπιδαι-
μίδαι, σπιδαιμίδαις, μαρσάδας 23
ἔχοντες πολλὰς, κλωναῖα μι-
κρά, λεπτά, πολλὰ, καφέλια σπιδαι-
μίδαι, ἔχουσαν μὲν χερσὶν ὄντα ἀν-
θῶς, ἔχουσαν δὲ σπιδαιμίδαι κικλῶν τε-
ρῶς λευκά, ἡ μύλα ἡ πορφύρεα,
καὶ

καὶ μέγθος πηγάης φύλλων· φύε
 ἐν τοῖσι τραχέσι καὶ παρὰ ταῖς ὀ-
 δοῖς συλλέγε· δὲ ἕως. Διού-
 μιν ὃ ἔχουσι αἱ ῥίζαι καὶ τὰ αὐτῇ
 καὶ ἡ βοτάνη θριμαντικὴν, λεπτο-
 5 πικνὴ· πνέμεται δὲ καὶ ἐγκαθάρ-
 μαι, κατὰ μίλια ἀγροσι καὶ ἐμ-
 βρυα, καὶ λίθοις, καὶ ἕως ποτίει· ὃ
 καὶ πρὸς ἐμπνευματώσεις καὶ εἰ-
 λεοῖς, καὶ ἡ κτερον δὲ ὀποκαθαίρε-
 σι καὶ ἡ παπκοῖς ἰσθ· καὶ τὸ ἀφέ-
 10 λημα δὲ αὐτῶν εἰς πνέας λαμ-
 βάνεται καὶ πρὸς κύστην. πρὸς
 κτικώτερον ὃ τοῖς λιθώσι τὸ πορ-
 φυραντές, ὃ ὅς τοῖς ὅλοις ὅς με-
 ζον ἰδίως ἡρανθεμον καλέμενον.
 τὸ δὲ λευκάνθεμον καλέμενον ὁ-
 15 ρητικώτερον καὶ τὸ χρυσάνθεμον.
 πρὸς πνέουσι δὲ καὶ αἰγνώπια κα-
 ταπλαστέμεται· διαμαστέμεται
 δὲ καὶ ἄφθον ἰσθται. χρῶνται δὲ
 πνέσι καὶ συγλύσμεται μετ' ἑαίης,
 λειοτερεῖται αὐτὰ πρὸς ἀνα-
 20 σκευὴ τῶν πλειοδικῶν πυρετῶν.
 ἀποτίθειται δὲ δεῖ ταὶ φύλλα καὶ
 τὰ αὐτῇ ἔχουσι αὐτῶν καπνοῦται
 ἰδίως καὶ ἀνακαμάνοντας τροχί-
 κοις· ὃ ῥίζαν ἐκκαίνοντας· χρεί-
 ας δὲ ὀποκαθαίρεται, διδόναι ὃ τὸ
 3· ῥὺ τῆς βοτάνης μέση β'. ὃ τὸ ὃ τὸ
 αὐτοῖς ἡ ῥὺ τῆς μέσης ἐν ὃ τὸ δὲ
 τοῦμα πόν, τὸ αὐτοῖς ῥὺ β'. τῆς
 ὃ βοτάνης ἐν, ἐν ἀμύξ διπλασι-
 ζοῦται παρ' ἡμέραν· πίνειν δὲ δεῖ
 ἐν οἶνο μάλιστ' κακράμενον.

Περὶ Παρ-

vrinam, calculosque: aduer-
 sus inflationes, & ilei tormen-
 ta bibuntur: bilem suffusam
 expurgant: iocinerum vitia fa-
 nant: decocto earum vesicæ
 fouentur. Ex omnibus his ge-
 neribus ad calculos efficacissi-
 ssima est, quæ florem purpu-
 reum habet, cuius amplitudo
 maiuscula est: hanc proprie he-
 ranthemum vocant. Ea cui leu-
 canthemum nomen est, ite quæ
 chrysanthemum dicitur, vehe-
 mentius vrinam ciunt. Aegi-
 lopiis illitæ medentur: com-
 manducatæ vlcerum eruptio-
 nes in ore, fanant. Nonnulli
 in clysteribus ex oleo vtun-
 tur, terunturque in farinam,
 ad abigendos febrium circui-
 tus. Flores & folia recondi
 debent, & priuatim tusa, in
 pastillos digeri: radix quoque
 ficcari, dumque ingruit ne-
 cessitas, binæ partes herbæ da-
 ri, modo floris aut radicis pars
 vna, modo contrâ, floris par-
 tes duæ, & herbæ vna, per-
 mutatim duplicato pon-
 dere, alternis diebus:
 bibere autem o-
 portet in vi-
 no mul-
 so, dilu-
 to.

Par-

DIOSCORIDIS

Parthenium. Cap. CLV.

Parthenium, aliqui amaracon vocant, foliis est coriandri, tenuibus: flore per ambitum albo, intus melino, odore subniroso, sapore amaro. Siccatū, cum aceto mulso, aut sale potū, non fecus atq; epithymū, & bilem & pituitā detrahit: suspiriosis prodest, & melancholicis. Herba sine flore à calculosis, & anhelatoribus magna utilitate bibitur. Valet decoctum ad insidendum in duritiis vulvarum, & inflammationibus. Illinitur sacro igni, & collectionibus, cum flore.

Bupththalmum.

Cap. CLVI.

Bupththalmum (quidam ca-chlam vocant) tenues emittit cauliculos, mollésq; folia fœniculi: luteum florem, anthemide maiore, oculi similitudine, unde nomen traxit: circa oppida nascitur, & in cāpestribus: Flores cū cerato triti, tumores duritiâsque discutiunt. Aiunt epotam post exitū à balneis, regio morbo correptis, colorem tractu temporis reddere.

Præonia. Cap. CLVII.

Præonia siue glycyfide. Græcis aliquibus pentoboron dicitur: sunt qui idæos daetylos radicē

Περὶ Παρθένιου. Κεφ. ρνθ'.

Παρθένιον, οἱ δὲ ἀμαράκον, οἱ
ἢ λευκάνθεμον, φύλλα ἔχει δάκτυλα
κοῦλον λεπτά· αὐτὴ λευκὰ κίχλω,
τὸ δὲ μέσον μέλινον, ὁσπὶν ὑπὸ
ἑρωμιον, τῇ δὲ γούσσει σπικρίζον. 5
Δωμάτιον δὲ ἔχει· ὡς δὲ θυμὸν
τι ἢ ὡς δὲ ποδῶν, ὡς τὸ ἐπι-
θυμιον, ἐλέγματος, καὶ γὰρ ἡ ἀρετή
καὶ τὸν ἀδματικὸν ὠφε-
λεῖν καὶ μελαγχολικοῖς. ἡ πῖα δὲ
χρῆσις τοῦ αὐτοῦ, ὠφελεῖ μὲν
πῶς καὶ τῶν ἀδματικῶν πο-
τῶν. τὸ δὲ ἀφ' ἧς αὐτῆς ἐγ-
κρίσις ἡ ὑπερβολὴ ἐκκρίσις καὶ
φλεγμονῶν ὅστις καὶ τὴν πλάσσει-
ται δὲ καὶ πρὸς ἐξοσπτελέατα καὶ
φλεγμονὰς σὺν τοῖς αὐτοῖς. 15

Περὶ Βυφθαλμοῦ. Κεφ. ρνθ'.

Βυφθαλμον (οἱ δὲ καὶ χλῶν
καλοῦσι) χαλκίαν ἀνίστι τρυφερά,
ὑπόλευκα φύλλα δὲ μετὰ ὀφθαλ-
μοῦ· αὐτὴ μέλινα, μέλινον τῆς
αὐτοῦ μῆδος, ἐφθαλμοῦ ὅστις ὅστις 20
καὶ ὀνόμασται· φέρεται δὲ ἐν πε-
δίον· καὶ πρὸς τὰς πέλεις. Ταύ-
της τὰ αὐτὴν λεία σὺν κηρωτῇ, οἱ-
δύματα καὶ σκληρίας διαφέρει·
φασι δὲ ὅτι ἐν τῷ βαλανείῳ με-
τὰ τὸ ἐξῆλθαι πρὸς ὕδρον, αὐτῶν
αὐτοῖς πρὸς χρῆσιν πᾶσι τοῖς
ἐκ τῆς οἰκίας.

Περὶ Παιονίας. Κεφ. ρνθ'.

Παιονία, ἢ γλυκύσις, οἱ δὲ
πεντόβορον· οἱ δὲ ἰδαίους δακτύλους
τῶν ῥίζων

τῆς ῥίζαν παμονίαν χαλκῶς. χα-
 λκὸς δὲ διασπασμαῖος. φύεται πα-
 ραφυσάδας ἔχων πολλὰς. φύλλα
 δὲ ἢ ῥῆ ἄρβιλον βασιλικὴ καρφά. ὁ-
 μοία ἢ δὲ θηλεία ἀπὲρ σταυρὰ
 5 φύλλα ὅσων σπέρμιον. λοβοὺς δὲ
 πῖνας ἀνίστην ἐπ' ἄκρου τῷ χαλκῷ
 ἀνωτῶν οὐμοῖς. ὅν ἀνέωχθ' ἐν-
 των ἐνρίστον. ἐρυστροὶ κόκκοι πολ-
 λοὶ, μικροὶ, ἐμφερεῖς τοῖς πῖσ τοῖς,
 ἐν μέσῳ δὲ μέλανες, ἐμπερφερεῖ
 10 ἢ ῥῆ. ῥίζα δὲ πῖς ῥῆ ἄρβενος, πε-
 ρὶ δακτύλου πάχος, μήκος ὅσων
 διαμῖς, γεννητῶν σφύσας, λευκὴ
 ἐπὶ δὲ πῖς θηλείας παραφυσάδας
 ὅσων βαλαάοις ἔχουσα ῥῆ. ἢ ῥῆ.
 ὅσων ἀσπρόδελος. Δίδεται ὅ γυ-
 15 ναῖν ἢ ῥίζα τῶς ἐν τῷ καὶ χα-
 λκῶν. κινεῖ δὲ καὶ τὰ χα-
 λκῶν. ἀμυγδαλὸν μέγας
 πινυλῶν. τοῖς τε χαλκῶν γαστέρας
 ὁδωμῶς βοηθεῖ περὶ τῶν ἐν οἴνῳ.
 ὁφελεῖ δὲ καὶ ἐντερικοῖς, καὶ νεφρι-
 20 πκοῖς καὶ κύστιν δι' ὅσων. ἐν-
 δεῖται ἐν οἴνῳ καὶ πινυλῶν κοι-
 λίας ἱσῆσι. τοῦ δὲ χαρπυῖ ἢ ῥῆ
 ῥῆ. κόκκοι ἀσπρόι πορρῆτες ἐν
 οἴνῳ μέλανι ἀντιφύσας ἐρυστρον
 ἱσῆσι. σωματικῶς τε δακρυμέ-
 25 γοῖς ἐσπόμενοι βοηθεῖται, καὶ ὅσων
 πῖν παμῶν πινυλῶν, καὶ ἐν-
 δεῖται ἀρρῶς λιθιάσεως πα-
 ραφυσάδας. οἱ δὲ μέλανες καὶ
 πῖς τῶν ὅσων ἐνρίστον πινυλῶν
 καὶ πῖς τῶν ὅσων πινυλῶν
 καὶ ῥῆ

radicē pæoniam vocant. Cau-
 lis altitudine sesquipedis ado-
 lescit, comitátibus multis stolo-
 nibus. Huius duo genera: mas,
 folia iuglandis habet: in fœmi-
 na verò, smyrnij more diuidun-
 tur. Summo caule filiquas e-
 mittit, veluti græcas nuces: in
 quibus cùm dehiscunt, multa
 granula rubra, acinis punico-
 rum similia, inueniuntur, & in
 medio nigra, quinque aut sex,
 purpurea. Radix maris (te-
 nuis) digitali crassitudine, &
 palmi longitudine, gustu ad-
 stringens, alba: fœminæ ra-
 dicibus ceu glandes circiter
 septem aut octo inhaerent, vt
 in hastula regia. Fœminis à
 partu non purgatis ficca ra-
 dix datur: ciet menses nucis
 græcæ magnitudine pota: sic
 ventris doloribus cum vinò
 auxiliatur. Valet contra re-
 gium morbum, & renum, ac
 vesicæ dolores. Decocta in vi-
 no aluum sistit. Rubra grana
 rubenteis menses sistunt, de-
 cem vel duodecim pota in vi-
 no austero & nigro: stomachi-
 cis & erosionibus ea esse pro-
 dest: à pueris pota, initia calcu-
 lorú eximūt. Grana nigra auxi-
 liatúr suppressionibus noctur-
 nis, vuluæ strangulationibus,
 &

DIOSCORIDIS

& matricis doloribus, quinde-
cim numero pota, in aqua mul-
sa, aut vino. Nascitur in altissi-
mis montibus & præruptis.

Lithospermum.

Cap. CLVIII.

Lithospermon à feminis du-
ritia nomen accepit: foliis est
olea lōgioribus, & latoribus,
mollioribus: iacent humi, quæ
ab radice exiliunt: ramulis re-
ctis, tenuibus, firmis, crassitu-
dine acuti iunci, lignosis, in
quorum cacumine bifidi ex-
ortus, cauliculorum speciem
exhibent: foliis longis, inter
quæ paruum semen, rotun-
dum, erui magnitudine, du-
ritia lapidea. Nascitur in aspe-
ris & æditis locis. Vim hanc
habet, vt semine cum vino al-
bo potō calculos frangat, pel-
latque vrinam.

Phalaris. Cap. CLIX.

Phalaris cauliculos emittit
zeæ culmis similes, à minutis ac
nullius vsus radicibus, multos,
duūm palmorū, geniculis cin-
ctos, graciliores tamen ac dul-
ces: semē cādidū, oblongū, mi-
lij magnitudine. Tūditur, & in
aqua aut vino succus ad vesi-
cæ cruciatus vtilissimè bibitur.
Semen cochlearis mensura po-
tum, ad eadem efficax est.

Rubia.

ἢ ὁ δυνάς μύττας ἐν μελικράτῳ
ἢ οἶνῳ, ὅσον ἑ. κοκκοὶ πινόμενοι,
πειούσι. *

Περὶ Λιθόσπερμου.

Κεφ. ρνθ.

Λιθόσπερμον, οἱ δὲ αἰγάνυχον, 5
οἱ δὲ ἐξάνυχον, οἱ δὲ ἡράκλειαν,
διὰ τὴν σπῆλ τὸ σπέρμα ἰσχυρὸν
ἐν καὶ λιθόσπερμον ὀνόμασται.
φύλλα ἔχει θυμα ὕδατος, μακρό-
τερα δὲ καὶ πλατύτερα, καὶ μαλα-
χώτερα, καὶ τὰ σπῆλ τὴν πυθμένα 10
ἐπὶ γῆς κείμενα. κλωνία δὲ ὀρ-
θα, λεπτά, πάχος ὅσον χίνου, στερεά,
ξύλωδη, ἐπὶ δὲ τῶν ἄκρων ἀν-
τὼν διακλίσταις, χαλαροὶ δὲ
ἐχρυστα φύλλα μακρά παρ' οἷς
σπέρμα λιθώδες, στρογγύλον, μι- 15
κρόν, ὅσον ὅσον. φύεται ἐν τρα-
χέσι τόποις καὶ ὑψηλοῖς. Διωά-
μιν δὲ ἔχει τὸ σπέρμα μετ' οἶνου
λευκοῦ πινόμενον, λιθοῖς θρύπτειν
καὶ οὕτως ἄγει.

Περὶ φηλαρίδος. Κεφ. ρνθ'. 20

φηλαρίς, χαλκία ἀνίστην ἐκ ῥι-
ζῶν λεπτῶν καὶ ἀχρῆστων πολλὰ,
διπλάσια ῥονα τῶν καλαμῶ-
δων, ἐοικότα τοῖς τ' ἑσας σπέρμα
ἐπὶ μεγέθος κίτρου λευκὸν ὑπὸ
μυκτός. Διωάμιν δὲ ἔχει κοπτομέ- 25
νη ἢ πῶ καὶ χυλίζομένη δι' ὕδατος
ἢ οἶνου, πρὸς τὰ τ' κύστεως ἀγρήμα-
τα πεινῇ πινόμενη, καὶ τ' σπέρμα-
τος δὲ καὶ κοχλιαρίῳ ὕδατος πλῆ-
θος πινόμενον πρὸς τὸ αὐτὰ πεινῇ.

Πρὶ Ερυ-

Πρὶ Ἐρυθροδάνου. Κεφ. ρζ'.

Rubia. Cap. CLX.

- Ερυθρόδανον, ἢ ἔρυθρόδανον, ἔνιοι δὲ τεύθριον καλοῦσι, ρίζα δὲ ὅθεν ἔρυθρὰ βασιμὴ· ἢ ὡς τις ἀγρία· ἢ δὲ σπαρτή, ὡς ἐν θαλάσσῃ ἢ γαλιθίας, καὶ βασιμὴν ἢ ἰταλίαν, ἐν κασία μετὰ ἑὺ ἤλατον περιέρχον ὡς ἄρ' ἐν ἄρῳ· ἔστι δὲ φθιμὸς ὃ περὶ τὸ, διὰ τὸ γίνεσθαι ἐν πύτῃ πλείων πέρσσο· ὅθεν οἱ δὲ αὐτὸ οἰκιστοὶ τεβάρων· ὅθεν οἱ αὐτοὶ οἰκιστοὶ τοῖς πῖς ἀπεινῶν, καὶ πύτῃ δὲ μείζονες καὶ ῥαμαλώτεροι ἔχοντες ἐν διασημάτων τὰ φύλλα καὶ ἔχουσιν γόνυ, ὡς ἄρ' ἀέρας εἰς κύκλον περικείμενα κατὰ τὸν στρογγύλον, τὰ περὶ τὰ χλωρόν, εἴτα ἔρυθρόν, εἴτα πεπαιγμένον μέλανα, ρίζα λεπτή, μακρὰ, ἔρυθρὰ, διουρητικὴ ὅθεν ἰκτερικοῖς μετὰ μακρὰ του σπινούρου βοηθεῖ, ἰσχαικοῖς τὲ καὶ παραλελυμένοις· ὅθεν οἱ οὖρα πολλὰ καὶ παχέα· ὅτε δὲ καὶ αἷμα, λούεσθαι ὡς τοι δεῖ καὶ ἡμέραν τὸς πίνοντας, καὶ ὅρῳ τῶν κενουμένων πλεῖν διαφραγνῶν· θνείδνικτοις τὲ βοηθεῖ ὁ χυλὸς μετὰ τῶν φύλλων ποθεῖς.
- ὁ δὲ καρπὸς μετ' ὀνυμίου πινόμενος, σπινούρα τήκει. περὶ τὰ δεῖσα δὲ ἢ ρίζα, ἔμβρυα καὶ ἔμμηνα ἄγει καὶ δεύτερά. θνείδνικτοις δὲ καὶ ἀλφοῖς λευκοῖς μετ' ὀξέως κατὰ πλάσσωμένον.

Erythrodanum radix rubra est, qua tinguntur lana. Vna sponte prouenit, altera feritur vt in Thebana Gallia, & Rauenna Italix: in Caria inter oleas, vt in aruis, solo creditur. hanc non sine quaestu ferunt: nanque maximum ex ea sentiunt prouentum. Asperi caules & quadranguli, longi, aparinæ non dissimiles, robustiores, & multo prorsus maiores: foliis per interualla certa circum articulos, stellatim decussatis. Semē eius rotundum, inter initia viride, mox rubrū, postea cum ematurui, nigrū: radix tenuis, longa, rubra. Vrinam ciet: qua de causa regio morbo opitulatur, pota cum aqua mulsa: item ischiadicis, & resolutis. Crassum, copiosamque vrinam pellit, nōnunquam & sanguinem: bibentes tamen quotidie lauari oportet, & excrementorum quæ redduntur differētiam spectare. Aduersus serpentium morsus, ramulos cum foliis, vino bibere prodest. Semē ex aceto potum, lienem absumit. Imposita radix trahit partus, menses, secundasque. Albæ vitilagini, illita ex aceto medetur.

Περὶ Λογ-

Λογ-

DIOSCORIDIS

Lonchitis. Cap. CLXI.

Lonchitis folia habet por-
ri, latiora, rubentia, plurima,
ad radicem circumfracta, ve-
luti in terram procumbentia,
paucā in caule, in quo flores,
ceu galericuli, hiantibus co-
micis personis similes, nigri,
& è rictu albam exerentes ve-
lut linguam, quæ ad labrum
inferius spectet: semen inuo-
lucris clausum lanceæ simile,
triangulum: vnde sibi cogno-
mentum arrogavit: radix dau-
ci. Nascitur in sitientibus, &
asperis. Radix ex vino pota vi-
rinam ciet.

Lonchitis altera.

Cap. CLXII.

Altera est lonchitis, quam a-
liqui asperā lonchitin dicūt: fo-
lia scolopēdrij emittit, sed aspe-
riora maiorāque, ac multò ma-
gis diuīsa. Vulneribus mirū in
modū prodest, in eīsq; inflam-
mationes excitari non patitur.
Pota ex aceto lienē absumit.

Althæa. Cap. CLXIII.

Althæa, quam alij ibiscū vo-
cāt, in syluestrium maluarum
genere est, cui folia vt cycla-
mino, rotunda, lanugine can-
nescunt flore rosaceo: bicubi-
tali caule: radice lenta, intus
alba. Althæa appellatur, quòd
inter

Πρὶ Λογχίτιδος. Κεφ. ρξζα.
Λογχίτις φύλλα ἔχει παρὰ πο-
τὴν ῥίζαν ὁμοία, καταπύματα δὲ καὶ
ὑπερῶντα παλῆστα, παρὰ τὴν ῥί-
ζαν ἀεικλωμένα ὡς ἐπὶ τῇ γλῶσ-
σῃ· δὲ καὶ παρὰ τὴν καρπὸν ὁλί-
γα, ἐφ' οὗ αὖτις ὁμοία παλίστοις,
τῶ τύπῳ δὲ κομμικοῖς παρὰ πο-
ταίοις κερχυμένοι, μέλανα καὶ λευ-
κὸν δὲ πᾶσι ἀντὶ τῶν ἐξ ἑαυτῶν
τῇ χάσματι παρὰ τὸ κατὰ χεῖ-
λος, ὡς παρὰ γλωσσέειον· τὸ σπέρ-
μα δ' ὁμοίον λόγχῃ, τείρονον ἐν
παρὰ ποταμοῖς· ὅθεν καὶ τῆς παρὰ
ποταμίας ἡξιώθη· ῥίζα δὲ ὁμοία
δαύκῳ, φύεται ἐν τραχεῖσι καὶ ἀ-
νέμοις τόποις. ταύτης ἡ ῥίζα δι-
ουρητικὴ πνομὴν συνδύει. 10

Περὶ Ἑτέρας λογχίτιδος.

Κεφ. ρξζβ.

Λογχίτις ἑτέρα, ἢ δὲ λογχί-
τις τραχεῖαν, φύλλα ἀνίστην ὁ-
μοία σκολοπεριδείῳ, τραχύτερα
δὲ καὶ μείζονα καὶ μάλλον ἐρησμέ-
να. Διῶσται δὲ ἔχει τραυματι-
κὴν, ἀσπέρμαντον· τῇ καὶ δὲ καὶ
παλῶν μετ' ὅξους πνομὴν. 15

Περὶ Ἀλθαίας. Κεφ. ρξζγ.

Ἀλθαία, ἔναι δὲ ἰσχυρὸν κα-
λὸς, μαλάρως ὅτι ἀγρίαις ἐν-
δος, φύλλα παρὰ ποταμὸν κα-
κλάρμος, ἐγγυα· ἔχει δὲ αὖ-
τος ῥοδοειδὲς· καρπὸν δὲ πικρὸν,
ῥίζαν δὲ γλίσχρον, λευκὴν ἐνδο-
θεν. ὠνόμασται δ' ἀλθαία διὰ τὸ
πλυσσά- 25

πολυαλγές καὶ πάλυχρηστον ἀν-
 τὶς ἐλπίθειται γὰρ ἐν μεγάλῃ τῷ
 ἢ οἴνῳ, καὶ καὶ ἐν αὐτῷ ποιεῖται
 ποιεῖ πρὸς βλάβματα, παρὰ τὴν δὲ
 χροιάδας, ἀποσήματα, μαζοὺς
 5 φλεγμαίνοντας, δακτυλίων θλάσ-
 ματα, ἐμφυσήματα, συντάσεις
 νευρῶν διαφορεῖ γὰρ καὶ ἐκπύεται,
 ἢ ῥήγισι καὶ ἐπουλεῖ, συμμιμαλα-
 χθεῖται δὲ ἐφ' ὃν ὡς εἴρηται σέα π-
 ὑεῖναι ἢ χροῖαν ἢ τερβύθινον, πρὸς
 10 ὑστέρας φλεγμονὰς καὶ μύσεις ἐν
 πρὸς δὲ ματὶ ποιεῖ, καὶ τὸ ἀφ' ἐλπί-
 μα δ' αὐτῆς τὸ αὐτὸ ποιεῖ, ἄρον
 καὶ τὰ καλοῦ μύθου λόγῳ. τὸ δὲ
 τῆς ῥίξης ἀφ' ἐλπίμα συνὸν π-
 νόμῳ, ὁφείλει δυσσοεῦνται,
 15 λιθιῶντων ὁμότητας, δυσεν-
 τερικούς, ἰσχιαδικούς, τρωμα-
 δείς, ῥινηματίας· καὶ πόνους ὁ-
 δόντων προκαίνει συνὸν ὅξει ἀφ' ἐλ-
 πίθειται καὶ διακλυζομένη. ὁ δὲ
 καρπὸς χλωρὸς τε καὶ ξηρὸς λεί-
 20 ος καταχρηθεῖται συνὸν ὅξει ἐν ἡ-
 λιώ, σμηκτικὸς ὅτιν ἀλφῶν μετ'
 ὀξέλαίου δὲ συγχροῖ μύθος, πρὸς
 φυλακτικὸς ὅτιν ἰοβόλων. ποιεῖ δὲ
 καὶ πρὸς δυσεντερίας καὶ αἵματος
 ἀνὰ γαστρίῳ καὶ διὰ ῥοῖαν. τὸ δὲ ἀ-
 25 φ' ἐλπίμα τοῦ πρὸς ματος πρὸς με-
 νον, καὶ πρὸς μελισσῶν καὶ τῶν
 λεπτῶν θηρίων πληρὸς πάντων,
 ἐν ὀξυκέρατῳ ἢ οἴνῳ πεδέν. καὶ
 τὰ φύλλα δὲ μετ' ὀλίγου ὕδατος
 καταπλάσσεται ἐπ' ᾧ τῶν δυνάμεων
 καὶ ἐπὶ

inter primas sit utilis, & pluri-
 bus polleat remediis. Decocta
 enim in vino aut aqua mulsa,
 & per se cum imponitur tusa,
 efficax est cōtra vulnura: item
 ad strumas, parotidas, absces-
 sus, māmaram inflāmationes,
 fracta sedis, inflationes, neruo-
 rū rigores: siquidem discutit, &
 excoquit, rumpit, & ad cicatri-
 cem perducit. Cocta, vt dictū
 est, adiecto suillo adipe, aut an-
 ferino, terebinthināve, vt ma-
 lagmatis lētor fiat, facit ad vul-
 uæ inflāmationes, præclusio-
 nēsq; in pēsis subdita. Deco-
 ctum eodē fungitur munere:
 onera uulua, reliquiāsque à par-
 tu extrahit. decoctæ succus ex
 vino potus, succurrit vrinæ dif-
 ficultati, calculosorū crudita-
 tibus, dysentericis, ischiadicis,
 tremulis, ruptis: dentiū mulcet
 dolorem, cum aceto decocta
 colluto indē ore. Viride semen
 ficcūmq; tritum, vitilignes in
 sole perunctas emendat: eodē
 cum oleo & aceto peruncti, à
 venenatis non feriuntur. Valet
 cōtra dysenteria, & sanguinis
 reiectiones, aluiq; profluuiū. In
 posca aut vino decoctū bibi-
 tur, cōtra omnes vesparū, apū,
 similiumq; aculeatos ictus. Fo-
 lia cū olei momēto, morfibus,
 &

DIOSCORIDIS

& igni ambustis illinūtur. Con-
stat aquam, trita radice addita,
sub diuo addensari.

Alcea. Cap. CLXIII.

Alcea sylvestrium malua-
rum generi assignatur: folia ha-
bet diuisa, verbenacæ proxi-
ma, caules treis aut quatuor,
cortice cānabino vestitos: flo-
rem rosæ, paruum: radices al-
bas, latas, quinque aut sex, cum
plurimum cubitales: quæ cum
vino aut aqua potæ, dysenteri-
cis ruptisque medentur.

Cannabis. Cap. CLXV.

Cannabis fatiua planta ma-
gni in vita vsus ad robustissi-
mos funes factitandos: foliis
fraxini, graui odore: caulibus
proceris, inanibus: semine ro-
tundo, quod largiore cibo ge-
niturem extinguit. Succus

ex ea recēte, conuenien-
ter auriū dolorib⁹
instillatur.

Cannabis sylvestris.

Cap. CLXVI.

Sylvestris cannabis virgas
fert althææ similes, minores,
nigriores, & asperiores, cubi-
ti altitudinem æquantes: fo-
lio fatiux, nigriore & aspe-
riore: flore lychnidis, subru-
bro: semine & radice althææ.

Deco-

η ἐπὶ τῶν πνευματικῶν. πύρισι
δὲ ἢ ῥίζα καὶ ὕδωρ μετρίαια λεία καὶ
συνεξάθρια δέισα.

Πεὶ Αλλέας. Κεφ. ρξδ'.

Αλλέα, καὶ αὐτὴ εἶδος ὄσπιν α-
λείας μαλάχης, ἔχουσα φύλλα ἐ-
περισσὰ πρὸς τὰ τῆς ἱερῆς
βοτανῆς χαμλοῖς γ'. ἢ δ' φλουῖ
ἔχοντας καννάβει παρὰ πλῆστον.
ἀνδρὸς μικρὸν, ἐμφερὲς ῥόδιον ῥίζας
λευκὰς, παλατείας ἐ. ἢ ε'. ὅσον
πύρεως αὖ πινεσὶ οἶνον ἢ ὕδατι πι-
νόμενοι, δυσεντερειάν καὶ ῥήγμα-
τα ἰόνται.

Πεὶ Καννάβειος ἡμέρα.

Κεφ. ρξε'.

Καννάβειος φυτὸν ὄσπιν οὐχ ἔχον
ἐν τῷ βίῳ πρὸς τὰς τῶν ὑπο-
νωτῶν θρινίων παροχάς· φύλλα
φέρει παρὰ πλῆστον τῇ μελίᾳ, δυσ-
ώδη· χαμλοῖς μακροῖς, κανοῖς·
χαρπὸν τρογγύλον, ἐς ἐσπόμενος
πλείων, στέγγισι τ' ῥονίῳ. χλω-
ρὸς δ' ὡς χυλιδῆς, ἀμύδι πρὸς τὰς
τ' ὥτων ἀλγυδίας ἐνσταζόμενος.

Πεὶ Καννάβειος ἀλείας.

Κεφ. ρξς'.

Καννάβειος ἀλεία ῥαβδία φέρει
ὁμοία τοῖς τῆς ἀλθίας, μελαν-
τερά· δὲ καὶ τετραχύτερα, καὶ μι-
κρότερα, τὸ ὕψος πύρεως· τὰ δὲ
φύλλα ὁμοία τῇ ἡμέρᾳ, τετρα-
τέρα δὲ καὶ μελανότερα· ἀνθὶ ὡς
περὶ δρυά, λυχνίδι ἐμφερῇ· σπέρ-
μα δ' καὶ ῥίζαν ὁμοία τῇ ἀλθίας.
Δυνά-

Δυσώειν δὲ ἔχει ἢ ῥίζα ἐφθὴ κα-
ταπλαθεῖται, φλεγμονὰς παρη-
γεῖν, καὶ οἰδήματα διαφορεῖν,
καὶ πόρους διαχεῖν. καὶ ὁ ἀπὸ
ταύτης δὲ φλοιὸς, εὐθετος εἰς
5 πολυκλὺν ὀνίον.

Περὶ Ἀναγυρίος. Κεφ. εἰς.

Ἀνάγυρις, οἱ δὲ ἀνάγυρον, οἱ
ᾧ ἄκοπτον χαλᾶσι, θάμνος ὅτι φύλ-
λοις καὶ ταῖς ῥάβδους περσεμφε-
ρὸς ἄγρω, δειδρώδης, βαρύσο-
10 μος ἰχυρὸς· ἀνθος κράμβη ἐοι-
κός· καρπὸς ἐν κερατοῖς μα-
κροῖς, τὸ ὄχημα νεφρὸν, ποικί-
λος * σερεθός, σκληρυνέται δὲ πρὸς
τὸν τῆς σαφυλῆς πεπασμένον. Ταύ-
της τὰ φύλλα ἀπαλά, λεῖα κα-
15 ταπλασθέντα, οἰδήματι τέλ-
λει. ποτίζεται δὲ < πολλὸς ἐν
ζυγυκαῖ περὶ δάμα καὶ ἐμβολὴν
χωρείου, καὶ ἐμυλῶν καὶ ἐμερῶν·
περὶ δὲ κεφαλῆς αἰνῶν οἶνω.
ἔσθ' δὲ πείλαπτον δυσκοῦσαις· δει-
20 νύ τοι μετὰ τὸ ἀποτεκεῖν ἐν-
δέως ἀφελόντι ῥίπην τὸ πείλαμ-
μα. τῆς δὲ ῥίζης χυλὸς διαφορεῖ
καὶ ἐκπίπτει· δὲ καρπὸς ἐπιτόμα-
νος, ἕμετον συντόνως κινεῖ.

Περὶ Κηπίας. Κεφ. εἰς.

25 Κηπία ἐμφερὲς ὅστιν ἀνδρά-
γην, μελάντερον ᾧ ἔχει τὰ φύλλα,
ῥίζαν λεπτήν. βλάπτει δὲ τὰ φύλλα
πνιγνύμενα συνὶ οἶνω, τραχυνεῖ δὲ
καὶ ψευδῶσι τῶν κύων· μάστιγα
ᾧ ποιεῖ μετὰ ἐψήματος ῥιζῶν ἀ-
σπαράγου

Decocta radix, illitu inflama-
tiones mulcet, tumores discuti-
tit, tofos articularum dissipat.
Huius cortex torquendis funi-
bus accommodatus.

Anagyris. Cap. CLXVII.

Anagyris frutex est arboris
instar, perquam grauis odore:
foliis agni, virgisque flore bras-
sica: semen in filiquis non bre-
uibus gignit, subrotundum, fir-
mum, versicolori facie, simi-
le renibus, quod durefcit vna
maturescente. Tenera folia tri-
ta tumores illitu reprimunt. si
partus hareat, & secundæ men-
sesque morētur, dragma pon-
dere bibuntur in passō: sic &
suspuriōsis dantur, & contra ca-
pitis dolores in vino: Difficul-
ter parientibus adalligātur, ita
vt à partu statim auferantur.
Radicis cortex concoquendis
discutiendisque adhibetur. Se-
men commanducatum vomiti-
ones vehementer ciet.

Cepæa. Cap. CLXVIII.

Cepæa portulacæ similis est,
sed nigriora habet folia, & ra-
dicem tenuem. Folia in vino
pota, vrinæ stillicidio, & vesicæ
scabie laborantibus, opitu-
lantur: maximè id præstat, si
cum decocto radicum aspara-

B gi

DIOSCORIDIS

gi eius quem myacáthon, hoc est corrudam vocant, bibatur.

Alisma. Cap. CLXIX.

Alisma, alij damafonion appellant: folia ei plantaginis: nisi angustiora essent, laciniosa, conuexáque in terram: caule simplici, tenui, cubito altiore: capitibus thyrsi: flore tenui, candido, pallefcéte: radicibus tenuibus, vt veratri nigri, acribus, odoratis, modicè pinguibus: aquosos amat tractus. Radix, si drachma vna aut altera bibatur, his conuenit, qui leporem marinum deuorauerunt, aut à rubetis ranis demorfi sunt, aut opium hauserunt: torminibus atque dysenteria: perse, aut cum pari modo feminis dauci, potui datur. Conuulsis, & contra vitia vuluæ prodest. Herba sistit aluum, menstrua pellit, tumores illita mitigat.

Onobrychis. Cap. CLXX.

Onobrychis, folia habet lentis, longiora paulò: caulem dorantalem: florem puniceum: radicem paruá: nascitur in vliginosis & incultis. Herba sua pte vi, si trita illinatur, tubercula dissipat: cum vino pota, strangurias sanat: illita ex oleo, sudores mouet.

απαράγου τῷ μυακάθου καλεῖται
μύρου ππομύνη.

Περὶ Ἀλίσματος. Κεφ. ρξθ'.
Ἀλίσμα, οἱ δ' ἀλκίαν, οἱ δ' ἀλ-
μασώνιον, οἱ δ' ἀκμερον, οἱ δ' ἀλ-
εον καλοῦσι. φύλλα μὲν ἔχει ἀφ-
ρογλώσσῃ ὅμοια, σενώτερα δὲ καὶ
ἐπὶ γῆνι κλωμυρὰ καμλὸς δὲ λε-
πίος, ἀπλοῦς ἔσθ' πᾶσι χυμὸν ἔχον
κεφάλαια, θυρσοειδὲς. αὐτὴ λε-
πία, λευκὰ, ὑπορχα. ῥίζα ὡς
μέλανος ἐλλεβορέου λεπτοὶ ἐυώ-
δεις, δειμήϊα, ὑπολίπτεται. ὑ-
δρῶν δὲ φιλεῖ χρεῖα. Ἀρμόζει
ἢ ῥίζα ππομύνη συνὸν οἶνον, ὅσον
α. ἢ β. τοῖς λαγῶν βεβρωκό-
σι θαλάσσιον, καὶ τοῖς ὑποπ-
νου διηχθεῖσι, καὶ τοῖς ὅππῃ πεπο-
κόσι, καὶ σφόδρως καὶ δυσεντερίαν
καὶ αὐτίλῳ, καὶ συνὸν ἴσῳ δαμά-
ππομύνη. ἀρμόζει καὶ ἀσάμα-
σι καὶ περὶ τὰ ὑστερικὰ πάθη.
ἢ δὲ πᾶσι ἐν σπλῆνι καὶ ἐμμη-
να ἄγει, καὶ οἰδήματα κατὰ πλά-
θεῖτα περὶ ἵναι.

Περὶ Ὀνοβρυχίδος. Κεφ. ρθ'.
Ὀνοβρυχίς φυλὴν ἔχει ὅμοια
φακῶ, μικρὰ μακρότερα καμλὸν
απιδαμῶν. αὐτὸς φοινικῶν, μι-
κρὰν ῥίζαν. φύλλον ἐν κατύρχει καὶ
ἀφ' ὧν τίποις. Διυάμιν δ' ἔχει ἢ
πᾶσι ἐπὶ πλάθεῖσι λεία διαχρῖν
φύματα μετ' οἶνου δὲ ππομύνη
σπαραγρίαν δεξαμένην συνὸν ἕλκω
δὲ δεξφομύνη ἰδρωτας κινεῖ.

Hype-

Περὶ Ὑπερ-

Περὶ Ὑπερικῆς. Κεφ. ροδ.

Hypericum. Cap. CLXXI.

- Ὑπερικόν, οἱ δὲ ἀνδρόσαμον, οἱ
 δὲ κόριον, οἱ δὲ χαμαίπτυν, διὰ τὸ
 ἔχει τὸ σπέρμα ὁσμὴν ἑοικέναι
 πρὸς τὴν ῥητίνην φύλλα ἔχει πηλίκω
 5 ὁμοία, ὁ μὲν οὖν φρυγαννοειδὴς, σπι-
 διαμοῦς ὑπερὶ υἱός. αὐτὸς ἔχει
 μύλινον, δὲ διαδίδεν ἐν τοῖς δακτύ-
 λαις αἵματά ἐν τῇ χυλὸν ἐκκρίνει,
 ὅθεν καὶ ἀνδρόσαμον ἐκλήθη. κλω-
 νάρια ὑποδάσσει, προμνην ἐν τῷ
 10 περὶ φέρει, μέγας κρεῖσσιν, ἐν δὲ
 σπέρμα μέγαν ῥητίνης ὄζον. φύε-
 ῖ ἐν ἐρησίοις καὶ βαρύνει τόποις.
 Δυῶν δὲ ἔχει διουρητικὴν, καὶ
 ἐμμήνων ἀγωγὸν περὶ στέφυον.
 τεταρταίως δὲ καὶ τεταίως ἀπαλ-
 15 λίσσει μετ' οἶνον πνόμυρον. ἑξα-
 πύξ δὲ ἰσχυράς ἐπὶ ἡμέρας μ. τὸ
 σπέρμα πνόμυρον. καὶ τὸ φύλλον
 συν τῷ σπέρματι καταπλατθ-
 ῖται κατὰ καύματα ἰαίνεται.

Περὶ Ἀσκύρου. Κεφ. ροβ.

Ascyron. Cap. CLXXII.

- Ἀσκυρον, οἱ δὲ ἀσχυροειδὲς, οἱ δὲ
 ἀνδρόσαμον, καὶ τὸ τοῦ εἶδος ὅτι
 ὑπερικῆς, μέγας δὲ διαφέρει, κλωστὶ
 μέγας, φρυγαννοειδὲς δὲ καὶ πε-
 ρονομύρον τοῖς φύλλοις λεπτοῖς.
 αὐτὴ δὲ μύλινος φέρει καρπὸν δὲ ὁ-
 μοιον ὑπερικῆς, ὅζοντα ῥητίνης, καὶ
 25 ἐν τῷ περὶ βίβηναι οἰοῖται αἰμάσ-
 σοντα τὰς δακτύλους, ὡς διὰ τῶν
 ἀνδρόσαμον καλεῖται. Ποιεῖ καὶ ὁ
 τέλει καρπὸς πρὸς ἰσχυράς πνόμυ-
 ρος μετ' ὑδρομέλιτος κοτυλῶν β.

ASCYRON siue ascy-
 roides, hyperici genus est, ma-
 gnitudine distans, fruticosus,
 maiores habens ramos, fur-
 culosiores, rubentisque fo-
 lia tenuia: flores luteos, & fru-
 ctum resinofum, hyperico nō
 absimilem: cuius attritu digi-
 ti ferē cruentantur, qua de
 causa androsamon vocauere.
 Vfus seminis ad ischiadicos, po-
 tum in hydromelitis sextario:

B ij nam

DIOSCORIDIS

nam biliosa recremēta amplif-
simè detrahit: sed assiduè da-
re oportet, donec sanitati rē-
stituantur. Illinitur & ambu-
lis efficaciter.

Androsæmum.

Cap. CLXXIII.

Androsæmon ab hyperico,
ascyrōque differt, quod fruti-
cet ramulis furculosis, ac te-
nuibus: rubētibus virgis: & fo-
liis rutæ, triplo aut quadruplo
maioribus, quæ trita vino so suc-
co manant: complureis alas ha-
bet in cacumine, vtrinque ex-
pansas, pinnatasq;: circa quas,
flores pusilli, lutei: & in caly-
culis semē papaveris nigri, in-
signe lineis. Huius comæ tri-
ta resinofum odorem reddūt.
Semen tritum drachmis dua-
bus potum, biliosa alui excre-
mēta pellit: ischiadicis maximè
medetur: sed à purgatione a-
quam exorbere oportet. Her-
ba ambustis illita medetur, vul-
neribus sanguinem cohibet.

Coris. Cap. CLXXIII.

Coris, quod aliqui hype-
ricon vocant, frutex est folio
erice, rubro, pinguiore, ac mi-
nore, non altior dodrante, sua-
vis, odoratus, acris. Potum se-
men menses trahit, & vrinas:
contra

ἀγει γὰρ χολώδη κόπρια πολλὰ
συμειχθεὶς δὲ διδόναι καὶ ἄγχις
αὐτῇ γινώσκονται. πείθει καὶ πύρε-
χματα ἐπιπλασθεῖς.

Πεὶ Ἀνδρόσαιμον.

Κεφ. ρογ.

Ἀνδρόσαιμον, οἱ δὲ διονυσιάδα,
οἱ δὲ καὶ τὸ τοῦ ἄσκυρον χαλκῶσι, δια-
φέρει δὲ τῷ ὕψος καὶ τῷ ἀσκού-
ρου δάμνος ὃν λεπτὸν καὶ φρού-
ραν δὲ πρὸς περὶ οὐκ ἐν τῷ ἑ-
σθίῳ φύλλον τετραπλάσιον ἢ τε-
τραπλάσιον ἢ πηγάς, ἀφ' ὧν
τα οἶνός ἐστιν ἡλικὸν ἀφ' ὧν μαζα-
λὰς δὲ ἔχει πλείους ἐπ' ἄκρῳ τεταρ-
σμοῦ, καὶ ἀπὸ ἀπὸ ἀπὸ ἀπὸ ἀπὸ
μυλῶν καὶ πρὸς ἐν χαλκῷ, ὅμοιος
τῷ τῷ μελαγχρῶς, μύκωνος, οἶνός καὶ
τάχης. ἀνὰ τὴν φθῆσιν δὲ ἡ κό-
ρη, ῥιπνῶς ἐστὶν ἀπὸ δίδωσι.
Καὶ τοῦτου ὁ καρπὸς λεῖος διδόν
ὅλην ποθεῖς, ἀγει χολώδη κό-
πρια. Ἐραπειὴ δὲ μάστιγι ἰσχυ-
ράς δὲ δὲ μετὰ τὴν χάδα σπινθῆ-
ρος ἐπὶ ῥοφῆν καὶ πυρεχματα
δὲ ἡ πῶς καὶ τετραπλάσιον ἰσχυ-
ρὰ καὶ αἷμα ἐπὶ χεῖ.

Πεὶ Κόρεως. Κεφ. ροδ'.

Κόρεως, οἱ δὲ καὶ τὸ τοῦ ὕψος καὶ
λοῦσι, φύλλον ἔχει παρὰ πλείον
τῷ τῷ ἐρεῖκλῳ, μικρότερον δὲ καὶ λι-
παρώτερον καὶ ἐρυθρόν, δάμνος δὲ
ἐστὶ σπιθαμῶν, εὐσμοῦς, δριμύς
καὶ εὐώδης. Τοῦτου ὁ καρπὸς πινθῆ-
ρος, οὗτος καὶ καὶ τετραπλάσιον ἰσχυ-
ρὰ βουθεῖ

βονθεὶ καὶ φαλαγγιστοῖς, ἰ-
σχιδικοῖς τε καὶ ὀπισθοτονικοῖς
συνὸν οἶνον πινόμενος· πρὸς δὲ
ρίνη συνπεπέρεται, ὅπῃ δὲ
ὀπισθοτονικῶν καὶ σύγ-
χρησιμὰ ὅσα συν-
ἐλάττω ἀφ'
μόδι-
ον.*

Περὶ Χαμαπίτυος.

Κεφ. ροζ.

- 10 Χαμαπίτυς, ἣν οἱ ἐν πέντε ὀ-
λόκυρον καλεῖσι, ἀδύνησιν ἰσχύει.
ἐν δὲ ἐνθάδε σιδηρίτην, πῶς ἔρπυσσιν
ἐπὶ γῆς ὑπόκυρτος· φύλλα δὲ ἔχει
ὁμοία ἀειζώῳ μικρῶν, λεπτότερά
15 δὲ πολλῶν καὶ λιπαρώτερα καὶ δου-
σέα, πυκνὰ πρὸς τὰς κλάδας, ὅσ-
μῶς ἔχοντα πίτυος, ἀνθὶν λεπτὰ
μήλων, ἢ λευκὰ ῥίξαν δὲ ὡς κιχά-
ριον. Ταύτης τὰ φύλλα πινόμενα
μὲν οἶνον ἐπὶ ἡμέρας ζ' ἢ κτερον δε-
20 ραπύει ὅπῃ δὲ μὲν ἰσχύει. Σερα-
πύει μὲν ὑδρομέλιτος πινόμε-
να· δίδεται καὶ ἡπατικοῖς καὶ δυσου-
ρίαι καὶ νεφρικοῖς ἰδίως, ἀρμόζον-
τα καὶ σφοδρῶσι. χρῆσθαι δὲ ἀν-
τήν καὶ οἱ ἐν ἡσχικῇ τῇ πομπῇ,
25 ὡς ἀντιδότω πρὸς ἀκόνιτον. πεπύ-
ζοντες τὸ ἀφέψιμα. κατὰ πλάσ-
σεται δὲ πρὸς τὰ σφοδρῶδη μὲν
ἀφ' οἷαν δεδευμένων τῶν ἀφεψί-
μα πρὸς πῶς· λεανθεῖσα δὲ συν-
σύνκοις καὶ ἀντὶ κατὰ πότον δίδο-
μεν.

cōtra phalangiorū morsus, is-
chiadicos, & opisthotonicos
ex vino potū auxilio est horro-
ribus ex pipere, sed opisthoto-
nicis ex oleo, aptissimè illini-
tur. Radix vino decocta pota-
que, defectis opem ferre credi-
tur, sed laborantē inter potan-
dū quam optimè cooperiri li-
cet: siquidem corpus totū de-
sudabit, ex qua repristinā agili-
tatem recuperabit.

Aiuga, siue chamæpitys.

Cap. CLXV.

A I V G A herba in ter-
ra repens: incurvæ similis: fo-
liis semperuiui minoris, mul-
tò tenuioribus, hirsutis & pin-
guioribus, circum ramos den-
sis, odore pinus: flore tenui,
luteo, vel candido: radice ci-
chorij. Folia septem diebus in
vino pota, regio morbo me-
dentur: & quadraginta diebus
ex hydromelite, ischiadicis san-
nant: dantur peculiariter vri-
næ difficultatibus, iocineris, &
renum vitiiis: torminosus pro-
funt. Et apud Heracleam Pon-
ticam, perinde atque antidoto
contra aconitū vtuntur, biben-
tes decoctum. Ad antedicta il-
linitur, cum polenta iure de-
cocti subacta: trita in farinam
& cum fico in pilulis sumpta,
B iij aluum

DIOSCORIDIS

aluum emollit: excepta melle,
cū aris squama & resina deij-
cit: apposita ex melle, vuluæ vi-
tia extrahit: mammarum duri-
tias discutit: vulnera glutinat:
vlcera quæ serpunt, cum mel-
le illita, cohibet.

Aiuga altera.

Cap. CLXXVI.

Alterum est genus aiugæ, cu-
bitalibus ramis, in anchoræ
speciem incuruatis, prætenui-
bus, coma supradictæ: flore
candido: semine nigro: hæc
etiam pinum redolet. Tertia
mas nominatur, paruula, fo-
liis exilibus, albis, pilosis, cau-
le aspero, candido: luteis flos-
culis, semine iuxta alas. Resi-
pit & hæc pinum. Hæ duæ
vim superioris obtinēt,
sed nō vsque adeo
efficacem.

μύνη, μαλάσσει κοιλίαν· ἢ μέλι-
τος δὲ καὶ λεπίδος, καὶ ἑπταῖνης ἀνα-
λινθιδείσθαι καὶ θαίρει· ἀγχεῖ δὲ καὶ τὰ
ἀπὸ ὑστέρας περυσσεδείσθαι συν μί-
λιπ. Διαφορεῖ δὲ καὶ σκληρίας μα-
στῶν, καὶ τραύματα κολλᾷ. καὶ ἐρ-
πυτας ἐπέχει μετὰ μέλιτος κα-
ταπλασσομένη.

Πρὶ Ετέρας χαμαιπί-
πτος. Κεφ. ροζ'.

Εἰ καὶ ἑτέρα χαμαιπίπτος. καὶ ἄ-
λλοις ἐχρυστα πηχυαῖς, ἀγκυρωτοί-
δεῖς, λεπτοκάρφους· κόμην δὲ ἐοι-
κῆσαν τῇ περὶ αὐτῆς, καὶ ἀνθος λευ-
κὸν· σπέρμα δὲ μέλαν· ἀπὸ δὲ καὶ
αὐτῇ πίπτος. Καὶ τελεῖται τις ὅσην
ἄρρη χαλουμένη. ἔστι δὲ βοτάνιον
λείον. ἔχον φυλλάεια λεπτά, λευ-
κά, δασέα· χαμλὸν δὲ* βράχυν, λευ-
κὸν· ἀνθήλια μόνιμα· σπέρμα πον-
δὲ παρὰ τὰς μαχάλας. ὅζει δὲ καὶ
τὸ τοῦ πίπτος. Διὸ αὖτις δὲ ἐχρυσ-
τα καὶ αὐτὰ ὁμοίαν τῇ περὶ αὐτῆς μόνι-
μῳ οὐ μὲν οὕτω περικτηκῆν. 20

TERTII LIBRI
FINIS.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΛΟ-
ΓΟΥ ΤΡΙΤΟΥ.

PEDANI

ΠΕΔΑΚΙΟΥ