

Dispensatorium
pro pharmacopoeis Viennensibus in Austria.

Ex mandato Sac. Caes. Mtatis a collegio medicorum
Viennensium collectum et revisum.

Lectori candido S.

Cum omnibus fere constet, tot hodie doctissimorum viro-
rum atque in re medica expertorum de arte componendi seu
dispensandi pharmaca adeo eruditos ac absolutos libellos extare,
ut in iis non facile aliquid desiderare debeamus, verendum certe
nobis esset merito, ne haec nostra diligentia in edendo novo
dispensatorio vitio potius quam laudi a plerisque tribueretur,
nisi et summa Imperatoris autoritate et optimis consilii nostri¹⁾
rationibus niti factumque defendere possemus.

Cum enim hactenus multis annis pharmacopoei in hac
urbe sua medicamenta variis modis et secundum diversorum
authorum descriptiones praeparare et componere consuevissent,
judicavimus sane ex tanta compositionum varietate, dum inter
veteres alii Mesuen alii Nicolaum, inter recentiores alii Fuchsium,
alii Cordum, nonnulli etiam incerti authoris scriptos codices
sequerentur, tanta absurda atque incommoda oriri posse, ut
una et eadem massa in unius officina ad solvendum alvum
fortior, alibi vero languidior sit.

¹⁾ Hier sind die in Angelegenheit des Dispensatorium abgehaltenen
Fakultätssitzungen gemeint.

Dem aufrichtigen Leser Heil!

Da es — wie fast allgemein bekannt — heutzutage so vieler hochgebildeter und in der Heilkunde erfahrener Männer derart gelehrte und vollendete Büchlein über die Kunst des Zusammensetzens oder Dispensierens der Arzneien gibt, daß man hierin nicht leicht noch irgend etwas zu wünschen vermag, müßten wir allerdings mit Recht befürchten, es könnte dieser unser Eifer bei Herausgabe eines neuen Dispensatorium uns von den Meisten eher zum Tadel denn zum Lobe angerechnet werden, wenn wir uns nicht ebenso auf die oberste Autorität des Kaisers, wie auch auf die besten Erwägungen unserer Ratsversammlung stützen und damit unser Werk verteidigen könnten.

Da nämlich die Apotheker dieser Stadt bisher durch viele Jahre ihre Arzneien nach mannigfacher Art und Vorschreibung verschiedener Gewährsmänner zu präparieren und herzustellen gewohnt waren, glaubten wir, daß bei solcher Verschiedenheit in der Zusammensetzung — da Einige von den älteren Autoren dem Mesue, Andere dem Nicolaus, Andere von den neueren Autoren dem Fuchsius, Andere dem Cordus, Einzelne auch den Handschriften eines unbekannten Gewährsmannes folgten — wohl so große Abgeschmacktheiten und Nachteile entstehen können, daß eine und dieselbe Masse in dieser Offizin ein kräftigeres, anderswo aber ein schwächeres Abführmittel darstellt.

Deinde adeo numerosam medicamentorum congeriem sibi parandam ex variis authoribus praescribebant ipsi, ut vix pari diligentia et labore tam exiguo commodioris temporis²⁾ spatio et confici et justo modo parari omnia potuerint.

Accessit et hoc, quod pharmacopoei nostri manuscripta tantum dispensatoriorum exempla in officinis habebant, ex quibus componere pharmaca consueverant, unde verendum merito fuit, ne error qualiscunque scriptoris incuria commissus in compositione medicamenti errorem quoque non contemnendum pareret, non sine medicorum infamia et periculo aegrorum.

Has et similes ob causas, cum ante quadriennium Imperator Ferdinandus felicissimae memoriae novam pharmacopolarum reformationem edidisset simul mandavit, ut una communis dispensatorii norma conciperetur et a nostra facultate revisa atque correcta omnibus in hac urbe pharmacopoeis proponeretur, quam solam tanquam communem regulam intueri atque ad ejus praescriptum pharmaca singuli praeparare possent.

Cui mandato nos ea qua decebat reverentia obtemperantes, hactenus non quidem ex nostro arbitrio novam prorsus, sed tamen unam certam et communem dispensandi formam ex optimis quibusque authoribus collegimus, addentes ea, quae partim a praecessoribus nostris medicinae doctoribus jam dudum praescripta in usum venerunt, partim etiam a nobis experientia teste probata sunt.

Et speramus sane, si aliud nihil hoc nostro studio et labore profectum sit, saltem incommoda quaedam antea

²⁾ Die Präparation vieler Arzneien wie des Theriak und Mithridat durfte nur in der warmen Jahreszeit vorgenommen werden. Gleiches galt von den frischen Frucht- und Pflanzensäften, daher sich gerade im Sommer die Arbeit sehr anhäufte.

Die Apotheker pflegten sich ferner aus verschiedenen Autoren einen solchen Wust von Arzneien zur Bereitung vorzuschreiben, daß sie kaum mit gleicher Umsicht und Ausdauer in der so kurzen Spanne, wo der Zeitpunkt geeigneter ist, dieselben sowohl zu bereiten wie ordnungsmäßig herzurichten imstande waren.

Hiezu kommt noch der Umstand, daß unsere Apotheker nur handschriftliche Dispensatorien, nach welchen sie die Arzneien herzurichten pflegten, in den Offizinen hatten, daher man berechtigterweise fürchten mußte, es könnte irgend ein durch die Sorglosigkeit des Abschreibers bei der Zusammensetzung der Arznei begangener Irrtum einen ebensolchen gar nicht gering zu achtenden Fehler dem Arzte zur Schande, dem Kranken zur Gefahr, erzeugen.

Aus diesen und ähnlichen Gründen gab vor vier Jahren Kaiser Ferdinand hochseligen Angedenkens anläßlich der neuen Apothekerordnung gleichzeitig den Auftrag, es solle ein gemeinsames Dispensatorium verfaßt, von unserer Fakultät durchgesehen und verbessert, allen Apothekern dieser Stadt vorgelegt werden, welches sie gewissermaßen als gemeinsame Norm ansehen und nach dessen Vorschrift sie die Arzneien zubereiten könnten.

Diesem Befehle mit geziemender Ehrfurcht folgend, haben wir nun zwar nicht nach eigenem Gutdünken eine ganz neue, aber doch einheitliche, bestimmte und allgemeine Dispensierform aus den besten Autoren zusammengestellt und jene Vorschriften hinzugefügt, welche teils durch unsere ärztlichen Vorgänger seit langer Zeit gebräuchlich waren, teils auch von uns auf Grund der Erfahrung erprobt wurden.

So hoffen wir denn, daß, wenn durch dieses unser Streben und Unternehmen gar nichts anderes erzielt worden sein sollte, so doch wenigstens gewisse vorher beobachtete Übelstände nunmehr verhütet werden können und weder ein Zweifel über die Form einer Zusammensetzung besteht, noch ein Fehler in der Handschrift zu besorgen ist, sondern man der

depraehensa ita posthac caveri posse, ut nec de compositionis forma dubitandum, nec manuscripti exemplaris errore metuendum sed pharmacopoei diligentiae, quae paucioribus et in certum numerum redactis pharmacis melius adhiberi poterit, tutius etiam confidendum sit.

Restat igitur, ut et tu candide lector hunc congestum laborem non ambitione aliqua nostra aut doctrinae jactantia sed Caes. Mtatis domini nostri clementissimi jussu et pro certiori aegrorum salute susceptum boni consulas deque nobis omnibus non secus ac candide sentias et judices.

Aufmerksamkeit des Apothekers, welche dieser den wenigen auf eine bestimmte Zahl beschränkten Mitteln besser zuwenden wird können, um so sicherer vertrauen darf.

Es erübrigt nun noch, daß auch du aufrichtiger Leser diese nicht aus irgend welchem Ehrgeiz von unserer Seite oder um mit Gelehrsamkeit zu flunkern, zusammengestellte, sondern auf Befehl der kaiserlichen Majestät unseres allergütigsten Herrn und im Interesse des sichereren Heiles der Kranken unternommene Arbeit gut aufnimmest und über uns alle nicht anders als aufrichtig denkst und urtheilst.

I. Electuaria et confectiones aromaticae corroborantes.

1. Diambra. Descriptione Mesue.

- R. Cinnamomi, Doronici veri vel Zedoarie, Caryophyllorum, Macis, Nucis muscatae, Folii vel ejus loco Nardi Celtice, Galangae . . . ana dr. III.
 Spicae Indicae, Cardamomi maior. et min. . . ana dr. I.
 Zingiberis, dr. 1. s.
 Sandali citrini, Ligni Aloës, Piperis longi . . ana dr. II.
 Ambrae dr. I.
 Moschi dr. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

2. Diamoschum dulce. Descriptione Mesue.

- R. Croci, Doronici veri seu ejus loco duplicetur dosis Zedoariae vel Caryophyllorum duae tertiae, Ligni Aloës, Macis ana dr. II.
 Margaritarum albarum, Serici crudi (diligenter exsiccati et minutim concisi), Carabe, Corallii rubei, Galliae Moschatae verae, Ocimi citrati ana dr. II. s.
 Been albi, rubei, Folii aut ejus loco Cassiae ligneae (vel nardi celticae), Spicae Indicae, Caryophyllorum ana dr. I.
 Zingiberis, Cubebae, Piperis longi ana dr. I. s.
 Moschi scr. II.
 Sacchari albi quadruplum.

3. Diamoschum amarum.

- R. Species Diamoschi dulcis, quibus adde, Absinthii, Rosarum ana dr. III.
 Aloës lotae unc. s.
 Castorei, Seseleos aut Levistici ana dr. I.
 Cinnamomi dr. I. s.

4. Dianthos. Descriptione Nicolai.

- R. Florum Roris marini unc. I.
 Violarum, Rosarum, Glycyrrhizae ana dr. VI.
 Charyophyllorum, Spicae Indicae, Nucis Muscatae, Galangae, Cinnamomi, Zingiberis, Zedariae, Macis, Ligni Aloës, Cardamomi, Sem. Anisi, Anethi ana scr. IV.
 Sacchari quadruplum.

5. Diatragacanthum frigidum. Descriptione Nicolai.

- R. Tragacanthae albiss. unc. II.
 Gummi arabici dr. X.
 Amyli unc. s.
 Glycyrrhizae, Nucleorum seminum Cucurbitae, Cucumeris, Citrulli, Melonis ana dr. II.
 Camphorae scr. s.
 Penidiarum unc. III.
 Sacchari albissimi quadruplum in decoctione Violarum purpurearum dissoluti in qua emulsae sint Sem. papaveris dr. III.

6. Diatragacanthum cum bolo.

- R. Specierum Diatragacanthu frigidi unc. I.
 Boli Armeni optime praeparati scr. I. s.
 Fiat confectio ut superius.

7. Diapenidium. Descriptione Nicolai.

- R. Penidiarum dr. XVI.
 Pinearum, Amygdalarum dulcium amararum,
 Papaveris albi ana dr. III. scr. I.
 Cinnamomi, Garyophyllorum, Zingiberis, Succ
 Glycyrrhicae, Tragacanthae, Gummi arabici,
 Amyli candidissimi, Seminum quatuor frigi-
 dorum malorum enucleatorum ana dr. I. s.
 Camphorae gr. VII.

Misce fiant Species. Pro tabulatis vero
 conficiantur cum sacchari in decoctione viola-
 rum dissoluti quadruplo.

8. Diaireos Salomonis ex Nicolao.

- R. Ireos unc. I.
 Pulegii, Hyssopi, Glycyrrhizae ana dr. VI.
 Tragacanthae, Amyli, Amygdalarum amara-
 rum, Pinearum, Cinnamomi, Zingiberis, Piperis ana dr. III.
 Caricarum, Passularum enucleatarum, Car-
 nium Dactylorum ana dr. III. s.
 Styracis calamitae rubeae dr. II. scr. I.

Sacchari albissimi quadruplum.

9. Diaireos simplex.

- R. Ireos unc. s.
 Sacchari candi, Specierum diatragacanthi
 frigidi ana dr. II.
 Sacchari albissimi quadruplum.

10. Diahyssopus ex Nicolao.

- R. Hyssopi, Ireos, Thymi, Piperis nigri ana dr. XXX.
 Pulegii, Thymbrae vel ejus loco Satureiae,
 Rutae, Cymini ana dr. XX.
 Carnium Dactylorum, Tragacanthae, Gly-

cyrrhizae, Caricarum pinguium, Passularum
 enucleatarum, Foeniculi ana dr. X.
 Zingiberis, Anisi, Carvi, Seminis Levistici ana dr. V.
 Sacchari quadruplum.

11. Diacodion simplex in tabulis.

R. Capita papaveris albi mediocria magnitudine
 nec nimium viridia nec nimium matura numero XX.
 Aquae pluvialis recentis purae vel fontanae lib. III.
 Macera 24 horis vel si sint sicciora diutius.
 Postea coque donec contabuerint et cola.
 Adde Sacchari q. s. fiant rotulae s. a.

12. Diacodion cum Sapa.

R. Decoctionis praedictae, Sapae vini dulcis ana lib. II.
 Liquiritiae unc. II.
 Coquantur ad justam consistentiam.

13. Diacodion compositum secundum Mesuen.

R. Caput papaveris flaccidorum nō X.
 Aquae pluvialis lib. I. s.
 Coquantur ad tertias, ita ut tertia pars aquae
 supersit. Colaturae expressae adde:
 Sapae optimae ad tertias coctae unc. III.
 Mellis optimi unc. I.
 Coquantur ad perfectionem deinde addantur:
 Acaciae liquidae, Hypocistidis, Croci, Myrrhae,
 Florum balaustiorum ana dr. I.
 Trochiscorum Ramich dr. IV.
 Misceantur secundum artem.

14. Manus Christi simplex.

R. Sacchari albissimi lib. I.
 Aquae rosarum lib. s.
 Coquantur ad consumptionem aquae rosaceae.

15. Manus Christi perlata.

- R. Confectionis super. simpl. lib. I.
 Margarit. praeparat. unc. I.

16. Diamargariton frigidum descriptione incerti Authoris.

- R. Nucleorum seminum Citrulli, Cucurbitae, Melonum, Cucumerum, Seminis Portulacae, Papaveris albi, Sandali albi, citrini, Ligni Aloës, Zingiberis, Rosarum rubearum, Florum Nymphaeae albae, Borraginis, Myrtillorum verorum (veri sunt Italici non nostrates) ana dr. I.
 Corallii albi, Corallii rubei ana dr. s.
 Margaritarum dr. III.
 Sacchari quadruplum.

17. Diamargariton calidum. Descriptione Avicennae.

- R. Margaritarum non perforatarum, Pyretri ana dr. I.
 Zingiberis, Mastiches ana dr. IV.
 Zedoariae, Charyophyllorum, Seminis Apii, Thapsiae, loco ejus Cassiae lignae, Cardamomi, Nucis Muschatae, Macis ana dr. II.
 Been rubei, Piperis, Piperis longi ana dr. III.
 Cinnamomi dr. V.
 Sacchari quadruplum.

18. Electuarium de Gemmis. Secundum Mesuen.

- R. Margaritarum alb. dr. III.
 Saphyri, Hyacinthi, Sardi id est Carneolae, Granatorum, Smaragdi ana dr. I. s.
 Zedoariae, Corticum citrei mali, Macis, Seminis Ocymi charyophyllati ana dr. II.

Corallii rubei, Carabae, Rasurae Eboris . . .	ana scr. II.
Been albi, Been rubei, Charyophyllorum, Zingiberis, Piperis longi, Spicae Indicae, Folii vel Cassiae lignae ejus loco, Croci, Carda- momi majoris	ana dr. I.
Trochiscorum de Rosis, Ligni Aloës, Cinna- momi, Galangae, Zurumbeth	ana dr. I. s.
Foliorum Auri, Argenti	ana scr. II.
Ambrae	dr. II.
Moschi	dr. s.
Sacchari albissimi quadruplum.	

19. Electuarium laetificans Conciliatoris.

R. Succi pomorum dulcium, Buglossi, despu- matorum	ana dr. V.
Charyophyllorum, Corticis Citrii, Flor. Borra- ginis, Rosarum, Been albi, Been rubei, Corallio- rum, Eboris, Quinque generum Myrobalanorum	ana unc. s.
Antispodii, Macis, Galliae Moschatae, Succini, Chartilaginis osseae de corde cervi, Sandalo- rum rubeorum, Margaritarum	ana dr. III.
Seminis Ocymi, Malabathri, Myrtorum, Me- lissae, Coriandri praeparati, Cinnamomi, Ga- langae, Zedoariae, Spicae Nardi, Ligni Aloës, Serici crudi minutim incisi, Croci	ana dr. II.
Berillorum, Smaragdorum, Hyacinthorum, Sar- donii id est Carneolae, Saphirorum, Granatorum	ana dr. I.
Fol. Auri, Argenti	ana dr. I. s.
Camphorae, Ambrae	ana scr. V.
Moschi	dr. I.
Sacchari albissimi quadruplum.	

20. Electuarium Plirisarcoticum. Des-
criptione Mesue.

R. Cinnamomi, Charyophyllorum, Ligni Aloës, Galangae, Spicae Indicae, Nucis Muscatae,	
--	--

Zingiberis, Spodii, Schoenanthi, Cyperi, Rosarum, Violarum ana dr. I. gr. XV.
 Folii vel Macis, Glycyrrhicae, Mastiches, Styracis Calamitae, Majoranae, Balsamitae seu Menthae aquaticae, Ocymi, Cardamomi, Piperis longi, Piperis albi, Myrtillorum verorum, Corticis mali Citrii ana scr. II. gr. V.
 Margaritarum splendorum, Been albi, Been rubei, Coralli rubei, Serici tosti ana scr. I. gr. II. s.
 Moschi gr. VII. s.
 Camphorae gr. V.
 Sacchari albissimi quadruplum.

21. Confectio Liberantis.

R. Cinnamomi electi, Radic. Tormetillae, Herb. Scordii, Cardui benedicti ana unc. s.
 Charyophyllorum, Rosarum, Sem. Portulacae, Coriandri praeparati, Rasurae Eboris ana dr. III.
 Cornu cervi usti, Sem. Citri excorticati, Arantiorum vel Limonum ana dr. VI.
 Ligni Aloës, Nucis Muscatae, Sem. Anisi, Foeniculi, Sem. Bombacis, Serici crudi tosti, Granorum Juniperi in aceto Rosarum praeparatorum, Osis de Corde Cervi, Dietamni Cretici, Scabiosae, Florum Buglossae ana dr. I.
 Boli Armeni praeparati unc. IV.
 Sandalorum omnium ana dr. I.
 Quinque lapidum praecios. ana scr. II.
 Margaritarum dr. I.

Misce et fiat pulvis subtilissimus s. a.
 Pro tabulatis autem cum quadruplo Sacchari albi dissoluti in aquis Ros. Melissae vel Buglossae fiat confectio in tabulis quadratis.

22. Confectio Morsellorum Facultatis.

R. Hyacinthorum praeparat. dr. III.
 Smaragdorum, Sapphirorum, Rubinorum praeparat. ana dr. I.

Margaritarum alb. non perforat.	dr. I. s.
Corallorum amborum praeparat.	ana unc. s.
Boli Armeni Orient. praeparat.	unc. I.
Cristalli praeparati.	dr. I.
Lap. Aëtitis in aqua Rosarum vel Acetosae praeparati.	dr. III.
Rad. Dictamni, Zedoariae, Tormetillae, An- gelicae, Cyperi, Valerianae, Morsus Diaboli, Tapsi barbati, Pimpinellae, Been utriusque, Rhabarbari electissimi	ana unc. s.
Cornu cervi usti praeparati	dr. III.
Ligni Aloës electi, Rasurae Eboris, Sandalo- rum rubeorum, citrinorum	ana dr. I.
Corticum et sem. Citri	ana dr. II.
Sem. Cardui benedicti	dr. I.
Croci Austriaci	dr. I. s.
Herb. Salviae, Rutae, Calendulae, Scabiosae	ana dr. I.
Cinnamomi optimi, Scordii veri	ana unc. s.
Sem. Portulacae, Acetosae, Coriandri praep.	ana scr. I.
Flor. Borraginis, Buglossae, Anthos, Nymphaeae albae, Violarum	ana dr. I. s.
Rosarum rub.	dr. II.
Camphorae	dr. I. s.
Folior. Auri, Argenti	ana nō X.

Misceantur et pulverisentur omnia sub-
tilissime et cum quadruplo sacchari albi in
aquis cordialibus dissoluti, fiat Confectio in
Morsellis.

23. Mixtura theriacalis facultatis.

- R. Specierum confectionis Morsellorum facultatis unc. VI.
Infundantur in Syrupo acetositatis Citri lib. I. s.
Stent ita tribus diebus ac noctibus in loco
temperate calido et saepe agitentur. Deinde
adde: Theriacae electae, Mithridatii electi ana lib. I.
Misceantur diligenter.

24. Diaſcordium Fracaſtorii.

R. Cinnamomi, Cassiae lignae	ana unc. s.
Scordii	unc. I.
Dictamni Cretici, Tormentillae, Bistortae,	
Galbani, Gummi	ana unc. s.
Opii	dr. I. s.
Styracis	dr. IV. s.
Sem. Acetosae	dr. I. s.
Gentianae	unc. s.
Boli Armenii	unc. I. s.
Terrae sigillatae	unc. s.
Piperis longi, Zinziberis	ana dr. II.
Mellis albi despumati	lib. II. s.
Vini aromatici	lib. s.
Sacchari rosati	lib. I.
Misce.	

25. Aromaticum rosatum. Descriptione
Gabrielis.

R. Rosarum rubearum	dr. XV.
Glycyrrhicae rasae	dr. VII.
Ligni Aloës, Sandali Citrini	ana dr. III.
Cinnamomi electi	dr. V.
Macis, Charyophyllorum	ana dr. II. s.
Gummi Arabici, Tragacanthae	ana dr. II. scr. II
Nucis Muscatae, Cardamomi minoris, Galangae	ana dr. I.
Spicae Indicae, Ambrae griseae	ana scr. II.
Moschi	scr. I.
Sacchari quadruplum.	

26. Diagalanga. Descriptione Mesue.

R. Galangae, Ligni Aloës	ana dr. VII. (Alii omnes dr. VI. praeter Cordum.)
Charyophyllorum, Macis, Levistici	ana dr. II.

Zingiberis, Piperis longi, Piperis albi, Calami
aromatici / Acori veri, Cinnamomi ana dr. I. s.
Calaminthae siccae, Cardamomi majoris, Spicae
Indicae, Seminis Apii, Seminis Foeniculi,
Seminis Anisi, Seminis Carvi ana dr. I.
Sacchari albissimi quadruplum.

27. Diatrionpipereon Galeni.

R. Trium piperum dr. L.
Anisi, Thimi, Zinziberis ana dr. VIII.
Sacchari quadruplum.

28. Confectio Imperatoris.

R. Zinziberis albi unc. I.
Cinnamomi electi unc. s.
Galangae, Charyophyllorum ana dr. III.
Zedoariae, Cubearum, Piperis longi, Grano-
rum paradisi, Coriandri praeparati ana dr. I.
Macis, Nucis Muscatae ana dr. II.
Incidantur grosso modo et cum sacchari
quadruplo fiat confectio in morsellis.

29. Zinziber coctum.

R. Pulv. Zinziberis dr. V.
Sacchari unc. V.
Fiat confectio in morsellis.

30. Zedoaria cocta.

Fit eodem modo ut Zinziber coctum.

31. Diaxyloaloës. Descriptione Mesue.

R. Ligni Aloës crudi, Rosarum ana unc. I.
Charyophyllorum, Spicae Indicae, Macis, Nucis

Dr. Senfelder, Dispensatorium.

2

Muscatae, Galliae Moschatae, Cubebae, Cardamomi majoris, Cardamomi minoris, Mastiches, Cinnamomi, Cyperi, Schoenanthi, Zedoariae, Been albi, Been rubei, Folii aut loco ejus Macis, Serici crudi, Margaritarum, Corallii rubei, Carabae, Fol. Citri, Corticum Citrii mali, Ocymi Charyophyllati, Sisymbrii, Menthae siccae, Majoranae, Piperis longi, Zingiberis ana dr. IV.
 Moschi boni scr. I.
 Ambrae dr. I. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

32. Diacyminum Descriptione Nicolai.

R. Cymini praeparati aceto infusi et iterum exiccati dr. VIII. scr. I.
 Cinnamomi, Charyophyllorum ana dr. II. s.
 Piperis nigri, Zingiberis ana dr. II. gr. V.
 Galangae, Thymbrae loco ejus Saturejae, Calaminthae ana gr. I. scr. II.
 Ammeos, Levistici ana dr. I. gr. XVIII.
 Piperis longi dr. I.
 Spicae Indicae, Cardamomi, Nucis Muscatae ana scr. II. s.
 Sacchari quadruplum.

33. Diacalamentum Galeni.

R. Calaminthae, Pulegii, Petroselini, Seseleos ana unc. I.
 Apii, Cacuminum Thymi ana unc. II.
 Sem. Levistici unc. VIII.
 Piperis unc. XXIV.
 Sacchari quadruplum.

34. Diacorum Mesue.

R. Radicum Secacul vel Pastinacae albae sylvestris, Acori, Calami aromatici vulgo dicti, Pinearum. ana lib. I. s.

Radices Secacul mundatae et incisae coquantur in aqua clara, donec aqua consumatur, postea optime pistentur et in minutissimas partes conterantur, donec pulti similes fiant. Deinde affunde eis mellis odorati et optime despumati lib. X.

Coquantur lento igne, donec tota aqua, quam radices Secacul imbibebunt in vaporem resoluta sit, diligenter agitando, ne ad vasis fundum adurantur radices. Cum autem justae spissitudinis consistentiam acquisiverit, ab igne deponito et adde radices Acori tenuissime tritas et Pineas minutissime incisae cum subsequenti pulvere optime mistas.

- R. Piperis (nigri) unc. I.
 Piperis longi, Charyophyllorum, Zingiberis,
 Rosarum, Macis ana dr. IV.
 Nucis Muscatae, Galangae, Cardamomi . . . ana dr. III.

Omnia ista simul cum melle et radicibus Secacul misceto et unito diligenter agitando, ne grumi aliqui relinquantur.

35. Electuarium de baccis Lauri. Descriptione Rasis.

- R. Sem. Rutae dr. X.
 Ammeos, Cymini, Nigellae, [Sem. Levistici,
 Origani, Carvi, Amygdalarum amararum,
 Piperis nigri, Piperis longi, Menthastris, Dauci,
 Acori, Calami aromatici vulgo dicti, Baccarum
 Lauri, Castorei ana dr. II.
 Sagapeni unc. s.
 Opopanacis dr. III.
 Mellis despumati triplum h. e. lib. I. unc. IV. dr. VII.

36. Diarhodon Abbatis. Ex Nicolao.

- R. Sandali albi, Sandali rubei ana dr. II. s.
 Tragacanthae, Gummi Arabici, Spodii ana scr. II.
 Melissae (Reliqui omnes ponunt Asari),
 Mastiches, Spicae Indicae, Cardamomi, Succ
 Glycyrrhicae, Croci, Ligni Aloës, Charyo-
 phyllorum, Galliae Muscatae Mesue, Sem.
 Anisi, Sem. Foeniculi, Cinnamomi, Rhabbarbari,
 Sem. Ocymi, Acinorum Berberis, Sem. Sca-
 riolae, Sem. Portulacae, Nucleorum sem.
 Cucurbitae, Nucleorum sem. Citrulli, Nucleo-
 rum sem. Cucumeris, Nucleorum sem. Melonis,
 Sem. papaveris albi ana scr. I.
 Margaritarum praeparatarum, Corallorum,
 praeparatorum, Ossium de corde cervi ana scr. s.
 Sacchari Candi, Rosarum ana unc. I. dr. III.
 Camphorae gr. VII.
 Moschi gr. III. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

37. Rotulae de succis.

- R. Specierum Diarrhodon Abb. unc. I.
 Mirobalanorum nigrorum, Mirobalanorum Che-
 bulorum, Mirobalanorum Indorum, Rhabbarbari ana dr. s.
 Epithymi, Polypodii, Succ Fumi terrae exiccati ana scr. I.
 Succ Eupatorii, Spicae, Sqinanthi ana dr. s.
 Sacchari quadruplum.
 Fiat confectio in rotulis cum aqua rosata.

38. Diatrion Sandalon. Descriptione Nicolai.

- R. Trium Sandalorum, Rosarum ana dr. II. scr. II.
 Violarum, Rhabbarbari, Spodii, Succ Glycyrrhicae, Sem. portulacae ana dr. II.

Gummi Arabici, Tragacanthae, Sem. Papaveris,
 Sem. Cucumeris, Sem. Cucurbitae, Sem. Citruli
 Sem. Intybi ana dr. I. scr. I.
 Camphorae scr. I.
 Sacchari albissimi quadruplum.

39. Dialacca. Descriptione Mesue.

R. Laccae praeparatae, Rhabbarbari ana dr. III.
 Spicae Indicae, Mastiches, Apii, Folliculorum
 Schoenanthi, Absinthii, Succu Eupatorii Mesue,
 Ammios, Sabinae, Amygdalarum amararum,
 Costi, Myrrhae, Rubeae tinctorum verae,
 Foeniculi, Anisi, Asari, Aristolochiae longae,
 Aristolochiae rotundae verae, Gentianae,
 Croci, Cinnamomi, Hyssopi, Cassiae lignae
 verae, Summitatum Schoenanthi, Bdellii ana dr. I. s.
 Piperis, Zingiberis ana dr. I.
 Sacchari albissimi quadruplum.

40. Diacurcuma. Descriptione Mesue.

R. Tragacanthae dr. I.
 Croci, Asari, Petroselini Macedonici, Dauci,
 Anisi, Apii ana unc. s.
 Rhabbarbari, Meu, Spicae Indicae ana dr. VI.
 Costi, Myrrhae, Cassiae lignae verae,
 Schoenanthi, Olei Charyophyllorum per ex-
 pressionem facti non per elambicationem,
 Rubeae tinctorum verae, Succu Absinthii,
 Succu Eupatorii Mesue, Opobalsami, Calami
 aromatici, Cinnamomi ana dr. I. s.
 Scordii, Scolopendriae, Succu Glycyrrhicae ana dr. II. s.
 Sacchari albissimi quadruplum.

41. Electuarium de Limatura chalybis.

R. Mucilaginis Althaeae	lib. II.
Mellis despumati	lib. IV.
Glycyrrhicae	dr. XVIII.
Betonicae, Melissae	ana unc. s.
Cuscutae, Tamarisci	ana unc. I.
Sem. Anisi, Rubeae tinctorum	ana unc. s.
Zingiberis	dr. II.
Passularum enucleatarum	unc. II. s.
Cinnamomi electi	dr. V.

Misce et fiat electuarium, cui adde in fine limaturae chalybis praeparati, per tres dies macerati in aceto deinde exiccati unc. V. dr. II.

42. Electuarium de passulis.

R. Uvarum passarum enucleatarum	dr. VI.
Pistachiorum	dr. III.
Cuscutae	dr. I. s.
Cinnamomi el., Cassiae lignae, Schoenanthi,	
Croci, Spodii	ana scr. s.
Santali albi, Santali rubei, Rosarum rubearum	ana dr. s.
Specierum Dialaccae	dr. I.
Rhabarbari	dr. s.
Sacchari dissoluti in vino odorifero	unc. VI.

Fiat electuarium secundum artem.

43. Diasatyrium. Descriptione Nicolai.

R. Testiculorum Satyrii recentium	dr. XV.
Radicum Pastinacae sativae recentium, Radicum Siseris vel Pastinacae sylvestris, Nucis Indicae, Pinearum, Pistachiorum	ana dr. XII.
Charyophyllorum, Zingiberis, Anisi, Seminis Erucae, Linguae avis (seminis fraxini)	ana dr. V.

Cinnamomi, Caudarum Scincorum ana dr. II. s.
 Moschi gr. VII.
 Mellis despumati optimi triplum.

Radices singulae privatim et seorsim bene tritae melli imponantur ac subigantur paululumque molliusculo igne fervescent. Deinde Pistacia et nuces Pineae repurgatae ac tusae adjiciantur, ubi cum melle aliquantulum bullierint sublato ab igne lebetes species tusae et cribratae adjiciantur, postremo moschus cum exigua aqua destillata inseratur. Rursus haec probe subacta ponantur ad vasculum.

44. Lithontribon Nicolai.

R. Spicae Indicae, Zingiberis, Xylobalsami vel loco ejus Ligni Aloës, Acori vel Calami aromatici, Cinnamomi, Peucedani loco ejus Pimpinellae Italicae, Meu vel loco ejus Seseli Cretici, Trium piperum, Saxifragiae ana dr. II. s.
 Opobalsami vel loco ejus olei Juniperi, Charyophyllorum, Costi, Rheupontici, Glycyrrhicae, Cyperi, Tragacanthae, Chamaedreos, Sem. Apii, Sem. Ammios, Sem. Asparagi, Sem. Ocymi, Sem. Urticae, Sem. Citri ana dr. I. gr. XV.
 Folii vel loco ejus Macis, Croci, Schoenanthi, Cassiae lignae, Bdellii, Masticis, Ireos, Amomi, Ligustici, Milii solis, Petroselini Macedonici, Seselios, Cardamomi, Anethi, Euphorbii, Lapidis Lyncis, Olei Nardini, Olei Moschelini ana scr. I.

Misceantur fiant species.

45. Species electuarii Justini.

- R. Folii vel Macis, Cinnamomi, Costi, Spicae Indicae, Cassiae lignae, Aristolochiae longae, Aristolochiae rotundae, Enulae Campanae, Hyssopi, Pulegii, Artemisiae, Radicis Pentaphylli, Piperis albi, Orobi veri, Petroselini, Levistici, Petroselini Macedonici, Seminis Urticae, Milii solis, Seminis Saxifragiae, Baccarum Juniperi, Seminis Asparagi, Sileris montani, Seminis Apii, Seminis Anethi, Seminis Ruthae, Seminis Citrei mali, Seminis Foeniculi, Seminis Anisi, Baccarum Lauri . . . ana dr. I. s.
Fiat pulvis.

46. Electuarium de Sorbis.

- R. Carnis Sorborum propemodum maturorum coctorum in aqua, cui prius rosae et cortices granatorum incocti fuerint lib. IV.
Pulv. Myrtillorum, Pulv. Mali corii, Pulv. Hypocystidos, Pulv. Masticis ana dr. III.
Pulv. Rosarum rubearum dr. II.
Pulv. Lapidis Haematitis praep., Boli Armeni orientalis praep. ana dr. I.
Pulv. sem. Plantaginis dr. II.
Sacchari lib. III.
Coque ad crassitiem aliquam.

II. Confectiones opiatæ.

47. Mithridatium Damocratis ex Galeno.

- R. Myrrhae, Croci, Agarici, Zingiberis, Cinnamomi, Thuris, Thlaspios, Spicae nardi . . . ana dr. X.
Seseleos, Succis balsami vel succedanei, Junci odorati, Costi, Galbani, Stoechados,

Terebinthinae, Piperis longi, Castorei, Hypocistidos, Styracis, Opopanax, Folii aut succedanei	ana unc. I.
Casiae, Polii, Piperis albi, Scordii, Sem. Dauci, Carpobalsami, Trochiscorum Cypheos, Bdellii	ana dr. VII.
Nardi Celticae, Gummi, Sem. Petroselini, Opii, Cardamomi, Sem. Foeniculi, Gentianae, Fol. rosarum, Dictamni Cretici.	ana dr. V. boni pond.
Anisi, Ari, Acori vel Calami aromatici vulgo appellati, Phu, Sagapeni	ana dr. III.
Mei, Acaciae, Ventris scinci veri, Succu Liquiritiae, Sem. Hypericon	ana dr. II. s.

Vini q. s. succis et liquoribus dissolvendis, mellis optimi et despumati tantum ut una cum vino addito constituat triplum totius compositionis.

Confice secundum artem ut docet Galenus.

48. Theriaca Andromachi ex Galeno.

R. Trochiscorum scylliticorum	unc. VI.
Trochiscorum de Vipera, Trochiscorum Hedychroi, Piperis nigri, Opii	ana unc. III.
Rosarum aridarum, Scordii, Sem. Napi, Iridis Illyricae, Agarici, Cinnamomi, Succu Glycyrrhicae, Opobalsami	ana unc. I. s.
Myrrhae, Croci, Zingiberis, Rhapontici, Rad. Quinquefol., Calaminthae montanae, Marrubii, Petroselini, Stoechados, Costi, Piperis longi, Dictamni, Florum Junci odorati, Thuris, Terebinthinae, Casie fistulae, Nardi Indicae	ana dr. VI.
Polii Cretici, Seseleos, Styracis, Thlaspios, Ameos, Chamaedryos, Chamaepithyos, Succu Hypocistidos, Malabathri vel succedanei, Nardi Celticae, Radicum Gentianae, Anisi, Mei, Sem. Foeniculi, Terrae Lemniae, Chalcitidis ustae,	

Amomi, Acori, Phu pontici, Carpobalsami,
 Hyperici, Acaciae, Gummi, Cardamomi . . . ana unc. s.
 Sem. Dauci, Galbani, Sagapeni, Opopanacis,
 Bituminis, Castorei, Centaurei minoris, Aristo-
 lochiae tenuis ana dr. II.
 Mellis lib. X.

Vini generosiss. quantum ad liquores
 et gummata dissolvenda sufficit. Confice
 diligenter secundum artem ut docet Galenus.

49. Theriaca Diatessaron. Descriptione
 Mesue.

R. Gentianae, Baccarum Lauri, Myrrhae, Aristo-
 lochiae rotundae ana unc. II.
 Mellis despumati optimi lib. II.

50. Philonium Romanum.

R. Piperis albi, Sem. Hyoscyami albi ana dr. V.
 Opii dr. II. s.
 Cinnamomi optimi dr. III.
 Seminis Apii dr. I.
 Petroselini Macedonici, Foeniculi, Dauci
 Cretici ana scr. II. gr. V.
 Croci orientalis, Spicae Celticae, Pyrethri,
 Zedoariae ana scr. s. gr. V.
 Euphorbii, Costi vel succedanei ana dr. I.
 Sapae optimae triplex pondus.

51. Philonium Persicum. Descriptione
 Mesue.

R. Piperis albi, Hyoscyami albi ana dr. XX.
 Opii, Terrae sigillatae ana dr. X.
 Lapidis Haematitis, Croci ana dr. V.
 Castorei, Spicae Indicae, Euphorbii, Pyrethri,

Margaritarum albarum, Carabae, Zedoariae,
 Trociscorum Ramich ana dr. I.
 Charyophyllorum scr. I. s.
 Camphorae scr. I.
 Mellis rosati optimi triplum.

III. Conservae usitatiores.

(52—72.)

Vide indicem compositorum. Fiat omnes
 diligenter s. a.

IV. Condita.

(73—98.)

Vide indicem compositorum. Omnia di-
 ligenter saccharo clarificato s. a. condiantur.

99. Diacitonium simplex.

R. Carnium Citoniorum vapore aquae calidae
 dulcis coctorum ad spissitudinem usque Sac-
 chari albissimi despumati et ad justam con-
 sistentiam cocti ana lib. VIII.

Coquantur simul ad solidam consisten-
 tiam et extendatur in tabulam fervens massa:
 Refrigerata in partes incidatur.

100. Diacitonium compositum ex carne Citoniorum.

R. Carnium Citoniorum in aqua coctarum . . lib. IV.
 Sacchari lib. VI.
 Coquantur simul ad justam consistentiam et
 postquam ab igne deposueris, antequam re-
 frigerentur insperge subsequentes species in
 tenuissimum pulverem contritas, Cinnamomi,
 Piperis, Zingiberis ana unc. I.

Nucis muscatae, Charyophyllorum, Macis . ana unc. s.
 Conficiantur s. a.

101. Diacitonium e succo Citoniorum
 Galeni.

- R. Succī malorum Citoniorum struthiorum sextarios Romanos duos h. e. unc. XL.
 Mellis optimi tantundem, Aceti sextarium unum et semis i. e. unc. XXX.
 Coctis super prunos modice et spuma detracta immittuntur: Zingiberis unc. III.
 Piperis albi unc. II.

Deinde rursus simili igne recoquantur donec mellis crassitudinem consequantur.

102. Gelu Citoniorum quod Diacitoniton
 lucidum dicitur.

- R. Cotonea quadrifariam secta, cortice et seminibus purgata, quae tantisper coque ex aqua donec tabescant; postea setaceo vel linteo raro trans mitte sine compressione. Deinde cum saccharo percoque ad cerati consistentiam pari amborum portione vel secundum alios sacchari clarificati dimidio.

V. Species sive pulveres.

103. Pulvis contra epilepsiam.

- R. Margarit. praep., Corallorum rubeorum . . ana dr. I.
 Visci quercini dr. III.
 Seminis et radicum Paeoniae mascul. . . . ana dr. II.
 Carabae albae dr. III.

Fol. auri nō IV.

Unicornu dr. I.

Misce fiat pulvis.

104. Pulvis dentifricius.

R. Cornu cervi usti alb., Corall. alb. praeparati ana unc. I. s.

Masticis, Ossis sepie ana dr. IV.

Radicis Ireos alb., Aluminis ana dr. II.

Misce fiat pulvis non subtilis.

105. Species pro epithemate cordis.

R. Sandali rubei unc. I.

Cortic. Citrii mali, Sandali albi, Rosarum

rubearum, Corallii albi, Corallii rubei, Succini,

Eboris usti, Ossis cordis cervini, Croci . . ana dr. I.

Specierum electuarii laetificantis, Electuarii
de Gemmis, Diamargarit. frig. ana scr. IV.

Camphorae scr. I.

In pulverem redigantur species et com-
misceantur.

106. Species pro epithemate hepatis.

R. Rosarum rubearum, Sandali albi, Sandali rubei,

Absinthii pontici, Schoenanthi, Eboris usti,

Spicae Indicae, Semin. Endiviae verae . . ana unc. s.

Trita in pulverem redigantur et mi-
sceantur.

107. Tragea communis.

R. Zingiberis albi incisi unc. IV.

Zingiberis pulveris. unc. V.

Cinnamomi electi incisi unc. II.

Charyophyllorum, Nucis muscatae, Macis,

incisorum ana unc. s.

Pulveris Piperis longi, Pulveris Charyophyl-
lorum, Pulveris Galangae, Pulveris Carda-
momi, Pulveris Granorum paradysi . . . ana dr. II.
Sacchari albi duri pulveris. lib. V.
Confectionis Anisi lib. I. boni pond.
Misce fiat tragea.

108. Pulvis contra lumbricos.

R. Sem. Santonici unc. II.
Scordii, Corallinae, Dictamni Cretensis . . ana unc. I.
Tanacetii, Folior. persicorum, Folior. Lupinorum . ana unc. s.
Rad. graminis unc. I. s.
Cornu cervi usti dr. VI.
Misce fiat pulvis subtilis.

109. Pulvis restrictivus.

R. Cort. Granator, Balaustiarum, Gallarum, Cu-
pularum glandium, Carabae praeparatae,
Lapidis Haematitis praep. ana dr. I. s.
Boli Armeni oriental. dr. II.
Sem. antherae, Myrtillorum, Acatiae, Sumach,
Berberorum, Hypocistidos, Tragacanthae,
Gummi arab. ana dr. I.
Corall. ambor. praep., Masticis, Sem. Acetosae,
Sem. Plantag. ana scr. II.
Sandali albi, Sandali rubei, Sanguinis dra-
conis el. ana dr. s.
Sacchari albi unc. I.
Misce fiat pulvis.

110. Tragea cum Alkakengis.

R. Amygdal. dulc. mundat. dr. I. s.
Granorum Pini majoris, Sem. Cucurbitae,
Anguriae mundatae ana unc. I.

- Liquiritiae rasae unc. III.
 Sacchari albiss. lib. s.
 Passularum sine arillis mundat. Sem. papaveris albi ana unc. II.
 Granor. Alkakengi pulv. unc. IV.
 Misce et fiat tragea.

III. Pulvis contra morsum canis rabidi.
 Ex Galeno.

- R. Cancros fluviat. q. s.
 Imponantur vivi in vas aeneum et urantur
 tam diu, donec facile in pulverem redigantur
 idque fiat sole existente in Leone, triduo post
 plenilunium. Deinde:
 R. Hujus pulv. cancror. ustor. unc. V.
 Rad. Gentianae el. unc. II. s.
 Thuris el. unc. s.
 Misce fiat pulvis.
 Volumus etiam, ut species confectio-
 num aromaticarum roborantium asservantur
 ad usum.

VI. Pilae odoratae.

II2. Aestiva.

- R. Flor. Nymphaeae, Buglossi, Violarum, Rosarum ana dr. I.
 Cort. mali citrii dr. I. s.
 Macis dr. I.
 Sandalor. omnium ana dr. I. s.
 Papaveris albi scr. I.
 Sempervivi scr. II.
 Ladani dr. II.
 Ambrae gr. IV.

Trita excipiantur aqua stillaticia Lac-
 tucae et Styrace liquido formenturque pilae
 odoratae.

113. Hiberna.

R. Styracis	dr. III.
Charyophyllorum, Cinnamomi	ana dr. II.
Macis, Nucis muscatae	ana dr. I.
Ligni Aloës	dr. s.
Mastiches	dr. I. s.
Moschi, Ambrae	ana gr. III.

Trita et cribrata aqua Majoranae et
Styrace liquido, quod satis est, excipiantur
finganturque pilae odoratae.

VII. De Syrupis.

114. Syrupus de succo Violarum.

R. Succī violarum recentium in mortario mar- moreo tritarum	lib. III.
Sacchari clarificati	lib. II.
Coquantur s. a. ad syrupi consistentiam.	

115. Syrupus de infusione Violarum
solutivus.

R. Infusionis Violarum	lib. V.
Sacchari clarificati	lib. IV.
Coquantur	s. a.
Infusio violarum hoc modo fiat:	
R. Violarum recentium	lib. VI.
Roris coelestis aut loco ejus aquae pluvialis recentis calefactae	lib. XVIII.

Macerentur in vase vitreato et operto
stricti orificii per horas VIII. Deinde ex-
primantur leviter et colentur, postea eidem
aquae iterum calefactae tantundem violarum
imittantur iterum cum expressione eodem
modo colentur. Rursum eadem reiterentur

eodem ordine et modo usque ad duodecim
vicēs. Postea cum saccharo, ut supra dictum
est fiat syrupus.

116. Syrupus de succo Rosarum.

Eodem modo sicut syr. de succo Violar.

117. Syrupus rosatus solutivus.

Fit sicut syr. de infus. Violar.

118. Syrupus rosatus de Rosis siccis.

- R. Infus. Rosarum siccar. ter factae lib. V.
Sacchari clarificati lib. IV.
Coquantur s. a.

Infusio Rosarum siccarum sic fit:

- R. Rosarum rubearum siccarum unc. III.
Aquaе chalybeatae lib. VI.

Infundantur per horas VIII, postea ex-
primantur leviter et colentur. Rursus eidem
aquaе calefactae tantundem Rosarum siccarum
addatur et eodem modo omnia fiant ut
superius in infusione Rosarum et Violarum
usque ad tres vices.

119. Syrupus de Nymphaea compositus sive de Nenuphare.

- R. Flor. Nymphaeae unc. II.
Flor. Ungulae caballinae aquaticae i. e.
Nymph. citrin., Flor. Psyllii integri, Flor.
Acetosae ana unc. I.
Sem. quatuor frigidorum majorum ana unc. s.
Sem. Lactucae, Sem. Endiviae, Sem. Scariolae

Sem. Portulacae ana dr. II.
 Rad. Foeniculi unc. I.
 Bulliant in sufficienti quantitate aquae
 hordei et addatur:
 Sacchari lib. I.
 Aceti albi, Succī Granatorum acidorum . . ana unc. II.
 Coctis ad syrupi consistentiam in-
 jiciantur:
 Sandali rubei, Spodii ana dr. I.
 Spicae dr. s.
 Fiat syrupus.

120. Syrupus de Papavere simplex
 Mesuae.

R. Capita recentia Papaveris albi, nigri . . ana unc. VII. s.
 Coquantur in aquae pluvialis lib. IV.
 Ad dimidiaē partis consumptionem,
 colato adjice:
 Sacchari puri, Penidiarum ana unc. VI.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

121. Syrupus de Jujubis.

R. Jujubarum ño LX.
 Violarum, Sem. Malvae ana dr. V.
 Capillorum Veneris, Hordei mundati, Gly-
 cyrrhicae ana unc. I.
 Sem. Citoniorum, Sem. Papaveris albi, Sem.
 Melonum, Sem. Lactucae, Tragacanthae . . ana dr. III.
 Aquae fontanae lib. VI.
 Coquantur ad tertiae partis consum-
 ptionem, deinde colato adjice:
 Sacchari lib. II.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

122. Syrupus acetosus simplex.

- R. Aquae fontanae lib. IV.
 Sacchari lib. V.

Coquantur in vase lapideo super carbonibus accensis aut flamma exigua citra fumum, semper despumando ad dimidias. Deinde adjiciantur:

- Aceti albi clari lib. IV.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

123. Syrupus acetosus compositus.

- R. Rad. Foeniculi, Rad. Apii, Rad. Endiviae ana unc. III.
 Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Sem. Apii ana unc. I.
 Sem. Endiviae unc. s.
 Aquae q. s.
 Sacchari optimi lib. III.
 Aceti acerrimi lib. II.

Coquantur secundum artem.

124. Syrupus acetositatis Citri.

- R. Acetositatis mali citrii incorrupti depuratae lib. VII.
 Sacchari clarificati lib. IV.

Coquantur s. a.

125. Syrupus de corticibus Citri.

- R. Corticum mali citrii recentium lib. I.
 Aquae fontis lib. V.

Coquantur ad duarum librarum consumptionem. Postea cum Sacchari lib. I. percoquatur in syrupum. In fine decoctionis rursus injice:

- Corticum Citri recentium unc. II.
 et aromatizentur cum moschi gr. IV.

126. Syrupus acetositatis Limonum.

- R. Acetositatis Limon. maturor. depuratae . . . lib. VI.
Sacchari clarificati lib. II.
Coquantur s. a.
-

127. Syrupus de Agresta.

- R. Succi uvarum immaturarum lib. VI.
Sacchari clarificati lib. III.
Coquantur s. a.
-

128. Syrupus Granatorum dulcium.

- R. Succi Granatorum dulcium lib. V.
Sacchari albiss. lib. II.
Coquantur s. a.
-

129. Syrupus Granatorum acidorum.

Fit ut praecedens.

130. Syrupus de succo Endiviae.

- R. Succi Endiviae sativae depurati lib. VIII.
Sacchari clarificati lib. V. s.
Coquantur s. a.

Nota: Non debet accipi Lactuca sylvestris ut
solet sed verus Intybus hortensis, qui
facile haberi potest. Idem intelligendum
in sequentibus.

131. Syrupus de Cichorio silvestri
simplex.

- R. Succi fol. et rad. Cicoreae depurati . . . lib. VI.
Sacchari albi lib. II.
Decoquantur s. a. et fiat syrupus clarus.
-

132. Syrupus de Endivia compositus.

- R. Endiviae recentis, Scariolae, Lactucae, Epaticae, Borraginis, Buglossae, Melissae, Eupatorii ana M. I.
 Sem. frigidorum majorum ana unc. I.
 Sandali albi, Sandali rubei ana dr. I.
 Florum cordialium ana dr. III.

Coquantur s. a. in s. q. aquae, deinde colentur et addatur:

- Succi Endiviae depurati lib. I.
 Vini Granatorum unc. III.
 Sacchari albi lib. IV.

Fiat syrupus s. a.

133. Syrupus de Cichorio cum Rhabbaro.

- R. Intybi sativi utriusque, Cichorii, Taraxiconis / dentis leonis ana M. II.
 Cicerbitae / Sonchi levis, Lichenis, Lactucae sativae, Lactucae sylvestris, Fumariae, Lupulorum ana M. I.
 Hordei integri, Halicacabi ana unc. IV.
 Glycyrrhicae, Adianti albi, Adianti nigri, Aspleni, Trichomanis, Saxifragiae Rutae murariae, Cassuthae ana dr. VI.
 Rad. Foeniculi, Rad. Apii / Petroselini, Rad. Asparagi ana unc. II.

Coquantur in suf. q. aquae et colentur et cum saccharo clarificato colatum in syrupum coquatur, pro ejus qualibet libra inter coquendum adjiciantur:

- Rhabbarbari optimi unc. s.
 Spicae scr. IV.

Colligentur in linteo raro, quod saepe exprimatur, dum syrupi justam consistentiam consequatur.

134. Oxysacchara simplex Nicolai.

- R. Aceti unc. IV.
 Succī mali punici acidi unc. VIII.
 Sacchari albi et puri lib. I.

Saccharum purificatum cum aceto co-
 quatur. Deinde succus malorum punicorum
 adjiciatur circa finem et reducantur simul
 ad syrupi consistentiam.

135. Syrupus Myrtinus simplex.

- R. Succī baccarum Myrti decocti et depurati . lib. VIII.
 Sacchari clarificati lib. IV.

Decoquantur s. a. pro syrupo.

Nota: Pharmacopolae debent operam dare,
 ut habeant succum sed in defectu
 faciant ex ipsis Myrtillis decoctis.

136. Syrupus Myrtinus compositus.

- R. Baccarum Myrti dr. XX.
 Rosarum rubearum, Sandalorum rubeorum,
 Sandalorum alborum, Sumach, Balaustiorum,
 Berberorum ana dr. XV.
 Mespilorum dr. L.
 Aquae fontanae lib. VIII.

Coquantur ad medietatis consumptionem,
 colato adjice:

- Succī Granatorum, Succī Cydoniorum . . . ana unc. VI.
 Sacchari clarificati lib. IV.

Coquantur s. a. ad formam syrupi.

137. Syrupus ex succo Acetosae.

- R. Succī Acetosae purgati lib. III.
 Sacchari clarificati lib. II.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

138. Syrupus de Pomis simplex.

R. Succi Pomorum dulcium, acetosorum . . . ana lib. V.

Coquantur despumando ad dimidia
partis consumptionem. Deinde residere per-
mittantur et clarescant. Postea colentur et
addantur Sacchari lib. III. Fiat syrupus.

139. Syrupus de Pomis compositus.

R. Epithymi, Fol. Senae, Polypodii . . . ana unc. I.
Ellebori nigri, Fumi terrae . . . ana dr. X.
Flor. et rad. Borriginis, Flor. Buglossae,
Capillorum Veneris . . . ana dr. VI.
Flor. Chamomillae, Flor. Chamaedryos, Flor.
Squinanthi . . . ana unc. s.

Bulliant in III. lib. aquae ad con-
sumptionem tertiae partis colentur, cola-
turae adde:

Succi Fumi terrae, Borriginis, Buglossae . . ana unc. III.
Succi Pomorum dulcium . . . unc. VI.
Sacchari . . . lib. II. s.

Fiat syrupus.

140. Syrupus ex succo Borriginis.

R. Succi Borriginis colati et clarificati s. a. . lib. III.
Sacchari clarificati . . . lib. II.

Coquantur despumando in syrupum.

141. Syrupus ex succo Buglossae.

Fit eodem modo ut praecedens.

142. Syrupus de Portulacca.

- R. Sem. Portulacae tritor. lib. I.
 Macerentur horis 24 in succi Intybi cocti
 et purgati lib. IV.
 Igne lento coquantur ad dimidias. Deinde
 cum lib. II. Sacchari percoquantur in
 syrupum.

143. Syrupus de Stoechade simplex.

- R. Florum Stoechadis dr. XXX.
 Florum Thymi, Florum Calaminthae, Florum
 Origani ana dr. X.
 Florum Anisi dr. VII.
 Passularum enucleatarum unc. IV.
 Coquantur in lib. VIII. aquae ad duarum
 librarum consumptionem. Colaturae adde:
 Sacchari albiss. lib. V.
 Coquantur ad syrupi consistentiam,
 postea condiatur cum
 Cinnamomi, Calami odorati, Zingiberis . . . ana dr. I. s.
 Quae suspendantur in panno raro ligata
 in syrupo.

144. Syrupus de Betonica.

- R. Succi Betonicae depurati lib. VIII.
 Sacchari clarificati lib. V. s.
 Coquantur s. a. Fiat syrupus.

145. Syrupus pro oculis.

- R. Succi Verbenae, Succi Chelidoniae, Succu
 Foeniculi, Succu Euphrasiae omnium depurator. ana unc. IV.
 Succu Rosarum unc. II.

Sacchari albi lib. II.
 Clarificentur simul et fiat syrupus, qui
 aromatizetur cum
 Cinnamomi, Charyophyllorum ana dr. VI.

146. Syrupus de quinque radicibus.

R. Rad. Apii, Rad. Foeniculi, Rad. Petroselini,
 Rad. Rusci, Rad. Asparagi. ana unc. IV.
 Ad quantum satis, Sacchari lib. IV.
 Coquantur s. a.

147. Syrupus de Byzantiis.

R. Succı Endiviae, Succı Apii ana lib. II.
 Lupulorum, Buglossae ana lib. I.
 Depurentur inter coquendum et despumentur
 donec maneant lib. IV.
 Adde: Sacchari albissimi lib. II. s.
 Coquantur cum facilitate ad syrupi
 consistentiam.

148. Syrupus de Eupatorio.

R. Radicum Foeniculi, Radicum Apii, Radicum
 Endiviae ana unc. II.
 Glycyrrhicae, Schoenanthi, Cassuthae, Ab-
 sinthii, Rosarum ana dr. VI.
 Capillorum Veneris, Cardui benedicti, Flor.
 aut rad. Buglossae, Anisi, Foeniculi, Eupatorii /
 Agerati ana dr. V.
 Rhabarbari optimi, Mastiches ana dr. III.
 Spicae nardi, Azari, Folii vel Cassiae lignae
 verae ana dr. II.
 Coquantur in aquae lib. VIII. ad tertiae
 partis consumptionem dein adde:

Sacchari clarificati lib. IV.
 Succii Apii, Succii Endiviae ana lib. II.
 Coquantur s. a. et fiat syrupus.

149. Syrupus de Glycyrrhiza.

R. Glycyrrhizae rasae unc. II.
 Capillorum Veneris unc. I.
 Hyssopi unc. s.
 Aquae lib. IV.
 Macerentur superiora in aqua per
 24 horas. Deinde coquantur ad dimidia
 partis consumptionem. Colaturae adde:
 Mellis optimi, Penidiarum, Sacchari . . . ana unc. VIII.
 Aquae Rosarum unc. VI.
 Fiat syrupus s. a.

150. Syrupus de Hyssopo.

R. Hyssopi mediocriter aridi, Rad. Apii, Rad.
 Foeniculi, Rad. Petroselini, Glycyrrhicae . . ana dr. X.
 Hordei mundati dr. IV.
 Sem. Malvae, Sem. Cytoniorum, Tragacanthae ana dr. III.
 Capillorum Veneris dr. VI.
 Jujubarum, Sebesten ana ño XXX.
 Passularum magnarum enucleatarum . . . unc. I. s.
 Ficum siccarum, Dactylorum pinguium . . ana ño X.
 Coquantur in lib. VIII. aquae, donec
 quinque tantum supersint.
 Expresso adde: Penidiorum albor. . . . lib. II.
 Coquantur ad syrupi consistentiam.

151. Syrupus de Prassio.

R. Prassii unc. II.
 Glycyrrhicae unc. I.

Capillorum Veneris, Hyssopi	ana dr. VI.
Calaminthae, Anisi, Radicum Foeniculi, Radicum Apii	ana dr. V.
Radicum Ireos, Sem. Malvae, Sem. Foenugraeci	ana dr. III.
Sem. Lini, Sem. Cytoniorum	ana dr. II.
Passularum enucleatarum	unc. II.
Caricarum pinguum	nō XVI.

Coquantur in lib. X. aquae ad dimidia
partis consumptionem.

Expresso adde:

Penidiorum, Mellis	ana lib. II.
------------------------------	--------------

Coquantur ad syrupi consistentiam.

152. Syrupus de Farfara.

Fit simpliciter ut syrupus de succo
Buglossae.

153. Syrupus de capillis Veneris.

R Capillorum Veneris	M. II.
Adianthi, Ceterach, Polytrichi	ana M. I.
Jujubarum, Glycyrrhicae	ana unc. II.

Decoquantur simul in aqua simplici q. s.

Deinde adde:

Sacchari albi	lib. III.
-------------------------	-----------

Fiat syrupus s. a.

154. Syrupus de Calamintha.

R. Calaminthae domesticae, Calaminthae sylvestris	ana unc. II.
Sem. Ligustici, Sem. Dauci, Schoenanthi	ana dr. V.
Passularum enucleatarum	lib. s.

Coquantur in lib. VI. aquae ad dimidias.

Expresso adde:

Mellis optimi lib. II.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

155. Syrupus de Mentha.

R. Succi Menthae depurati lib. I.

Succi Granatorum dulcium, Succi Granatorum
acetosorum ad medietatis consumptionem
coctorum et depuratorum, Sacchari albissimi ana lib. I.

Coquantur s. a. ad syrupi consistentiam.

156. Syrupus de Absinthio.

R. Absinthii pontici lib. s.

Rosarum rubearum unc. II.

Spicae Nardi dr. III.

Vini clari veteris optimi, Succi Cydoniorum . ana lib. II. s.

Macerentur praedicta in vase marmoreo
per horas 24. Deinde igne lente coquantur
ad medietatis consumptionem.

Colaturae adde:

Sacchari albiss. lib. II.

Coquantur in syrupi consistentiam.

157. Syrupus de succo Fumi terrae.

R. Myrobalanorum citrinor., Myrobalanorum che-
bulorum ana dr. XX.

Flor. Borriginis, Flor. Buglossae, Flor. Viola-
rum, Flor. Absinthii, Flor. Cuscutae . . . ana unc. I.

Glycyrrhicae, Rosarum ana unc. s.

Epithymi, Polypodii ana dr. VII.

Prunorum, Passularum purg. ana libr. s.

Tamarindorum, Pulpae Cassiae fistulae . . . ana unc. II.
 Aquae lib. X.

Coquantur omnia simul ad tertiae partis
 consumptionem, colaturae adde:

Succi Fumi terrae depurati, Sacchari albiss. ana lib. III.

Coquantur lento igne ad syrupi con-
 sistentiam.

158. Syrupus de Epithymo.

R. Epithymi dr. XX.
 Myrobalanorum citrinorum, Myrobalanorum
 Indorum ana dr. XV.
 Cuscutae, Fumi terrae ana dr. X.
 Thymi, Buglossae, Calaminthae, Myrobalano-
 rum emblicorum, Myrobalanorum bellirico-
 rum, Glycyrrhicae, Polypodii, Agarici, Stoe-
 chados ana dr. VI.
 Rosarum, Sem. Anisi, Sem. Foeniculi . . . ana dr. II. s.
 Prunorum ño XX.
 Passularum enucleatarum unc. IV.
 Tamarindorum unc. II. s.

Coquantur omnia praeter Agaricum
 in lib. X. aquae ad dimidia partis con-
 sumptionem. Deinde remotis illis ab igne
 infundatur per horas X. Agaricus et recale-
 factis istis colentur.

Colaturae adde:

Sacchari clarificati lib. IV.
 Sapae lib. II.

Coquantur a. s.

159. Syrupus de Artemisia.

R. Artemisiae M. II.
 Pulegii, Calaminthae, Origani, Melissa, Dic-
 tamni Cretici, Persicariae, Sabinae, Majoranae,

Chamaedryos, Hyperici, Chamaepityos, Coma-
 rum Matricariae, Centaurii minoris, Rutae,
 Betonicae, Buglossae ana M. I.
 Rad. Foeniculi, Rad. Apii, Rad. Petroselini,
 Rad. Asparagi, Rad. Rusci, Rad. Saxifragiae
 vel Pimpinellae, Rad. Dietamni vulgaris /
 Fraxinellae, Rad. Enulae campanae, Rad.
 Cyperi, Rad. Rubeae tinctorum, Rad. Ireos,
 Rad. Poeoniae ana unc. I.
 Baccarum Juniperi, Sem. Ligustici, Sem.
 Petroselini, Sem. Apii, Sem. Anisi, Sem.
 Nigellae, Carpobalsami, Costi, Rad. Azari,
 Rad. Pyrethri, Cassiae ligneae aromaticae,
 Cardamomi, Calami aromatici, Radicis Phu ana unc. s.

Coquantur omnia in libr. XVIII. aquae
 fluvialis, sic ut primum radices, postea semina,
 deinde herbae, postremo autem Pyrethrum
 et aromata injiciantur et fiat coctio ad di-
 midiae partis consumptionem. Maneant deinde
 in infusione per 24 horas, postea fricentur
 manibus omnia et colentur. Colaturae adde:
 Sacchari lib. IV.

Coquantur ad syrupi consistentiam.

160. Mel rosatum.

R. Fol. Rosarum rubearum nondum explica-
 tarum contusorum lib. II.
 Mellis optimi lib. VI.

Coquantur lento igne quantum oportet.

161. Oxy-mel simplex.

R. Aceti acerrimi lib. I.
 Mellis optimi despumati lib. II.
 Aquae clarissimae lib. IV.

Aqua et Mel simul coquantur ad dua-
 rum librarum consumptionem et dilligenter

despumentur. Deinde addito Aceto coquantur
ad syrupi consistentiam.

162. Oxymel compositum.

- R. Corticum rad. Foeniculi, Corticum Apii, Cor-
ticum Petroselini, Corticum Rusci, Corticum
Asparagi ana unc. II.
Sem. Apii, Sem. Foeniculi ana unc. I.

Haec macerentur omnia in lib. XII.
aquae. Postea decoquantur ad dimidiaē partis
consumptionem, colaturae adde:

- Aceti acerrimi lib. I.
Mellis optimi despumati lib. II.

Coquantur s. a. in vase lapideo aut
vitreato.

163. Acetum scylliticum.

- R. Scyllae candidae ab exterioribus et interioribus
repuratae in taleolos seu lamina cultello
ligneo concisae. Cujus segmenta acu lignea
trajecta filo, ne se contingant modicis inter-
vallis suspenduntur et in umbra per dies 40
siccantur lib. I.
Aceti acerrimi lib. VIII.

In quo Aceto maceretur Scylla in vase
vitreato stricti orificii bene obstructo, in sole
VII diebus, postea Scylla eximitur et expressa
abjicitur. Defecatum Acetum reponitur.

164. Oxymel scylliticum.

- R. Aceti scyllitici lib. II.
Mellis despumati lib. III.

Coquantur s. a. ad debitam syrupi
consistentiam in vase lapideo ut supra.

165. Oxymel scilliticum compositum.

Fit ut Oxymel compositum, solum ut pro Aceto communi accipiat scylliticum Acetum.

166. Oxymel elleboratum ex Gessnero.

- R. Calaminthae, Thymi, Pulegii, Cardui benedicti,
 Rosarum rubearum, Menthae crispae . . . ana p. I.
 Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Sem. Ocymi,
 Sem. Urticae, Sem. Anethi . . . ana dr. I.
 Rad. Angelicae, Rad. Foeniculi, Rad. Altheae,
 Rad. Scyllae, Rad. Iridis nostrae, Turbith . . ana unc. s.
 Ellebori albi montani, Esulae praeparatae . . ana dr. II.
 Rad. Asari . . . dr. I. s.
 Galangae, Cinnamomi, Calami aromatici . . ana dr. I.

Infundantur trita omnia in Aceti fortissimi lib. III. et stent in vase vitreo vel figulino obturato per triduum in sole vel loco calido. Deinde bulliant in terreo vel lapideo vase ad tertiae partis consumptionem et in fine decoctionis adde Agarici albi friabilis unc. s. Postea fortiter exprimantur, expressioni adde:

- Mellis optimi despumati . . . unc. VIII.
 Sacchari clarificati . . . unc. V.

Fiat syrupus, qui aromatizetur cum Cinnamomo et Macis.

VIII. De Julep et succis medicatis Rob appellatis et succis inspissatis.

167. Julep Rosarum.

- R. Aquae Rosarum . . . lib. IV.
 Sacchari clarificati . . . lib. II.
 Coquantur ex praescripto artis.

168. Julep Violarum.

Fit eodem modo ut Julep Rosarum.

169. Rob de Ribes simplex.

R. Succı Ribes lib. VIII.
Coquatur per se ad mellis spissitudinem.

170. Rob de Ribes compositum.

R. Succı Ribes lib. IV.
Sacchari optimi lib. II.
Coquantur s. a.

171. Rob de Berberis simplex et
compositum.

Fit utrumque eodem modo ut de Ribes.

172. Rob Nucum compositum.

R. Succı corticum viridium Juglandium . . . lib. V.
Glycyrrhicae recentis unc. X.
Coquatur succus cum Glycyrrhica ad
mellis crassitiem et per colum trajiciatur
deinde adde:
Mellis optimi lib. I.
Iterum coquatur.

173. Diamoron.

R. Succı Mororum Celsi nondum perfecte ma-
turatorum lib. I.
Succı Mororum rubi nondum perfecte ma-
turatorum lib. II.

Coquantur ad mellis spissitudinem. De-
inde adde:
Mellis optimi lib. I.
Sapae lib. s.
Iterum coquantur s. a.

174. Succus acetositatis Citri.

R. Succī acidī Citrii lib. I.
Sacchari optimi lib. s.
Coquantur s. a.

175. Succus uvae immaturae.

R. Succī uvae immaturae agrestae quantum
voles (!) et coque ad spissitudinem s. a.

176. Succus Prunorum silvestrium.

R. Baccarum Pruni sylvestris q. v.
Macerentur per aliquot dies in aqua et
coquantur. Deinde postquam colata fuerint
recoquantur ad crassitudinem.

177. Miva Cytoniorum simplex.

R. Succī Cytoniorum acidorum lib. XII.
Coquantur lento igne despumando ad
dimidiaē partis consumptionem. Coletur et
clarescat, deinde addantur:
Vini antiqui lib. V.
Sacchari lib. III.
Iterum coquantur despumando ad justam
consistentiam.

178. Miva Cytoniorum aromatica.

R. Succī Cytoniorum acidor. lib. X.

Vini antiqui boni lib. V.

Coquantur igne lento semper despumando ad tertias, colatum residendo clarescat.

Deinde claro adde:

Mellis boni et despumati lib. VI.

Iterum coquatur despumando et in eis suspendantur nodulo ligata haec aromata:

Cinnamomi el., Cardamomi majoris ana dr. I. s.

Caryophyllorum dr. I.

Zingiberis, Macis, Ligni Aloës, Mastiches ana scr. II. gr. V.

Crocī dr. I.

Moschī scr. I.

Galliae moschatae dr. I.

Omnia praeter Crocum parum terantur et suspendantur ut dictum est in syndone ligata.

179. Vinum Cytoniorum.

180. Vinum Granatorum.

Fiant s. a. et conserventur.

Volumus etiam, ut nostrae pharmacopolae ex herbis syruporum habeant semper etiam succos inspissatos, usui repositos.

IX. Decoctiones.

181. Decoctio florum et fructuum cordialium.

R. Passularum, Liquiritiae rasae ana unc. I.

Prunorum nō X.

Jujubarum, Sebesten ana nō XX.

4*

Flor. Borraginis, Flor. Buglossae, Flor. Viola-	
rum	ana M. I.
Tamarindorum	dr. VI.
Caricarum pinguium	nō VIII.
Incidentur et misceantur pro decoctione.	

182. Decoctio pectoralis.

R. Passularum, Liquiritiae rasae	ana unc. I.
Ficum pinguum	nō VI.
Sebesten	nō X.
Ungulae caballinae, Florum Violarum	ana M. II.
Scabiosae, Hyssopi	ana M. I.
Radic. Ireos, Hordei mundi	ana unc. s.
Jujubarum	nō XV.
Capillorum Veneris	dr. III.
Foenugraeci	dr. I.

Misceantur et incidentur pro decoctione.

183. Decoctio aperitiva.

R. Passularum, Liquiritiae rasae, Rad. Apii, Rad.	
Asari, Rad. Foeniculi, Rad. Petroselini, Rad.	
Calami aromatici	ana unc. I.
Eupatorii, Capillorum Veneris, Salviae, Hys-	
sopi, Betonicae	ana M. I.
Ireos	dr. VI.
Sem. Anisi, Sem. Foeniculi	ana dr. III.

Misceantur et incidentur pro decoctione.

184. Additio ad choleram.

R. Quatuor semin. frigid. major.	unc. I.
Hordei mundi	unc. I. s.
Misce.	

185. Additio ad phlegma.

R. Agarici albi	dr. II.
Rad. Polypodii	unc. I. s.
Fol. Senae el.	unc. II.
Misce pro decoctione.	

186. Additio ad melancholiam.

R. Foliculorum Senae	unc. I.
Epithymi, Ceterach	ana dr. III.
Corticum radicum Capparorum, Cort. Tamarisci, Rad. Polypodii	ana dr. II.
Cort. rad. Hellebori nigri	dr. I. s.
Sem. Anisi, Sem. Foeniculi	ana dr. I.
Misceantur pro decoctione.	

187. Decoctio pro clysteribus.

R. Malvae, Bismalvae, Chamomillae, Violariae, Brancae ursinae, Mercurialis, Parietariae	ana part. aequ.
Misceantur pro decoctione.	

188. Infusio foliorum Senae.

R. Folior. Senae el.	unc. VI.
Zingiberis albi	dr. II.
Flor. Borraginis, Flor. Buglossae, Flor. Rosarum, Flor. Violarum	ana dr. IV.
Corticis Citri, Radicum Polypodii	ana unc. I.
Passularum	unc. II.
Sebesten	ñō XL.
Misce.	

189. Elixir. vitae ex Mathiolo.

R. Cinnamomi	unc. I.
Zingiberis	unc. s.

Sandalorum omnium	ana dr. VI.
Charyophyllorum, Galangae, Nucis Myristicae	ana dr. II. s.
Macis, Cubebarum	ana dr. I.
Cardamomi utriusque, Sem. Melanthii	ana dr. III.
Zedoariae	unc. s.
Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Sem. Pastinacae silv., Sem. Ocimi, Rad. Angelicae, Rad. Charyophyllatae, Rad. Glycyrrhicae, Rad. Calami odorati, Rad. Phu minoris, Foliorum Sclareae, Thymi, Calaminthae, Pulegii, Men- thae, Serphylli, Amaraci	ana dr. II.
Rosarum rubearum, Flor. Salviae, Flor. Betonicae, Flor. Roris marini, Flor. Stoe- chados, Flor. Buglossi, Flor. Borriginis	ana dr. I. s.
Cortic. Citri	dr. III.
Specierum Diambrae, Aromatici rosati, Dia- musci dulcis, Diamargariti, Diarrhodon Ab- batis, Electuarii de Gemmis	ana dr. III.

Terantur, quae terenda sunt et deinde in vitreo vase macerentur in lib. XII. aquae vitae praestantissimae ex optimo vino paratae ocluso vasis osculo diebus XV. continuis. Ac deinde vitreo alembico vase superposito per aquae ferventis balneum distillantur ita diligenter clauso alembico, ne quid inde expirare possit. Aqua, quae inde fluxerit in aliud subinde vas recondatur additis Sandali odorati tessellatim concisi dr. II.

Moschi, Ambari in tenui linteolo ligatorum	ana scr. s.
Julep rosati clariss.	lib. I.

Demum concutiantur fortiter, donec Julep cum aqua misceatur claudaturque vas cera et membrana et ita quiescat diebus XV. continuis. Ultimo in aliud vitrum transferatur ibique asservetur.

X. Eclegmata seu Lohoch.

190. Lohoch sanum et expertum.

- R. Cinnamomi, Hyssopi sicci, Glycyrrhicae . . . ana unc. s.
 Jujubarum, Sebesten ana nō XXX.
 Passularum enucleatarum, Ficum siccarum,
 Dactylorum pinguium ana unc. II.
 Foenugraeci dr. V.
 Capillorum Veneris M. I.
 Anisi, Foeniculi, Ireos, Seminis Lini, Calaminthae ana dr. IV.

Coque in lib. IV. aquae ad dimidium.

Colaturae expressae adde:

- Penidiarum lib. II.

Coquantur ad mellis crassitiem. Postea insperge subsequētia minutissime incisa et tusa:

- Pinearum mundatarum dr. V.
 Amygdalarum dulc. mundat. Succī Glycyrrhicae, Tragacanthae, Gummi arabici, Amyli ana dr. III.
 Ireos dr. II.

Misce omnia probe donec album fiat medicamentum.

191. Lohoch de Pino.

- R. Nucleorum Pini dr. XXX.
 Amygdalarum dulcium, Avellanarum assatarum, Gummi Arabici, Tragacanthae, Succī Glycyrrhicae, Amyli, Capill. Veneris, Ireos . . . ana unc. s.
 Carnium dactylorum dr. XXXV.
 Amygdal. amar. dr. III.
 Mellis passularum, Butyri recentis, Sacchari albi ana unc. IV.
 Mellis optimi q. s.

Fiat secundum artem.

192. Lohoch de pulmone vulpis.

- R. Pulmonis vulpini siccati, Succi Glycyrrhicae,
 Sem. Anisi, Sem. Foeniculi, Capill. Veneris ana unc. I.
 Sacchari clarificati unc. XV.

Conterantur omnia tennissime et cum
 saccharo excipiantur.

193. Lohoch ex Scylla.

- R. Succi Scyllae, Mellis despumati ana lib. I.
 Coquantur s. a. ad eclegmatis con-
 sistentiam.
-

194. Lohoch ad asthma.

- R. Scyllae assatae unc. s.
 Radic. Ireos dr. II.
 Hyssopi, Prassii ana dr. I.
 Croci, Myrrhae ana dr. s

Cum mellis quantitate suffici: Fiat
 Lohoch.

195. Lohoch de Papavere.

- R. Papaveris albi dr. XXV.
 Amygdalarum dulc., Pinearum, Gummi Arabici,
 Tragacanthae, Succi Glycyrrhicae ana dr. X.
 Amyli, Sem. Portulacae, Lactucae, Cytoniorum ana unc. s.
 Croci dr. I.
 Penidiarum albar. unc. VIII.
 Syrupi de Papavere lib. III.

Omnia contendantur et incidantur atque
 cum syrupo excipiantur s. a. Porro iste
 syrupus de Papavere sic fieri debet:

- R. Caputum Papaveris albi recentium, Caputum
 Papaveris nigri recentium ana unc. VI.
 Seminis Lactucaae, Florum Violarum ana unc. I.
 Aquae lib. VIII. vel q. s.
 Coquantur et colaturae adde:
 Sacchari albi, Penidiarum ana lib. I.
 Coquantur ad spissitudinem.
-

196. Lohoch ex Caulibus.

- R. Succī Caulium lib. V.
 Lento igne coquantur auferendo spumam usque ad remanentiam lib. II. Deinde adde:
 Mellis optimi, Sapae ana lib. I.
 Coquantur rursus ad justam consistentiam.
-

197. Lohoch de Farfara.

- R. Rad. Farfarae / Tussilaginis lib. s.
 Bene mudentur, laventur et coquantur usque ad mollitiem. Deinde conterantur, pistentur et rursus coquantur in eadem aqua, in qua prius dissolvatur
 Sacchari lib. I. s.
 Deinde adde:
 Pinearum mundat. unc. I. s.
 Passularum unc. II.
 Quae utraque prius in vase lapideo conterantur. Postremo injice:
 Croci, Charyophyllorum ana scr. s.
 Succī Glycyrrhicae dr. I. gr. XV.
 Cinnamomi, Macis ana scr. I.
 Misceantur.
-

198. Saponea.

R. Amyli unc. VI.

Dissolvatur in emulsione Papaveris et
coletur per pannum, ponatur ad patellam
mundam prope ignem et addantur:

Sacchari Candi unc. III.

Et continuo agitetur spatula lignea,
donec coaguletur ad consistentiam Lohoch,
addatur aqua rosata et iterum agitetur
spatula.

Fiat lambitivum.

XI. Electuaria alvum lenientia et purgantia.

199. Flores Cassiae.

Extrahantur s. a.

200. Electuarium de Cassia sine foliis
Senae.

R. Prunorum nō XII.
Violarum M. I.
Hordei repurgati, Anisi, Polypodii, Sem.
Carthami ana dr. V.
Adianti, Thymi, Epithymi ana M. s.
Passularum unc. s.
Sem. Foeniculi dr. II.
Sem. Portulacae, Malvae ana dr. III.
Glycyrrhicae unc. s.

Coquantur in s. q. aquae, colentur et in
colatura diluantur sequentia:

Medullae Cassiae lib. II.
Tamarindorum unc. I.
Cinnamomi dr. III.
Sacchari optimi lib. I.

Coquantur ad perfectam consistentiam.

201. Electuarium lenitivum (Florenzuole).

R. Passularum enucleatarum	unc. II.
Adianti nigri, Violarum, Hordei mundi . . .	ana M. I.
Jujubarum, Sebesten	ana $\overline{n}$ XX.
Glycyrrhicae	unc. s.
Prunorum enucleatorum, Tamarindorum . . .	ana dr. VI.
Senae, Polypodii	ana unc. II.
Mercurialis	M. I. s.

Decoquantur s. a. in s. q. aquae. Deinde cola et in colatura dissolve:

Pulpa Cassiae, Pulpa Tamarindorum, Pulpa Prunorum, Sacchari optimi, Sacchari Violati	ana unc. VI.
Pulv. Senae	unc. III. dr. III. s.

Confice s. a.

202. Diaprunum lenitivum.

R. Prunorum Damascenorum el.	$\overline{n}$ C.
--------------------------------------	-------------------

Coquantur in modica aqua donec emolliantur, excola, deinde decoctum eorum privatim reponens. Ipsa vero Pruna super inversum et vasi impositum cribrum ponantur et manibus hinc et inde ducantur et premantur, donec omnis eorum pulpa penetraverit et cutis cum nucleis tantum remaneat. Collectam deinde pulpam et excolatum eorum decoctum in quo bullierint violarum unc. s. Lento igne ad spissitudinem coquito. Melius esset, si Prunorum pulpa per se inspissaretur et si cum decocto Prunorum et Violarum pulpa Tamarindorum extraheretur. Deinde cum inspissaveris:

R. Pulpa inspissatae	lib. I.
Sacchari clarificati	lib. II.

Pulpa^e Tamarindorum, Pulpa^e Cassiae . . . ana unc. I.

Agita omnia simul supra ignem,
deinde insperge subsequentium specierum
pulverem:

Sandali rubei, Sandali albi, Spodii, Rhabar-
bary, Cinnamomi ana dr. III.

Rosarum, Violarum, Sem. Portulacae, Sem.
Scariolae, Sem. Berberorum, Succⁱ Glycyrrhicae,
Tragacanthae ana dr. II.

Sem. Cucurbitae, Sem. Cucumeris, Sem.
Citrulli, Sem. Melonis ana dr. I.

Confice s. a.

203. Diaprunum laxativum.

R. Diapruni lenitivi adhuc recent. et calidi . . . lib. I.

Diagridii unc. s.

Misce et repone.

204. Electuarium Diacatholicon lenitivum Nicolai.

R. Pulpa^e Cassiae fistulae, Pulpa^e Tamarindorum,
Senae mundatae ana unc. II.

Rhabarbari, Violarum, Polypodii ana unc. I.

Glycyrrhicae rasae, Penidiarum, Sacchari
Candi ana dr. I. (aliqui ponunt dr. II.)

Sem. Cucurbitae, Sem. Citrulli, Sem. Cucu-
meris, Sem. Melonis ana dr. II.

Conterenda conterantur et seminum
quatuor majorum nuclei incidantur. Postea
omnia simul conficiantur cum subsequenti
syrupo:

R. Polypodii unc. I.

Sem. Foeniculi dr. VI.

Fiat horum decoctio in aqua coelesti
q. s. Hoc decocto Cassiam et Tamarindos, dis-
solve, reliquo adde:

Sacchari optimi lib. II.

Fiat electuarium s. a.

205. Tryphera Persica.

R. Succorum Solani, Succorum Intybi, Succo-
rum Apii, Succorum Lupulorum depurator. . ana lib. II.

In his coquantur Prunor. Damascenor.
nō L. ad consumptionem tertiae partis et
projiciantur desuper sequentia.

Violarum, Rosarum ana dr. III.

Foliculor. Senae unc. II.

Agarici unc. I.

Cuscutae unc. s.

Myrobalanorum citrinorum, Myrobalanorum
Chebulatorum, Myrobalanorum Indorum om-
nium fricatorum in oleo amygdal. dulc. . . ana dr. II.

Spicae aromaticae dr. III.

Bulliant leniter super prunis lento igne ut
remaneant lib. II. s.

Adjice Epithymi unc. V.

Bulliant leviter, deinde ab igne depo-
nantur et percolentur. In una parte hujus
colaturae dissolve:

Tamarindorum recentium unc. III.

Mannae el. unc. I. s.

Pulpaе Cassiae unc. IV.

Sacchari violati lib. I.

Colentur et purgentur a granis et
sordibus atque in alteram colaturae partem
projiciantur:

Sacchari albiss. lib. III.

Aceti vini lib. I.

Coquantur lento igne. Deinde addantur
omnia simul in unum et coquantur ad

spissitudinem mellis. Postremo sequentes species in pulverem redactae injiciantur:

Rhabarbari optimi	unc. II.
Myrobalanor. citrin.	unc. I. s.
Myrobalanor. Chebulor., Myrobalanor. Indor., Myrobalanor. Belliricorum, Myrobalanor. Em- blicorum	ana unc. s.
Sem. Fumi terrae, Trociscorum Diarrhodon, Macis, Masticis, Cubebarum, Spodii, Sandali citriini, Sem. quatuor frigidior. major enucleat.	ana dr. II.
Anisi	unc. s.
Spicae Indicae	dr. II.

Involvuntur pulveres oleo violato, postea reliquis permisceantur et ponantur in vase vitreo.

206. Electuarium de Sebesten.

R. Sebesten recent. sine nucleis unc. V.

Infundantur in lib. I. aquae violarum et bulliant. Deinde colentur et colaturae ejus addantur:

Aquae Iridis, Aquae Anguriae	ana unc. VI.
Tamarindorum, Prunorum siccorum con- tusorum	ana unc. V.
Violarum, Quatuor semin. communium frigidior.	ana unc. I.
Succi Mercurialis	unc. IV.

Coquantur simul usque ad consumptionem medietatis fortiterque exprimantur et colentur. Colaturae adde:

Penidiarum	unc. VIII.
Diaprunis lenitivi	lib. I. s.
Pulveris Diagridii	dr. III.

Fiat electuarium.

207. Electuarium Diasenae lenitivum
Nicolai.

R. Senae	unc. III.
Avellandarum tostatarum	nō L.
Serici tosti	dr. II.
Lapidis Armeni loti	dr. I.
Lapidis Lazuli loti	dr. III.
Sacchari	unc. VI.
Cinnamomi	unc. I.
Charyophyllorum, Galangae, Piperis, Spicae Nardi Indicae, Ocymi / Basiliconis, Folior. Charyophyllorum si haberi possunt vel eorum loco Macis, Cardamomi, Croci, Zingiberis, Zedoariae, Florum Roris marini, Piperis longi	ana dr. II.
Mellis despumati	lib. II.
Misce et fiat electuarium sec. art.	

208. Electuarium rosatum Mesue.

R. Succi Rosarum rubear.	lib. IV.
Sacchari albiss.	lib. I. s.

Dissolvatur saccharum in succo Rosarum, eo parum refrigerato adde Diagridii pulverisati unc. I. s.

Coquantur sensim ad ignem molliusculum, dum ad mellis consistentiam usque densescant. Deinde statim in eo dissolvatur:

Mannae purae et recentis	lib. s.
------------------------------------	---------

Postea successive injice:

Trociscorum pulverisat. de Spodio	unc. I.
Trociscorum de Berberis	unc. s.
Galliae moschatae, Croci	ana dr. II.

Reponantur in vase vitreo.

209. Electuarium e succo Rosarum
Nicolai.

- R. Succī Rosarum rubear., Sacchari albiss. . ana lib. I. unc. IV.
Sandālor albor., Sandālor. rubeorum, Sandālor.
citrinorum ana dr. VI.
Spodii dr. III.
Diagridii unc. I. s.
Camphorae scr. I.

Succus Rosarum cum Saccharo ad
syropi consistentiam coquatur. Deinde additis
reliquis lento igne inspissetur.

Idem electuarium in tabulis. Haec
compositio potest etiam fieri in forma solida
cum saccharo s. a.

210. Electuarium Diaphoenicon sive
de Dactylis.

- R. Dactylor. in sapa vini et hydromelite per
tres dies maceratorum postea leviter cocto-
rum et per cribrum colatorum dr. C.
Penidiorum dr. L.
Amygdalar. purgat. dr. XXX.
Turbith opt. dr. XXXV.
Diagridii dr. XII.
Zingiberis, Piperis longi, Folior. Ruthae siccor.,
Cinnamomi, Macis, Ligni Aloës, Anisi, Foeni-
culi, Dauci, Galangae ana dr. II. s.
Mellis optimi despumati q. s.

211. Diaphoenicon in forma solida seu
in tabulis.

- R. Specierum praedicti electuarii, exceptis Dac-
tylis unc. IV.
Sacchari lib. I.

Dissolvatur Saccharum in infusione Dac-
tylorum facta in vino Cytoniorum et aqua

rosacea q. s. per triduum et fiat confectio
in rotulis.

212. Electuarium Elescoph sive epi-
scopi. Descriptione Mesuae.

- R. Scammoneae Antiochenae praepar., Diagridii,
Turbith albi ana dr. VI.
Charyophyllorum, Cinnamomi, Zingiberis, Mi-
robalanor. emblicor., Nucis muscatae, Poly-
podii ana dr. II. s.
Sacchari, Mellis despumati ana lib. s.
Misce fiat electuarium.

213. Diaturbith cum Rhabarbaro (Mon-
tagnanae).

- R. Sandalor. albor., Sandalor. rubeorum, Viola-
rum, Zingiberis ana dr. I. s.
Anisi, Cinnamomi, Croci, Mastiches ana dr. s.
Turbith, Hermodactylorum ana unc. I.
Rhabarbari el. dr. X.
Diagridii unc. s.
Sacchari albi triplum omnium lib. I. unc. II. dr. II.

214. Hiera simplex.

- R. Cinnamomi, Xylobalsami, loco ejus Ligni
Aloës, Asari, Spicae Nardi Indicae, Croci,
Mastiches Chiaae ana dr. VI.
Aloës non lotae dr. C.
Mellis despumati lib. IV. unc. III.

215. Hiera Logadii Ex Aetio.

- R. Pulpae Colocynthidos dr. XX.
Scyllae assatae, Agarici, Ammoniaci, Scam-
monii, Corticis Ellebori nigri, Hyperici ana dr. III.

Epithymi, Polypodii, Bdellii, Aloës, Chamae-
dryos, Cassiae aromaticae, Marrubii . . . ana unc. I.
Myrrhae, Piperis vulgaris, Piperis albi, Piperis
longi, Cinnamomi, Croci, Opopanacis, Saga-
peni, Castorei, Petroselini, Aristolochiae . . ana unc. s.
Mellis despumati q. s.

Fiat electuarium.

216. Electuarium Indum majus.

R. Cinnamomi, Charyophyllorum, Spicae Indicae,
Rosarum, Cassiae lignae, Macis, Cyperi
rotundi ana dr. IV.
Sandali citrini dr. II. s.
Ligni Aloës, Nucis muscatae ana dr. II.
Turbith optimi dr. L.
Sacchari, Penidiorum ana dr. XX.
Galangae, Cardamomi majoris / granorum,
paradisi, Cardamomi minoris, Azari, Mastiches . ana dr. I. s.
Diagridii unc. I. s.

Omnia terantur, cum oleo Amygdala-
larum dulcium fricentur et cum subsequenti
syrupo conficiantur:

Succi Cytoniorum, Succi Granatorum, Succi
Apii, Succi Foeniculi omnium depurat. . . ana lib. s.
Mellus optimi despumati lib. IV. s.

Decoquantur succi cum melle ad justam
spissitudinem s. a.

217. Benedicta laxativa Nicolai Myrepsi.

R. Turbith optimi, Sacchari ana dr. X.
Polypodii, Folii vel succedanei ana dr. VI.
Cardamomi, Spicae, Pulegii, Calaminthae,
Saxifragiae, Charyophyllorum, Sem. Apii . ana unc. s.
Milii solis dr. II.
Piperis albi, Piperis longi ana scr. I.
Rhabarbari dr. II. scr. II.

Amomi, Cinnamomi, Hermodactyli, Epithymi,
 Agarici, Senae ana unc. I.
 Mellis optimi despumati q. s.
 Fiat electuarium s. a.

218. Electuarium de Psyllio Mesuae.

R. Succi Borriginis, Succi Buglossae, Succi
 Endiviae, Succi Apii ana lib. II.
 Coquantur et despumentur et quando
 repurgati fuerint, adjiciantur:

Cuscutae, Anisi, Folliculorum Senae . . . ana unc. s.
 Capillor. Veneris M. I.
 Succi Fumi terrae recenter expressi . . . unc. III.
 Radic. Azari dr. IV.
 Spicae Nardi Indicae dr. II.

Macerentur per 24 horas, deinde bulliant
 aliquantulum, adde:

Violarum unc. III.
 Epithymi unc. II.

Et bulliant adhuc alia ebullitione parva,
 deinde colentur et exprimantur et in cola-
 tura ponatur:

Psyllii unc. III.

Macerentur per 24 horas, omni hora
 agitando cum spatula. Deinde exprimatur
 mucilago tota:

Hujus mucilaginis lib. IV.
 Sacchari albiss. despumat. lib. II. s.
 Diagridii unc. III.

Coquantur lento igne ad perfectionem,
 postea adde subsequencia subtilissime trita:
 Trociscorum Diarrhodon, Trociscorum de
 Spodio, Rhabarbari electi ana unc. I.
 Trociscorum de Berberis unc. s.

Confice s. a.

219. Confectio Hamech major Mesuae.

R. Myrobalanorum citrinor	unc. IV.
Myrobalanorum chebulator., Myrobalanorum	
Indor. Rhabbarbari electi	ana unc. II.
Agarici, Colocynthidos, Polypodii quercini	ana dr. XVIII.
Absinthii, Thymi, Senae	ana unc. I.
Violarum	dr. XV.
Epithymi	unc. II.
Anisi, Foeniculi, Rosarum	ana dr. VI.
Succi Fumi terrae	lib. I.
Prunorum	nō LX.
Passularum major. enucleat.	unc. VI.

Infundantur omnia in sero lactis caprini
q. s. et ponantur in vitro angusti orificii
bene obturato et dimittantur per dies V.
Postea ad ignem ferveant una atque altera
ebullitione ac manibus deinde fricentur et
colentur. In colatura dissolve:

Pulpae Cassiae	unc. IV.
Pulpae Tamarindorum	unc. V.
Mannae	unc. II.

Agitentur simul et adjiciatur:

Sacchari clarificati	lib. I. s.
Scammoneae correctae	unc. I. s.

Coquantur simul ad mellis spissitudinem,
deinde inspergatur subscriptarum specierum
pulvis:

Myrobalanorum citrin., Myrobalanor. chebulator.	ana unc. s.
Myrobalanor. Indorum, Mirobalanor. bellirico-	
rum, Myrobalanor. emblicorum, Rhabbarbari,	
Sem. Fumi terrae	ana dr. III.
Spica Nardi, Indicae, Anisi	ana dr. II.

Confice s. a.

220. Michleta secundum descriptionem

Nicolai.

- R. Myrobalan. citrinor., Myrobalan. chebulor.,
 Myrobalan. Indorum omnium tostorum . . . ana dr. II. s.
 Myrobalanor. Belliric., Myrobalanor. emblic.
 tostor. ana dr. II.
 Nasturtii, Cymini, Anisi, Foeniculi, Ammios,
 Carvi ana dr. I. s.

Omnia cruda terantur et macerentur
 in aceto vini modico per 24 horas. Exiccantur
 cum insperso aceto, postea torreantur super
 prunis et tostis addantur subsequencia:
 Spodii, Balaustiorum, Pulpae Sumachii, Masti-
 ches, Gummi Arabici ana dr. I. gr. XV.

Omnia cum oleo rosato fricentur et
 commisceantur cum syrupi myrtini triplo.

221. Morselli laxativi.

- R. Cinnamomi interioris dr. I.
 Zingiberis albi dr. I. s.
 Margarit. praeparat., Corallorum rubeor.
 praeparat. ana scr. I.
 Cardamomi, Macis, Nucis muscatae, Ligni
 Aloës ana scr. s.
 Galangae, Charyophyllorum ana scr. I.
 Turbith electi unc. s.
 Diagridii scr. IV. s.
 Sacchari albi in aqua Rosarum et Menthae
 dissoluti unc. V.
 Conservae Rosarum unc. I.

Fiat confectio in morsellis.

222. Anisum laxativum.

- R. Senae praeparat., Turbith albi ana dr. IV.
 Rhabarbari el. scr. IV.

Zingiberis albi scr. II.
 Masticis, Galangae, Macis, Cinnamomi . . . ana scr. I.
 Diagridii unc. II. s.
 Misce fiat pulvis.
 Sem. Anisi mundati unc. X.
 Sacchari albi lib. V.
 Conficiantur s. a.

223. Tragea laxativa.

R. Turbith unc. I.
 Zingiberis, Cinnamomi, Mastiches, Galangae,
 Cardamomi minoris, Charyophyllorum, Anisi,
 Hermodactylorum, Diagridii ana unc. s.
 Folior. Senae unc. II.
 Sacchari albiss. unc. IV.
 Redigantur in pulverem et misceantur.

224. Pulvis Senae praeparatae.

R. Senae dr. XII.
 Zingiberis, Macis dr. III.
 Cinnamomi, Tartari ana dr. I. s.
 In pulverem redigantur et misceantur.

225. Pulvis sternutatorius.

R. Nucis muscatae, Piperis longi, Pirethri, Sta-
 phisagriae, Nigellae, Synapis, Majoranae . . . ana dr. I.
 Cubebarum dr. s.
 Hellebori albi dr. III.
 Fiat pulvis.

226. Nasalia.

R. Species supradictas et cum Ladano q. s.
 fiant nasalia.

XII. Catapotia sive Pilulae.

227. Pilulae Alephanginae sive aromaticae.

- R. Cinnamomi, Cubebæ, Ligni Aloës, Calami aromatici, Macis, Nucis muscatae, Cardamomi, Charyophyllorum, Asari, Mastiches, Schoenanthi, Spicae, Carpobalsami vel succedanei ana unc. I.
 Absinthii sicci, Rosarum ana dr. V.

Terantur parum, coquantur in duplici vase lento igne in aquae lib. XII. ad duarum partium consumptionem. Deinde exprimantur fortiter et colentur. In colaturae lib. II. dissolve Aloës electae, saepius in vase vitreo lotae cum aqua pluvia et iterum siccatae lib. I.

Agitentur simul continue (!) in sole, postea addantur pulveres:

- Myrrhae, Mastiches ana dr. V.
 Croci dr. III.

Praedicti decocti reliquum ipsis affundatur, permixta ad solem vel in hypocausto siccentur, lintheo puro vase oblecto. Postremo reponatur massa et usu urgente fiant pilulae.

228. Pilulae pestilenciales seu communes Ruffi.

- R. Aloës electae unc. II.
 Myrrhae optima, Croci sinceri ana unc. I.
 Confice cum vino aromatico.

229. Pilulae Assaieret.

- R. Specierum Hierae picrae simplicis Galeni unc. I.
 Mastiches, Myrobalanor. citrinor ana unc. s.
 Aloës optimi unc. II.

Cum syrupo de Stoechade q. s. ex-
 cipiatur et fiat massa.

230. Pilulae sine quibus esse nolo.

- R. Aloës optimae lotae dr. XIV.
 Quinque generum Myrobalanor., Rhabarbari
 Mastiches, Absinthii, Rosarum, Violarum,
 Senae, Agarici, Cuscuthae ana dr. I.
 Diagridii dr. VI. s.

Haec dissolvantur succo Foeniculi q. s.
 et reliquis deinde admixtis fiat massa.

231. Pilulae mastichinae.

- R. Mastiches dr. IV.
 Agarici optimi dr. III.
 Aloës electae dr. X.
 Confice cum syrupo de Stoechade.

232. Pilulae aggregativae.

- R. Myrobalanor. citrin., Rhabarbari ana unc. s.
 Succu Eupatorii, Succu Absinthii ana dr. II.
 Diagridii dr. VI.
 Myrobalanor. chebulator., Myrobalanor. Indo-
 rum, Agarici, Colocynthidos, Polypodii ana dr. II.
 Turbith, Aloës ana dr. VI.
 Mastiches, Rosarum, Salis gemmae, Epithymi,
 Anisi, Zingiberis ana dr. I.
 Electuarii rosat. Mesue q. s.

Fiant pilulae crassiusculae.

233. Pilulae ex Aloë lota.

- R. Aloës cum succo Rosarum rubear. lotae unc. I.
 Agarici trociscati dr. III.
 Mastiches dr. II.
 Specierum Diamoschi dulcis dr. s.
 Cum vino Malvatico cogantur in
 massam.
-

234. Pilulae de Rhabbarbaro Mesuae.

- R. Rhabbarbari dr. III.
 Succi Glycyrrhicae, Succi Abinthii, Mastiches ana dr. I.
 Myrobalanorum citrinor. dr. III. s.
 Sem. Apii, Sem. Foeniculi ana dr. s.
 Trociscorum Diarrhodon dr. III. s.
 Hierae picrae simpl. dr. X.
 Cum aqua Foeniculi q. s. fiat massa.
-

235. Pilulae aureae Nicolai Myrepsi.

- R. Aloës, Diagridii ana dr. V.
 Rosarum, Sem. Apii ana dr. II. s.
 Anisi, Foeniculi, Mastiches ana dr. I. s.
 Croci, (Trocisc. Alhandal.), Pulvae Colo-
 cynthidos ana dr. I.
 Mucilaginis Tragacanthae q. s., fiat massa.
-

236. Pilulae de Agarico Mesue.

- R. Agarici, Mastiches ana dr. III.
 Ireos, Prassii ana dr. I.
 Turbith dr. V.
 Specierum Hierae picrae dr. IV.
 Colocynthidos, Sarcocollae ana dr. II.
 Myrrhae dr. I.
 Sapae q. s., fiat massa.
-

237. Pilulae de Hiera simplici Galeni.

- R. Aloës dr. L.
 Cinnamomi, Xylobalsami, loco ejus Ligni
 Aloës, Asari, Spicae Nardi Indicae, Croci,
 Mastiches Chiaie ana dr. III.
 Mellis rosati q. s., fiat massa.
-

238. Pilulae de Hiera composita.

- R. Cinnamomi, Spicae nardi Indicae, Croci,
 Schoenanthi, Asari, Xylocassiae, Xylobalsami,
 Carpobalsami aut succedaneorum, Violarum,
 Absinthii, Epithymi, Agarici, Rosarum, Turbith,
 Colocynthidos, Diagridii, Mastiches ana scr. II.
 Aloës dr. X. scr. II.
 Fiat massa.
-

239. Pilulae de Hiera cum Agarico.

- R. Specier. Hiera simpl. Galeni, Agarici troci-
 scati ana dr. IV.
 Aloes bonae unc. I.
 Mellis rosati q. s., fiat massa.
-

240. Pilulae Cochiae Rhasis.

- R. Specier. Hierae picrae Rhasis dr. X.
 Colocynthidos dr. III. scr. I.
 Scammoneae dr. II. s.
 Turbith, Stoechadis ana dr. V.
 Syrupi de Stoechade q. s., fiat massa.

Hiera picra Rhasis pro conficiendis his
 pilulis Cochiis haec est:

- R. Rosarumr ubear., Spicae Nardi Indicae, Masti-
 ches, Xylobalsami, Carpobalsami, Xylocassiae

verae vel succedaneor., Cinnamomi, Rad.

Azari ana scr. I. gr. VI.

Aloës dr. VI. scr. II.

Misce.

241. Pilulae lucis majores.

- R. Rosarum, Violarum, Absinthii, Colocynthidos, Turbith, Cubeborum, Calami aromatici, Nucis muscatae, Spicae, Epithymi, Carpobalsami, Xylobalsami aut succedan., Sileris, Sem. Rutae, Schoenanthi, Azari, Masticis, Charyophyllorum, Cinnamomi, Anisi, Foeniculi, Apii, Cassiae, Croci, Macis ana dr. II.
 Myrobalanor. citrinor., Myrobalanor. chebulator., Myrobalanor. Indor., Myrobalanor. belliricor.
 Myrobalanor. emblicor., Rhabarbari ana dr. IV.
 Agarici, Senae ana dr. V.
 Euphrasiae dr. VII.
 Aloës succotrinae ad pondus omnium unc. XI. dr. II.

Confice cum succo Foeniculi.

242. Pilulae de Benedicta.

Fiant semper ex speciebus Benedictae laxativae recentibus, quando opus fuerit.

243. Pilulae arthriticae de Hermodactylis.

- R. Hermodactylor., Turbith ana unc. I. s.
 Myrobalan. Indorum, Myrobalan. chebulatorum, Myrobalan. citrinor., Agarici, Colocynthidos, Anisi, Charyophyllorum, Spicae, Zingiberis, Saxifragiae, Piperis longi, Sem. Apii, Dauci,

Rosarum, Amomi, Salis gemmae, Mastiches,
 Granorum solis, Carvi, Sem. Asparagi, Sem.
 Foeniculi ana dr. s.
 Aloës flavae unc. III.
 Diagridii dr. I.
 Succı Absinthii q. s., fiat massa.

244. Pilulae foetidae majores.

R. Sagapeni, Ammoniacy, Opopanacy, Bdellii
 mollis, Colocyntydis, Sem. Rutae, Aloës,
 Epithymi ana dr. V.
 Hermodactylorum, Esulae minoris ana dr. II.
 Diagridii dr. III.
 Cinnamomi, Spicae Nardi Indicae, Croci,
 Castorei ana dr. I.
 Turbith dr. IV.
 Zingiberis dr. I. s.
 Euphorbii scr. II.
 Succı Porri q. s., fiat massa.

245. Pilulae de Colocyntyde.

R. Colocyntydos dr. VI.
 Myrobalanor. nigror., Myrobalanor. citrinor.,
 Sagapeni, Bdelli, Sarcocollae ana dr. V.
 Aloës dr. VII.
 Melanthii, Cumini, Origani, Nasturtii albi,
 Salis gemmae, Absinthii sicci ana dr. I.
 Infunde lacrymas succo Porri et cum
 caeteris effinge massam.

246. Pilulae Diacolocyntydos Alexandri alias de Nitro.

R. Aloës unc. I.
 Euphorbii unc. s.

Colocyntidos, Scammoneae, Gummi . . . ana unc. I.
 Nitri Alexandrini unc. s.
 Cort. Ellebori nigri unc. I.
 Cum succo Brassicae vel Citri fiat
 massa.

247. Pilulae de Mezereo.

R. Folior. Mezerei aceto infusor. et exiccator. dr. V.
 Myrobalanor. citrinor. unc. s.
 Myrobalanor. chebulator. dr. III.
 Forma cum Manna et Tamarindis succo
 Intybi dissolutis q. s.

248. Pilulae de Fumo terrae.

R. Myrobalanor. citrinor., Myrobalanor. chebulator.,
 Myrobalanor. Indor., Diagridii ana dr. V.
 Aloës dr. VII.
 Succi Fumi terrae clarificati q. s. ut
 ter formetur haec massa. Nam cum primo
 fuerit siccata massa, plus succi est addendum
 et rursus exiccetur, idque tertio est faciendum.

249. Pilulae Indae ex Hali.

R. Myrobalanorum Indor., Hellebori nigri, Poly-
 podii ana dr. V.
 Thymi, Epithymi, Stoechados ana dr. VI.
 Agarici, Lapidis Lazuli loti, Colocynthidos,
 Salis Indi aut Salis Gemmae ana unc. s.
 Succi Eupatorii inspissati, Spicae Indicae ana dr. II.
 Charyophyllorum dr. I.
 Hierae picrae simplic. Galeni dr. XII.
 Succi Apii q. s. fiat massa.

250. Pilulae de Helleboro ex Mesue.

- R. Hierae picrae dr. XII.
 Hellebori nigri, Polypodii ana dr. V.
 Epithymi, Stoechados ana dr. VII.
 Agarici, Lapidis Lazuli, Salis Indi, Colocyn-
 thidae ana dr. III.
 Cum oxymellite helleborato q. s., fiat massa.
-

251. Pilulae de lapide Lazuli sive cyaneo.

- R. Lapidis Lazuli abluti dr. VI.
 Epithymi, Polypodii ana unc. I.
 Diagridii, Hellebori nigri, Salis Indi . . . ana dr. II. s.
 Agarici unc. I.
 Charyophyllorum, Anisi ana unc. s.
 Hierae picrae dr. XV.
 Confice cum succo Endiviae.
-

252. Pilulae de lapide Armeno ex
Alexandro.

- R. Hierae picrae, Epithymi ana unc. s.
 Agarici, Lapidis Armeniaci ana scr. IV.
 Scammoneae unc. I.
 Charyophyllorum gr. XX.
 Excipiantur cum melle Rosarum aut
 succo Citri et fiat massa.
-

253. Pilulae de Cynoglossa.

- R. Cynoglossae, Opii, Sem. Hyoscyami . . . ana dr. IV.
 Myrrhae Trogloditae dr. VI.
 Thuris masculi dr. V.
 Charyophyllorum, Cinnamomi, Styracis rubei
 ana dr. II.
 Cum aqua Rosarum conficiatur massa.
-

XIII. De Trochiscis.

254. Trochisci de Rosis Nicolai.

R. Rosarum virid.	dr. III.
Spodii	dr. II.
Sandali rubei	dr. I. s. gr. VII.
Sandali albi	dr. I. gr. XII
Croci	scr. II.
Florum Nymphaeae	scr. s.

Trita cum Rosarum aqua formentur in trochiscos.

255. Trochisci de Rosis Rhasis.

R. Rosarum	unc. s.
Ligni Aloës	dr. II.
Mastiches	dr. I. s.
Absinthii pontic, Cinnamomi, Spicae Nardi, Cassiae lignae, Flor. Schoenanthi	ana dr. I.
Vini veteris q. s. et formentur trochisci.	

256. Trochisci de Absinthio.

R. Rosarum, Absinthii, Anisi	ana dr. II.
Rhabarbari el., Succ. Eupatorii, Asari, Sem. Apii, Amygdal. am., Spicae nardi, Mastiches, Folii aut succedanei	ana dr. I.
Cum succo Endiviae q. s. fiant trochisci.	

257. Trochisci de Eupatorio.

R. Mannae el., Succ. Eupatorii Mesuae, / Agerati	ana unc. I.
Rosar	unc. s.
Eboris usti	dr. III. s.

Spicae Nardi dr. III.
 Rhabbarbari, Asari, Anisi ana dr. II.

Fiant trochisci cum aqua Cuscuthae et
 umbra libera ventoque perflata exiccati re-
 ponantur.

258. Trochisci de Lacca.

R. Laccae mundatae, Succu Glycyrrhicae, Ab-
 sinthii, Berberis, Succu Eupatorii Mesuae /
 Agerati, Rhabbarbari, Aristolochiae longae,
 Costi, Asari, Amygdalarum amar. Rubeae
 tinctorum, Anisi, Apii, Schoenanthi . . . ana dr. I.

Cum aqua Eupatorii fiant trochisci
 pondere drachmae.

259. Trochisci de Rhabbarbaro.

R. Rhabbarbari el. dr. X.
 Succu Eupatorii, Amygdalar. amar. ana dr. IV.
 Rosarum dr. III.
 Spicae Nardi, Anisi, Rubeae tinctorum, Sem.
 Apii, Absinthii, Asari ana dr. I.

Cum succo Absinthii q. s. fiant trochisci.

260. Trochisci de Nymphaea.

R. Rosarum, Gummi Arabici, Tragacanthae,
 Spodii ana unc. s.
 Sem. quatuor frigidior. maior., Sem. Portulacae,
 Glycyrrhicae ana unc. I.
 Croci dr. II.
 Amyli dr. III.
 Flor. Nymphaeae dr. s.

Trita cum succo Psyllii fiant trochisci.

261. Trochisci Bechii albi.

- R. Sacchari albiss. lib. I.
 Sacchari Candi opt., Sacchari Penidii . . . ana unc. IV.
 Ireos unc. I. dr. VII.
 Amyli unc. II. s.
 Mucilaginis Tragacanthi albiss. cum aqua
 Rosarum factae q. s. formentur trochisci.

262. Trochisci Bechii nigri.

- R. Succī Glycyrrhicae unc. IV.
 Styracis Calamitae unc. I. s.
 Sacchari Candi unc. II. s.
 Specier. Diaireos Salomonis, Loch sani et
 experti ana unc. s.
 Sacchari Penidii lib. s.
 Sacchari albiss. lib. II. unc. III.

Mucilaginis Tragacanthae cum aqua
 Hyssopi factae q. s., fiant trochisci.

263. Trochisci pectorales cum Opio.

- R. Sem. Portulacae, Sem. Papaveris albi, Sem.
 Lactucae ana dr. II.
 Nuc. muschatae, Sacch. Penidii, Sacchar.
 Candi ana unc. s.
 Olibani, Masticis, Succī Glycyrrhicae . . . ana dr. II.
 Storacis Calamitae scr. II.
 Opii gr. XII.

Cum infusione Tragacanthae facta in
 aqua Foeniculi fiant trochisci.

364. Trochisci de Glycyrrhiza.

- R. Rad. Glycyrrhizae recent. rasae et mundae unc. X.
 Incidantur et contundantur et decoquantur

in aqua Hordei sufficienter, tandem fortiter
exprimantur. Expressioni adde:

Sacchari Candi unc. X.

Iterum leviter coquantur ad justam
spissitudinem et cum farina amyli q. s. fiat
massa, de qua formentur trochisci parvi.

265. Trochisci cum Manna.

- R. Succī Glycyrrhicae, Syrupi violati ana dr. III.
Semin. excortic. Citrulli, Sem. excortic. Cu-
cumeris, Sem. excortic. Cucurbitae, Mannae
electae ana dr. II.

Cum mucilagine seminis Psyllii facta
in aqua Hordei q. s. fiant trochisci.

266. Trochisci de Cappare.

- R. Cortic. rad. Capparis, Sem. Agni casti ana dr. VI.
Ammoniāci, Sem. Nigellae verae, Calaminthae,
Succi Eupatorii Mesuae ut supra, Amygdalar.
amar., Folior. Ruthae, Rad. Aristolochiae
rotund. verae, Sem. Nasturtii, Acori ana dr. II.
Cyperi, Scolopendriae ana dr. I.

Cum praedicto Ammoniaco in aceto dis-
soluto formentur trochisci.

267. Trochisci cum Myrrha.

- R. Myrrhae dr. III.
Lupinorum dr. V.
Folior. Ruthae, Mentastri, Pulegii cervini,
Cymini, Rubeae tinctorum, Asae foetidae,
Sagapeni, Opopanacis ana dr. II.
Succi Artemisiae q. s. fiant trochisci.

268. Trochisci de Alkakengis.

- R. Fructus Alkakengi dr. III.
 Sem. Citrulli, Sem. Anguriae, Sem. Cucurbitae ana dr. III. s.
 Boli Armenii, Gummi Arabici, Thuris, Sanguinis Draconis, Papaveris albi, Amygdalar. amar., Succi Glycyrrhicae, Tragacanthae, Amyli, Pinearum ana dr. VI.
 Sem. Apii, Carabae, Terrae sigillatae, Hyoscyami ana dr. II.
 Succi Alkakengi q. s. fiant trochisci.
 Possunt etiam additis Opii dr. II. fieri tales trochisci cum Opio.

269. Trochisci de Spodio.

- R. Rosar. rubear. dr. XII.
 Spodii dr. X.
 Sem. Acetosae dr. VI.
 Sem. Portulacae, Coriandri praeparati, Pulpae Sumach ana dr. II. s.
 Amyli, Florum Balaustiorum, Berberis ana dr. II.
 Gummi Arabici assati dr. I. s.
 Agrestae q. s. Fiant trochisci.

270. Trochisci de Carabe.

- R. Carabae dr. VI.
 Cornu cervi usti, Gummi Arabici assi, Coralii rubei usti, Tragacanthae, Acaciae, Hypocystidos, Balaustiorum, Mastiches, Laccae, Papaveris nigri assati ana dr. II.
 Thuris, Croci ana dr. I. s.
 Mucilaginis Psyllii q. s., Formentur trochisci.
 Fiunt et hi trochisci cum Opio addita Opii dr. I. s.

271. Trochisci Ramich.

- R. Succi Acetosae unc. XVI.
 Rosarum unc. I.
 Baccar. Myrthi unc. II.
 Bulliant parum et colentur. Colaturae
 adde:
 Gallarum bene tritar. unc. III.
 Coquantur denuo aliquantulum, deinde
 inspergatur sequentium specierum pulvis
 minutissimus:
 Rosarum unc. I.
 Sandali flavi unc. I. dr. II.
 Gumi Arabici unc. I. s.
 Carnium Sumach, Spodii ana unc. I.
 Omphacii dr. VII.
 Succi Cytoniorum unc. IV.
 Ligni Aloës, Charyophyllorum, Macis, Nucis
 muscatae ana unc. s.

Misceantur optime et exiccentur, postea
 in tenuissimum pulverem redigantur et cum
 Camphorae aureo uno et aqua Rosarum q. s.
 formentur trochisci, qui in umbra exiccentur
 et reponantur.

272. Trochisci de Terra sigillata.

- R. Sanguinis Draconis, Gummi Arabici assati,
 Trochiscorum Ramich, Rosarum rubear., Sem.
 Rosarum, Amyli assati, Spodii, Acaciae,
 Hypocystidis, Balaustiorum, Boli Armeni,
 Terrae sigillatae, Corallii rubei, Carabae . . . ana dr. II.
 Margaritarum, Tragacanthae, Papaveris nigri . . . ana dr. I. s.
 Sem. Portulacae, Cornu cervi usti, Thuris,
 Gallarum Cupressi, Croci ana dr. II.
 Aquae Plantaginis q. s. fiant trochisci.

273. Trochisci de Vipera.

Debent fieri secundum descriptionem antiquam Andromachi, quam Galenus recenset de antidotis lib. I.

274. Trochisci scyllitici.

- R. Scyllae assae partium internar. lib. I.
 Farinae Orobi unc. VIII.
 Terantur valide in mortario et excepta in trochiscos digerantur et in umbra reponantur.

275. Trochisci Hedychroi.

- R. Mari, Asari, Amaraci, Aspalathi ana dr. II.
 Schoenanthi, Calami odorati, Phu pontici, Xylobalsami, Opobalsami vel succedaneorum, Cinnamomi, Costi ana dr. III.
 Myrrhae, Folii vel succedanei, Nardi Indicae, Croci, Cassiae ana dr. VI.
 Amomi dr. XII.
 Mastiches Chiaie dr. I.
 Cum vino phalerno aut veteri optimo fingantur trochisci.

276. Trochisci Cyphi Damocratis.

- R. Carnium uvae passae albae et pinguissimae, Therebinthinae coctae ana unc. III.
 Myrrhae, Squinanthi ana dr. XII.
 Calami aromatici dr. IX.
 Cinnamomi dr. IV.
 Bdellii, Onychis, Spicae Nardi, Cassiae optimae, quae est similis Cinnamomo, Cyperi purgati, Baccar. Juniperi maximarum pinguiss. ana dr. III.

Asphalathi vel succedanei dr. II. s.
 Croci dr. I.
 Mellis optimi, Vini optimi ana q. s. ad for-
 mandum et incorporandum.

277. Trochisci Galliae moschatae.

R. Ligni Aloës crudi dr. V.
 Ambrae dr. III.
 Moschi dr. I.

Mucilaginis Tragacanthae cum aqua
 Rosarum factae q. s. fiant trochisci.

278. Trochisci Alistae moschatae.

R. Ladani puriss. unc. III.
 Styrac. calamitae unc. I. s.
 Styrac. rubeae unc. I.
 Ligni Aloës dr. II.
 Ambrae dr. I.
 Camphorae dr. s.
 Moschi scr. s.
 Aquae Rosarum q. s. fiant trochisci.

279. Trochisci de Violis Mesuae.

R. Folior. Violar. mediocrium in siccitate et
 humiditate dr. VI.
 Turbith boni arundinei unc. s.
 Succ. Glycyrrhicae, Mannae ana dr. II.
 Fac trochiscos.

Aliquando additis Scammoneae dr. II.
 fiant trochisci de Violis cum Scammonea.

280. Trochisci de Agarico sive Agaricus
trochiscatus.

- R. Agarici el. unc. III.
 Salis gemmae unc. I.
 Vini infusionis Zinziberis q. s. fiant trochisci.

281. Trochisci Alhandali.

- R. Pulpae Colocyntidis dr. X.
 Incidatur minutissimae et fricetur cum olei
 rosati dr. I.
 Deindesume:
 Mucilaginis Tragacanthae, Gummi Arabici,
 Bdelii cum aqua Rosarum factae . . . ana scr. II. gr. V.

Et cum parte mucilaginis ex praedicta
 Colocyntide fiant trochisci, qui postquam
 siccati fuerint, rursum contendantur minutis-
 sime et cum reliquo mucilaginis rursum
 formentur trochisci, qui reponantur.

282. Trochisci de Berberis.

- R. Berberis dr. II.
 Spodii, Ligni Aloës, Sem. Acetosae, Mastiches,
 Galliae moschatae verae, Spicae Nardi Indicae . . . ana dr. I.
 Gummi Arabici dr. III.
 Rosarum dr. V.
 Aquae Rosarum q. s. formentur trochisci.

283. Trochisci pro fumo.

- R. Ladani puri unc. XX.
 Olibani electi unc. X.
 Thymiamatis, Asae dulcis, Styracis calamitae . . . ana unc. III.
 Aiptae moschatae, Galliae muscatae . . . ana unc. I.
 Ligni Aloës dr. III.

Charyophyllor., Cinnamomi, Rosarum rubearum
 Calami aromatici, Sandali albi, Sandali citrini,
 Majoranae, Florum Lavendulae, Spicae Cel-
 ticae ana unc. s.
 Carbonum Tiliae unc. XXX.
 Styracis liquidae unc. IV. vel q. s.

Et cum modico Terebinthinae et in-
 fusione Tragacanthae facta cum aqua Rosa-
 rum vel Lavendulae fiat massa, de qua
 formentur candelae seu trochisci.

284. Trochisci pro fumo cum Moscho.

R. Ligni Aloës boni unc. I.
 Benzuin, Styracis calamitae ana unc. II.
 Sacchari albi unc. III.
 Moschi gr. XVI.

Cum mucilagine Tragacanthae facta cum
 aqua Rosarum q. s. fiant trochisci.

285. Diagridium seu praeparatio Scam- moneae.

R. Sem. Apii, Sem. Dauci, Sem. Foeniculi, Sem.
 Psyllii, Flor. Violarum, Flor. Rosarum rubear. ana dr. II.
 Galangae, Ligni Aloës ana dr. I.
 Cortic. Myrobalanor. citrin. unc. s.
 Vini Citoniorum lib. I.
 Succī Rosarum lib. s.

Fiat s. a. decoctio ad consumptionem
 medietatis, postea fiat fortis expressio et
 colatura, deinde:

R. Scammoneae el. pulveris. lib. I. s.
 Pulv. Masticis, Pulv. Tragacanthae alb., Pulv.
 Bdellii ana dr. VI.
 Cortic. Myrobalanor. citrin unc. s.

Specierum electuar. de Gemmis, Specierum
Diagalangae ana dr. II.

Misce omnia simul et cum praedicta
expressione in mortario calido fiat massa, de
qua formentur trochisci.

XIV. De Collyriis vel Sief.

286. Collyrium album cum Opio ex
Mesuae.

R. Gummi Arabici, Tragacanthae, Amyli . . . ana unc. s.
Cerussae lotae dr. VI.
Opii dr. I.
Cum albumine ovi q. s. distemperentur et
fiat collyrium vel sief aridum in modum
trochisci.

287. Idem Collyrium sine Opio.

Fit ut praecedens tantum omisso Opio.

288. Collyrium rubeum.

R. Lapidis Haematitis, Cerussae lotae . . . ana dr. III.
Aeris usti dr. II.
Myrrhae, Croci ana dr. I.
Cum vino veteri formentur sieff.

289. Collyrium Cygnus albus Nicolai
Myrepsi.

R. Pompholygis lotae unc. s.
Cadmyae ustae et lotae dr. II. s.
Cerussae dr. V.
Samii Asteris vel Terrae sigillatae . . . dr. s. gr. VII.

Opii	gr. XV.
Amyli	unc. II. s.
Acaciae	dr. s.
Tragacanthae	dr. I.
Gummi	dr. II. s.

Trita cum aqua pluviali digerantur in
collyria arida vel sieff.

290. Collyrium viride.

R. Floris aeris	dr. III.
Atramenti sutorii usti	dr. VI.
Arsenici rubei, Nitri, Spumae maris	ana dr. I.
Salis hammoniacy	dr. s.
Amoniaci	dr. II.

Cum succo Rutae fingantur sieff.

XV. De Oleis.

291. Oleum rosaceum.

R. Folior. Rosarum nondum omnino explicatarum contusarum in marmoreo mortario	unc. IV
Olei omphacini	lib. II.

Coquantur ad tres horas in vase duplici, insolentur in vitreo vase diebus VII, exprimatur oleum, cui injiciantur Rosae contusae aliae, iterum coquantur et insolentur diebus VII. Eodem modo post expressionem aliae addantur contusae, insolentur per dies XXX, coquantur in vase duplici, exprimatur oleum, coletur et reponatur.

292. Oleum violatum.

Fit eodem modo ut rosatum.

293. Oleum nympheatum.

Fit eodem modo.

294. Oleum melinum vel Cydoniorum.

- R. Carnis Cydoniorum praematurorum cum cortice tritorum abjectis granis q. s. et succus eorum aequali portione in olei omphacini sufficiente quantitate in vase vitreo bene obturato diebus XV. insoletur. Dein horis IV. in vase duplici coquatur, posthaec abjiciantur Cydonia et recentia imittantur et rursus insolentur et coquantur. Dein tertio recentia injiciantur et ut praedictum est insolentur et coquantur. Tandem in vase diligenter obturato ne, expiret recondatur oleum.
-

295. Oleum myrtinum.

Fit ex foliis Myrti viridibus [aut eorum loco ex aridis sed vino odorato conspersis et contusis] et oleo omphacino et vino odorato adstringente. Quae omnia coquantur ad lentas prunas ad vini consumptionem. Dein per colum trajiciuntur et oleum purum in vas vitreum reponitur. Sed praestare judicamus, ut hoc oleum myrtinum pharmacopolae ex Italia sibi afferri curent, ubi ex recentibus materiis fieri potest.

296. Oleum e Myrti baccis seu Myrtillorum.

Fit ex viridibus baccis Myrti [vel ex aridis vino odorato conspersis] et oleo omphacino ut Rosaceum.

Sed et hoc oleum ex Italia ad ferri praestat, ubi baccae recentes habentur.

297. Oleum papaverinum.

Fit ex capitibus recentibus, foliis et
floribus utriusque Papaveris ut rosaceum.

298. Oleum Hyoscyami.

Si haberi debet, fiat ut amygdalinum.

299. Oleum Mandragorae.

Curent apportari pharmacopolae ex iis
locis, ubi recte fieri potest.

300. Oleum chamaemelinum.

R. Flor. Chamaemeli abjectis albis foliolis,
Olei maturi ana q. s.
Fiat ut rosaceum.

301. Oleum anethinum.

Fit ut praecedens.

302. Oleum florum Verbasci.

R. Florum Verbasci et olei maturi q. s., fiat ut
oleum Liliorum alborum.

303. Oleum Amygdalarum dulcium.

Parent pharmacopolae quantum fieri
potest recentissimum et purissimum secun-
dum consuetum usum.

304. Oleum Amygdalarum amarum.

Fiat ut praecedens.

305. Oleum Liliorum alborum.

- R. Flor. Liliorum alborum abjecto croceo . . . unc. II.
 Olei maturi dulcissimi lib. I. s.

Insolentur per triduum, exprimantur et
 abjiciantur priora folia, injiciantur nova
 secundo et ita etiam tertio. Colentur et re-
 ponantur.

306. Oleum de semine Lini.

Fiat secundum usitatum in Germania
 modum.

307. Oleum irinum.

- R. Radic. Iridis lib. I.
 Flor. Iridis lib. II.
 Aquae, cui incoctae sint aliae radices Iridis lib. III.
 Olei dulcis lib. VI.

Coquantur in vase duplici et prioribus
 expressis et abjectis, radices et florum folia
 nova imittantur ut in rosaceo.

308. Oleum nardinum.

- R. Spicae Nardi unc. III.
 Vini, Aquae ana unc. II. s.
 Olei sesamini veri vel in illius defectu olei
 dulcis lib. I. s.

Coquantur in vase duplici horis IV. et
 frequenter moveantur.

309. Oleum mastichinum.

- R. Mastichis unc. III.
 Vini odoriferi unc. VIII.
 Olei rosacei lib. I.

Coquantur in vase duplici ad vini consumptionem.

310. Oleum Absinthii.

- R. Summitatum Absinthii pontici, Succij hujus ana unc. IV.
 Olei communis lib. III.

De reliquo fiat ut rutaceum.

311. Oleum de Mentha.

- R. Menthae sativae, Succij ejus ana unc. IV.
 Olei omphacini lib. II.

Caetera fiant ut in rutaceo.

312. Oleum e Spica seu Lavendula nostrate.

Afferendum est ex Gallia.

313. Oleum e Ruta.

- R. Folior. Rutae viridium contusor., Succij foliorum Rutae ana unc. III.
 Olei veteris clarissimi lib. III.

In reliquis omnibus fiat ut rosaceum, nisi quod XV. diebus insolari debeat.

314. Oleum de Abrotano.

Fiat ut oleum de Ruta.

315. Oleum e Capparibus.

- R. Cortic. radic. Capparum unc. I.
 Cortic. Tamarisci, Sem. Agni, Aspleni, Cyperi, ana dr. II.
 Rutae dr. I.
 Aceti, Vini albi, clari, odorati ana unc. II.
 Olei maturi lib. I.

Coquantur in duplici vase ad acetum et
 vini consumptionem.

316. Oleum laurinum.

Pharmacopolae comparent ex Italia vel
 ex baccis contusis exprimant s. a.

317. Oleum e sarmentis Juniperi.

318. Oleum e baccis Juniperi.

Haec duo olea comparentur a chymicis
 artificibus.

319. Oleum cheirinum vel leucoinum.

Fit e floribus Leucoii lutei ut rutaceum.

320. Oleum e Castoreo simplex.

- R. Castorei unc. I.
 Olei lib. I.

Coquantur ad tertias, reponantur in
 vase vitreo.

321. Oleum e Castoreo compositum.

- R. Castorei, Bdellii, Styracis calamitae / Saga-
 peni, Galbani, Opopanax, Cassiae lignae,
 Cinnamomi ana dr. II.

Salviae, Lavendulae, Primulae veris odoratae,
 Cyperi, Flor. Junci odorati, Piperis longi,
 Piperis nigri, Sabinae, Pyrethri, Iridis . . . ana dr. II. s.
 Vini odoriferi lib. II.
 Olei lib. III.

Gummi seorsim in vino dissolvantur,
 reliqua omnia tusa macerentur in vino III.
 diebus, quarto cum oleo et vino in duplici
 vase coquantur ad vini consumptionem,
 postea coletur exprimatur et reponatur.

322. Oleum Scorpionum.

Aliunde comparari bonum debet.

323. Oleum Hyperici.

R. Summitatum Hyperici jamjam maturescentis unc. III.

Macerentur in vino odorifero diebus III,
 bulliant deinde in vase duplici, obturato
 orificio vasis. Postea exprime et recentis
 Hyperici par pondus injice et iterum macera,
 coque et exprime. Tum etiam tertio recens
 Hypericum adde et si vinum minuetur adde
 aliquid. Postea:

R. Terebinthinae clarae dr. III.
 Olei veteris clari , unc. VI.
 Croci scr. I.

Coquantur in duplici vase usque ad
 consumptionem vini, postea exprime et a
 sedimento purgatum oleum repone.

324. Oleum Momordicae.

Fit per infusionem pomorum Momor-
 dicae in oleo olivae q. s.

325. Oleum e Lumbricis.

- R. Lumbricorum terrestrium lib. s.
 Olei maturi lib. II.
 Vini unc. II.

Coquantur omnia simul in duplici vase
 ad vini consumptionem, coletur, reponatur.

326. Oleum de Piperibus ex Rondeletio.

- R. Trium Piperum ana unc. IV.
 Seminis Been unc. VI.
 Radic. Apii, Radic. Foeniculi ana dr. III. s.
 Sagapeni, Opopanacis, Agarici albi ana dr. II. s.
 Turbith boni dr. XII.
 Zingiberis dr. III.
 Summitatum Hyssopi recentis, Foliorum rutae ana M. I.
 Parum trita coquantur in aquae lib. XXIV.
 Colentur et adjiciantur olei ricinini vel
 Amygdalarum amar. unc. XVIII.

Percoquantur ad aquae consumptionem.

327. Oleum vulpinum.

- R. Integram vulpem detracta duntaxat pelle et
 intestinis diligenter extractis,
 Aquae fontanae, Aquae marinae ana q. s.
 Olei veteris clari lib. VII.
 Salis unc. III.

Coquantur ad aquae consumptionem et
 articulorum vulpis dissolutionem. Postea
 aquae dulcis, cui herbarum Hyssopi et Anethi
 ana M. I. incoctus sit, affundatur vasi et cum
 dictarum herbarum ana lib. I. recoquatur ad
 hujus aquae consumptionem. Deinde colatum
 oleum ad usum reponatur.

328. Oleum costinum.

Afferatur probatum ex Italia.

329. Oleum e lateribus.

R. Lateres ex terra seu luto rubente confectos antiquissimos, quos confringe in frusta medicoria et carbonibus non fumantibus accende et ure, donec igniti rubeant. Deinde ex carbonibus exempta fragmenta restingue in oleo claro veteri et in eo demitte, quousque se oleo bene impleverint. Postea oleo exempta in minutissimum pulverem contundito et cucurbitae vitreae per sublimationem destillando indito et s. a. luto chymistico juncturas vitrorum claudito et subtus in fornace carbonibus accensis oleo elicito et elicium in vase obstructo reponito.

330. Oleum sesaminum.

Pharmacopolae nostri sibi aliunde comparent genuinum aut in defectu substituant oleum Amygdalarum dulcium.

331. Oleum e Ricini seminibus, quod et e Cherva vocant.

R. Semen Ricini repurgatorum tritorum in sartagine aut vase duplici torrefactorum et coctorum atque in sacco, ut exprimatur oleum inclusorum q. s. Fiat oleum s. a.

332. Oleum e vitellis ovorum.

R. Ova recentia nō C.

Coquantur donec indurentur. Deinde vitelli eorum exempti et comminuti in sartagine frignantur, donec rubescant et pinguedinem remittant. Postea massa fervens in sacculum pilis contextum indatur et exprimatur oleumque expressum reponatur.

333. Oleum de Tartaro.

R. Tartari dolii lateribus adhaerentis puri . . lib. IV.

Conjiciantur in vas figulinum vel ollam et urantur in fornace cum lateribus aut fictilibus aut per se, ita ut Tartarum omne candidum reddatur. Dein imponatur sacco ex laneo panno facto et inferne acuto, cui parum aceti et vini superinfundatur et in cella vinaria suspendatur. Tunc ex eo clarus quidam liquor destillat in vitrum suppositum, qui ad usum reponendus.

334. Oleum de Terebinthina.

R. Terebinthinae aut laricinae resinae . . . lib. IV.

Ponantur in vas vitreum, cucurbitam destillatoriam seu retortam appellatam et chymistarum more oleum eliciatur, ita nimirum, ut vas praedictum arenae imponatur a sordibus probe mundatae. Atque tum primum cum aqua elicietur oleum tenue et clarum, secundo aurei coloris, ultimo fuscum et crassum. Horum unum quodque per se aufertur et reponitur.

335. Oleum de Euphorbio.

- R. Euphorbii unc. s.
 Olei Leucoini, Vini odoriferi ana unc. V.
 Coquantur ad vini consumptionem.

336. Oleum Balsami Petri de Abano.

- R. Myrrhae electae, Aloës hepaticae, Spicae
 Nardi, Sanguinis Draconis, Thuris, Mumiae,
 Opopanacis, Bdellii, Carpobalsami, Ammoniacy,
 Sarcocollae, Croci, Mastiches, Gummi arabici,
 Styracis liquidae ana unc. II.
 Ladani el. unc. II. s.
 Moschi dr. I. s.
 Therebinthinae ad pondus omnium.

Pulveriscentur supradictae species et cum
 Terebinthina misceantur et omnia per alem-
 bicum destillantur et liquor stillaticius re-
 condatur.

337. Petroleum.

Aliunde afferatur.

XVI. De Unguentis.

338. Unguentum Dialtheae simplex.

- R. Radic. Altheae lib. II.
 Seminis Lini, Seminis Foenugraeci ana lib. I.
 Olei lib. IV.
 Cerae lib. I.
 Terebinthinae unc. II.
 Resinae unc. VI.
 Radices et semina contusa macerentur III.
 diebus in aquae lib. VIII. aut q. s.

Quarto die coquantur, donec remittant crassam et viscosam mucilaginem, eam deinde exprime, mox:

- R. Expressae mucilaginis lib. II et coque cum oleo. Cum deinde aquosum illud in mucilagine consumptum fuerit, ceram addito et fiat s. a.

339. Unguentum Dialtheae compositum.

- R. Rad. Altheae lib. I.
Sem. Lini, Sem. Foenugraeci ana lib. s.
Scyllae unc. III.

Radices et semina bene tusa III. diebus in lib. III. s. aquae macerentur. Deinde coquantur, donec mucilaginis crassitudinem acquirant et per linteum tenue colentur et exprimantur. Postea:

- R. Mucilaginis hujus lib. I.
Olei communis lib. II.

Rursus coquantur, donec mucilago absumpta fuerit, deinde injiciatur:

- Cerae lib. s.
Terebinthinae, Galbani, Gummi Hederae aut
ejus succi ana dr. I.

Postremo imponantur:

- Colophoniae bene tritae, Resinae albae purae ana unc. III.

Concussa et agitata probe ut in lebetes eliquentur, ab igne removeantur et refrigerata in vase condantur.

340. Unguentum populeum.

- R. Oculorum seu gemmarum Populi arboris recentium lib. I. s.
Axungiae porcinae non salsae praep. lib. II.

Oculi seu gemmae Populi contendantur et macerentur in axungia, donec sequentes herbae in aestate colligi possint:

- R. Folior. Hyoseyami unc. VI.
Folior. Papaveris nigri, Cimarum Rubi tene-
rarum, Solatri, Vermicularis, Lactucae, Sem-
pervivae majoris, Rad. Crassulae, Violariae,
Cymbalii ana unc. III.

Herbae contendantur et misceantur oculis Populi et axungiae et dimittantur per dies X. Deinde coquantur supra lentum ignem in vini odorati sufficienti quantitate, donec vinum consumatur. Postea colentur et exprimantur et expressum unguentum reponatur.

341. Unguentum de Alabastro.

- R. Vini aromatici albi lib. VIII.
Flor. Chamaemeli viridium unc. IX.
Cimarum Rubi virid. M. I.
Rutae viridis M. II.
Seminis Foeniculi pulveris unc. IV.

Pistatis herbis fiat infusio in olla vitrea per III. dies, deinde adde:

- Olei rosati lib. II.

Bulliant lento igne ad consumptionem vini, postea prelo subdantur et fiat expressio.

Cui adde:

- Cerae unc. II.
Pulveris Alabastri lib. I.

His bene mixtis adde:

- Conquassata albumina ovorum nō XII.

Fiat unguentum bene agitando spatula vel pistello ligneo, donec albescat.

342. Unguentum somniferum.

- R. Olei Violarum, Olei Rosarum, Olei nenu-
 pharini, Hyoseyami ana unc. I.
 Cortic. Mandragorae dr. II.
 Sem. Hyosciami, Sem. Papaveris albi ana dr. I.
 Croci scr. II.
 Unguenti populeonis unc. II.
 Opii scr. IV.
 Aquae Rosarum, Aceti rosacei ana dr. II.
 Cerae albae parum, fiat linimentum.

343. Unguentum pectorale album.

- R. Mucilaginis seminis Psyllii, Tragacanthae,
 Gummi arabici, Sem. Lini, Foenugraeci ana dr. I.
 Adipis Gallinae, Medullae vituli, Butyri re-
 centis loti cum aqua Violarum ana unc. I. s.
 Olei violati, Olei Amygdal. dulc. ana unc. I.
 Cerae albae q. s., fiat unguentum.

344. Unguentum rosatum.

- R. Axungiae porcinae q. v.

Probe lavetur novies aqua calente et
 toties frigida. Deinde teratur cum ea aequalis
 portio Rosarum rubearum recentium, quae
 marcescant cum ea dies septem. Coquantur
 fundanturque igne lento et colentur. Rursus
 tandundem Rosarum rubearum recentium
 cum ea tere, quae dies etiam VII. cum ea
 marcescant. Fundantur ut prius et colentur.
 Tunc affundatur succi Rosarum dimidium,
 olei Amygdalarum dulcium pars VI. Co-
 quantur igni lento ad succi consumptionem
 et reponantur. Si inter coquendum injiciatur
 parum Opii in stillatio Rosarum liquore so-
 luti, fit efficacius.

345. Unguentum infrigidans Galeni.

- R. Olei rosati omphacini lib. I.
 Cera albae unc. III.
 Ceram in oleo liquabis et saepius
 aqua frigida lavabis, donec albescat. Post-
 remum aqua rosacea lavato et paululum
 Aceti rosati addito.

346. Unguentum nenufarinum.

- R. Olei Nymphaeae citrinae unc. VIII.
 Florum Nymphaeae citrinae dr. VI.
 Seminis Acetosae, Corall. rub. praep., Sandali
 rubei ana dr. II.
 Ossis de corde cervi, Margaritarum, praep.,
 Hyacinthorum praep. ana dr. I.
 Camphorae scr. I.
 Cerae albae q. s., fiat unguentum cum
 pauxillo aquae Rosarum.

347. Unguentum resumptivum.

- R. Olei violati unc. VI.
 Butyri recentis non salsi unc. IV.
 Axungiae porcinae recentis non salsae,
 Axungiae gallinarum, Axungiae anseris, Axun-
 giae anatis ana unc. II.
 Oesipi humidi unc. s.
 Mucilaginis Tragacanthae, Sem. Citoniorum,
 Sem. Lini, Sem. Althaeae, Mucilaginis Gummi
 arabici ana unc. I.
 Cerae albae unc. V.
 Commixtis omnibus fiat unguentum.

348. Unguentum pro stomacho.

- R. Olei Absinthii, Olei Menthae, Olei nardini,
 Olei Cydoniorum, Olei Rosarum ana lib. s.

Olei Rutae, Olei Masticis ana unc. IV.
 Pulv. Galangae, Pulv. Charyophyllorum, Pulv.
 Ruthae, Pulv. Menthae, Pulv. Absinthii, Pulv.
 Rosarum ana unc. s.
 Pulv. Masticis dr. III.
 Pulv. Corallor. rubeor., Pulv. Spicae, Pulv.
 Ligni aloës, Pulv. Cyperi ana dr. I.

Haec autem sequentia peculiariter ad
 coquendum componantur:

R. Absinthii, Menthae, Ruthae, Rosar. rubear.,
 Folior. Lauri ana M. I.
 Charyophyllorum, Galangae, Zingiberis, Cyperi ana dr. II.
 Vini odoriferi lib. I. s.
 Olei communis lib. III.

Coquantur simul usque ad vini con-
 sumptionem fiatque expressio et colatura, cui
 adde pulveres et olea suprascripta. Misce
 et cum cera q. s. fiat unguentum s. a.

349. Unguentum pro splene.

R. Olei Capparum, Pinguedinis anseris, Unguenti
 Dialtheae, Succı radic. Bryoniae, Succı Cy-
 claminis, Ammoniaci in Aceto dissoluti ana unc. I. s.
 Pulveris Tamarisci, Sem. Agni casti, Cortic.
 radic. Capparum, Ceterach ana dr. II.

Cum modico cerae fiat unguentum
 molle s. a.

350. Unguentum contra Lumbricos.

R. Olei Amygdalar. amar. unc. VI.
 Olei Absinthii unc. III.
 Succı folior. Persici, Succı Matricariae, Succı
 Absinthii, Succı Centaurii minoris, Succı
 Abrotani ana unc. III.
 Fellis tauri, Aceti ana unc. II.

Bulliant simul ad consumptionem aquositatis et colentur. Colaturae huic, cum incepit infrigidari adde:

Pulv. Rosarum, Cornu cervi usti, Farinae
Lupinorum ana dr. VI.
Aloës hepaticae unc. I. s.

Misce et cum cerae unc. I. s. fiat
unguentum s. a.

351. Unguentum Artanitae majus (de succo Cyclamini).

R. Succi Cyclamini lib. III.
Succi Cucumeris sylvest. lib. I.
Olei irini lib. II.
Butyri vaccini lib. I.
Pulpae Colocynthidis unc. III.
Polypodii unc. VI.
Euphorbii unc. s.

Arida haec terantur et macerentur in succis et oleo in vase vitreo angusti oris bene obstructo diebus VIII. Postea IX. die lento igne coquantur et colentur.

Colaturae adde:

Sagapeni aureos V.
Myrrhae aureos II.

Prius autem haec duo in Aceto q. s. dissolvantur. Deinde iterum omnia coquantur, donec succi absumantur. Dein adde:

Cerae unc V.
Fellis taurini aureos V.

Fervescant simul, donec cera liquetur. Deinde inspergatur paulatim pulvis iste:

Scammonii, Aloës, Mezerei, Colocynthidos,
Turbith ana aur. V.
Euphorbii aur. I.

Salis gemae aur. III.
 Piperis longi, Zingiberis, Chamaemeli ana aur. II.

Commixtis omnibus diligenter, fiat un-
 guentum s. a.

352. Unguentum arthriticum Mathioli.

R. Flor. Lavendulae, Flor. Pseudonardi, Flor.
 Hypericonis, Flor. Chamaemeli, Flor. Dictamni
 albi, Flor. Salviae, Flor. Stoechados ana M. I.
 Folior. Ivae M. II. s.
 Folior. Calamenti, Folior. Pulegii, Folior.
 Origani, Folior. Serpilli, Folior. Thymi, Folior.
 Betonicae, Folior. Salviae ana M. I. s.
 Rad. Enulae, Rad. Ebuli, Rad. Angelicae ana unc. I. s.
 Nucis muscatae, Charyophyllorum, Calami
 odorati, Macis ana unc. s.
 Vermium terrestrium lotorum cum vino unc. V.
 Olei de Ruta, Olei de Terebinthina, Olei de
 Castoreo, Olei laurini, Olei philosophorum,
 Olei de Euphorbio ana unc. II.
 Pinguedinis anseris, Pinguedinis gallinae,
 Pinguinis ursi, Medullae crurum bovis, Me-
 dullae crurum cervi, Butyri recentis ana unc. I. s.
 Vini albi q. s.

Bulliant haec omnia usque ad con-
 sumptionem II. partium ex III. vini et postea
 colentur et fortiter exprimantur, cui expres-
 sioni adde:

Mucilaginum rad. Altheae, Mucilaginum rad.
 Squillae, Mucilaginum sem. Lini, Mucilaginum
 Sem. Foenugraeci ana unc. II. s.

Et iterum bulliant usque ad con-
 sumptionem totius fere humiditatis et adde:

Bdellii in Aceto dissoluti unc. I. s.
 Armoniaci, Opopanacis in aceto dissolu-
 torum ana dr. VI.

Cerae novae odoratae q. s. et fiat unguentum in forma linimenti et cum inceperit infrigescere adde:

Castorei subtilissime pulv. unc. I.
Mithridatii optimi dr. XII.

Et ita ducantur diu cum pistillo, addendo guttatim aquae vitae electae unc. II.

Et deinde unguentum hoc recondatur in pyxide.

353. Unguentum martianum parvum.

R. Folior. Lauri lib. III.
Ruthae lib. II. s.
Majoranae lib. II.
Rosmarini lib. I. s.
Fol. Myrthi lib. I.
Esbrii vel loco ejus summitatum Majoranae,
Balsamitae, Ocymi ana unc. VI.
Butyri unc. V.
Styracis, Medullae cervinae, Adipis ursini,
Adipis gallinacei ana unc. IV.
Mastiches unc. III.
Thuris unc. II. s.
Olei nardini unc. I.
Olei Olivae, Cerae munditissimae ana q. s.
Fiat unguentum s. a.

354. Unguentum Arogon.

R. Rosmarini, Majoranae, Iridis, Serpylli, Ruthae,
Rad. Cucum. asinini ana unc. IV. s.
Fol. Lauri, Fol. Salviae, Fol. Sabinae ana unc. III.
Fol. Pulicariae majoris, Fol. Pulicariae minor. ana unc. IV.
Rad. Bryoniae unc. III.
Laureolae unc. IX.

Folior. Cucum. asinini, Nepetae	ana unc. VI.
Mastiches, Olibani	ana dr. VII.
Pyrethri, Euphorbii, Zingiberis, Piperis	ana unc. I.
Adipis ursini, Olei laurini	ana unc. III.
Olei moschelini	unc. s.
Petrolei clari	unc. I.
Butyri	unc IV. aut. q. s.

Herbae et radices Majo mense collectae in oleo macerentur diebus VII., deinde coquantur et colentur. Colato oleo adjice reliqua et adde cerae lib. I. unc. III.

355. Unguentum Agrippae regis.

R. Radic. Bryoniae	lib. II.
Radic. Cucum. asinini	lib. I.
Scyllae	unc VI.
Ireos	unc. III.
Radic. Filicis, Radic. Ebuli, Tribulorum aquaticorum	ana unc. II.
Cerae albissim.	unc. XV.
Olei albissim.	lib. IV.

Radices omnes istae recentes incisae et contusae macerentur in oleo per dies VIII., deinde coquantur, postea exprimantur et in colato oleo et in expresso resolvatur cera. Fiat unguentum s. a.

356. Unguentum potabile.

R. Butyr. recentis sine sale	lib. III.
Rubeae tinctorum, Castorei, Sperma ceti, Radic. Tormetillae	ana unc. I.

Bulliant simul in vino odoro ad ejus consumptionem ac formetur unguentum.

357. Unguentum contra casum.

R. Folior. Lauri, Folior. Rosmarini, Folior. Majoranae, Folior. Scariolae, Folior. Salviae, Folior. Nepetae, Folior. Consolidae maj., Folior. Consolidae Sarracenicae, Folior. Consolidae aureae	ana M. II.
Folior. Lavendulae, Apii, Absinthii, Hyperici Plantaginis majoris, Plantaginis minoris, Buglossae, Rutae, Agrimoniae	ana M. IV.
Hyssopi, Urticae pinguis, Millifolii, Athanasiae Flor. et herb. Chamaemeli, Flor. et herb. Rosarum rubear., Flor. et herb. Rosarum albarum	ana M. III.

Herbae istae omnes colligantur sub ortum solis recentes et virides. Postea inciduntur, contundantur et infundantur vino bono sufficienti et:

Butyri recentis	lib. VIII.
Ol. communis	lib. I.

Stent ita per VII. dies, postea coquantur lento igne ad consumptionem suorum et vini, deinde exprimantur fortiter et colentur. Colaturae adde:

Cerae albae	lib. s. vel q. s.
Pulveris Masticis	unc. IV.

Fiat unguentum s. a.

358. Unguentum album.

R. Cerusae in aqua Rosar. lotae	unc. III.
Olei rosac.	lib. s.
Cerae alb.	unc. II.
Alba ovorum	nō II.
Aquae Rosarum	unc. VI.

Bene subactis omnibus fiat unguentum.

359. Unguentum e Pompholyge.

R. Spumae Argenti, Cerussae	ana unc. III.
Pompholygis	unc. I. s.
Plumbi usti	unc. I.
Antimonii praep.	dr. III.
Thuris	dr. II.
Olei rosati completi	lib. II.
Cerae albae	unc. VIII.
Succi Solani	lib. I.

Bulliant ad consumptionem succi et
fiat unguentum s. a. in mortario plumbeo.

360. Unguentum de Tutia pro oculis.

R. Tutiae praep.	unc. I.
Cerussae in aqua Foeniculi et Rosar. saepius ablutae	dr. III.
Lapidis calamin. subtiliss. pulveris	unc. s.
Margarit. praeparat., Corallor. rubeor. prae- parat.	ana dr. I.
Camphorae	scr. II.

Axungiae porcinae in aqua Rosarum,
Foeniculi et Chelidoniae bene lotae lib. I.
Misce omnia simul et fiat unguentum s. a.

361. Unguentum defensivum.

R. Boli Armeni, Sanguinis draconis, Terrae sigil- latae	ana unc. s.
Olei rosati	unc. VI.
Cerae	unc. I. s.
Aceti	unc. IV.

Coquantur simul Oleum, Cera et Acetum,
donec Acetum consumptum fuerit. Deinde
sublatum ab igne, ubi refrigerari coeperit,
adde reliqua tenuissime pulverisata.

362. Unguentum exiccativum.

- R. Lapidis calaminaris, Terrae Lemniae . . . ana unc. IV.
 Lithargyri auri, Cerussae . . . ana unc. III.
 Succī Sempervivi . . . dr. II.
 Cerae . . . unc. V.
 Olei rosati omphacini . . . unc. XII.
 Formetur unguentum.

363. Unguentum Comitissae.

- R. Membranae Castanearum inter carnem et
 corticem mediae, Membranae glandium inter
 carnem et corticem mediae, Membranae
 Quercus inter lignum et corticem mediae,
 Baccarum Myrti, Caudae equinae, Gallarum,
 Corticum Fabarum, Acinorum uvarum, Sor-
 borum immaturor. siccor., Mespilorum imma-
 turor. et exiccator., Folior. Pruni silvestris,
 Radic. Bistortae . . . ana unc. I. s.

Contusa leviter coquantur in aquae
 Plantaginis lib. VIII., quoad dimidia pars
 consumpta fuerit. Deinde in colatura la-
 ventur sequentia novem vicibus semper re-
 centem aquam hujus colaturae affundendo,
 quotiescunque laveris:

- R. Cerae novae . . . unc. VIII.
 Olei myrtini, Olei mastichini . . . ana lib. I. s.

Postea inspergatur sequentium specie-
 rum tenuissimus pulvis:

- R. Membranae Castanearum inter carnem et
 corticem mediae, Membranae glandium ejus-
 dem, Membranae Quercus inter lignum et
 corticem mediae, Gallarum . . . ana unc. I.
 Cineris ossium cruris bubuli, Baccarum Myrti,
 Acinorum uvarum, Sorborum siccorum . . . ana unc. s.
 Trochiscorum de Carabe . . . unc. II.

Fingatur unguentum s. a.

364. Unguentum contra scabiem.

- R. Terebinthinae in aqua Rosarum lotae . . . unc. III. s.
 Axungiae porcinae unc. I. s.
 Salis gemmae dr. II.
 Sulphuris vivi dr. III.
 Aluminis usti, Plumbi usti ana dr. II.
 Cerussae, Thuris ana dr. I. s.
 Litargyri dr. III.
 Cerae albae q. s. Fiat unguentum.

365. Unguentum Pomada.

- R. Cinnamomi, Charyophyllorum, Styracis Calamitae, Benzuin, Nucis muscatae, Galliae moschatae, Aliptae moschatae, Macis, Ireos ana dr. II.
 Pomorum odoriferorum nō X.
 Axungiae porcinae in aqua Rosarum lotae . lib. I.
 Fiat unguentum s. a. et aromatisetur cum Moschi scr. s. vel q. s.

366. Unguentum benedictum Nicolai Massae.

- R. Axungiae porcinae mundatae a suis pelliculis et per setonem colatae sine igne . . . lib. II.
 Argenti vivi lib. I.
 Lithargyrii unc. III.
 Cerussae unc. II.
 Olibani unc. I.

Misce et fiat unguentum in mortario lapideo, extinguendo inprimis Argentum vivum cum axungia. Postea adde caetera semper bene agitando pistillo.

367. Unguentum de Litargyrio.

- R. Litargyrii aurei subtilissime pulverisati, Aceti
 fortis ana lib. I.
 Olei rosati lib. II.
 Coquantur simul ad formam unguenti.

368. Unguentum de Calce lota.

Calcem singulis diebus semel aqua com-
 muni pura lavabis et in fundo considerare per-
 mitted et aquam spongia exprimes X. diebus
 continuis, deinde aqua Rosarum lavabis et
 siccari sines.

- R. Hujus Calcis ita extinctae unc. III.
 Olei rosati lib. I.
 Cerae albae unc. III.

Ceram in oleo liquato. Huic ab igne
 exemptae et jam concrecere incipienti Calcem
 laevissime tritam admisceto et reponito.

369. Unguentum Basilicon magnum.

- R. Cerae, Resinae pini, Sevi vaccini, Picis na-
 valis, Terebinthinae, Thuris, Myrrhae . . . ana p. aequ.
 Olei q. s. fiat unguentum.

370. Unguentum nigrum alias fuscum.

- R. Olei communis unc. IX:
 Cerae purae unc. II.
 Colophoniae, Picis navalis, Sagapeni . . . ana unc. I.
 Mastiches, Thuris, Galbani, Resinae Terebin-
 thinae ana unc. s.

Olei (!) cum cera ubi ad ignem liquata
 fuerint injiciatur Colophonia primum, deinde
 caetera, unguentumque refrigeratum re-
 condatur.

371. Unguentum aureum.

R. Cerae flavae	unc. VI.
Olei boni	lib. II. s.
Terebinthinae	unc. II.
Resinae pineae, Colophoniae	ana unc. I. s.
Thuris, Mastiches	ana unc. I.
Croci	dr. I.

Cerae in oleo liquatae resina affundatur,
tandem reliquorum pulvis adjiciatur et
formetur unguentum.

372. Unguentum triapharmacon.

R. Litargyrii tenuissime triti	unc. III.
Aceti	unc. I. s.

Olei rosacei q. s. Terantur in mortario
plumbeo sine cera, fiat unguentum.

373. Unguentum tetrapharmacon.

R. Cerae, Resinae, Picis navalis, Adipis vaccinae ana q. v., fiat unguentum.

374. Unguentum apostolicum.

R. Terebinthinae, Cerae albae, Resinae, Ham- moniaci	ana dr. XIV.
Aristolochiae longae, Thuris masculi, Bdellii	ana dr. VI.
Myrrhae, Galbani	ana dr. IV.
Opopanax, Floris aeris vel ejus loco viridis aeris	ana dr. II.
Lithargyrii	dr. IX.

Olei lib. II. si fuerit aestas, in hyeme
vero lib. III.

Bdellium, Galbanum, Ammoniacum et
Opopanax in Aceto q. s. nocte una macerentur.

Deinde calefactis Terebinthina permisceatur, postea in oleo adjecta cera et omnibus reliquis in pulverem tritis coquantur et in unguenti formam redacta reponantur.

375. Unguentum Aegyptiacum.

R. Aeruginis seu viridis aeris	unc. V.
Mellis optimi	unc. XIV.
Aceti fortis	unc. VII.

Coquantur omnia simul, donec fiat unguentum spissum colore purpureum.

376. Unguentum contra pediculos.

R. Staphysagriae	unc. IV.
Aloës, Lupinorum, Myrrhae	ana unc. s.
Sulphuris vivi	unc. I.
Axungiae	unc. VI.
Saponis liquidi, Butyri recentis	ana unc. III.

Liquabilia liquefiant, arida seorsim trita refrigeratis commisceantur, simul moveantur et in usus recondantur.

XVII. De Emplastris.

377. Emplastrum Diachylon simplex.

R. Mucilaginis Foenugraeci, Mucilaginis Sem.	
Lini, Mucilaginis Rad. Altheae	ana lib. I.
Olei veteris clari	lib. III.
Lithargyri	lib. I. s.

Coquantur s. a. et fiat emplastrum.

378. Emplastrum Diachylon compositum
cum gummis.

- R. Mucilaginis Rad. Altheae, Mucilaginis Sem.
Lini, Mucilaginis mediani corticis Ulmi,
Mucilaginis Foenugraeci ana unc. IV.
Olei chamaemelini, Olei Liliorum alborum,
Olei anethini ana unc. I.
Hammoniacy, Galbani, Opopanacis, Sagapeni ana unc. s.
Crocī dr. II.
Cerae novae unc. XX.
Terebinthinae unc. II.

Gummi sive lacrymae resolvantur in
vino optimo et conficiatur s. a. emplastrum.

379. Emplastrum Dialtheae.

Fit ex iisdem, ex quibus unguentum
Dialtheae s. a.

380. Emplastrum de Melitoto.

- R. Melilotti lib. s.
Flor. Chamaemeli, Foenugraeci, Baccarum
Lauri, Radicum Altheae, Absinthii, Majoranae, ana dr. III.
Sem. Apii, Cardamomi, Ireos, Cyperi, Spicae
Nardi Indicae, Anisi, Cassiae lignae, Am-
mios ana dr. I. s.
Armeniacy dr. X.
Styracis Calamitae, Bdellii ana dr. V.
Terebinthinae unc. I. s.
Ficuum pinguium nō XII.
Sevi hircini, Resinae ana unc. II. s.
Cerae unc. VI.
Olei sampsuchini, Olei Spicae ana q. s., fiat
emplastrum.

381. Emplastrum de Violis ex Montagnana.

R. Violarum siccarum	dr. VI.
Rosarum	dr. II. s.
Spicae, Masticis	ana dr. I. s.
Flor. Chamaemeli, Flor. Meliloti, Farinae	
Hordei, Sem. Altheae	ana unc. X.
Farinae sem. Lini	unc. I.
Schoenanthi, Cyperi, Calami aromatici . . .	ana dr. I.
Fiat emplastrum cum aqua communi.	

382. Emplastrum de crusta panis ex eodem.

R. Masticis, Menthae, Spodii, Corallor. rubeor.,	
Sandalor. ambor.	ana dr. I.
Crustae panis assatae infusae in Aceto per	
mediam horam	unc. II.
Olei mastichini, Olei Citoniorum	ana unc. I.
Farinae Hordei q. s., fiat emplastrum s. a.	

383. Emplastrum Diaphoeniconis.

R. Dactylorum maturitati propinquorum . . .	unc. V.
Panis biscocci	unc. I.
Carnis Citoniorum in vino austero coctorum	unc. I. s.
Styracis, Mastiches, Ladani, Acaciae, Succu	
ivae immaturae, Flor. Labruscae, Rosarum,	
Sandalorum citrinor., Myrrhae, Ligni Aloës,	
Ramich	ana unc. s.
Cerae	unc. IV.
Olei rosati	unc. XV.

Vini austeri q. s. ad infundendum infundenda. Fiat emplastrum.

384. Emplastrum de baccis Lauri.

- R. Thuris, Mastiches, Myrrhae ana unc. I.
 Baccar. Lauri unc. II.
 Cyperi, Costi ana unc. s.

Mellis colati q. s. ad cogendum em-
 plastrum.

385. Emplastrum oxycroceum.

- R. Picis navalis, Croci, Colophoniae ana unc. IV.
 Terebinthinae, Galbani, Ammoniacy, Myrrhae,
 Mastiches Thuris ana unc. I. dr. III.

Galbanum et Ammoniacum in Aceto
 nocte una macerentur, postridie liquentur
 igni et colentur. Iterum coquantur ad partis
 Aceti consumptionem. Tunc adde Picem
 navalem colatam, hac liquata Ceram, qua
 etiam liquata Colophonium, deinde Terebin-
 thinam. Aliquamdiu post Mastichen, Thus,
 Myrrham, subtilissime pulverisata, semper
 spatula movendo. Cocta in aquam frigidam
 infunde. Manibus hanc totam massam exime
 et exprime ac super tabulam marmoream
 oleo laurino inunctam subigendo pulverem
 Croci tabulae inspersum commisce et ob-
 longos orbiculos effinge.

386. Emplastrum album coctum.

- R. Cerussae lib. I. s.
 Olei rosati lib. II.
 Cerae albae unc. IV.

Coquantur s. a. et fiat emplastrum.

387. Emplastrum griseum.

R. Lapidis calaminaris praep.	unc. I.
Lithargirii	unc. II.
Cerussae	unc. s.
Tutiae	dr. I.
Terebinthinae	dr. VI.
Cerae albae	unc. I. s.
Sevi cervini	unc. II.
Thuris electi	dr. V.
Mastiches	dr. III.
Myrrhae	dr. II.
Camphorae	dr. I. s.
Confice s. a.	

388. Emplastrum viride.

R. Cerae novae, Resinae, Terebinthinae . . .	ana unc. IV.
Olibani, Mastiches, Viridis aeris . . .	ana dr. III.
Confice s. a.	

389. Emplastrum ad bubones pesti-
lenciales.

R. Radic. Liliorum alborum, Radic. Altheae, Radic. Valerianae, Radic. Raphani, Radic. Pirethri, Seminis Sinapis	ana unc. I. s.
Gummi armeniaci, Gummi Sagapeni, Gummi Galbani, Gummi Opopanacis	ana unc. I.
Pulveris Scabiosae, Pulveris Scordii, Pulveris Chamaemeli	ana dr. II.
Caricarum pinguium	nō XII.
Theriaca communis, Laminarum Scyllae in melle coctarum, Coeparum assatarum, Fer- menti acris	ana unc. II.
Gummi in vino dissolvantur et colentur cum oleo Scorpionum et Liliorum alborum et Visco	

quercino recenti ana q. s. Fiat emplastrum tractabile. Adde etiam Ceram, si opus est.

390. Emplastrum Graecum.

R. Olei communis	lib. II.
Lithargyrii aurei	lib. I.
Aeris usti	unc. I. s.
Aceti, Cerae	ana unc. IV.
Terebinthinae	unc. I.

Fiat emplastrum s. a.

391. Emplastrum citrinum.

R. Cerae citrinae	lib. II.
Resinae	lib. I.
Terebinthinae, Sevi hircini	ana lib. s.
Olei communis	unc. III.

Misce fiat emplastrum.

XVIII. De Ceratis.

392. Ceratum stomachale.

R. Rosarum rubearum, Mastiches	ana dr. XX.
Foliorum Absinthii aridor.	dr. XV.
Spicae Nardi Indicae	dr. X.
Cerae purae	unc. IV.
Olei rosati	lib. I. s.

Cera et oleum igne liquentur et ex aqua Rosarum aliquoties laventur. Dein iterum liquentur et vino austero, succo Cydoniorum et paucis Aceto laventur. Postea alia omnia in tenuissimum pulverem redacta inspergantur et fiat ceratum.

393. Ceratum sandalinum.

R. Rosarum rubear.	dr. XII.
Sandali rubei	dr. X.
Sandali albi, Sandali citrini	ana dr. VI.
Boli Armeniaci	dr. VII.
Spodii	unc. s.
Camphorae	dr. II.
Cerae albae	dr. XXX.
Olei rosati	lib. I.

Confice s. a.

394. Ceratum e pelle arietina Arnoldi
de Villa nova.

R. Lithargyrii, Lapidis haematitis, Sanguinis draconis, Boli Armeni, Mastiches, Ammoniaci, Mumiae, Galbani, Thuris, Costi, Lumbricor. terrestrium	ana dr. s.
Picis navalis, Picis Graecae, Cerae albae, Cerae rubeae	ana dr. I.
Radic. Consolidae majoris, Radic. Consolidae minoris, Radic. Consolidae mediae	ana dr. III.
Rosarum, Myrrhae, Aloës	ana IV. partem dr.
Paleae marinae combustae, Gallae, Balaustio- rum, Aristolochiae rotundae	ana dr. VI.
Terebinthinae, Visci quercini	ana dr. II.
Sanguinis hominis ruffi	unc. IX.

Pellem arietinam sive hoedinam pilis
onustam sume, quae decoquatur quasi ad
aquae consumptionem. Cujus recipias lib. I.
optime per pannum colatam. Bulliant cum
Visco in olla nova lento igne movendo.
Deinde adde lumbricos, postea Ceram et
Picem, praeterea Terebinthinam, ultimo Colo-
phoniam, Mastichen, Myrrham, Ammoniacum
et Galbanum, quod moveas, donec gutta
marmoris inspersa coaguletur.

Catalogus simplicium, quorum praecipuus usus in nostris pharmacopoliis.

I. Herbae et folia.

Abrotanum.	Bismalva.
Absinthium.	Borrago.
Absinthium ponticum.	Branca ursina.
Acetosa.	Brassica.
Acorus vel Calamus aromaticus.	Buglossa.
Adiantum.	Calamus aromaticus vide
Ageratum.	Acorus.
Agrimonia seu Eupatorium	Calamintha montana.
Graecorum.	Calamintha domestica.
Alchimilla. ¹⁾	Calamintha sylvestris.
Amaracus.	Calendula.
Anagallis.	Capillus Veneris alias Adi-
Anethum.	antum.
Apium.	Carduus benedictus.
Aristolochia longa.	Cassuta vel Cuscutha.
Aristolochia rotunda vera.	Cauda equina.
Artemisia.	Centaurium minus.
Asarum.	Ceterach.
Asplenium.	Chamaedrys.
Athanasia.	Chamaeipytis.
Balsamina seu Momordica.	Chamomilla.
Basylicon.	Chelidonia.
Been album et rubeum.	Cherefolium. ²⁾
Bechium vel Ungula caballina	Cicerbita vel Sonchus levis.
vulgo Farfara.	Cichorium.
Betonica.	Cimae Rubi.
	Consolida major.
	Consolida Sarracenic.

- Consolida aurea.
 Corallina.
 Cucumer asininus.
 Cyclamen.
 Cynoglossa.
 Cyperus.
 Dens leonis vel Taraxicon.
 Ebulus.
 Endivia vera sativa h. e. Intybus hortensis non lactuca sylvestris.
 Epatica.
 Epithymus.
 Erigeron.³⁾
 Eupatorium Mesue vel Ageratum.
 Euphrasia.
 Farfara vide Bechium.
 Foeniculum.
 Foenugraecum.
 Filix.
 Fragaria.⁴⁾
 Fumaria vel Fumus terrae
 Gallitrichum.
 Gattaria.
 Gentiana.
 Geranium.⁵⁾
 Gratia Dei, species Geranii.
 Gratiola.
 Halicacabus.
 Hedera arborea.
 Hedera terrestris.
 Herba paralysis.
 Herba tunicae.⁶⁾
 Helxyne, Cissampelos, Convolvulus.
 Hyoscyamus.
 Hypericon.
 Hyssopus.
 Intybum sativum utrunque.
 Iva arthetica, Chamaeipyttis.
 Iva Muscata Species Geranii.
 Juncus odoratus vel Schoenanthos.
 Lactuca sativa et sylvestris.
 Lappa / Personata.
 Lappation, Rumex.
 Lavendula.
 Laureola.
 Lauri folia.
 Laurus Alexandrina.
 Lepidium.⁷⁾
 Lichen.
 Ligusticum vel Levisticum.
 Lupinorum folia.
 Lupulus.
 Majorana.
 Malva.
 Marrubium.
 Marum.
 Matricaria, Parthenium.
 Matrisylva.⁸⁾
 Melilothus.
 Melissa.
 Mentha crispa.
 Mentha Sarracenicæ.
 Menthastrum.
 Mercurialis.
 Meu.
 Mezereon.
 Miliun solis.
 Millefolium.
 Morsus diaboli, Succisa species Scabiosae.
 Myrica.⁹⁾
 Myrti folia.

Nardus Celtica.	Ruta.
Nardus Indica.	Sabina.
Nasturtium.	Salvia.
Nepeta / Gattaria.	Salvia sylvestris / Orminum.
Nymphaea vulgo Nenuphar.	Sanicula alba, rubea.
Oculi vel gemmae populi arboris.	Saponaria.
Origanum.	Satyrion.
Parietaria.	Satureja vel Thymbra.
Penthaphyllon.	Saxifragia.
Perfoliata. ¹⁰⁾	Scabiosa.
Persicaria.	Scariola.
Persicorum folia.	Sclarea.
Petroselinum.	Scolopendria.
Phu.	Scordium verum.
Pimpinella Germanica.	Scrophularia. ¹³⁾
Pimpinella Italica, Sanguisorba.	Sempervivum majus.
Pirethrum.	Sempervivum minus alias Vermicularis.
Pirola. ¹¹⁾	Senae folia.
Plantago major.	Serpentaria.
Plantago minor.	Serpillum.
Paeonia.	Seseli vel Siler montanum.
Polium Creticum vel montanum.	Sideritis. ¹⁴⁾
Polypodium.	Sigillum Salomonis. ¹⁵⁾
Polytrichon.	Solatrum.
Potentilla.	Soldanella.
Portulaca.	Sonchus levis vel Cicerbita.
Prassium.	Staphisagria.
Primula veris.	Stoechas Arabica.
Prunella, species Consolidae.	Stoechas citrina.
Pruni sylvestris folia.	Spica Celtica vide Nardus.
Psyllium.	Spica lavendulata.
Pulegium.	Tamarindi folia.
Pulicaria major, minor.	Tamariscus.
Pulmonaria. ¹²⁾	Tanacetum.
Rosae albae, rubeae.	Tapsus barbatus, Verbascum proprie.
Rosmarinum.	Taraxicon.
Rubea tinctorum.	

Thlaspi.
 Thymus.
 Trichomanes.
 Tussilago vel Ungula caballina.
 Vermicularis vide Sempervivum minus.
 Violaria.
 Verbascum.
 Verbena.
 Veronica.
 Vinca pervinca.¹⁶⁾
 Vincetoxicon.¹⁷⁾
 Umbilicus Veneris.
 Viscum quercinum.
 Ungula caballina vide Bechium.
 Urtica.
 Urtica Romana.

II. Flores.

Acatiae.
 Anthos.
 Arantiorum.
 Balaustiorum.
 Betonicae.
 Borraginis.
 Buglossae.
 Buphthalmi.
 Calendulae.
 Chamadryos.
 Chamaemeli vel Chamomillae.
 Carthami.
 Cichorii.
 Cidoniorum.
 Citri.
 Cheiri seu Leucoii.
 Centaurei minoris.
 Consolidae regalis.
 Croci Orientalis, Austriaci.

Cyani.¹⁸⁾
 Dictamni albi.
 Fabarum.
 Fumi terrae.
 Hypericonis.
 Summitates Hyssopi.
 Iridis.
 Labruscae.
 Lavendulae.
 Leucoii lutei.
 Lilli convallium.¹⁹⁾
 Liliorum alborum.
 Malvarum.
 Macis.
 Melilothi.
 Nardi Celtici.
 Nardi Indici.
 Nenupharis seu Nymphaeae albae.
 Nucum.
 Papaveris.
 Persicorum.
 Paeoniae.
 Primulae veris.
 Pseudonardi.
 Roris marini.
 Rosarum albarum.
 Rosarum rubearum.
 Salviae.
 Sambuci.
 Schoenanthos.
 Siliginis.²⁰⁾
 Spicae.
 Stoechados Arabicae.
 Tiliae.
 Verbasci.
 Violarum purpurearum.
 Ungulae caballinae.

III. Semina.

- Acetosae.
 Acini Berberorum.
 Acini uvarum.
 Agni casti.
 Altheae.
 Alkakengi.
 Amaranthi purpurei.²¹⁾
 Ammios.
 Anethi.
 Anisi.
 Antherae.
 Apii.
 Aquilegiae.²²⁾
 Arantiorum.
 Asparagi.
 Basiliconis.
 Been.
 Berberorum acini.
 Bombacis seu Xyli.
 Brusci.
 Cardamomi majoris vel Granorum paradisi.
 Cardamomi minoris.
 Cardui benedicti.
 Canabis.²³⁾
 Carthami.
 Carvi.
 Caulium.
 Ceparum.²⁴⁾
 Cicerum alb. et rub.²⁵⁾
 Cicutae.²⁶⁾
 Citoniorum.
 Citrei mali vel Citri.
 Citrulli.
 Cocognidii.
 Coriandri.
 Cucumeris.
 Cucurbitae.
 Cumini vel Cymini.
 Dauci Cretici.
 Dictamni.
 Endiviae verae.
 Erucae.
 Euphrasiae.
 Fabarum.
 Foeniculi.
 Foenugraeci.
 Fraxini vel Linguae avis.
 Fumi terrae.
 Genistae.²⁷⁾
 Geranii.
 Grana Alkakengi.
 Grana Mespilorum.
 Grana Paradysi vide Cardamom. majus.
 Grana tinctorum.²⁸⁾
 Grana Pini majoris.
 Hordei.
 Hyoseyami.
 Hypericonis.
 Hyssopi.
 Intybi.
 Juniperorum.
 Lactueae sativae.
 Lapatii acuti.
 Lentium.
 Levistici.
 Liliorum alborum.
 Limonum vel Aranciorum.
 Linguae avis vel Fraxini.
 Lini.
 Lupinorum.
 Majoranae.
 Malabathri.

Malvae.
 Melanthii vel Nigellae utriusque.
 Melissae.
 Melonum.
 Menthastrum.
 Mespilorum.
 Milii.
 Milii solis.
 Myrtillorum.
 Myrtorum.
 Napi.
 Nasturtii.
 Nigellae vel Melanthii utriusque.
 Ocymi vel Basiliconis.
 Ocymi citrati.
 Ocymi charyophyllati.
 Origani.
 Ormini.
 Orobi.
 Papaveris albi.
 Papaveris nigri.
 Pastinacae sylvestris.
 Petroselini.
 Pini majoris grana.
 Pirethri.
 Plantaginis.
 Paeoniae.
 Porri.
 Portulacae.
 Psyllii.
 Raparum.²⁹⁾
 Raphani.
 Ricini.
 Rosarum.
 Rubi canini.³⁰⁾
 Ruthae.
 Santonici.
 Saxifragiae.

Sesami.³¹⁾
 Seseleos.
 Scariolae.
 Sileris montani.
 Sinapis.
 Staphisagriae.
 Sumach.
 Thapsiae.
 Urticae.
 Xyli seu Bombacis.

IV. Fructus.

Acatia.
 Alkagengi.
 Amygdalae amarae.
 Amygdalae dulces.
 Anacardium.³²⁾
 Anguria.
 Arantia.
 Avellanae nuces.
 Baccae Juniperi.
 Baccae Lauri.
 Baccae Myrti, Myrtilli.
 Berberes.
 Cappares.
 Caricae.
 Carpobalsamum.
 Cassia fistula.
 Cerasa.
 Charyophyllorum.
 Citria mala.
 Citonia mala.
 Colocynthis.
 Cubebae.
 Cucurbitae.
 Dactyli.

Ficus.
 Gallae Cupressi.
 Gallae Quercus.
 Glandes.
 Juglandes.
 Juniperi.
 Jujubae.
 Limones.
 Lupini.
 Mespili.
 Mirobalani bellirici.
 Mirobalani citrini.
 Mirobalani chebuli.
 Mirobalani emblici.
 Mirobalani Indi.
 Mora.
 Myrtilli.
 Nuclei Pini.
 Nux Cypressi.
 Nux Indica.
 Nux muscata vel Myristica.
 Nux vomica.³³⁾
 Passulae majores.
 Passulae minores.
 Pineae.
 Piper album.
 Piper longum.
 Piper nigrum.
 Pistacia vel Pistachia.
 Pruna Damascena.
 Pruna domestica.
 Pruna sylvestria.
 Pyra muscatellina.
 Ribes.
 Sebesten.
 Sorbi.
 Tamarindi.
 Tribuli aquatici.

Uvae.
 Uvae passae.

V. Radices.

Acori vel Calami aromatici.
 Agrimonii.
 Allii.
 Altheae.
 Angelicae.
 Apii.
 Ari.
 Aristolochiae longae.
 Aristolochiae rotundae verae.
 Asari.
 Asparagi.
 Asphodeli.³⁴⁾
 Been utriusque.
 Benedictae charyophyllatae.
 Bistortae.
 Borriginis.
 Brusci.
 Bryoniae.
 Buglossae.
 Chardopatii vel Chamaeleonis.³⁵⁾
 Calami aromatici vel Acori.
 Centaurei minoris.
 Chelidoniae.
 Cichorii.
 Consolidae majoris.
 Consolidae mediae.
 Consolidae minoris.
 Corallinae.
 Crassulae.
 Cucumeris asinini.
 Cyclamini.
 Cyperi.
 Dauci.

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| Dictamni Cretici. | Peucedani. |
| Dictamni vulgaris vel Fraxinellae. | Phu pontici. |
| Dracunculi. | Pimpinellae Germanicae. |
| Ebuli. | Pimpinellae Italicae sive San- |
| Ellebori albi. | guisorbae. |
| Ellebori nigri. | Poeoniae maris. |
| Endiviae. | Poeoniae foeminae. |
| Enulae seu Elenii. | Polypodii. |
| Eringii. ³⁶⁾ | Pyrethri. |
| Esulae. | Quinquefolii vel Pentaphylli. |
| Farfarae vel Tussilaginis. | Raphani. |
| Ferulae. | Rhabbarbari. |
| Filicis. | Rheupontici. |
| Filipendulae. ³⁷⁾ | Rhodiae rad. ³⁹⁾ |
| Foeniculi. | Rubeae tinctorum. |
| Galangae. | Rumicis. |
| Genistae. | Rusci. |
| Gentianae. | Saniculi albi. |
| Glycyrrhicae. | Saniculi rubei. |
| Graminis. | Satyrii. |
| Hermodactyli. | Scabiosae. |
| Ireos utriusque. | Secacul vel Pastinacae albae et |
| Lappatii acuti. | sylvestris. |
| Levistici. | Serpentariae. |
| Liliorum alborum. | Scrophulariae. |
| Malvae. | Scyllae. |
| Meu. | Sigilli Salomonis. |
| Mezerei. | Siseris. |
| Morsus Diaboli. | Saxifragiae. |
| Nymphaeae. | Tapsi barbati. |
| Orobi veri. | Thapsiae. |
| Ostrutii. | Tormentillae. |
| Palmae Christi. | Turbith. |
| Pastinacae sativae. | Tussilaginis. |
| Pastinacae sylvestris vel Siseris. | Valerianae. |
| Pentaphylli. | Vincetoxicon. |
| Petasitis. ³⁸⁾ | Violariae. |
| Petroselini Macedonici. | Urticae. |

Zedoariae.
 Zingiberis.
 Zurumbeth vel Zedoaria ro-
 tunda.

VI. Succi et liquores.

Absinthii.
 Acetosae.
 Acetositatis Citri.
 Acetositatis Limonum.
 Acatiae.
 Agrestae.
 Aloë.
 Apii.
 Baccarum Myrti.
 Balsami.
 Berberum.
 Betonicae.
 Borriginis.
 Buglossae.
 Cardui benedicti.
 Caulium.
 Chelidoniae.
 Cichorii.
 Citri.
 Cyclamini.
 Cucumeris sylvestris.
 Cydoniorum acidorum.
 Endiviae sativae.
 Eupatorii Mesuae.
 Euphrasiae.
 Euphorbium.
 Foeniculi.
 Fumi terrae.
 Granatorum acidorum.
 Granatorum dulcium.

Glycyrrhiza.
 Hyoscyami.
 Hypocistis.
 Intybi.
 Juglandium vel cortic. virid.
 juglandium.
 Levistici.
 Limonum.
 Lupulorum.
 Manna.
 Menthae.
 Mercurialis.
 Mororum.
 Myrti vel baccarum Myrti.
 Nymphaeae.
 Opium.
 Pomorum dulcium.
 Portulacae.
 Prunorum sylvestrium.
 Punici mali.
 Ribes.
 Rosarum.
 Ruthae.
 Saccharum album.
 Saccharum rubeum.
 Scammonea Antiochiana.
 Sempervivae.
 Scyllae.
 Solani.
 Verbenae.
 Vinum Citoniorum.
 Vinum Granatorum.
 Vinum sublimatum.
 Violarum.
 Uvae immaturae vel Agrestae.

VII. Olea.

De Abrotano.
 Absinthii.
 Amygdalarum amararum.
 Amygdalarum dulcium.
 Anethinum.
 E Baccis Juniperi.
 Balsami.
 Chamaemelinum.
 E Capparibus.
 Charyophyllorum.
 E Castoreo simplex.
 E Castoreo compositum.
 Cheirinum vel Leucoinum.
 Costinum.
 De Euphorbio.
 Florum Verbasci.
 Hyoseyami.
 Hyperici.
 Irinum.
 E lateribus seu philosophorum.
 Laurinum.
 Liliorum alborum.
 E Lumbricis.
 Mandragorae.
 Mastichinum.
 Melinum vel Citoniorum.
 De Mentha.
 Momordicae.
 Moschelinum.
 Myrtinum.
 E Myrti baccis vel Myrtillorum.
 Nardinum.
 Nymphaeatum.
 Olivarum.
 Opobalsamum.
 Papaverinum.

Petroleum.
 Philosophorum seu de lateribus.
 De Piperibus.
 E Ricini seminibus.
 Rosaceum.
 E Rutha.
 E Sarmentis Juniperi.
 Scorpionum.
 E Semine Lini.
 Sesaminum.
 E Spica seu Lavendula.
 De Tartaro.
 De Terebinthina.
 Violatum.
 De Vitellis ovorum.
 Vulpinum.

VIII. Gummata.

Ammoniacum.
 Arabicum.
 Asa dulcis vel Benzoin.
 Asa foetida.⁴⁰⁾
 Bdellium.
 Camphora.
 Colophonia.
 Galbanum.
 Hederae.
 Laccae.
 Ladanum.
 Mastix Chia.
 Mastix Troglodyta.
 Myrrha.
 Opopanax.
 Pix navalis.
 Pix nigra.
 Resina Laricina.
 Resina Terebinthina.

Sanguis Draconis.
 Sagapenum vel Serapinum.
 Sarcocolla.
 Styra calamita.
 Styra liquida.
 Styra rubea vel Thymiana.

IX. Cortices et iis adnascencia.

Agaricus.
 Arantiorum cort.
 Capparum.
 Caput papaveris putamina.
 Capularum glandium put.
 Castanearum membranae inter carnem et corticem mediae.
 Citrei mali cort.
 Fabarum.
 Glandium membranae inter carnem et corticem mediae.
 Granatorum cort.
 Mandragorae.
 Quercus inter lignum et corticem membranae mediae.
 Tamarisci cort.
 Ulmi cort. medianus.

X. Ligna.

Cupressi.
 Guajacum.⁴¹⁾
 Juniperi.
 Sandali albi.
 Sandali citrini.
 Sandali rubei.
 Tamarisci.
 Visci quercini.

Xyloaloës vel Ligni aloës.
 Xylobalsamum.

XI. Ex animantibus integra.

Canci fluviatiles justo tempore in pulverem redacti.
 Cantharides.⁴²⁾
 Lumbrici terrestres.
 Vulpes integrae detractis tantum pellibus et intestinis extractis.

XII. Partes.

Castoreum.
 Caudae Scincorum.
 Epar Lupi.
 Fel taurinum.
 Oculi Tauri.
 Pulmo Vulpis sicca.
 Tunica interior ventriculi Gallinae.

XIII. Pinguedines.

Adeps Anseris.
 Adeps Anatis.
 Adeps Canis.
 Adeps Gallinae.
 Adeps Hominis.
 Adeps Lucii.
 Adeps Taxi.
 Adeps Vaccae.
 Adeps Vulpis.
 Axungia porcina.
 Butyrum.
 Oesypus vel Hyssopus humidus.
 Sevum hircinum.

XIV. Medullae.

Cervi.
Crurum Bovis.
Vituli.

XV. Ossa.

Blatta Byzantia.
Cartilaginis osseae de corde
Cervi.
Cornu Cervi ustum.
Cranium Hominis.
Dentalium.⁴³⁾
Ebur.
Os cordis Cervi.
Ossa cruris Bubuli.
Ossa Sepiae
Spodium.
Ungula Alcis.
Unguis odoratus.
Unicornu.

XVI. Excrementa.

Album Graecum.⁴⁴⁾
Moschus.
Sericum crudum.
Sperma Coeti.
Zibethum.⁴⁵⁾

XVII. Sanguis.

Hirci.
Hominis ruffi.
Lac.

XVIII. E terra mineralia.

As, aes ustum.
Aerugo vel viride aeris.

Alumen crudum.
Alumen plumosum.
Alumen ustum.
Alumen zuccarinum.
Antimonium praeparatum.
Argenti folia.
Argentum vivum.
Arsenicum.
Atramentum sutorium.
Auri folia.
Auri pigmentum.
Cadmia.
Cerussa.
Cinnabaris.
Flos aeris.
Limatura chalybis.
Mercurius sublimatus.
Lithargirium Auri et Argenti.
Mercurius praecipitatus.
Minium.
Pompholyx seu Nihil album.
Plumbum ustum.
Sal amoniacum.
Sal gemmae.
Sal Indi.
Sal nitri.
Succinum.
Sulphur.
Spuma argenti.
Tutia praeparata.
Vitriolum utrunque.

XIX. Lapides et Gemmae.

Aetites.
Alabastrum.
Ametistus.
Armenus lap.

Berillus.
 Borax.
 Calaminaris lap.
 Carbunculus.
 Carneolus alias Sardus.
 Chalcitis.
 Cristallus.
 Haematites.
 Hyacinthus.
 Granati.
 Lazuli lap.
 Lyncis lap.
 Magnes.
 Margaritae.
 Pumex.
 Pyrites vel Marchasita.
 Rubinus.
 Saphirus.
 Smaragdus.

XX. Terrae.

Bolus Armenus.
 Calx viva.
 Creta.
 Gypsum.
 Terra sigillata vel Lemnia,
 Samia Asteris.

XXI. Ex mari et aquis.

Ambarum.
 Bitumen Judaicum vel Asphaltos.
 Coralli albi.
 Coralli rubei.
 Paleae seu pilae marinae.
 Spongia.
 Spuma maris.
 Succinum seu Carabe.

Antiballomena quaedam.

Pro Amomo vero vel Rosa Hyerichuntis odorata — Acorum
 verum / Calamum aromaticum.
 Pro Balsamo — Oleum nucis Muscatae.
 Pro Carpobalsamo — Charyophyllos vel Cubebas.
 Pro Cassia lignea — Cinnamomum vulgare crassum.
 Per Cinnamomum intellige optimum, electum et acutissimum.
 Semen Dauci Cretici — afferatur Venetiis verum.
 Pro Eupatorio Mesue — Ageraton Galeni non Gratiolam
 Cordi.
 Doronicum vulgare, quo nostri pharmacopoei hactenus usi sunt,
 ubique omisimus, quia deleterium esse depraehensum est.
 In aliquibus substituimus Charyophyllos.

Pro Folio et Malabathro — Cassiam ligneam vel Macis vel Charyophyllos.

Pro Meu — Seseli Creticum Behrwurtz vel radicem imperatoriam Meisterwurtz.

Pro Opobalsamo — Oleum nucis Muscatae vel ol. Charyoph.

Rhaponticum intellige verum non Centaurei majoris radicem.

Rubea tinctorum vera ex Silesia est afferenda, quia nolumus deinceps hic usurpari Echii illam radicem, quae hactenus pro rubea in usu fuit.

Pro Thymbra — Satureiam (idem est).

Xylobalsamum — Lignum Aloës.

Index compositorum omnium in hoc libro descriptorum secundum alphabetum.¹⁾

- | | |
|---|---|
| <p>Acetum scylliticum 47.
 Agaricus trochiscatus 87.
 Anisum laxativum 69.
 Aromaticum rosatum 16.
 Benedicta laxativa 66.
 Ceratum e pelle arietina 122.
 Ceratum sandalinum 122.
 Ceratum stomachale 121.
 Collyrium album cum Opio 89.
 Collyrium album sine Opio 89.
 Collyrium Cygnus albus 89.
 Collyrium rubeum 89.
 Collyrium viride 90.
 Conditæ:
 Arantia integra, Arantiorum cortices, Berberi, Calamus aromaticus, Caro Citri, Cassia fistula, Cerasa, Citonia, Cortices Citri, Cucurbitae, Flores Arantiorum, Flores Citri, Galanga, Juglandes, Limones, Mespila, Mirobalani, Nuces muscatae, Pyra muscatellina, Radices Cichorii, Radices Enulae campanae, Radices Erin-gii, Pimpinellae, Ribes, Zingiber commune, Zingiber Indicum viride 27.
 Confectio Hamech major 68.
 Confectio Imperatoris 17.
 Confectio Liberantis 14.</p> | <p>Confectio Morsellorum Facultatis 14.
 Conserva Absinthii pontici, Conserva acetositatis Citri, Conserva Anthos, Conserva Betonicae, Conserva Borriginis, Conserva Buglossae, Conserva Euphrasiae, Conserva florum Malvarum, Conserva florum Salviae, Conserva florum Sambuci, Conserva florum Cichorii, Conserva Fumi terrae, Conserva Hyssopi, Conserva Lavendulae, Conserva Majoranae, Conserva Mellissae, Conserva Nenupharis, Conserva Paeoniae, Conserva Rosarum, Conserva Spicae nardi, Conserva Violarum 27.
 Decoctio aperitiva 52.
 Decoctio aperitiva cum additione ad cholera 52.
 Decoctio aperitiva cum additione ad melancholia 53.
 Decoctio aperitiva cum additione ad phlegma 53.
 Decoctio flor. et fruct. cordialium 51.
 Decoctio pectoralis 52.
 Decoctio pro clysteribus 53.
 Diacalamenthum 18.</p> |
|---|---|

¹⁾ Die Schreibweise ist der im Dispensatorium angepaßt. — Die nebenstehenden Ziffern bedeuten die Seitenzahl.

- Diacatholicon lenitivum 60.
 Diacyminum 18.
 Diacitonium simplex 27.
 Diacitonium compos. e carne Citoniorum 27.
 Diacitonium e succo Citoniorum 28.
 Diacitonium lucidum alias gelu Citon. 28.
 Diacodion simplex 11.
 Diacodion cum Sapa 11.
 Diacodion compositum 11.
 Diacorum 18.
 Diacureuma 21.
 Diagalanga 16.
 Diagridium 88.
 Diahyssopus 10.
 Diaireos Salomonis 10.
 Diaireos simplex 10.
 Dialacca 21.
 Diamargariton calidum 12.
 Diamargariton frigidum 12.
 Diambra 8.
 Diamoron 49.
 Diamoschum amarum 9.
 Diamoschum dulce 8.
 Dianthos 9.
 Diapenidium 10.
 Diaphoenicon 64.
 Diaprunum laxativum 60.
 Diaprunum lenitivum 59.
 Diarhodon Abbatis 20.
 Diasatyriion 22.
 Diasena 63.
 Diasecordium 16.
 Diatragacanthum cum bolo 9.
 Diatragacanthum frigidum 9.
 Diatrionpipereon 17.
 Diatrion Sandalon 20.
 Diaturbith cum Rhabbarbaro 65.
 Diaxyloës 17.
 Electuarium de baccis Lauri 19.
 Electuarium de Cassia sine fol. Senae 58.
 Electuarium Elescoph sive episcopi 65.
 Electuarium de Gemmis 12.
 Electuarium Indum majus 66.
 Electuarium Justinum 24.
 Electuarium laetificans 13.
 Electuarium lenitivum 59.
 Electuarium de Limatura chalybis 22.
 Electuarium de passulis 22.
 Electuarium Plirisarcoticum 13.
 Electuarium de Psyllio 67.
 Electuarium rosatum 63.
 Electuarium de Sebesten 62.
 Electuarium de Sorbis 24.
 Electuarium e succo Rosarum 64.
 Elixirium vitae 53.
 Emplastrum album coctum 119.
 Emplastrum de baccis Lauri 119.
 Emplastrum ad bubones pestil. 120.
 Emplastrum citrinum 121.
 Emplastrum de crusta panis 118.
 Emplastrum Diachylon compos. 117.
 Emplastrum Diachylon simpl. 116.
 Emplastrum DIALTHAEAE 117.
 Emplastrum Diaphoeniconis 118.
 Emplastrum Graecum 121.
 Emplastrum griseum 120.
 Emplastrum de Melilotho 117.
 Emplastrum oxycroceum 119.
 Emplastrum de Violis 118.
 Emplastrum viride 120.
 Flores Cassiae 58.
 Hiera simplex 65.
 Hiera Logadii 65.
 Infusio foliorum Senae 53.
 Julep Rosarum 48.
 Julep Violarum 49.
 Lithontribon 23.
 Lohoch ad asthma 56.
 Lohoch ex Caulibus 57.
 Lohoch de Farfara 57.
 Lohoch de Papavere 56.
 Lohoch de Pino 55.
 Lohoch de pulmone vulpis 56.
 Lohoch sanum et expertum 55.
 Lohoch ex Scylla 56.
 Manus Christi simplex 11.
 Manus Christi perlata 12.

- Mel rosatum 46.
 Michleta 69.
 Mithridatium 24.
 Miva Cytoniorum aromat. 51.
 Miva Cytoniorum simplex 50.
 Mixtura theriacalis facult. 15.
 Morselli laxativi 69.
 Nasalia 70.
 Oleum de Abrotano 94.
 Oleum Absinthii 94.
 Oleum Amygdal. amar. 93.
 Oleum Amygdal. dulc. 92.
 Oleum anethinum 92.
 Oleum e baccis Juniperi 95.
 Oleum Balsami 100.
 Oleum chamaemelinum 92.
 Oleum e Capparibus 95.
 Oleum e Castoreo simplex 95.
 Oleum e Castoreo compos. 95.
 Oleum cheirinum vel leucoinum 95.
 Oleum costinum 98.
 Oleum de Euphorbio 100.
 Oleum florum Verbasci 92.
 Oleum Hyoscyami 92.
 Oleum Hyperici 96.
 Oleum irinum 93.
 Oleum e lateribus 98.
 Oleum laurinum 95.
 Oleum Liliorum albor. 93.
 Oleum e Lumbricis 97.
 Oleum Mandragorae 92.
 Oleum mastichinum 94.
 Oleum melinum vel Cydoniorum 91.
 Oleum de Mentha 94.
 Oleum Momordicae 96.
 Oleum myrtinum 91.
 Oleum e Myrti baccis vel Myrtillorum 91.
 Oleum nardinum 93.
 Oleum nymphaeatum 91.
 Oleum papaverinum 92.
 Oleum Petroleum 100.
 Oleum de Piperibus 97.
 Oleum e Ricini seminibus 98.
 Oleum rosaceum 90.
 Oleum e Ruta 94.
 Oleum e sarmentis Juniperi 95.
 Oleum Scorpionum 96.
 Oleum de semine Lini 93.
 Oleum sesaminum 98.
 Oleum e Spica seu Lavandula 94.
 Oleum de Tartaro 99.
 Oleum de Terebinthina 99.
 Oleum violatum 90.
 Oleum de vitellis ovorum 99.
 Oleum vulpinum 97.
 Oxymel compositum 47.
 Oxymel helleboratum 48.
 Oxymel scylliticum 47.
 Oxymel scylliticum compos. 48.
 Oxymel simplex 46.
 Oxysacchara simplex 38.
 Philonium Persicum 26.
 Philonium Romanum 26.
 Pilae: Aestiva 31.
 Pilae: Hiberna 32.
 Pilulae de Agarico 73.
 Pilulae aggregativae 72.
 Pilulae ex Aloë lota 73.
 Pilulae Alephanginae seu aromat. 71.
 Pilulae arthriticae cum Hermodactylis 75.
 Pilulae Assaieret 72.
 Pilulae aureae 73.
 Pilulae de Benedicta 75.
 Pilulae Cochiae 74.
 Pilulae de Colocynthide 76.
 Pilulae de Cynoglossa 78.
 Pilulae Diacolocynthidos Alexandri alias de Nitro 76.
 Pilulae de Elleboro 78.
 Pilulae foetidae majores 76.
 Pilulae de Fumo terrae 77.
 Pilulae de Hiera simplici 74.
 Pilulae de Hiera compos. 74.
 Pilulae de Hiera cum Agarico 74.
 Pilulae Indae 77.
 Pilulae de lapide Armenio 78.
 Pilulae de lapide Lazuli s. cyaneo 78.
 Pilulae lucis majoris 75.
 Pilulae mastichinae 72.

- Pilulae de Mezereo 77.
 Pilulae pestilenciales s. commun.
 Rufi 71.
 Pilulae de Rhabbarbaro 73.
 Pilulae sine quibus esse nolo 72.
 Pulvis contra epilepsiam 28.
 Pulvis contra lumbricos 30.
 Pulvis contra morsum canis rabidi 31.
 Pulvis dentifricius 29.
 Pulvis restrictivus 30.
 Pulvis Senae praeparatae 70.
 Pulvis sternutatorius 70.
 Rob de Berberis simplex 49.
 Rob de Berberis compos. 49.
 Rob de Ribes compos. 49.
 Rob de Ribes simplex 49.
 Rob Nucum compos. 49.
 Rotulae de succis. 20.
 Saponea 58.
 Species pro epithemate cordis 29.
 Species pro epithemate hepatis 29.
 Succus acetositatis Citri 50.
 Succus uvae immaturae 50.
 Succus Prunorum sylvestr. 50.
 Syrupus de Absinthio 44.
 Syrupus acetosus simplex 35.
 Syrupus acetosus compos. 35.
 Syrupus acetositatis Citri 35.
 Syrupus acetositatis Limonum 36.
 Syrupus de Agresta 36.
 Syrupus de Artemisia 45.
 Syrupus de Betonica 40.
 Syrupus de Byzantiis 41.
 Syrupus de Calamintha 43.
 Syrupus de capillis Veneris 43.
 Syrupus de Cichorio silv. simplex 36.
 Syrupus de Cichorio cum Rhabbarbaro 37.
 Syrupus de corticibus Citri 35.
 Syrupus de Endivia compos. 37.
 Syrupus de Epithymo 45.
 Syrupus de Eupatorio 41.
 Syrupus de Farfara 43.
 Syrupus Glycyrrhiza 42.
 Syrupus Granatorum acid. 36.
 Syrupus Granatorum dulc. 36.
 Syrupus de Hyssopo 42.
 Syrupus de infusione Viol. solutiv. 32.
 Syrupus de Jujubis 34.
 Syrupus de Mentha 44.
 Syrupus Myrtinus simplex 38.
 Syrupus Myrtinus compos. 38.
 Syrupus de Nymphaea s. de Nenuphare 33.
 Syrupus pro oculis 40.
 Syrupus Oxsacchara simplex 38.
 Syrupus de Papavere simplex 34.
 Syrupus de Pomis simplex 39.
 Syrupus de Pomis compos. 39.
 Syrupus de Portulaca 40.
 Syrupus de Prassio 42.
 Syrupus de quinque radicibus 41.
 Syrupus rosatus solutivus 33.
 Syrupus rosatus de Rosis siccis 33.
 Syrupus de Stoechade simplex 40.
 Syrupus ex succo Acetosae 38.
 Syrupus ex succo Borraginis 39.
 Syrupus ex succo Buglossae 39.
 Syrupus de succo Endiviae 36.
 Syrupus de succo Fumi terrae 44.
 Syrupus de succo Violarum 32.
 Theriaca Andromachi 25.
 Theriaca Diatessaron 26.
 Tragea communis 29.
 Tragea cum Alkakengis 30.
 Tragea laxativa 70.
 Tryphera Persica 61.
 Trochisci de Absinthio 79.
 Trochisci de Agarico 87.
 Trochisci Alhandali 87.
 Trochisci Aliptae moschatae 86.
 Trochisci de Alkakengis 83.
 Trochisci Bechii albi 81.
 Trochisci Bechii nigri 81.
 Trochisci de Berberis 87.
 Trochisci de Cappare 82.
 Trochisci de Carabe 83.
 Trochisci Cyphi 85.
 Trochisci de Eupatorio 79.
 Trochisi pro fumo 87.

- Trochisci pro fumo cum Moscho 88.
 Trochisci Galliae moschatae 86.
 Trochisci de Glycyrrhiza 81.
 Trochisci Hedichroi 85.
 Trochisci de Lacca 80.
 Trochisci cum Manna 82.
 Trochisci cum Myrrha 82.
 Trochisci de Nymphaea 80.
 Trochisci pectorales cum Opio 81.
 Trochisci Ramich 84.
 Trochisci de Rhabarbaro 80.
 Trochisci de Rosis Nicolai 79.
 Trochisci de Rosis Rhazis 79.
 Trochisci de Spodio 83.
 Trochisci scyllitici 85.
 Trochisci de Terra sigillata 84.
 Trochisci de Violis 86.
 Trochisci de Vipera 85.
 Vinum Cytoniorum 51.
 Vinum Granatorum 51.
 Unguentum Aegyptiacum 116.
 Unguentum Agrippae regis 109.
 Unguentum de Alabastro 102.
 Unguentum album 110.
 Unguentum apostolorum 115.
 Unguentum Arogon 108.
 Unguentum Artanitae majus s. de
 succo cyclamini 106.
 Unguentum artheticum 107.
 Unguentum aureum 115.
 Unguentum Basilicon magnum 114.
 Unguentum benedictum 113.
 Unguentum de Calce lota 114.
 Unguentum contra casum 110.
 Unguentum Comitissae 112.
 Unguentum defensivum 111.
 Unguentum Dialthaeae simplex 100.
 Unguentum Dialthaeae compos. 101.
 Unguentum exiccativum 112.
 Unguentum infrigidans Gal. 104.
 Unguentum de Lytargyrio 114.
 Unguentum contra Lumbricos 105.
 Unguentum martianum parv. 108.
 Unguentum nenupharinum 104.
 Unguentum nigrum alias fuscum 114.
 Unguentum pectorale album 103.
 Unguentum contra pediculos 116.
 Unguentum Pomada 113.
 Unguentum e Pompholyge 111.
 Unguentum populeum 101.
 Unguentum potabile 109.
 Unguentum resumptivum 104.
 Unguentum rosatum 103.
 Unguentum contra scabiem 113.
 Unguentum somniferum 103.
 Unguentum pro splene 105.
 Unguentum pro stomacho 104.
 Unguentum triapharmacum 115.
 Unguentum tetrápharmacum 115.
 Unguentum de Tutia pro oculis 111.
 Zeduaría cocta 17.
 Zingiber coctum 17.

Beilage.

Taxa vendicionis medicinarum in apotecis juxta consuetudinem civitatis wiennensis. Cod. mss. 5400 fol. 276^a—279^b. K. u. k. Wiener Hofbibliothek.

Syrupi.

Item omnis syrupus confectus cum zukkaro	unc. 1.	den. VIII.
Item omnis syrupus confectus cum melle	unc. 1.	den. VI.
Item omnis confectio laxativa sive elec- tuarium laxativum in solida sive liquida substantia cum zukkaro aut cum melle	dr. 1. facit den. II.	
Item omnis confectio tabulata sive con- formativa sicut dyagalanga, dya- citoniton, dyadragantum, electuarium ducis, aromaticum rosatum et sic de aliis	unc. 1. facit den. VIII.	
Item pliris cum musco	unc. 1.	den. XII.
Item dyamusci	unc. 1.	den. XII.
Item leticie galieni	unc. 1.	den. XII.
Item dyaambra	unc. 1.	den. XII.
Item dyatameron	unc. 1.	den. XII.
Item dyamargariton	unc. 1.	den. XII.
Item electuarium de gemis	unc. 1.	den. XVI.
Item manus christi perlati	unc. 1.	den. XVI.
Item anisum confectum album et rubeum	unc. 1.	den. VIII.
Item coriandrum confectum album vel rubeum, carvi, seminis feniculi, sileris montani confectorum et sic de aliis	unc. 1.	den. VIII.

Item cinamomum confectum	unc. 1.	den. XIV.
Item cubebe confecte	unc. 1.	den. XIV.
Item citrinati confecti	unc. 1.	den. XII.
Item fungi confecti	unc. 1.	den. XII.
Item persica confecta	unc. 1.	den. XII.
Item electuarium regum	unc. 1.	den. XIV.
Item electuarium resumptivum	unc. 1.	den. XIV.
Item dyasatyrion	unc. 1.	den. XIV.
Item acori conditi	unc. 1.	den. XII.

Opiate.

Omnis opiata	unc. 1.	den. XII.
Item metridatum	unc. 1.	den. XIV.
Item tyriaca	unc. 1.	den. XIV.

Lohoch.*)

Item omne lohoch	unc. 1.	den. XII.
Item omnis conserva, ut zukkarum rosarum, violarum, boraginis et sic de aliis	unc. 1.	den. VIII.
Item omne genus pilularum	dr. 1. solvit	den. IV.
Item pilule de reubarbaro	dr. 1.	den. VI.
Item pilule alefangine	dr. 1.	den. VIII.
Item pilule de lapide lazuli	dr. 1.	den. VIII.
Item pilule de lapide armeno	dr. 1.	den. VIII.
Item pilule alberti magni	dr. 1.	den. VI.
Item pilule imperiales	dr. 1.	den. VI.
Item omnis pilula deaurata	dr. 1.	den. VII.
Item omnes trocisci	dr. 1.	den. IV.
Item trocisci de camphora	dr. 1.	den. VI.
Item trocisci de rosis	dr. 1.	den. VI.
Item trocisci de terra sigillata	dr. 1.	den. VI.

*) Fol. 276^b.

Item omnis pulvis specierum, ut dya- galange, dyacitoniton, triasandalum, dyarodon abbatis, dyamacis, dya- draganti, dyapenidii, dyacimini, dya- calamenti et sic de aliis	dr. 1. solvit	den. IV.
Item species electuarii de gemis	dr. 1.	den. XII.
Item species dyaambre	dr. 1.	den. XII.
Item species dyatameron	dr. 1.	den. VI.
Item species pliris cum musco	dr. 1.	den. VI.
Item species aromaticae rosarum	dr. 1.	den. VI.
Item species leticie galieni	dr. 1.	den. XII.
Item sdecies auree alexandrine	dr. 1.	den. VI.
Item species dulces	unc. 1.	den. XIV.
Item species fortes	unc. 1.	den. XII.
Item species magistri perichtoldi	unc. 1.	den. XIV.
Item omnes species laxative*)	dr. 1.	den. XII.
Omnis anxugia	unc. 1.	den. VI.
Item anxugia vulturis	unc. 1.	den. XVI.
Item anxugia daxi	unc. 1.	den. XII.
Item anxugia castorei	unc. 1.	den. XVI.
Item anxugia catti	unc. 1.	den. XII.
Item anxugia canis	unc. 1.	den. XII.
Item anxugia ursi	unc. 1.	den. VIII.

Unguenta.

Item vnguentum marciaton	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum agrippa	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum arrogon	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum dyaltea	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum album cum albumine ovi	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum rubeum	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum fuscum	unc. 1.	den. XII.
Item vnguentum mundificativum	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum appostolorum	unc. 1.	den. XII.

*) Fol. 277^a.

Item vnguentum commune	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum citrinum	unc. 1.	den. XXXII.
Item vnguentum pectorale	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum stomachale	unc. 1.	den. VI.
Item vnguentum album	unc. 1.	den. VI.

Emplastra.

Item dyaaquilon cum gummis	unc. 1.	den. XVI.
Item dyaaquilon simplex	unc. 1.	den. VI.
Item emplastrum oxicroceum	unc. 1.	den. XX.
Item emplastrum ad crepaturam	unc. 1.	den. XVI.
Item apostolicon	unc. 1.	den. XX.
Item emplastrum coctum	unc. 1.	den. VI.
Item emplastrum grecum	unc. 1.	den. VI.
Item emplastrum gratia dei	unc. 1.	den. XVI.
Item emplastrum de melliloto	unc. 1.	den. XVI.

Olea.

Item omnia olea	unc. 1.	den. IV.
Item oleum jusquiama	unc. 1.	den. XVI.
Item oleum mandragorae	unc. 1.	den. XVI.
Item oleum scorpionis	unc. 1.	den. XVI.
Item oleum amygdalarum dulcium	unc. 1.	den. XVI.
Item oleum amygdalarum amararum	unc. 1.	den. XVI.
Item oleum juniperorum	unc. 1.	den. XXXVI.
Item oleum de cappare	unc. 1.	den. VI.
Item oleum terbentine	unc. 1.	den. LX.
Item oleum benedictum	unc. 1.	den. LX.
Item oleum petroleum	unc. 1.	den. XVI.
Item oleum tartari	unc. 1.	den. LX.
Item oleum ovorum	unc. 1.	den. XXXVII.
Item oleum zizanum	unc. 1.	den. XXXII.
Item oleum rosarum	unc. 1.	den. VI.
Item oleum masticis	unc. 1.	den. XII.

Item oleum costinum	unc. 1.	den. VI.
Item oleum castorinum	unc. 1.	den. XII.
Item oleum vulpinum*)	unc. 1.	den. XII.
Item oleum de spica	unc. 1.	den. XII.
Item oleum de euforbio	unc. 1.	den. XII.
Item oleum formicarum	unc. 1.	den. XII.

Aque distillate.

Omnis aque destillate	unc. 1.	den. II.
Item aque rosarum de alexandria	unc. 1.	den. XII.
Item aque rosarum	unc. 1.	den. VI.
Item aque rose camphorate	unc. 1.	den. XII.
Item aque boraginis	unc. 1.	den. IV.
Item aque melissarum	unc. 1.	den. IV.
Item aque roris marini	unc. 1.	den. VI.
Item aque mayorane	unc. 1.	den. VIII.
Item aque viole	unc. 1.	den. IV.
Item aque buglosse	unc. 1.	den. IV.
Item aque spargi	unc. 1.	den. IV.
Item aque scolopendrie	unc. 1.	den. IV.
Item aque eufrasiae	unc. 1.	den. IV.
Item aque ysopi	unc. 1.	den. IV.
Item aque mente	unc. 1.	den. IV.
Item aque de floribus fabarum	unc. 1.	den. IV.
Item aque fragorum	unc. 1.	den. IV.

Herbe.

Omnis herbe	M. 1.	den. I.
Item ysopi	M. 1.	den. II.
Item mayoranae	M. 1.	den. IV.
Item basiliconis	M. 1.	den. IV.

*) Fol. 278^a.

Item balsamite	M. 1.	den. II.
Item saliuca ¹⁾	M. 1.	den. II.
Item yve	M. 1.	den. II.
Item florum rosarum*)	M. 1.	den. II.
Item camomille	M. 1.	den. II.
Item nenufaris	M. 1.	den. II.
Item sambuci	M. 1.	den. II.
Item florum viole	M. 1.	den. II.
Item florum boraginis	M. 1.	den. II.
Item florum buglosse	M. 1.	den. XII.
Item centauree	M. 1.	den. II.
Item scolopendrie	M. 1.	den. II.
Item nepite	M. 1.	den. II.
Item abrothani	M. 1.	den. II.
Item satiregie	M. 1.	den. II.
Item melliloti	M. 1.	den. II.
Item mente	M. 1.	den. II.
Item prassii	unc. 1.	den. II.
Item florum boraginis	unc. 1.	den. XII.
Item florum buglosse	unc. 1.	den. XII.
Item florum viole	unc. 1.	den. XII.
Item melisse	M. 1.	den. IV.

Radices.

Omnis radiceis	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis petroselini	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis brusci	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis spargi	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis feniculi	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis enule	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis polipodii	unc. 1.	den. IV.
Item radiceis altee	unc. 1.	den. VI.
Item radiceis ellebori albi preparati	unc. 1.	den. VIII.

*) Fol. 278^b.

Item radicis ellebori nigri preparati	unc. 1.	den. VIII.
Item radicis esule preparate*)	unc. 1.	den. VIII.
Item radicis serpentarie	unc. 1.	den. XII.
Item radicis tormentille	unc. 1.	den. XII.
Item radicis dyptami	unc. 1.	den. VIII.

Semina.

Omnium seminum	unc. 1.	den. VI.
Item semen apii	unc. 1.	den. XII.
Item semen spargi	unc. 1.	den. XII.
Item semen basiliconis	unc. 1.	den. XVI.
Item semen petroselini	unc. 1.	den. VI.
Item semen feniculi	unc. 1.	den. VI.
Item semen milii solis	unc. 1.	den. VI.
Item semen melonum	unc. 1.	den. IV.
Item semen cucumeris	unc. 1.	den. IV.
Item semen angurie	unc. 1.	den. IV.
Item semen cucurbite	unc. 1.	den. IV.
Item semen sileris	unc. 1.	den. IV.
Item semen aneti	unc. 1.	den. IV.
Item semina omnia frigida mundata	unc. 1.	den. XII.
Item semen endivie	unc. 1.	den. VIII.
Item semen lactuce	unc. 1.	den. VIII.
Item semen urticae	unc. 1.	den. VI.
Item semen scariole	unc. 1.	den. VI.
Item semen nasturcii	unc. 1.	den. VI.
Item semen cathapucie ²⁾	unc. 1.	den. XIV.
Item semen laureole	unc. 1.	den. XIV.
Item coriandri preparati	unc. 1.	den. IV.
Item carvi.**)	unc. 1.	den. IV.
Item semen dauci	unc. 1.	den. VI.
Item semen pastinace	unc. 1.	den. XII.

*) Fol. 279^a.**) Fol. 279^b.

Item semen nigelle	unc. 1.	den. XII.
Item semen numularie ³⁾	unc. 1.	den. XII.
Item semen papaveris albi	unc. 1.	den. XVI.
Item semen rute	unc. 1.	den. VIII.
Item semen saxifrage	unc. 1.	den. XII.
Item semen lupini	unc. 1.	den. XVI.
Item semen carthami	unc. 1.	den. VIII.

Item vasa pro syrupis et aquis distillatis et pixides pro
vnguentis et scatule pro confectionibus et lagene, flascones de
ferro et stanno, ista omnia forum habent.

Notizen zum Dispensatorium.

Die arabischen Ziffern sind gleichartig mit der Nummer des Receptes. In betreff der Abkürzungen von Autornamen vergleiche das Verzeichnis am Schlusse dieser Arbeit.

1.

Cinnamomum: Da nur die beste Rindensorte verwendet werden soll, dürfte am ehesten an *Laurus Cinnamomum* L. (*Cinnamomum ceylanicum* Nees) zu denken sein, während *Cordus* u. *Disp. Colon.* von *canella tenuissima* (*Canella alba* Murr.?) sprechen. Nach Clusius kann letztere als Ersatzmittel für *Cinnamomum* und *Cassia* genommen werden.

Heute wird *Cinnamomum Cassia* Bl. verwendet.

Doronicum: Als Ersatz die *caryophylli*. *Doronicum Pardalianches* L. Gemswurz. gemsenbuerezen in den steierischen Bergen vorfindlich (Stainpeis). Nicht zulässig war das bisher in Wien gebräuchliche, als giftig erkannte d. vulgare. (*Aconitum Napellus* L.?)

Zedoaria: Die Wurzel von *Amomum Zedoaria* L. Zittwerwurzel. zitber Stainpeis.

Charyophylli: Die Blütenknospen von *Caryophyllus aromaticus* L. Gewürznelken. negel Stainpeis.

Macis: Der Samenmantel von *Myristica aromatica* L. Muskatnußbaum. muscatplue Stainpeis.

Nux muscata: Der Samen von eben genanntem Baum.

Folium: Auch f. *Indum*, nach Galeazzo gleichbedeutend mit *malabathrum* (*malabathron* Diosk.). Nach Stainpeis äußerst selten. H. *muscatplat*; Indianisch *samkrautblat*, Passau. Die Blätter von *Laurus Cassia* Ait. u. a. (Berendes) Kassienlorbeer. Als Ersatzmittel dienten: *Cassia lignea*, *Macis*, *Charyophylli*.

Nardus Celtica: = *Spica Celtica*; laugspeick Stainpeis. Die Stengel, Blätter von Wurzel von *Valeriana celtica* L. Keltische Narde.

Galanga: galigunt Stainpeis, auch *g. minor*. *Alpinia officinarum* Hance, zum Unterschied von der nach Cordus weniger guten *g. major*: *Maranta Galanga* L (*Alpinia Galanga* Willd.) Vergl. Dragendorff p. 144. Gebräuchlich war die Wurzel.

Spica Indica: = *Spica nardi*, spica schlechtweg, röm. speick Stainpeis; indianische Spick Passau, auch *Nardus Indica*. *Nardostachys Jatamansi* D. C. In Verwendung war die Wurzel.

Cardamomum: Nach Stainpeis machten die Apotheker keinen Unterschied zwischen majus und minus. Nach Cordus ist unter *cardam.* schlechtweg stets minus zu verstehen. Die Früchte von *Amomum Cardamomum* L. c. majus = *grana paradisi* *Amomum granum Paradisi* L.

Zingiber: z. crudum raber imber, z. coctum, pachner imber, z. conditum, greun imber Stainpeis, die Wurzel von *Zingiber officinale* Rose.

Santalum album, *citrinum*, *rubeum*: Das Holz von *Santalum album* L., welches, wenn älter, gelblich erscheint. *S. rubeum* das Holz von *Pterocarpus santalinus* L. fil. *santal rouge*. Vergl. Dragendorff p. 183, 327.

Aloë: Saft u. Holz von *Aloë perfoliata* seu vera L.

Piper album, *longum*, *nigrum*: Die reifen Beeren von *Piper nigrum* L. geben den sogenannten weißen und die grünen getrockneten den schwarzen Pfeffer. Die dritte Art stammt von *P. longum* L.

Ambra: Stainpeis nennt als beste die grisea, wovon eine Unze 8 ungarische Gulden kostete. Sie wurde häufig mit Aloëholz, *Storax* u. dergl. verfälscht. Ein Produkt von nicht ganz sicher-gestellter Herkunft. Nach einigen ein dem Fettwachs analoges Produkt faulender Sepien, welches auf der Meeresoberfläche schwimmend und auch im Darm des Pottwal gefunden wird. Vergl. auch Peters N. F. p. 30 f.

A. citrina = *germanica* ist bei Clus. gleichbedeutend mit *carabe* (Bernstein).

Moschus: muscus, pisen. Stainpeis. Nach demselben wird die Droge am besten in einem Bleigefäß verwahrt. Die häufigste

Fälschung war die mit geröstetem Brot, Bocks- oder Taubenblut. Das bekannte Sekret vom Moschustier, *Moschus moschiferus*.

Saccharum: Vergl. hierüber die sehr gute Abhandlung bei Peters N. F. p. 11 ff.

2.

Crocus: saffran., saffaranum 5400. Galeazzo; saffaran Stainpeis. Zulässig waren: *Crocus sativus* L. Safran und *c. austriacus*: *Carthamus tinctorius* L. Saffor, wilder Safran. In Niederösterreich versteht man heute unter wilden Safran *Colchicum autumnale* L. Herbstzeitlose. Höfer-Kronfeld.

Margaritae albae: Weiße Perlen in zerriebenem Zustande hauptsächlich als herzstärkendes Mittel verwendet.

Sericum crudum: Nach Cordus das feine Häutchen über der Puppe des Seidenwurmes, welches in einem Tongefäße geröstet wurde (s. *tostum*). In unserem Manuskript stand zuerst *tostum*, wurde aber durchgestrichen.

Carabe (caraba): = *succinum* Bernstein. Gelber achstain (Stainpeis).

Corallium rubeum: Isis nobilis rote Koralle, daneben als Abart *album*. Grallen „ist die Wurzel eines in Afrika am Meeresgrunde wachsenden Baumes“ (Stainpeis).

Ocimum: = *Basilicum*. Man unterscheidet *O. charyophyllum* nach Stainpeis *ocimum* schlechtweg *Ocimum integerrimum* W. und *O. citratum*: *O. Basilicum* L. In Verwendung waren Kraut und Samen.

Been album, rubeum: Die Wurzel von *Centaurea cerinthifolia* Sibth. (weiß) und *Statice Limonium* L. Widerstoß. Bei Diosk. *tripolion*.

Cassia lignea: = *cinnamomum*. Die Rinde von *Laurus Cassia* Ait. o. *Cinnamomum ceylanicum* Nees. o. *C. Cassia* Blume. Vergl. *Cinnamomum* bei Berendes p. 37 f. — *Cassia fistula* *cassa fistel* Stainpeis ist das Mark.

Cubebae: So nennt Stainpeis die Körner von *mirtus silvestris* o. *alba Myrtus communis* L. Auch Clusius bemerkt, daß die Apotheker keine arabischen Kubeben besitzen, sondern anstatt ihrer die Rinde von *canella alba*: *Canella alba* Murr. *Serapio*

hält sie für identisch mit *carpesium* bei Galen und bemerkt, daß sie der Zimmtrinde ähnlich seien. Wohl kaum handelt es sich hier um die echten Kubeben von *Piper Cubeba* L. fil.

3.

Absinthium: Schlechtweg *Artemisia Absinthium* L. Wermut, daneben auch *ponticum*: *A. pontica* L. pontischer Beifuß.

Rosa: *Rosa centifolia* L. Nach Stainpeis erzeugen Rosenblätter unter die Speise gemischt Frohsinn und schützen vor giftigen Getränken.

Castoreum: Bibergeil, das bekannte Sekret von *Castor fiber*.

Seseli: = *siler montanum*, igelsamen, gaiffenchel Stainpeis.

Seseli tortuosum L. *Seseli creticum* = *levisticum*. Letzteres ist hier gemeint.

Levisticum: Auch *ligusticum*. *Levisticum officinale* Koch. Verwendet wurden Wurzel, Kraut u. Samen.

4.

Nicolaus: N. Praepositus. Vergl. die historische Einleitung I.

Rosmarinum: *Rosmarinus officinalis* L. Die Blüten wurden auch *anthos* genannt. *Rosmarin plaimen* Stainpeis.

Viola: Die Blüten von *Viola odorata* L., deren Blätter auch unter dem Namen *violaria* bekannt waren. Das Kraut der *Viola tricolor* L. ist unter dem Namen Dreifaltigkeitstee noch heute ein beliebtes Volksmittel.

Glycyrrhiza: Gleich *liquiritia*, *leckawicz* Stainpeis. Die Wurzel von *Glycyrrhiza glabra* L.

Anisum: Die Samen von *Pimpinella Anisum* L.

Anethum: Tilln, Stainpeis. Kraut u. Samen von *Anethum graveolens* L.

5.

Tragacantha: Gleich *dragagantum*. Der Gummisaft von einer Anzahl von *Astragalus*arten. Nach Clusius als *gummi arabicum* verwendet, was hier aber nicht zutrifft.

Gummi arabicum: Der Saft von *Acacia vera* Willd., der aber nach Clusius nicht erhältlich war, daher häufig das Harz vom einheimischen Schlehdorn *Prunus spinosa* L. verwendet wurde. Welcher Art die „*acacia*“ zur Zeit des Stainpeis war, geht

aus der Übersetzung „schlehinsafft“ hervor. Gummi arabicum = thintengummi. Passau.

Amylum: Stärkemehl aus dem Weizen ohne Mühle — daher der Name — hergestellt.

Cucurbita: Außer den Samen auch die Schale und das Fleisch vom Kürbis. kürbsensamen. Passau. Verzuckerte Kerne galten nach Stainpeis in Klöstern als Leckerei. Neben Cucurbita lagenaria L. waren wohl auch C. Pepo L. u. andere Abarten gebräuchlich. Vergl. hierüber die Abhandlung bei Fischer-Benzon, p. 89 ff.

Cucumis: vmuercken Stainpeis. Cucumis sativus L. Gurke.

Citrullus: kichern Stainpeis, Citrullensamen (Passau). Cucurbita Citrullus L. Wassermelone.

Melo: Melaun von grüner Farbe, zumeist aus Ungarn stammend. (Stainpeis) Cucumis Melo L. Melone.

Camphora: Der mit Asphalt vermischte besitzt nicht die rein weiße Farbe des echten Kampfer. In den Apotheken wurde er zum Schutz gegen Luftzutritt in Lein- oder Hirsesamen aufbewahrt. Kommt von Cinnamomum camphora Fr. Nees.

Penidiaie, penidium: Zucker penat Stainpeis. Disp. Colon. gibt folgende Zubereitung an: Weißer Zucker wird über mäßigem Feuer solange eingekocht, bis er feine, bei einer Erschütterung wie Glas zerspringende Fäden ziehen läßt. Darauf kommt die Masse auf eine mit Butter, Oliven- und Mandelöl eingefettete Marmorplatte und wird mit befetteten oder bestaubten Händen einige Male durchgeknetet, bis sie ein wenig ausgekühlt ist, sodann um einen eisernen Haken ausgezogen und geflochten. Papaper: Magen schlechtweg, gleich papaver album (Stainpeis). Die Samen von Papaver somniferum L. Schlafmohn.

6.

Bolus Armenus: Gelbrötlicher Fetton. Dieses Präparat fehlt bei Cordus.

7.

Pinea = nucleus pini: Ziernüßel Stainpeis; Zirbelnuß Passau. Die Samen von Pinus Cembra L. Zirbelkiefer.

Amygdalae dulces, amarae: Amygdalus communis L. Var. amara.

Semina quatuor frigidorum etc. Diese sind: *Semen cucurbitae, citrulli, cucumeris, melonis.*

8.

Iris: Gleichbedeutend mit *i. Illyrica* (Cordus); viel wuerzen, auch *i. Venetiana* oder *ireos* schlechtweg genannt (Stainpeis).

Iris germanica L. und *J. florentina* L.

Pulegium: polay (Stainpeis); *Mentha Pulegium* L.

Hyssopum: Zur Zeit, da das *Riceptario* verfaßt wurde, war *hyss.* Diosk. nicht bekannt. *H. Mesue* ist gleich *h. vulgare*, welches in Gärten gepflanzt wurde. *Hyssopus officinalis* L. (Fischer-Benzon). *H. silvestre* ist gleich *thymum vulgare*; *Thymus vulgaris* L. (Clusius). Verwendet wurden Blätter und Stengel.

Carica: Ist die trockene Feige, während unter *ficus* die frische sowohl wie die trockene zu verstehen ist. (Stainpeis). Die Frucht von *Ficus Carica* L. Feigenbaum.

Passula enucleata; Gleich *uva passa, passularia*, welhische Weinperlen zum Unterschied von *u. p. major* = *czibebe*, in Mähren *rasencken* (heute *hrosinky*). Stainpeis. Die Samenkerne hießen *arilli*.

Dactylus: Gleich dem *domestica tatel* (Stainpeis). Die Früchte von *Phoenix dactylifera* L. Dattelpalme.

Styrax calamita rubea: Das Harz vom Baum *Lubue* in halb-festem, *nigra* in festem Zustande. Ganz frisch erscheint es flüssig und weiß. (Stainpeis). *Lubue* = *lubna* bei E. B. II. 428 entspricht dem *Styrax officinalis* L. oder *Liquidambar orientalis* Mill. — Der in den Apotheken gebräuchliche *Styrax* entspricht zum Teil der Beschreibung bei Dioskurides und wird eben in Ermangelung eines besseren weiter verwendet. Verfälschungen waren sehr häufig. Clusius.

9.

Saccharum candi: Ursprünglich stand im Original *s. candidi* und ist die letzte Silbe durchstrichen. Zuckerkandel Stainpeis. Kristallinischer Rohrzucker. Stainpeis erzählt von einem Apotheker in der Stadt Steier, daß dieser einfach Zucker auflöste, Eiweiß zusetzte und dann über Stäbchen tropfen

ließ. Diese Zubereitungsart hielt unser Gewährsmann für direkte Fälschung.

10.

Thymus, thymum: Das Kraut von *Satureja capitata* L. Satureistrauch. Berendes p. 289.

Thymbra: *Satureja Thymbra* L. Großer Saturei. Bei Cordus gleich *satureja silvestris*. Ist aber sehr selten zu haben, daher man als Ersatz *sat. sativa*: *Satureja hortensis* L. Bohnenkraut *satrey* bei Stainpeis verwendete.

Ruta: *R. hortensis* weinrutten Stainpeis; *r. silvestris* wilde rauten Passau. *Ruta graveolens* L. Gartenraute.

Cyminum: Gleich *carvi romanum*, welhischer küm Stainpeis. *Cuminum Cyminum* L. Mutterkümmel, römischer Kümmel.

Foeniculum: Gleich *marathrum* Diosk. Kraut, Samen und Wurzel von *Anethum Foeniculum* L. Fenchel.

Carvum: Auch *carvi*, kim Stainpeis: *Carvum Carvi* L. Kümmel.

11.

Dieses sowie die folgenden Präparate 12, 13 sind bei Cordus unter einem Titel angeführt.

12.

Sapa vini dulcis: Eingedickter süßer Weinmost.

13.

Hypocistis: Das Kraut von *Cytinus Hypocistis* L. Gemeiner Hypozist.

Myrrha: Das Harz von *Balsamea Myrrha* Engl., Balsamodendron *Myrrha* Nees v. Es.

Balaustium: Die Blüten von *Punica Granatum* L. Granatbaum.

14.

Fehlt bei Cordus.

16.

Portulaca: Puerezelkraut Stainpeis; Burtzel-, Burgel-, Bortzelkraut, Passau. *Portulaca oleracea* L. Portulak.

Nymphaea alba: Gleich *nenuphar*. *Nymphaea alba* L. Weiße Seerose. Außerdem kommt noch vor: *n. citrina* = *ungula caballina aquatica* N. *lutea* L. gelbe Seerose.

Borrage: Herczinfreidt Stainpeis, boretsch, borragen, Passau.
Borrage officinalis L. Boretsch.

Myrtilli veri: Im Gegensatz zu den einheimischen, *nostrates*.
 Nach Stainpeis von *myrtus domestica nigra*. Cordus erwähnt,
 daß die echte *Myrtus* bei uns nicht vorkommt (die kultivierte
Myrtus communis L.) und deren Früchte *myrtilli* in trockenem
 Zustande meist von Italien oder Spanien kommen. Die *myrtilli*
nostrates Heidelbeeren von *Vaccinium Myrtillus* L. finden sich
 bereits in der *Physica* der heiligen Hildegardis verzeichnet.
 Fischer-Benzon p. 213.

Ursprünglich war, wie bei Cordus, Nicolaus als Autor
 des *Rezeptes* angeführt.

17.

Pyretrum: *Perichtram* Stainpeis. Kraut und Wurzel von *Anacyclus Pyrethrum* D. C. Bertram Kamille.

Mastiche: Das Harz von *Pistacia Lentiscus* L. Die feinste
 Sorte m. Chia wurde durch Einschnitte in die Rinde ge-
 wonnen. Berendes p. 64.

Den Baum nannten die Römer *Lentiscus*, das weiße
 Harz hieß *gluten romanum*, das dunkle m. *aegyptiacum*.
 (Stainpeis).

Apium: Kraut, Samen und Wurzel von *Apium graveolens* L.
 Gebaute Sellerie. Epich Stainpeis.

Thapsia: Samen und Wurzel von *Thapsia Garganica* L.
 Berendes p. 453.

18.

Saphyrus: Saphierstein; **Hyacinthus:** Hyazintstein; **Sardus:**
 Karneol; **Granatus:** Granat; **Smaragdus:** Smaragd.

Citreus malus: Die Früchte hießen auch *limones*. Schale,
 Samen und Blätter von *Citrus Limonum* Risso.

Rasura eboris: Geraspeltes Elfenbein; *ebur ustum* = *spodium*.

Zurumbeth: Gleich *zedoaria rotunda* (Cordus). Die Wurzel von
Zingiber Zerumbet Rosc.

19.

Conciliator: Petrus Aponensis 1250 bis 1315, nach seinem
 großen Werk *Conciliator differentiarum* so genannt.

Buglossum: Kraut und Blüten von *Anchusa italica* Retz. Bei Stainpeis axenzungen.

Myrobalani: Fünf Arten, und zwar: bellirici, chebuli, citrini, emblici, indi. Nigri werden die großen chebuli und indi bezeichnet. Die Früchte von *Terminalia bellerica* Roxb., *T. Chebula* Roxb., *T. citrina* Roxb. *Phyllanthus Emblica* Willd. *Terminalia horrida* Steud.

Antispodium: Gleich antispodon Diosk. Pflanzenasche. Spodos (spodium) bedeutet Zinkasche. Berendes p. 508.

Doch bereits Avicenna verstand unter spodium die veraschte *Bambusa arundinacea* Schreb. Später galt das Wort für ebur ustum.

Os de corde cervi: Auch cartilago etc. Kalkkonkremente im Herzen des Hirsches.

Melissa: Wanczenkraut, citraria Stainpeis. *Melissa officinalis* L.

Coriandrum: Die Samen von *Coriandrum sativum* L. Koriander.

Berillus: Beryll.

An Stelle dieser Verschreibung finden sich bei Cordus die von Nicolaus Praepositus u. Rhazes.

20.

Plirisarcoticum: Richtig Pleres archonticon.

Schoenanthum. Gleich squinanthum. Die Blüten von *Andropogon Schoenanthus* L. Kamelheu, Stainpeis kemeltierhey. Die nach Galeazzo dazumal in Wien gebräuchliche Art „ohne Blüten“ dürfte vielleicht das im Marchfelde und auf den Donauinseln wild vorkommende Bartgras *A. Ischaemum* L. gewesen sein.

Cyperus: Man unterschied c. rotundus und longus. Ersteres (das runde Cyperngras) *C. rotundus* L. war nach Cordus nicht immer zu haben, daher dann *C. longus* L. als Ersatz diente. Verwendet wurden Kraut und Wurzel. Bei Stainpeis wilder galigant.

Majorana: Sampsychon bei Diosk. Das Kraut von *Origanum Majorana* L. Majoran.

Balsamita: Gleich mentha aquatica, sisymbrium bei Diosk, pachmenczen Stainpeis. Das Kraut von *Mentha aquatica* L. o.

M. silvestris Koch. Berendes p. 223. Cordus und Disp. Aug. benutzen die Vorschrift nach Nikolaus Praepositus.

21.

Auch liberans a peste.

Tormentilla: Tormentil, auch *bistorta*, *consolida rubea*. Stainpeis. Nach Galeazzo fälschlich auch *consolida major* genannt. Die Wurzel von *Tormentilla erecta* L. Blutwurz.

Scordium: Das Kraut von *scordium verum*. Unzulässig ist das auch *allium silvestre* genannte sc.: *Allium Scorodoprasum* L. Sandlauch. Clusius. Nach Cordus wächst das echte auf Kreta *Teucrium Creticum* L., doch wird auch das einheimische *T. Scordium* L. Knoblauch-Gamander verwendet.

Carduus benedictus: Das Kraut von *Cnicus Benedictus* Gaertn. Kardobenedikte.

Cornu cervi ustum: Gebranntes Hirschhorn als Ersatz für os de corde cervi.

Aurantium: Die Frucht von *Citrus Aurantium* L.

Bombax (Xylum): Bei Galeazzo als eine auf einem Baum wachsende Wolle beschrieben. Die Samen von *Gossypium arboreum* W. Stainpeis versteht unter *bombax* den Seidenwurm.

Juniperus: Bei Diosk. *arkeuthos*. Die große Art *Juniperus phoenicea* L. Zypressen-Wacholder, die kleinere: *J. Oxycedrus* L. Großer Stachel-Wacholder Berendes p. 97 f. Die zweite kleinere Art kommt nach Galeazzo nächst Wien vor und ist möglicherweise die von Clusius in Niederösterreich beschriebene Varietät *J. nana* Sm. Doch wurde wohl auch *J. communis* L. verwendet. T. wecholder, bei Stainpeis *kraniper*.

Dictamnus Creticus: Die Wurzel von *Origanum Dictamnus* L. Echter Diptam. Als Ersatz hiefür *d. albus* = *d. schlechtweg* = *fraxinella* D. *albus* L. Spechtwurz. Vergl. Stainpeis. Galeazzo beschreibt den weißen.

Scabiosa: Gleich *morsus diaboli*, *succisa*, knoffkraut Stainpeis. — *Scabiosa succisa* L. Teufelsabbiß.

Diese Vorschrift unterscheidet sich wesentlich von der bei Cordus.

Lapides quinque pretiosi: Nach Disp. Aug.: Saphyrus, hyacinthus, sardus, granatus, smaragdus.

22.

Cristallus: Bergkristall, befördert nach Stainpeis den Milchzufluß.

Aetites: Adlerstein, befördert die Niederkunft. Stainpeis.

Angelica: Heiligeisterwuertz Stainpeis, Heiligengeistwurz Höfer-Kronfeld p. 100. Angelica silvestris L. Engelwurz. Nach Stainpeis verstand man unter angelica auch archangelica die urtica mortua = celidonia minor.

Valeriana: Unser Dispensatorium erwähnt daneben auch phu ponticum, d. i. phu majus: Valeriana Phu L. Großer Baldrian. Phu minus, unsere valeriana: Valeriana officinalis L.

Bei Stainpeis: valdrian, herba benedicta, h. gatte, serpillum majus. Bei Galeazzo gleich potentilla, valeria, spica silvestris, fu [fuw bei E. B. II. p. 265. Valeriana Dioscoridis Hawkins.] Im Gebrauch stand die Wurzel.

Tapsus barbatus: Gleich verbascum; himelbrandt Stainpeis. Nach Galeazzo um Wien sehr häufig. Thapsus und Verbascum Arten.

Unter Himmelbrand versteht man heute im Volksmunde folgende Pflanzen: Verbascum phlomoides L.; V. thapsiforme Schrad. V. Thapsus. L. und Solidago Virgo aurea L. (Compos.) Höfer-Kronfeld. Verwendet wurden Kraut, Blüten und Wurzel.

Pimpinella: Unser Dispensatorium unterscheidet p. germanica und p. italica = sanguisorba. Letztere Poterium Sanguisorba L. Bibernell, Nagelkraut schreibt Cordus vor, zum Unterschied von p. germanica = saxifraga der weißen B. Pimpinella Saxifraga L. In Verwendung waren Kraut und Wurzel.

Rhabarbarum: Das Rha des Diosk. rha ponticum, rheu-ponticum = Rheum Rhaponticum L. und die echte Rhabarberwurzel Rh. palmatum Rh.

Salvia: Das Kraut von Salvia officinalis L.

Calendula: Ringelpleumel Stainpeis; das Kraut und die Blüten von Calendula officinalis L. Ringelblume.

Acetosa: Sawrampher Galeazzo, saursenff 5400 P. surempher, T., ampferkraut Stainpeis. Eine große Art Rumex Acetosa L.

Sauerampfer, eine kleinere, acetosella, alleluja R. *Acetosella* L. Sauerklee, puechampfer Stainpeis. Unter lapathon (lapation, rumex) zählt Diosk. 4 Arten auf: *Oxylapathon*: *R. crispus* L., dann *R. Patientia* L., *R. bucephalophorus* L. und die beiden oben genannten als lapathon schlechtweg. Berendes p. 216. In Verwendung: Kraut u. Samen.

Diese und die Vorschrift 23 finden sich bei Cordus nicht.

24.

Girolamo Fracastoro (1483 bis 1553) Arzt aus Verona.

Bistorta: Nach Stainpeis gleich tormentilla, was aber hier nicht zutrifft. Naterwurz. Passau. Die Wurzel von *Polygonum Bistorta* L.

Galbanum: Nach Stainpeis häufig mit Säge- oder Bohnenmehl oder Kolophonium gefälscht. Die Stammpflanze ist *Ferula tingitana* L.

Gummi = *g. arabicum*.

Opium: Der aus den Mohnköpfen gewonnene, sehr häufig gefälschte Saft. Clusius. Vergl. *Papaver*.

Gentiana: Kraut und Wurzel von *Gentiana lutea* L. Gelber Enzian. Galeazzo beschreibt eine im n.-ö. Schneeberg- und Raxgebiet vorkommende Varietät *G. nivalis* L.

Terra sigillata: Gleich terra Lemnia, gesiegelt erdt Stainpeis. Nach ebendemselben kam nur die weiße Sorte ohne Siegel in den Handel. — Clusius: Derzeit werden zwei Sorten in Kuchenform, eine rötliche und weiße, mit türkischen Schriftzeichen versehen von Konstantinopel aus in den Handel gebracht. Höchstens die rötliche Sorte kommt von Lemnos. Einige halten t. s. für bolus Armenus, doch ist das nicht festzustellen.

Die im Altertum und Mittelalter so hochgeschätzte Siegelerde besteht aus rotem, eisenoxydhaltigem Ton.

Diese Vorschrift findet sich bei Cordus nicht.

25.

Gabriel: G. ben Bachtischua, Lehrer von Mesue dem Älteren, 9. Jahrhundert.

Vorschrift genau wie bei Cordus.

26.

Calamus aromaticus: Kalamos bei Diosk. ist vielleicht *Andropogon Nardus* L. Berendes p. 45. — Nach Clusius gar nicht mehr erhältlich, daher man *acorus verus*: *Acorus Calamus* L. Gewürzhafter Kalmus verwendete.

Unter dem Schlagworte *acorus* beschreibt Galeazzo die *Xyris* des Diosk. = *spatula foetida* L., Stinkende Schwertlilie. Für den echten *acorus* wurde auch *Iris pseudacorus* L. Wasserlilie. T. gelber gilgen, H. gele swerdeln, Stainpeis trackchenwurtzen, gelb liligin wurtzin verwendet. Vergl. auch Fischer-Benzon p. 45 f. In Verwendung: Kraut und Wurzel. *Calamintha sicca*: Gleich *c. montana*. Das Kraut von *Mentha tomentella* Link. Trockene Minze.

Mentha sicca: Das Kraut von *Mentha sativa* L. Var. *silv.*

27.

Bei Cordus die Vorschrift nach Galenus.

28., 29., 30., 31.

Bei Cordus nicht vorhanden.

32.

Ammi: Gleich *ameos*. Zu Stainpeis Zeiten kostete 1 Unze des Samen 1 ungarischen Gulden. *Ammi copticum* L. Koptische Haardolde o. A. *Visnaga* Lam. Berendes p. 304.

33.

Petroselinum: Kraut und Samen von *Petroselinum sativum* Hoffm. Von *p. macedonicum* die Wurzel. Doch ist dieses letztere *p.* eine in Mazedonien wild wachsende Varietät nach Cordus nicht erhältlich. Fälschlich verwendeten die Apotheker *semen olusatri* = *p. cilicicum* = *smyrnion*: *Smyrnum perfoliatum* L.

34.

Secacul: Schakakul bei E. B. II. p. 102 = *pastinaca alba et silvestris* = *siseris* *Sium Sisarum* L. Zuckerwurzel. Als Ersatz dient *Daucus Carota* L. Var. *silv.* Vergl. Fischer-Benzon

p. 118 f. Cordus übersetzt Secacul mit klingelmören, was auf obige Wurzel zutrifft.

35.

Nigella: Gleich *melanthium*. Die Samen von *Nigella sativa* L. Schwarzkümmel.

Origanum: Wolgemuet Galeazzo, Wolmut Stainpeis. Nach Diosk. 3 Arten: *O. heracleoticum* L., scharfer Dosten, *O. vulgare* var. *album* L., Gemeiner Dosten und *O. creticum* L. Letzteres kam in großen Mengen auf den venetianischen Markt (Clusius).

Menthastrum: Pachmincen Stainpeis. Der lateinische Name deutet auf *Mentha silvestris* L., der deutsche auf *M. aquatica* L. Verwendet wurde das Kraut.

Daucus: Nach Stainpeis wurde d. von einigen für *pastinaca silvestris* erklärt. *Daucus Carota* L. Var. *silv.* gemeine Möhre. *D. creticus*, dessen echte Samen von Venedig bezogen wurden, ist *Athamanta cretensis* L. Kretische Augenwurz.

Laurus: Die Blätter und Beeren von *Laurus nobilis* L. Die später erwähnte *laurus alexandrina* ist *Ruscus Hypophyllum* L. Lorbeerblättriger Mäusedorn.

Sagapenum: Wahrscheinliche Mutterpflanze *Ferula persica* Willd. o. *F. Scowitziana* D. C. Dragendorff p. 494 ff. Gleichbedeutend mit *serapinum* (Gummiharz).

Opopanax: Gummiharz von *panakes* bei Diosk. *Opopanax Chironium* Koch. Dragendorff.

36.

Asarum: 5400 P. haschwurz, T. haselwurtz, H. hasselwurz, weirichkraut Stainpeis. Auch *asara baccara*, bei Diosk. *asaron*, in Verona und Umgebung auch *baccara* genannt. *Asarum europaeum* L. Gemeine Haselwurz.

Berberis: *Oxyacantha* bei Diosk.; weintling, Stainpeis, *baccae oxyacanthae*, weinzepfel, weinlegeln, erbselen, saurach Passau. Die Früchte von *Crataegus Oxyacantha* L. Gemeiner Weißdorn. Unter Umständen kann auch *Berberis vulgaris* L. Saurach, Weinschädling verwendet werden (Clusius), was, nach den deutschen Namen zu schließen, bei uns Regel gewesen zu sein scheint.

Scariola: Gleich cicorea, wegwardt Stainpeis, intubus sativus im Disp. Aug., bei Galeazzo ist cicorea = sponsa solis, solsequium: Cichorium Intybus L. Wegwart, während er unter scariola die endivia (intubus sativus, hortensis, endivia vera sativa unseres Dispensatoriums) Cichorium Endivia L. Endivie versteht. Intybum bei Cordus ist gleich unserer scariola. In Verwendung waren Kraut, Samen und Wurzel.

37.

Epithymus: Thimseyden Passau. Das Kraut von Cuscuta Epithymum Murr. Die später erwähnte cassuta = cuscutha, seidenkraut (Passau), filzakraut (Stainpeis) ist wohl C. Epilinum Weihe — Flachsseide.

Polypodium: Bei Galeazzo auch silex quercinus; stainbuerczen, tropffenbuerczen (Stainpeis). Kraut und Wurzel von Polypodium vulgare L. Gemeiner Tüpfelfarn.

Fumus terrae: Gleich fumaria; brodesplat H., himelschlüssel (Stainpeis), Kraut, Blüten und Samen von Fumaria officinalis L. Gebräuchlicher Erdrauch.

Eupatorium: Grasskuniguntkraut. Es ist nicht gleichbedeutend mit salvia agrestis (H. wilder salveyen Salvia silvestris L.), wie einige Apotheker behaupten (Stainpeis). Das Kraut von Eupatorium cannabinum L. Außerdem: eupatorium graecorum = agrimonia: Agrimonia Eupatorium L. Odermennig und eupat. Mesue = ageratum, gratiola: Achillea Ageratum L. Berendes p. 395.

39.

Lacca: Das Harz von Aleurites laccifera Willd. hervorgehoben durch die Stiche von Coccus Lacca. Nach Clusius und Disp. Colon. nicht mehr erhältlich.

Sabina: Seylpawm 5400 P.; seyffenbaum H., segelpem Stainpeis Juniperus Sabina L. Sadebaum.

Costus: Costus arabicus L. Kostwurz.

Rubea tinctorum vera: Galeazzo erwähnt eine major: Rubia tinctorum L. Färberwurzel, röttelbuerczen (Stainpeis), welche nach unserem Dispensatorium aus Schlesien bezogen werden sollte und eine minor: Galium Aparine L. Klebkraut. Vergl. Fischer-Benzon p. 82.

Die bisher verwendete Wurzel stammte vielleicht vom wilden Krapp *Rubia lucida* L.

Aristolochia: Holwuertzen (Stainpeis). Es gibt eine *longa*, *rotunda* und *tenuis*. *Aristolochia longa* L., *A. rotunda* L. u. *A. baetica* L. Letztere bezeichnet Cordus als einheimische *longa*. Vielleicht meinte er damit *A. Clematitis* L. In Disp. Aug. u. Colon. wie bei Cordus ist in diesem Rezepte nur *a. rotunda* (*aristolochia* schlechtweg) erwähnt.

Bdellium: Das Harz von *Commiphora africana* Engl. Dragen-dorff p. 369.

Diese Vorschrift wird auch *Dialacca major* genannt.

40.

Meu: Die Wurzel von *Meum athamanticum* Jacq. Bärwurz; perbuerczen, wild tillen wuerczen, anetum agreste (Stainpeis). Als Ersatz *seseli creticum* behrwurtz, siehe dieses oder *radix imperatoria* meisterwurtz; *Imperatoria Ostruthium* L. Meisterwurz. Fischer-Benzon p. 121.

Opobalsamum: Balsamsaft. Der echte Balsam, wohl von *Amyris gileadensis* L. war bereits im Mittelalter nicht mehr im Handel. Der Saft aus den Früchten hieß *carpobalsamum*, aus dem Holze *xylobalsamum*. Als Ersatz dienten *oleum nucis muscatae*, *caryophyllorum* und *lignum aloës*.

Scolopendria: Nach Cordus = *ceterach* = *scolopendria minor* bei Galeazzo 5400. *Asplenium Ceterach* L. *asplenium* unseres Dispensatorium's.

Scolopendria (major) T. hirsszungen; hierschenzungen (Stainpeis) ist der Wurzelstock von *Asplenium Scolopendrium* L., Hirschenzunge. Die Vorschrift des Cordus verlangt aber hier *ceterach*, d. i. *scolopendria minor*.

Das Präparat heißt bei Cordus *Diacurcuma major*.

41.

Limatura chalybis: Gleich *scoria ferri*, *squama o. batitura ferri* Eisenschlacke.

Althaea: Nach Stainpeis gleich *malvaviscus*, *eviscus*, *bismalva*, eybischkraut, graspapeln. Kraut und Wurzel von *Althaea officinalis* L. Eibisch.

Betonica: Kraut und Blüten von *Betonica officinalis* L.
Betonie.

Tamariscus: Wilder segelpem Stainpeis. *Tamarix germanica* L.
Dieses und das folgende Präparat fehlt bei Cordus.

42.

Pistachium: Die Frucht von *Pistacia vera* L.

43.

Testiculi satyrii: Die Wurzelknollen von *Ophrys anthropophora* L. Berendes p. 348, stendelbuerczen (Stainpeis). Die echten kommen sehr selten in den Handel, statt ihrer verwendet man die *testiculi canis*: *Orchis papilionacea* L. (Clusius).

Pastinaca sativa: Die Wurzel von *Pastinaca sativa* L.
Pastinak.

Nux Indica: Die Frucht von *Cocos nucifera* L. Kokosnuß.

Eruca: Die Samen von *Eruca sativa* L., weißer seniff, Stainpeis. Derselbe bemerkt, daß dieser nicht mit *Sinapis alba* L. (*sinapis alba*) identisch ist.

Lingua avis: Gleich *fraxinus*. Die Samen von *Fraxinus excelsior* L. Gemeine Esche.

Scincus: Eine Eidechse mit verkümmerten Gliedmassen. *Scincus officinalis* L. Apotheker-Skink. Cordus bemerkt, daß die Apotheker bisher die „Wassermolchen sive Wasser-Eydexen“ (Triton) verwendeten, was aber unzulässig ist. Der echte Skink wurde von Alexandrien aus beschafft.

44.

Peucedanum: Die Wurzel von *Peucedanum officinale* L. Gemeiner Haarstrang.

Saxifragia: Kraut und Samen von *Saxifraga granulata* L.
Steinbrech, Heilkraut.

Chamaedrys: *Quercula minor*, klein aichen Stainpeis. Blätter und Blüten von *Teucrium lucidum* L. Gamanderstrauch.
Berendes p. 330.

Asparagus: Wurzel und Samen von *Asparagus acutifolius* L. und *A. officinalis* L.

Urtica: Kraut und Samen von *Urtica pillulifera* L. Pillennessel; *urtica romana* die Blätter von *Urtica urens* L. Brennessel.

Amomum: Unter diesem Namen kamen im Mittelalter die Früchte von *Myrtus Pimenta* L., *Sion Amomum* L., *Piper Cubeba* L., *Eugenia caryophyllata* Thunberg vor. Berendes p. 40. *Cordus* substituiert *acorus*, *carpesium*, *cubeba*, unser *Dispensatorium acorus*, *calamus aromaticus*, *rosa hierochuntica odorata* (*Anastatica hierochuntica* L.).

Milium solis: Merhersch. Zieht nach Michael Puff aus Schrick die Würmer aus dem Körper (Stainpeis). H. sunnenhirss. Kraut und Samen von *Lithospermum officinale* L. In Niederösterreich wild wachsend. Unter *milium* schlechtweg prein (Stainpeis) ist *Panicum miliaceum* L. Hirse und *P. italicum* L., Kolbenhirse zu verstehen. Fischer-Benzon p. 165.

Euphorbium: Die Mutterpflanze ist *Euphorbia resinifera* L. — Älteres Harz ist besser, doch kommt es meist zu alt und verdorben in den Handel (Clusius).

Lapis lyneis: Auch phrygischer Stein; ein lockeres alaunhaltiges Mineral.

45.

Ein Arzt Justus wird bei Galenus erwähnt. Richtiger lautet der Titel bei *Cordus*: *Electuarium Justinum*.

Enula campana: Alantbuerczen (Stainpeis), auch *elenium*, die Wurzel von *Inula Helenium* L. Echter Alant.

Arthemisia: H. beypos, buggl, Stainpeis sunibent guertel. Das Kraut von *Artemisia vulgaris* L. Gemeiner Beifuß.

Pentaphyllon: Gleich *quinguefolium*. Kraut und Wurzel von *Potentilla reptans* L. Kriechender Gänsefuß.

Orobus verus: Die Samen von *Vicia Ervilia* L. Linsenwicke.

Petroselinum Macedonicum: Nach *Cordus* gleich *olusatrum*.

46.

Sorbus: P. 5400, eschritz, Stainpeis erschriczen. Die Frucht von *Sorbus domestica* L. Speierling. In Niederösterreich Arschitzen. Höfer-Kronfeld p. 141.

Lapis haematites: Blutstein, Roter Glaskopf, Roteisenstein.

Plantago: Major: wegradt, minor: lanceolata, spiczigwegrat
 Stainpeis. Kraut und Samen von *Plantago major* L. und *Pl.*
lanceolata L.

Diese Vorschrift fehlt bei Cordus.

47.

Agaricus: T. tannenschwamm. *Polyporus officinalis* Fr. Lärchen-
 schwamm.

Thus: Gleich *olibanum*. Weihrauchharz von den Mutterpflanzen
Boswellia Charterii Bird und *B. Bhaudajiana* Bird. Th. mas-
 culum = *stagonias* Diosk. p. 83. sogenannter Tropfenweihrauch
 galt als beste Qualität.

Thlaspi: Stainpeis teschelkraut. *Capsella Bursa Pastoris*
 Mönch.

Juncus odoratus: Gleich *schoenanthos*.

Stoechas: St. arabica, die Blüten von *Lavandula Stoechas* L.
 Ährenförmiger Lavendel. Berendes p. 282.

Terebinthina: In Betracht kommen der einheimische von *Pinus*
Laricio Poir. Schwarzföhre und der venezianische Terpentin
 von *P. Larix* L.

Polium: *P. creticum* vel *montanum*, Stainpeis marichplaimen.
 Das Kraut von *Teucrium creticum* L.

Arum: Die Wurzel von *Arum maculatum* L. Zehrwurz.

Hypericon: Auch *herba Sti Johannis*, *perforata* Galeazzo. Kraut,
 Blüten und Samen von *Hypericum perforatum* L. Gemeines
 Hartheu.

48.

Napus: Gleich *bunias* bei Diosk. Die Samen von *Brassica*
Napus L. Steckrübe.

Marrubium: Gleich *ballota* bei Diosk. Die Blätter von *Ballota*
nigra L. Schwarzer Andorn. Berendes p. 333.

Chamaepitys: Vergismein nit (Stainpeis). Die Blätter von
Ajuga Iva Schreb. *Iva Günsel*.

Chalcitis usta: *Vitriolum* Stainpeis. Kupferhaltiger Eisenvitriol.

Bitumen: *B. judaicum* = *asphaltum*. Asphalt vom toten Meer,
 nach Stainpeis häufig mit Pech verfälscht. -- Das flüssige
 b. ist *petroleum*, das feste, *asphaltum*: das babylonische hieß
naphtha. Clusius.

Centaureum: *C. majus* *Centaurea* *Centaureum* L. Die sogenannte Rhapontikawurzel (Clusius) und *C. minus* fieberkraut Stainpeis, Blätter und Wurzel von *Erythraea* *Centaureum* Pers. Tausendguldenkraut.

Das vorliegende Rezept stimmt weder mit dem Original bei Galenus, noch mit der Vorschrift anderer Dispensatorien überein. Auch das 1592 in die Akten der Wiener medizinischen Fakultät eingetragene Rezept weist kleine Abänderungen auf.

50.

Hyoscyamus: Auch *jusquiamus*. Kraut und Samen von *Hyoscyamus niger*, *aureus*, *albus* L. Schwarzes, gelbes, weißes Bilsenkraut.

99.

Citonium: *cydonium*, *cotonea*, die Blüten, Kerne und Früchte von *Pirus* *Cydonia* L. Quittenbaum.

101.

Struthium citonium: Eine Abart der Quitte, der Sperlingsapfel, Birnquitte, welche im neapolitanischen Gebiete vorkommt und sehr starken Geruch besitzt.

102.

Bei *Cordus* nicht vorhanden.

103.

Viscum quercinum: Der Leim von der Eichenmistel *Loranthus europaeus* Jacqu.

Paeonia mascula: Blätter, Blüten und Samen von *Paeonia corallina* Retz. Berendes p. 355.

Unicornu: Nach Stainpeis das Horn vom Rhinoceros, dessen Bild, wahrscheinlich die Reproduktion nach A. Dürer, der Wiener Buchhändler Lucas (Alantsee) im Laden hängen hatte. Das echte u. ist aber der Stoßzahn des Narwal und noch heute in alten Apotheken als Schaustück zu sehen.

Diese Vorschrift und die folgende fehlen bei *Cordus*.

104.

Os sepieae: Die Schuppe vom Tintenfisch. *Sepia officinalis*.

Alumen: *A. crudum* ungereinigter, plumosum faseriger, leicht zerreiblicher, ustum gebrannter Alaun. *A. zuccarinum* Alaun mit Zucker und Eiweiß gemischt.

108.

Santonicum: Als Mutterpflanze gilt *Artemisia Cina* L. Dragen-
dorff 678.

Corallina: Darunter dürften wohl Kraut und Wurzel von *Polypodium vulgare* L. Tüpfelfarn, Korallenwurzel zu verstehen sein.

Tanacetum: *Athanasia*, rainfalkraut Stainpeis. Das Kraut von *Tanacetum vulgare* L. Rainfarn, Wurmkraut.

Persicum: Die Blätter von *Amygdalus Persica* L. Pfirsich.

Lupinus: Blätter und Samen von *Lupinus albus* L. Wolfsbohne.

Graminis radix: Die Wurzel von *Agropyrum repens* Beauv.
Quecke.

Diese und die folgende Vorschrift 109 fehlt bei Cordus.

109.

Quercus: Die Eicheln von *Quercus* L. Arten; cupula glandis, das Näpfchen der Eichel; galla, ein durch Stiche von *Cynips* Arten entstandener Auswuchs. H. aichaphl.

Anthera: Rosensamen.

Sumach: Die Samen von *Rhus coriaria* L. Gerberbaum.

Sanguis draconis: Das Harz von *Daemonorops Draco* Bl.

110.

Grana pini majoris: Pinienkerne von *Pinus Pinea* L.

Anguria: Gleich citrullus.

Alkakengi: Auch testiculi sacerdotales (Galeazzo), pfaffenhödel, pfaffenteschel (Stainpeis), halikakabon Diosk., elkahandsch bei E. B. I. p. 182. *Physalis Alkekengi* L. Judenkirsche.

111.

Fehlt bei Cordus.

112.

Sempervivum: *S. majus*, hauswuerezen Stainpeis: Die Blätter von *Sempervivum arboreum* L. Baumartige Hauswurz; *s. minus* = *vermicularis* vnser frauen prasen, ertpfeffer, stainpfeffer (Stainpeis) *Sedum amplexicaule* D. C.

Ladanum: Die Stammpflanze *Cistus creticus* L. Klebriges Ziströschen (Gummi). Berendes p. 113.

116 bis 118.

Fehlt bei Cordus.

119.

Psyllium: Blätter und Samen von *Plantago Psyllium* L. Flohsamenwegerich.

Lactuca: *Sativa* = *Lactuca sativa* L. Gartensalat, *l. silvestris* = *L. Scariola* L. Giftlattich. Von ersterem Blätter und Samen.

121.

Jujuba: *T. habotten*, die Früchte von *Zizyphus sativa* Gaertn.

Malva: *Id est m. parva*, die Blätter, Blüten und Samen von *Malva rotundifolia* L. Runde Käsepappel; *m. magna* = *bis-malva* = *althaea*.

Capillus Veneris: Gleich *adanthum nigrum*, *capillus Veneris verus*: *Asplenium Adiantum nigrum* L. und *a. album*: *Aspl. Ruta muraria* L. Galeazzo 5400 welsch frauenhaar, *T. mur-ruten*, Stainpeis widertodt. Wird von Venedig beschafft.

131.

Fehlt bei Cordus.

132.

Epatica: *T. leberkrut*, Stainpeis leberkraut. Derselbe unterscheidet eine *aquatica*, lichen bei Diosk. Cordus identifiziert sie ebenfalls damit. In Betracht kommen: *Pettigera canina* Hoffm. o. *P. aphtosa* Hoffm. o. *Lecanora Parella* Ach. Berendes p. 392. Die *e. terrestris* dürfte wohl *Anemone hepatica* L. sein. Die erstgenannte wurde hier verwendet.

Flores cordiales: Nach Disp. Aug.: *rosa*, *viola*, *borrago*, *buglossa*, *melissa*.

133.

Intybus sativus uterque: Nach Cordus gleich *endivia domestica*, *silvestris*.

Taraxicon: Gleich *dens leonis*. Die Blätter von *Leontodon Taraxacum* L. Löwenzahn.

Cicerbita: Gleich *sonchus levis*. Das Kraut von *Sonchus oleraceus* L. Sanddistel.

Lupulus: Das Kraut von *Humulus Lupulus* L., Hopfen.

Asplenium: Gleich *ceterach* *Asplenium Ceterach* L. Gebräuchlicher Milzfarn. (Blätter.)

Trichomanes: Gleich *polytrichum* (Cordus). *Asplenium Trichomanes* L. Streifenfarn. (Blätter.)

136.

Mespilus: Die Frucht von *Mespilus germanica* L. Gemeine Mispel.

139.

Sena: Die Blätter von *Cassia Senna*.

Elleborus niger: Christburzen, swarczniessburzen (Stainpeis) *Helleborus officinalis* L., schwarze Nieswurz; *e. albus* niestburzen (Stainpeis). *Veratrum album* L. Weißer Germer.

Chamomilla: (*chamaemeli*) Camilln, in Böhmen und Mähren hermendel (heute hörmandl Höfer-Kronfeld) Stainpeis. *Parthenium*, *matricaria* bei Diosk. Blätter und Blüten von *Matricaria Chamomilla* L. Mutterkraut und *Chrysanthemum Parthenium* Pers.

145.

Verbena: Eissenkraut, Stainpeis. Die Blätter von *Verbena officinalis* L.

Chelidonia: *Chelidonium majus* L. Großes Schöllkraut.

Euphrasia: Auch *euphrasia*, augentrost (Stainpeis). *Euphrasia officinalis* L.

Diese Vorschrift fehlt bei Cordus.

146.

Ruscus: Auch *bruscus*, bruschkenwurtz, Passau, *myrsine agria* Diosk. Die Wurzel von *Ruscus aculeatus* L. Stechender Mäusedorn.

147.

Bei Cordus Syrupus Dinarii sive byzantinus simplex Mesue genannt, sonst ganz gleich.

150.

Sebesten: Gleich persea Diosk. Die Frucht von Cordia Myxa L. Schwarzer Brustbeerenbaum.

151.

Prassium: Lawskletten Galeazzo, andorn H., marubium, sant bernhardinkraut Stainpeis. Marrubium vulgare L. Andorn.

Linum: Linum usitatissimum L.

Foenugraecum: Trigonella Foenum graecum L.

152, 153.

Fehlt bei Cordus.

154.

Calamintha domestica: Nepeta Cataria L., Steinminze, c. silvestris = c. montana = nepita Stainpeis. Nach Berendes p. 288 wäre: c. montana = Mentha tomentella Link, nepeta = M. gentilis L. c. silv. = Thymus Calamintha L.

157.

Prunus: Die Frucht von Prunus domestica L. Anstatt pr. damascena, die in Wien nicht zu haben war, empfiehlt Stainpeis die von Mähren und Siebenbürgen. Pr. silvestris = Prunus spinosa L.

Tamarindus: Die Frucht von Tamarindus indica L.

159.

Persicaria: Gleich herba St. Mariae, hydropiper, flöhkraut Passau. Das Kraut von Polygonum Hydropiper L., Wasserpfeffer.

Comae matricariae: Nach Disp. Aug. = matricaria cum flore. Diese Vorschrift stammt von Johannes Matthaeus de Gradibus (Ferrari aus Grado), Arzt zu Pavia, gestorben 1460.

163.

Seylla: Die Wurzel von *Scilla maritima* L., Meerzwiebel.

166.

Konrad Gessner aus Zürich 1516 bis 1565. Über seine Bedeutung für das Studium der Botanik vergl. E. Meyer, Geschichte der Botanik IV., p. 322 ff.

Mentha crispa: *Mentha crispa* L., Krauseminze.

Turbith: Soll das alypon des Diosk. sein. — Auf den Markt kam nur die Wurzel (Clusius). — *Globularia alypum* L., dreizählige Kugelblume.

Esula: Gleich *tithymalus*, und zwar nach Disp. Col. e. major = *pytusa* Diosk. *Euphorbia pityusa* L., Wachholderblättrige Wolfsmilch; e. minor = *cyparissias*: *E. cyparissias* L. oder *E. aleppica* L.: e. rotunda: *peplos*: *E. Peplus* L. Berendes p. 458 ff. (Wurzel).

169.

Ribes: *Ribes rubrum* L. sant joans per (Stainpeis). Nach dessen Mitteilung in den Gärten der Karthause zu Mauerbach in großen Mengen gebaut.

172.

Juglans: *Juglans regia* L., Walnuß.

173.

Morus Celsi: Gleich *morus*, mauelper Stainpeis. *Morus nigra* L.

182.

Ungula caballina: Gleich *bechium*, farfara, *tussilago*, das Kraut von *Tussilago farfara* L. Huflattich.

186.

Capparus: *Capparis spinosa* L. Gemeine Kapper.

Das ganze Kapitel über Dekokte fehlt bei Cordus.

187.

Branca ursina: *Perntaczen* Stainpeis. Das Kraut von *Heracleum Spondylium* L.

Mercurialis: Mistmalten, hunczmalten, scheismalten, Stainpeis.
Mercurialis annua L. Ruhrkraut.

Parietaria: Gleich *helxine*, *cissampelos convolvulus*. Das Kraut
von *Convolvulus arvensis* L. Ackerwinde. Berendes p. 385.

188.

Fehlt bei Cordus.

189.

Matthiolum Peter Andreas (1501 bis 1577), Kommentator des
Dioskurides. Vergl. E. Meyer a. a. O. IV., p. 366 ff.

Charyophyllata: Auch *benedicta caryoph.* Die Wurzel von
Geum urbanum L., Nelkenwurz.

Sclarea: Gleich *horminum*, *gallitrichum* bei Diosk. Das Kraut
von *Salvia Horminum* L.

Serpyllum: Kundelkraut Stainpeis. *Thymus Serpyllum* L.

Amaracus: Gleichbedeutend mit *majorana*.

191.

Avellana: *Coryllus Avellana* L.

196.

Caulis: *Brassica oleracea* Var. *capitata rubra* L. Roter Kopfkohl, wie ihn auch Stainpeis vorschreibt.

Diese Vorschrift sowie 197 bis 199 fehlt bei Cordus.

200.

Carthamus: Sitichkörner Stainpeis. *c. domesticus* — *enicus*
Diosk. Die Samen von *Carthamus tinctorius* L. Saflor.

201.

Florenzuole: Nach dem Florentiner Dispensatorium. Auch
bei Cordus.

205.

Solanum: Auch *solatrum*. Das Kraut von *Solanum nigrum* L.
Nachtschatten.

Spica aromatica: Gleich *sp. nardi*.

Manna: Himelthau Stainpeis. Der Saft von *Fraxinus Ornus* L.

207.

Lapis armenus: Wohl ein unserem Bergbau entsprechendes Kupferkarbonat. Berendes p. 522.

212.

Scammonea antiochena: Der eingedickte Saft von Convolvulus Scammonia L.

213.

Bartolomeo Montagnana, Professor in Padua, Sohn des gleichnamigen B., gab Ende des 15. Jahrhunderts ein Antidotarium heraus.

Hermodactylus: Zeitlas Stainpeis. Da derselbe die italienische Zwiebel vorschreibt, dürfte es sich um das in Südeuropa vorkommende Colchicum variegatum L., nicht um unser C. autumnale L. handeln.

215.

Colocynthis: Cucumis Colocynthis L. Koloquintengurke.

Ammoniacum: Als Stammpflanze des Harzes gilt Ferula tingitana L. Berendes p. 323.

217.

Nicolaus Myrepsus verfaßte zwischen 1270 und 1290 ein Rezeptbuch, welches 1541 unter dem Titel: Nicolaus Alexandrinus Liber de compositione medicamentorum gedruckt wurde.

220.

Nasturtium: Ostrutium, gartenkres Stainpeis. Derselbe erwähnt n. domesticum = kardamon Diosk. Lepidium sativum L. Gartenkresse und n. agreste, aquaticum Nasturtium officinale L. Brunnenkresse. Das später erwähnte n. album ist nach Cordus = thlapsi, Berendes p. 223, 236.

221, 222.

Bei Cordus nicht.

224.

Tartarus: Weinstein (Stainpeis). Saures weinsaures Kalium.

225.

Staphisagria: Laussamen (Stainpeis). Delphinium Staphisagria L.

Sinapis: Die Samen von Sinapis alba L.

232.

Sal gemmae: Kropfsalcz, steinsalcz (Stainpeis).

236.

Sarcocolla: Das Harz einer nicht näher bekannten persischen Astragalusart.

243.

Granum solis: Gleich milium solis.

244.

Porrum: Allium sativum L. Knoblauch (Stainpeis).

246.

Nitrum: Gleich sal nitri; sal indus unreine Soda n. alexandrinum Mauersalpeter. An dessen Stelle verwendet Disp. Colon. borax = nitrum fossile, worras Stainpeis.

Brassica: Gleich caulis. brassica marina, soldanella: Convolvulus Soldanella L. Kohlwinde.

247.

Mezereum: Gleich cocognidium, laureola. Nach Clusius thymelaia und chamelaia Diosk. Daphne oleoides L. und D. Gnidium L. (Kraut und Wurzel). Berendes p. 464.

253.

Cynoglossa: Das Kraut von Cynoglossum officinale L. Hundszunge.

Myrrha Trogloditae: Die Myrrhe aus dem Troglodytenlande an der Küste von Nubien und Habesch. Berendes p. 80.

266.

Agnus castus: T. Schafmilch. Vitex Agnus castus L. Keuschlamm.

267.

Pulegium cervinum: Gleich *dictamnus creticus* Disp. Aug.

269.

Agresta: Der Saft aus unreifen Weintrauben, auch *omphacium* genannt.

272.

Galla cupressi: Gleich *nux c.* (*Cordus*) *Cupressus semper-virens* L.

273.

Vipera: Gleich *tirus*. Zu Stainpeis Zeiten und noch später wurden die zum *Theriak* nötigen Vipernplätzchen aus Venedig eingeführt, da, wie *Cordus* bemerkt, die betreffenden Vipernarten *Vipera Aspis* Murr., *V. ammodytes* Dum. et Birr. (*Berendes* p. 158) in Deutschland nicht vorkommen. In gleichem Sinne spricht sich Disp. Colon. aus und äußert seine Befürchtung wegen häufiger Fälschung. Man sollte daher im Interesse „der gesammten Christenheit“ in Italien die Bereitung von Staatswegen überwachen und die Plätzchen amtlich siegeln. Die Zubereitung der *trochisci* war kurz folgende: Von etwa 20 im Mai gefangenen Vipernweibchen werden Kopf und Schweif abgehackt, die Körper abgehäutet und ausgeweidet. Das fettfreie Fleisch wird über Kohlen- oder Rebenholzfeuer so lange mit etwas Dill und Salz gekocht, bis es sich von den Knochen löst. Nun knetet man das Fleisch mit gerösteter Brotkrume durch und formt Pastillen im Gewichte von zwei Drachmen, welche nach frühestens 15 Tagen getrocknet in Büchsen verpackt werden und erst nach einem Jahre in Gebrauch kommen.

275.

Marum: Das Kraut von *Origanum sipyleum* L. *Berendes* p. 291. Als Ersatz verwendet *Cordus* *majorana* o. *dictamnus creticus*.

Aspalathum: Bereits im 15. Jahrhundert nicht mehr erhältlich. Ist die Rinde eines nicht näher bekannten Strauches. Als Ersatz: *lignum aloës*, *santalum citrinum*, *semen agni casti*. (*Cordus*).

276.

Onyx: Gleich *blatta byzantia*, *unguis odoratus*. Die Schalen von *Murex inflatus* L. Zackige Stachelschnecke. Berendes p. 155.

279.

Turbith arundinaceum: Die Wurzel (*turbith*) kam wie ein Rohr hohl auf den Markt, daher der Name. (Clusius.)

283.

Thymiama: Gleich *styrax rubea*.

Asa dulcis: Gleich *benzoin*, das Harz von *agallochon* (Diosk.) *lignum aloës* (Clusius). Das echte Aloëholz (*agallochon*) als Räucherwerk dürfte gar nicht nach Europa gekommen sein. Stainpeis bemerkt mit Berufung auf den Reisenden Ludovicus de Bononia, daß die feinste Sorte *calampat* an Ort und Stelle in „Sarnau“ per Pfund mit 10 Dukaten bezahlt wurde.

Als Stammpflanzen: *Aloëxylon Agallochon* Lour. und

Aquilaria malacensis Lam. Vergl. auch Berendes p. 49 f.

Lavandula: Kraut und Blüten von *Lavandula Spica* L.

Carbo tiliae: Lindenkohle, *Tilia europaea* L.

286.

Cerussa: *Psimythion*, Bleiweiß.

288.

Aes ustum: Rot und schwarz. Kupferoxydul und Kupferoxyd.

289.

Pompholyx: *Nihil album*, Zinkoxyd.

Cadmia usta: Gebrannter Galmei.

Samii Asteris: Eine Sorte, welche einen Stern (*Aster*) als Marke trug. Berendes p. 555.

290.

Flos aeris: Kupferoxydul.

Atramentum sutorium: *Melanteria* Diosk., *vitriolum*, Stainpeis. Aus den Grubenwässern stammender unreiner Kupfervitriol.

12*

Nach Matthiolus wäre es Chalkanthon Diosk., welches ebenfalls für Kupfervitriol gedeutet wird.

Arsenicum: Am gebräuchlichsten war a. citrinum, gelber huttrich (Auripigment) Stainpeis, dann a. rubrum (Realgar) Berendes p. 531.

Spuma maris: Halkyonion Diosk. Davon fünf Arten aus der Familie der Korallen: Alcyoneum cortoneum Pall., A. papillosum Pall., A. palmatum Pall., A. Ficus Pall oder A. Auran-tium Pall und Spongia panicea Pall. Berendes p. 540.

Disp. Aug. nennt h. rotundum = pilae sive paleae marinae. A. Ficus Pall. galt als spuma maris schlechtweg.

Sal ammoniacum: Unreines ägyptisches Natronsaltz, welches im Mittelalter nicht mehr versendet wurde. An dessen Stelle: s. gemmae.

Collyria kommen bei Cordus nicht vor.

299.

Mandragora: Alraun. Die Alraunmännlein wurden häufig aus der Bryoniawurzel hergestellt, Stainpeis. Die Wurzel von Atropa Mandragora L. Alraun.

305.

Lilium album: Lilium candidum L. (Blüten).

Oleum omphacinum: Das Öl aus unreifen Oliven.

314.

Abrotanum: A. masculum: Artemisia Abrotanum L. a. feminum: A. arborescens. L. (Kraut.)

319.

Cheiri: Leucoium luteum, die Blüten von Cheiranthus Cheiri L. Goldlack.

321.

Primula veris: Herba paralysis, die Blüten von Primula officinalis Jacq.

324.

Momordica: Balsamina, cucumis asininus, silv. Ecballium Elaterium Rich. Der eingedickte Saft der unreifen Frucht: elaterium.

326.

Rondeletius Guil. aus Montpellier (1507—1566) verfaßte ein Dispensatorium. Colon. 1565. Bei Cordus ist die Vorschrift nach Mesue.

331.

Ricinus: Palma Christi, die Samen von Ricinus communis L. Wunderbaum.

336.

Mumia: Eine Mischung aus Aloë, Myrrhe, Safran und Balsam, wie sie aus den balsamierten Leichen in Ägypten gesammelt wurde. Da diese aber auch mit Pech und Asphalt konserviert wurden, schreibt man der mumia dieselben Wirkungen wie dem pissaphaltos des Diosk. (Asphalt und Theer) zu. Weder m. noch p. sind erhältlich (Clusius). Später kamen ganze Leichenteile als m. in den Handel, worüber Ludovicus de Bononia berichtet. Stainpeis hält es nicht für ausgeschlossen, daß schlechte Händler derartiges verkaufen.

339.

Gummi hederæ: Nach Stainpeis von Venedig bezogen. Das Harz von Hederæ Helix L.

Colophonia: Pix graeca, das Destillationsprodukt aus dem Öl von Terebinthina communis L. o. laricina L.

Resina alba: Weispech Stainpeis, pix alba. Das Harz von Pinus Picea L., P. Abies L., P. Larix L.

340.

Populus: Die harzigen Laubknospen von Populus nigra L.

Cimæ rubi: Die Zweigspitzen von Rubus tomentosus Willd u. Var.

Crassula: Nach Disp. Aug. = alterum acetabulum Diosk. Die Wurzel von Umbilicus erectus L., Berendes p. 421. Nach Cordus fetthenne, bei Fischer-Benzon p. 80 crassula major = Sedum Telephium L. und Var. In den anderen Disp. wird an dessen Stelle bardana = lappa major, arkeion Diosk. Arctium Lappa L. verwendet. Disp. Aug. deutet bardana fälschlich für lapathon Diosk. Lappa personata = l. major.

Cymbalium: Umbilicus Veneris, scatuncellum, hennendarm (Stainpeis). Das Kraut von Alsine media L.

347.

Oesipus humidus: Hysopus h. Das Wollfett mit dem Schweiß der Tiere vermischt.

349.

Bryonia: Vitis alba, scheibuerczen Bryonia celtica L.

Cyclamen: Artanita, ertburtzen Stainpeis. Cyclamen europaeum L. Alpenveilchen.

352.

Pseudonardus: Bei Plinius nat. hist. XII. c. 26 erwähnt. Valeriana celtica L.

Iva: I. arthetica = chamaeipyttis, I. muscata nach Disp. Aug. das zweite polion Diosk. Teucrium capitatum L. doch könnte wohl auch die zweite chamaeipyttis Diosk. Passerina hirsuta L. dafür gelten.

Ebulus: Attich Galeazzo. Sambucus Ebulus L.; Sambucus: T. holder = S. nigra L.

Esbrium: An dessen Stelle im Disp. Aug. ebulus. Von Cordus für majorana o. flores salviae gedeutet.

354.

Iridis: Disp. Aug. und Cordus haben iari. Iarum = serpentaria, dracunculus, die Blätter und Wurzel von Arum Dracunculus L. Große Drachenwurz.

Pulicaria major, minor: Nach Cordus = konyza Diosk. Erigeron graveolens L. u. E. viscosum L. (Kraut). Berendes p. 344.

Nepeta: Gleich gattaria, calamintha.

355.

Filix: Der Wurzelstock von Aspidium Filix mas L. Gemeiner Wurmfarne.

Tribulum aquaticum: Die Samen von Trappa natans L. Wassernuß.

357.

Consolida major: Gleich *anagallis*, *symphytum* Diosk., swarczburtz 5400 Galeazzo, beinwelle H., walwurtz T., schwarczburczen Stainpeis; *Symphytum officinale* L. *Consol. media* nach 5400 Galeazzo gechhayl: *Anagallis coerulea* L. und *A. arvensis* L. Gauchheil, nach unserem Dispensatorium = *prunella*: (auch Stainpeis): *Prunella vulgaris* L. *Consol. minor* nach 5400 Galeazzo = *sanicula*, wintergrün. Unser Dispensatorium nennt eine *sanicula alba*: *Symphytum Brochum* Bory und *rubra*, welche wohl der *consol. major* entspricht. *Consol. sarracenica*, haidnisch wundkraut Stainpeis: *Senecio sarracenicus* L., *consol. aurea* s. *regalis*: *Delphinium Consolida* L. Feld-Rittersporn. Mit Recht bemerkt Stainpeis, daß bezüglich der *consolida* unter den Autoren große Meinungsverschiedenheit herrscht.

Urtica pinguis: Gleich *mollis*, *romana*. Kraut und Samen von *Urtica urens* L. Berendes p. 421.

Millefolium: Nach der Bezeichnung gochal Stainpeis, heute gachelkraut gachheil (Höfer-Kronfeld) wäre an *Achillea Millefolium* L. zu denken. Unter gach'l versteht man aber auch *Anagallis arvensis* L.! Vergl. über die Bedeutung von *millefolium* auch Fischer-Benzon p. 74.

Diese Vorschrift fehlt bei Cordus.

359.

Spuma argenti: *Lithargirium*, Bleiglätte als Nebenprodukt bei der Silbergewinnung. Nur rasch abgekühlte helle Bleiglätte wurde so genannt; die langsam abgekühlte lith. auri, minium oder *cinnabaris* (nebenbei auch für Zinnober) Berendes p. 519.

Plumbum ustum: Schwefelblei.

Antimonium praeparatum: Schwefelantimon.

360.

Tutia: *Pompholyx* in unreinem Zustande.

Lapis calaminaris: Geriebener Galmei.

Die Vorschriften 359 bis 362 fehlen bei Cordus.

363.

Castanea: Die Frucht von *Castanea sativa* Mill.

Cauda equina: Das Kraut von *Equisetum fluviatile* Gouan
und *E. arvense* o. *limosum* L.

364 bis 369, 372, 373, 376.

Bei Cordus nicht.

366.

Argentum vivum: *Servus fugitivus*, *mercurius*.

Nikolaus Massa, Arzt in Venedig, gestorben 1564.

369.

Pix navalis: Zopissa Diosk. Das abgekrazte Schiffspech (Harz,
Wachs und Seesalz.)

374.

Aerugo: *Viride aeris*, Grünspan, Kupferkarbonat.

376.

Sulphur vivum: Natürlicher Schwefel zum Unterschied vom
sublimierten.

378.

Ulmus: *Ulmus campestris* L. Feldulme.

379, 382, 383, 389, 390, 391.

Bei Cordus nicht.

381.

Melilotum: *Melilotus officinalis* L.

Armeniacum: Gleich ammoniacum.

383.

Labrusca: Die Blüten von *Vitis silvestris* L.

389.

Raphanus: *Raphanus sativus* L. Gartenrettig.

394.

Sanguis hominis ruffi: Seu robusti (Stainpeis); auch im Disp. Aug. Das durch Aderlaß gewonnene Blut wurde mit einem gespaltenen Rohr gepeitscht und stehen gelassen, bis der Blutkuchen, der später an der Sonne getrocknet wurde, sich absetzte.

Arnaldus de Villa Nova (1235 bis 1312).

Notizen zum Catalogus.

- 1) *Pes leonis*, *stellaria*, *aster atticus* Diosk. — *Aster Amellus* L.
- 2) *Myrrhis* Diosk. *Myrrhis odorata* L.
- 3) *Senecio vulgaris* L.
- 4) Die Blätter von *Fragaria vesca* L. Erdbeere.
- 5) *Geranium tuberosum* L.
- 6) *Saponaria officinalis* L.
- 7) *Gingidion* Diosk. *Lepidium sativum* L.
- 8) *Periklymenon* Diosk. *Lonicera caprifolium* L.
- 9) *Myrike* Diosk. *Tamarix africana* Desf. o. *Sarothamnus scoparius* Wimm. Fischer-Benzon p. 218.
- 10) *Bupleurum rotundifolium* L. Durchwachs.
- 11) Nach Disp. Aug. = *leimonion*, *Statice Limonium* L.
- 12) *Pulmonaria officinalis* L. Lungenkraut.
- 13) *Galiopsis* Diosk. *Scrophularia peregrina* L.
- 14) *Buphthalmus*. *Sideritis scordioides* L.
- 15) *Convallaria Polygonatum* L.
- 16) *Daphnoides* Diosk. *Daphne alpina* L. Alpenseidelbast.
- 17) *Vincetoxicum officinale* Mnch. Schwalbenwurz.
- 18) *Centaurea Cyanus* L. Kornblume.
- 19) *Convallaria majalis* L.
- 20) *Secale cereale* L. Roggen.

- 21) *Amarantus Blitum* L. Amarant, dessen rote Var. *blitum rubrum* hieß.
- 22) *Aquilegia vulgaris* L. Akelei.
- 23) *Cannabis sativa* L. Hanf.
- 24) *Allium Cepa* L.
- 25) *Cicer arietinum* L.
- 26) *Conium maculatum* L.
- 27) *Spartium junceum* L.
- 28) Die trächtigen Weibchen der Kermesschildlaus *Lecanium Illeis* L., welche auf der Kermeseiche vorkommen.
- 29) Gleich *napus*.
- 30) *Rosa canina* L.
- 31) *Sesamum orientale* L.
- 32) *Semecarpus Anacardium* L. fil. Die sogenannte Elephantenlaus (Samen).
- 33) Kranaigel Stainpeis. *Strychnos nux vomica* L.
- 34) *Asphodelus racemosus* L. u. *albus* Willd.
- 35) Gleich *chamelaia*.
- 36) Bei Diosk. 3 Arten *Eringium viride* Link, *E. campestre* L. und *E. maritimum* L. Berendes p. 276.
- 37) *Spiraea filipendula* L. oder *Pedicularis tuberosa* L.
- 38) *Tussilago Petasites* L. Pestwurz.
- 39) *Sedum Rhodiola* D. C.
- 40) *Ferula Asa foetida* L.
- 41) *Guajacum officinale* L. Franzosenholz.
- 42) *Lytta vesicatoria* L.
- 43) Nach Cordus eine gezähnte Seemuschel.
- 44) Weißer Hundekot.
- 45) Dasselbe Exkrement wie Moschus, von der Zibetkatze.

Notizen zur Beilage (Taxa venditionis).

- 1) Nach Cordus = *spica celtica*.
 - 2) Gleich *ricinus*.
 - 3) *Thlaspi arvense* L. Pfennigkraut.
-

Abkürzungen.

- Berendes: Des Pedanios Dioskurides aus Anazarbos Arzneimittellehre, übersetzt von B. Stuttgart Ferd. Enke 1902.
- Clusius: Vergl. das Riceptario, welches Clusius übersetzte. Einleitung III.
- Cordus: Valerius Cordus. Vergl. Einleitung III.
- Diosk.: Vergl. Berendes.
- Disp. Aug.: } Vergl. Einleitung III.
- Disp. Colon.: }
- Dragendorff: Die Heilpflanzen der verschiedenen Völker und Zeiten. Stuttgart. Ferd. Enke 1898.
- E. B.: Abu Mohammed Abdallah Ben Achmed aus Malaga (Ebn Baithar). Große Zusammenstellung über die Kräfte der einfachen Heil- und Nahrungsmittel. Übersetzt von J. Sontheimer. 2 Bände. Stuttgart 1840 bis 1842.
- Fischer-Benzon: Altdeutsche Gartenflora. Kiel 1894.
- Galeazzo: G. de Sta Sophia, dessen Arzneimittellehre Cod. 5156, 5361, 5396, 5400 (von Wolfgang Pürckl geschrieben und mit Randnoten versehen). K. u. k. Hofbibliothek in Wien.
- H.: Aufzeichnungen von Herman Haym von Rothenburg in Cod. P. 33, fol. 170 ff. Königliche öffentliche Bibliothek Dresden.
- Höfer-Kronfeld: Die Volksnamen der niederösterreichischen Pflanzen. Wien 1889.
- Passau: Reformation Passawerischer Aerzt- u. Apotheker-Ordnung. Aufgericht im Jahr 1586. Gedruckt zu Passaw durch Mattheum Nenninger.
- Peters: Aus pharmazeutischer Vorzeit in Bild und Wort Neue Folge. Berlin, J. Springer 1889.
- T.: Joh. Tollat von Vochenberg. Margarita medicinae 1497.

Lateinisches Register.

A.

- abrotanum 180.
 absinthium 153.
 Acacia vera Willd. v. gummi arabicum.
 acetabulum alterum v. crassula.
 acetosa, acetosella 160.
 Achillea Ageratum L. v. eupatorium;
 A. Millefolium v. millefolium.
 Aconitum Napellus L. v. doricum.
 acorus v. amomum, calamus.
 Acorus Calamus L. v. calamus.
 adianthum v. capillus Veneris.
 aerugo 184.
 aes ustum 179.
 aetites 160.
 agallochon v. asa dulcis.
 agaricus 168.
 ageratum v. eupatorium.
 agnus castus 177 v. aspalathum.
 agresta 178.
 agrimonia v. eupatorium.
 Agrimonia Eupatorium L. v. eupatorium.
 Agropyrum repens Beauv. v. graminis radix.
 Ajuga Iva Schreb. v. chamaepitys.
 album graecum 134.
 alchimilla 123.
 Alcyoneum Aurantium, cortoneum,
 Ficus, palmatum, papillosum Pall.
 v. spuma maris.
 Aleurites laccifera Willd. v. lacca.
 alkakengi 170.
 alleluja v. acetosa.
 Allium Cepa L. v. cepa; A. sativum
 v. porrum; A. Scorodoprasum
 L. v. scordium.
 allium v. scordium.
 aloë 151.
 Aloë perfoliata seu vera L. v. aloë.
 Aloëxylon Agallochon Laur. v. asa
 dulcis.
 Alpinia Galanga Willd., A. officinarum
 Hance v. galanga.
 Alsine media L. v. cymbalum.
 althaea 165 v. malva.
 Althaea officinalis L. v. althaea.
 alumen 170.
 alypon v. turbith.
 amaracus 175.
 amaranthus purpureus 127.
 Amarantus Blitum L. v. amaranthus
 purpureus.
 ambra 151.
 ameos v. ammi.

*) Die Zahlen 150—185 weisen auf die Seite hin, wo das Schlagwort zu finden ist. Bei den Zahlen 123—136, 142—147 ist zuerst das Schlagwort auf der betreffenden Seite und dann auf 185 f. die Erklärung zu suchen. v. = vide.

- ammi 162.
 Ammi copticum L., A. Visnaga v. ammi.
 ammoniacum 176.
 amomum 167.
 Amomum Cardamomum L., A. granum Paradisi L. v. cardamomum; A. Zedoaria L. v. zedoaria.
 amygdalae 154.
 Amygdalus communis Var. amara v. amygdalae; A. persica v. persicum.
 amylum 154.
 Amyris gileadensis L. v. opobalsamum.
 anacardium 128.
 Anacyclus Pyrethrum D. C. v. pyrethrum.
 anagallis v. consolida.
 Anagallis arvensis L. v. millefolium, A. arvensis, coerulea L. v. consolida.
 Anastatica hierochuntica L. v. amomum.
 Anchusa italica Retz v. buglossum.
 Andropogon Ischaemum L., A. Schoenanthus L. v. schoenanthum; A. Nardus L. v. calamus.
 Anemone hepatica L. v. epatica.
 anethum 153. a. agreste v. meu.
 Anethum Foeniculum L. v. foeniculum; A. graveolens L. v. anethum.
 angelica 160.
 Angelica silvestris L. v. angelica.
 anguria 170; v. citrullus.
 anisum 153.
 anthera 170; v. rosa.
 anthos v. rosmarinum.
 antimonium 183.
 antispodium (antispodon) 158.
 apium 157.
 Apium graveolens L. v. apium.
 Aquilaria malacensis Lam. v. asadulcis.
 aquilegia 127.
 Aquilegia vulgaris v. aquilegia.
 archangelica v. angelica.
 Arctium Lappa v. crassula.
 argentum vivum 184.
 arilli v. passula.
 aristolochia 165.
 Aristolochia baetica L., Clematidis L., longa L., rotunda L. v. aristolochia.
 arkeion v. crassula.
 arkeuthos v. juniperus.
 armeniacum 184.
 arsenicum 180.
 artanita v. cyclamen.
 Artemisia Abrotanum L. arborescens L. v. abrotanum; A. Absinthium L., pontica L. v. absinthium; vulgaris L. v. arthemisia; A. Cina L. v. santonicum.
 arthemisia 167.
 arum 168.
 Arum Dracunculus L., v. iridis, A. maculatum L. v. arum.
 asa dulcis 179, foetida 132.
 asara baccara v. asarum.
 asarum (asaron) 163.
 Asarum europaeum L. v. asarum.
 aspalathum 178.
 asparagus 166.
 Asparagus acutifolius L., officinalis L. v. asparagus.
 asphaltum v. bitumen.
 asphodelum 129.
 Asphodelus racemosus L., albus Willd. v. asphodelum.
 Aspidium Filix mas L. v. filix.
 asplenium 172, v. scolopendria.
 Asplenium Adiantum nigrum L., A. Ruta muraria L. v. capillus Veneris; A. Ceterach L. v. asplenium, scolopendria; A. scolopendrium L. v. scolopendria; A. Trichomanes L. v. trichomanes.
 Aster amellus L. v. alchimilla.
 aster atticus v. alchimilla.

Astragalus L. v. *sarcocolla*, *traga-*
cantha.
Athamanta cretensis L. v. *daucus*.
athanasia v. *tanacetum*.
atramentum sutorium 179.
Atropa Mandragora L. v. *mandra-*
gora.
aurantium 159.
avellana 175.

B.

baccara v. *asarum*.
balaustium 156.
ballota v. *marrubium*.
Ballota nigra L. v. *marrubium*.
Balsamea Myrrha Engl. v. *myrrha*.
balsamina v. *momordica*.
balsamita 158.
Balsamodendron Myrrha Nees v.
Es. v. *myrrha*.
Bambusa arundinacea Schreb. v.
antispodium.
bardana v. *crassula*.
basilicum v. *ocimum*.
batitura ferri v. *limatura chalybis*.
bdellium 165.
bechium v. *ungula caballina*.
been 152.
benedicta charyophyllata v. *charyo-*
phyllata.
benzoin v. *asa dulcis*.
berberis 163.
Berberis vulgaris L. v. *berberis*.
beryllus 158.
betonica 166.
Betonica officinalis L. v. *be-*
tonica.
bismalva v. *althaea*, *malva*.
bistorta 161, v. *tormentilla*.
bitumen 168.
blatta byzantia v. *onyx*.
bolus armenus 154.
bombax 159.
borax v. *nitrum*.
borrago 157.
Borrage officinalis L. v. *borrago*.

Boswellia Bhaudajiana Bird., B.
Charteri Bird. v. *thus*.
branca ursina 174.
brassica 177.
Brassica oleracea L., *capitata*
rubra L. v. *caulis*; B. *Napus* L.
v. *napus*.
bruseus v. *ruseus*.
bryonia 182.
Bryonia celtica L. v. *bryonia*.
buglossum 158.
bunias v. *napus*.
buphthalmus v. *sideritis*.
Bupleurum rotundifolium L. v.
perfoliata.

C.

cadmia usta 179.
calamintha sicca, *montana* 162; c.
domestica 173 v. *nepeta*.
calampat v. *asa dulcis*.
calamus 162, v. *amomum*.
calendula 160.
Calendula officinalis L. v. *calen-*
dula.
camphora 154.
canabis 127.
Canabis sativa L. v. *canabis*.
canella v. *cinnamomum*, *cubebae*.
Canella alba Murr. v. *cinnamomum*.
cubebae.
cantharides 133.
capillus Veneris 171.
Capparis spinosa L. v. *capparus*.
capparus 174.
Capsella Bursa Pastoris L. v.
thlaspi.
carabe 152, v. *ambra*.
carbo tiliae 179.
cardamomum 151.
carduus benedictus 159.
carica 155.
carneolus 157.
carpesium v. *amomum*, *cubebae*.
carpobalsamum v. *opobalsamum*.
carthamus 175.

- Carthamus tinctorius* L. v. *carthamus*, *crocus*.
cartilago de corde cervi v. *os de corde cervi*.
Carum Carvi L. v. *carvum*.
carvi v. *carvum*, *cuminum*.
carvum 156.
caryophylli 150.
Charyophyllus aromaticus L. v. *caryophylli*.
cassia 152, v. *cinnamomum*.
Cassia Senna L. v. *sena*.
cassutha v. *epithymus*.
castanea 184.
Castanea sativa Mill. v. *castanea*.
castoreum 153.
Castor fiber v. *castoreum*.
cathaputia 148 v. *ricinus*.
cauda equina 184.
caulis 175, v. *brassica*.
celidonia v. *chelidonia*.
Centaurea Centaurium L. v. *centaureum*; *C. cerinthifolia* Sibth. v. *been*; *C. Cyanus* v. *cyanum*.
centaureum 169.
cepa 127.
cerussa 179.
ceterach v. *asplenium*, *scolopendria*.
chalcitis usta 168.
chalkanthon v. *atramentum sutorium*.
chamaedrys 166.
chamaeleon v. *chardopatum*.
chamaemeli v. *chamomilla*.
chamelaia v. *mezereum*.
chamaepitys 168, v. *iva*.
chamomilla 172.
chardopatum 129 v. *chamelaia*.
charyophyllata 175.
charyophylli v. *caryophylli*.
Cheiranthus Cheiri L. v. *cheiri*.
cheiri 180.
chelidonia 172, *minor* v. *angelica*.
Chelidonium majus L. v. *chelidonia*.
cherefolium 123.
Chrysanthemum Parthenium Pers. v. *chamomilla*.
cicer 127.
Cicer arietinum L. v. *cicer*.
cicerbita 172.
Cichorium Endivia L., *Intybus* L. v. *scariola*.
cicuta 127.
cimae rubi 181.
cinnabaris v. *spuma argenti*.
cinnamomum 150, v. *cassia*.
Cinnamomum camphora Fr. Nees v. *camphora*; *C. Cassia* Blume, *ceylanicum* Nees v. *cassia*, *cinnamomum*.
cissampelos v. *parietaria*.
Cistus creticus v. *ladanum*.
citonium 169.
citraria v. *melissa*.
citreus malus 157.
citrullus 154.
Citrus Aurantium L. v. *aurantium*.
C. Limonum Risso v. *citreus malus*.
cnicus v. *carthamus*.
Cnicus Benedictus Gaertn. v. *carduus benedictus*.
Coccus Lacca v. *lacca*.
cocognidium v. *mezereum*.
Cocos nucifera L. v. *nux indica*.
Colchicum autumnale L. v. *crocus*; *C. variegatum* L. v. *hermodactylus*.
colocynthis 176.
colophonia 181.
comae matricariae 173.
Commiphera africana Engl. v. *bdellium*.
Conium maculatum L. v. *cicuta*.
consolida 183 v. *tormentilla*.
Convallaria majalis L. v. *lilium convallium*; *C. Polygonatum* L. v. *sigillum Salomonis*.
convolvulus v. *parietaria*.

Convolvulus arvensis L. v. *parietaria*; *C. Scammonia* L. v. *scammonaea*; *C. Soldanella* L. v. *brassica*.
corallina 170.
corallium 152.
Cordia Myxa L. v. *sebesten*.
coriandrum 158.
Coriandrum sativum L. v. *coriandrum*.
cornu cervi ustum 159.
Corylus Avellana L. v. *avellana*.
costus 164.
Costus arabicus L. v. *costus*.
cotonea v. *citonium*.
crassula 181.
Crataegus Oxyacantha v. *berberis*.
cristallus 160.
crocus 152.
Crocus sativus L. v. *crocus*.
cubebae 152, v. *amomum*.
cucumis 154, *asininus*, *silvestris* v. *momordica*.
Cucumis Colocynthis L. v. *colocynthis*; *C. Melo* L. v. *melo*; *C. sativus* L. v. *cucumis*.
cucurbita 154.
Cucurbita Citrullus L. v. *citrullus*; *C. lagenaria* L., *C. Pepo* L. v. *cucurbita*.
Cuminum Cyminum L. v. *cyminum*.
Cupressus sempervirens L. v. *galla cupressi*.
cupulae glandium v. *quercus*.
cuscutha v. *epithymus*.
Cuscuta Epilinum Weihe, *Epithymum Murr.* v. *epithymus*.
cyanum 126.
cyclamen 182.
Cyclamen europaeum L. v. *cyclamen*.
cydonium v. *citonium*.
cymbalum 182.
cyminum 156.
Cynips v. *quercus*.
cynoglossa 177.

Cynoglossum officinale L. v. *cynoglossa*.
cyparissias v. *esula*.
cyperus 158.
Cyperus longus L., *rotundus* L. v. *cyperus*.
Cytinus Hypocistis L. v. *hypocistis*.

D.

dactylus 155.
Daemonorops Draco Bl. v. *sanguis draconis*.
Daphne alpina L. v. *vinca pervinca*; *D. Gnidium* L., *oleoides* L. v. *mezereum*.
daphnoides v. *vinca pervinca*.
daucus 163.
Daucus Carota L. Var. *silv.* v. *daucus*, *secacul*.
Delphinium Staphis agria L. v. *staphisagria*; *D. Consolida* L. v. *consolida*.
dens leonis v. *taraxicon*.
dentalium 134.
dictamnus 159, v. *marum*.
Dictamnus albus L. v. *dictamnus*.
doronicum 150.
Doronicum Pardalianches L. v. *doronicum*.
dracunculus v. *iridis*.
dragaganthum v. *tragacantha*.

E.

ebulus 182 v. *esbrium*.
ebur v. *rasura eboris*; *e. ustum* v. *antispodium*, *spodium*.
Ecballium Elaterium Rich. v. *momordica*.
elaterium v. *momordica*.
elenium v. *enula campana*.
elkakandsch v. *alkakengi*.
elleborus 172.
endivia domestica, *silvestris* v. *intybus sativus uterque*; *e. vera sativa* v. *scariola*.
enula campana 167.

epatica 171.
 epithymus 164.
 Equisetum arvense L., fluviatile L.,
 limosum L. v. cauda equina.
 erigeron 124.
 Erigeron graveolens L., viscosum
 L. v. pulicaria.
 eringium 130.
 Eringium campestre L., maritimum
 L., viride Link. v. eringium.
 eruca 166.
 Eruca sativa L. v. eruca.
 Erythraea Centaurium L. v. cen-
 taureum.
 esbrium 182.
 esula 174.
 Eugenia caryophyllata Thumbg. v.
 amomum.
 eupatorium 164.
 Eupatorium cannabinum L. v. eupa-
 torium.
 Euphorbia aleppica L., Cyparissias
 L., Peplus L., Pityusa L. v. esula;
 E. resinifera L. v. euphorbium.
 euphorbium 167.
 eupragia v. euphrasia.
 euphrasia 172.
 Euphrasia officinalis L. v. euphrasia.
 eviscus v. althaea.

F.

farfara v. ungula caballina.
 Ferula Asa foetida L. v. asa foe-
 tida; F. persica Willd., Scowitzi-
 ana D. C. v. sagapenum; F. tin-
 gitana L. v. ammoniacum, gal-
 banum.
 ficus v. carica.
 Ficus Carica L. v. carica.
 filipendula 130.
 filix 182.
 flores cordiales 171.
 flos aeris 179.
 foeniculum 156.
 foenugraecum 173.
 folium Indum 150.
 Dr. Senfelder, Dispensatorium.

fragaria 124.
 Fragaria vesca L. v. fragaria.
 fraxinella v. dictamnus.
 fraxinus v. lingua avis.
 Fraxinus excelsior L. v. lingua
 avis; F. Ornus L. v. manna.
 fu, fuw v. valeriana.
 fumaria v. fumus terrae.
 Fumaria officinalis L. v. fumus
 terrae.
 fumus terrae 164.

G.

galanga 151.
 galbanum 161.
 galiopsis v. scrophularia.
 Galium Aparine L. v. rubea tinc-
 torum.
 galla v. quercus; g. cupressi 178.
 gallitrichum v. sclarea.
 gattaria v. calamintha.
 genista 127.
 gentiana 161.
 Gentiana lutea L., nivalis L. v.
 gentiana.
 geranium 124.
 Geranium tuberosum L. v. gera-
 nium.
 Geum urbanum L. v. charyophyl-
 lata.
 gingidion v. lepidium.
 Globularia Alypum L. v. turbith.
 gluten romanum v. mastiche.
 glycyrrhiza 153.
 Glycyrrhiza glabra L. v. glycyrrhiza.
 Gossypium arboreum W. v. bombax.
 graminis radix 170.
 grana paradisi v. cardamomum;
 g. pini 170; g. tinctorum 127.
 granatus 157. v. lapides quinque.
 granum solis 177 v. milium solis.
 gratiola v. eupatorium.
 guajacum 133.
 Guajacum officinale L. v. guajacum.
 gummi arabicum 153; g. hederæ 181.

H.

halikakabon v. alkakengi.
 halyonion v. spuma maris.
 Hedera Helix L. v. gummi hederæ.
 Helleborus officinalis L. v. elleborus.
 helxine v. parietaria.
 Heracleum Spondylium L. v. branca ursina.
 herba benedicta, gatte v. valeriana;
 h. paralysis v. primula veris; h.
 St. Johannis v. hypericon; h.
 St. Mariae v. persicaria; h. tunicae 124.
 hermodactylus 176.
 horminum v. sclarea.
 Humulus Lupulus L. v. lupulus.
 hyacinthus v. lapides quinque.
 hydropiper v. persicaria.
 hyoseyamus 169.
 Hyoseyamus albus L., aureus L.,
 niger L. v. hyoseyamus.
 hypericon 168.
 Hypericum perforatum L. v. hypericon.
 hypocistis 156.
 hysopus humidus v. oesipus humidus.
 hyssopum 155.
 Hyssopus officinalis L. v. hyssopum.

I.

iarum v. iridis.
 Imperatoria Ostruthium L. v. meu.
 intubus, intybum v. scariola.
 intybus 172.
 Inula Helenium L. v. enula campana.
 ireos v. iris.
 iridis 182.
 iris 155.
 Iris florentina L., germanica L. v.
 iris; I. foetida L., pseudacorus L.
 v. calamus.
 Isis nobilis v. corallium.

juglans 174.
 Juglans regia L. v. juglans.
 jujuba 171.
 juncus 168.
 juniperus 159.
 Juniperus communis L., nana Sm.,
 Oxycedrus L., phoenicea L. v.
 juniperus; J. Sabina L. v. sabina.
 jusquiamus v. hyoseyamus.
 iva 182.

K.

kalamus v. calamus.
 kardamon v. nasturtium.
 konyza v. pulicaria.

L.

labrusca 184.
 lacca 164.
 lactuca 171.
 Lactuca sativa L., Scariola L. v.
 lactuca.
 ladanum 171.
 lapathon v. acetosa, crassula.
 lapides quinque pretiosi 160.
 lapis armenus 176, l. calaminaris 183, l. haematites 167, l. lyncis 167.
 lappa v. crassula.
 lappation v. acetosa.
 laureola v. mezereum.
 laurus 163.
 Laurus Cassia Ait. v. cassia, folium;
 L. Cinnamomum L. v. cinnamomum; L. nobilis L. v. laurus.
 lavandula 179.
 Lavandula Spica L. v. lavandula;
 L. Stoechas L. v. stoechas.
 Lecanium Ilicis L. v. grana tinctorum.
 Lecanora Parella Ach. v. epatica.
 leimonion v. pirola.
 lentiscus v. mastiche.
 Leontodon Taraxacum L. v. taraxicon.

lepidium 124.
 Lepidium sativum L. v. lepidium,
 nasturtium.
 leucoium v. cheiri.
 levisticum 153.
 Levisticum officinale Koch v. le-
 visticum.
 lichen v. epatica.
 lignum aloës v. aloë, asa dulcis,
 aspalathum, opobalsamum.
 ligusticum v. levisticum.
 lilium album 180, convallium 126.
 Lilium candidum L. v. lilium album.
 limatura chalybis 165.
 limones v. citreus malus.
 lingua avis 166.
 linum 173.
 Linum usitatissimum L. v. linum.
 Liquidambar orientalis Mill. v.
 styrax.
 liquiritia v. glycyrrhiza.
 lithargirium v. spuma argenti.
 Lithospermum officinale L. v. mi-
 lium solis.
 Lonicera caprifolium L. v. matri-
 sylvia.
 Loranthus europaeus Jacqu. v.
 viscum.
 lubna (lubue) v. styrax.
 lupinus 170.
 Lupinus albus L. v. lupinus.
 lupulus 172.
 Lytta vesicatoria v. cantharides.

M.

macis 150.
 majorana 158 v. amaracus, esbrium,
 marum.
 malabatrū (malabathron) v. fo-
 lium.
 malva 171.
 Malva rotundifolia L. v. malva.
 malvaviscus v. althaea.
 mandragora 180.
 manna 175.
 Maranta Galanga L. v. galanga.

marathrum v. foeniculum.
 margaritae 152.
 marrubium 168 v. prassium.
 Marrubium vulgare L. v. prassium.
 marum 178.
 mastiche 157.
 matricaria v. chamomilla; m. cum
 flore v. comae matricariae.
 Matricaria Chamomilla L. v. cha-
 momilla.
 matrisylva 124.
 melantheria v. atramentum suto-
 rium.
 melanthium v. nigella.
 melilotum 184.
 Melilotus officinalis L. v. meli-
 lotum.
 melissa 158.
 Melissa officinalis L. v. melissa.
 melo 154.
 mentha aquatica v. balsamita; m.
 crispa 174; m. sicca 162.
 Mentha aquatica L., silvestris
 Koch v. balsamita, menthastrum;
 M. crispa L. v. mentha crispa;
 M. gentilis L., tomentella Link.
 v. calamintha domestica; M.
 Pulegium L. v. pulegium; M.
 sativa L. v. mentha sicca.
 menthastrum 163.
 mercurialis 175.
 Mercurialis annua L. v. mercuri-
 alis.
 mercurius v. argentum vivum.
 mespilus 172.
 Mespilus germanica L. v. me-
 spilus.
 meu 165.
 Meum athamanticum Jacqu. v.
 meu.
 mezereum 177.
 millefolium 183.
 milium solis 167 v. granum solis.
 minium v. spuma argenti.
 mirtus v. cubeba.
 momordica 180.

morus 174.
Morus nigra L. v. morus.
 morsus diaboli v. scabiosa.
 moschus 151.
Moschus moschiferus v. moschus.
 mumia 181.
Murex inflatus L. v. onyx.
 muscus v. moschus.
 myrica (myrike) 124.
Myristica aromatica L. v. macis,
 nux muscata.
 myrobalani 158.
 myrrha 156, m. *Troglodytae* 177.
 myrrhis 185.
Myrrhis odorata L. v. cherefolium.
 myrsine v. ruscus.
 myrtilli 157.
 myrtus v. cubebae, myrtilli.
Myrtus communis L. v. cubebae,
 myrtilli; *M. Pimenta* L. v. amomum.

N.

naphtha v. bitumen.
 napus 168.
Nardostachys Jatamansi D. C. v.
 spica indica.
 nardus 151; n. indica v. spica indica.
 nasturtium 176 v. thlaspi.
Nasturtium officinale L. v. nasturtium.
 nenuphar v. nymphaea.
 nepeta 182 v. calamintha domestica,
 gattaria.
Nepeta Cataria L. v. calamintha domestica.
 nigella 163.
Nigella sativa L. v. nigella.
 nihil album v. pompholyx.
 nitrum 177.
 nucleus pini v. pinea.
 nummularia 149.
 nux cypressi v. g. cupressi; n. indica 166; n. muscata v. macis,
 opobalsamum; n. vomica 129.

nymphaea 156.
Nymphaea alba L., lutea L. v.
 nymphaea.

O.

ocimum 152.
Ocimum Basilicum L., integerrimum
 W. v. ocimum.
 oesipus humidus 182.
 oleum omphacinum 180.
 olibanum v. thus.
 olusatrum v. petroselinum macedonicum.
 omphacium v. agresta.
 onyx 179.
Ophris anthropophora L. v. testiculi satyrii.
 opium 164.
 opobalsamum 165.
 opopanax 163.
Opopanax Chironium Koch. v. opopanax.
Orchis papilionacea L. v. testiculi satyrii.
 origanum 163.
Origanum creticum L., heracleoticum L., vulgare L. v. origanum;
 O. *Dictamnus* L. v. dictamnus;
 O. *Majorana* L. v. majorana; O.
 sipyleum L. v. marum.
 orobus verus 176.
 os de corde cervi 158.
 os sepiae 170.
 ostrutium v. nasturtium.
 oxyacantha v. berberis.
 oxylapathon v. acetosa.

P.

paeonia 169.
Paeonia corallina Retz. v. paeonia.
 palma Christi v. ricinus.
 panakes v. opopanax.
Panicum italicum L., miliaceum L.
 v. milium solis.
 papaver 154.
Papaver somniferum L. v. papaver.

- parietaria 175.
 parthenium v. chamomilla.
 Passerina hirsuta v. iva.
 passula enucleata 155.
 passularia v. passula enucleata.
 pastinaca alba, silvestris v. secacul;
 p. sativa 166; p. silvestris v.
 daucus.
 Pastinaca sativa L. v. pastinaca
 sativa.
 Pedicularis tuberosa L. v. filipen-
 dula.
 penidiae 154.
 pentaphyllon 167.
 peplos v. esula.
 perfoliata 125.
 perforata v. hypericon.
 periklymenon v. matrisylva.
 perseae v. sebesten.
 persicaria 173.
 persicum 170.
 pes leonis v. alchimilla.
 petasites 130.
 petroleum v. bitumen.
 petroselinum 162; p. macedoni-
 cum 167.
 Petroselinum sativum Hoffm. v.
 petroselinum.
 Pettigera aphtosa Hoffm., canina
 Hoffm. v. epatica.
 peucedanum 166.
 Peucedanum officinale L. v. peuce-
 danum.
 Phoenix dactylifera L. v. dac-
 tylus.
 phu v. valeriana.
 Phyllanthus Emblicus Willd. v. myro-
 balani.
 Physalis Alkekengi L. v. alka-
 kengi.
 pilae (paleae) marinae v. spuma
 maris.
 pimpinella 160.
 Pimpinella Anisum v. anisum; P.
 Saxifraga L. v. pimpinella.
 pinea 154.
 Pinus Cembra L. v. pinea; P. La-
 ricio Poir. Larix L. v. terebin-
 thina; P. Picea L., Abies L. v.
 resina alba; P. Pinea L. v. grana
 pini.
 piper 151.
 Piper Cubeba L. v. amomum, cu-
 bebae; P. longum L., nigrum v.
 piper.
 pirola 125.
 Pirus Cydonia L. v. citonium.
 pissasphaltos v. mumia.
 pistachium 166.
 Pistacia Lentiscus L. v. mastiche;
 P. vera L. v. pistachium.
 pityusa v. esula major.
 pix alba v. resina alba; p. graeca
 v. colophonia; p. navalis 184.
 plantago 168.
 Plantago lanceolata L., major L.
 v. plantago; P. Psyllium L. v.
 psyllium.
 plumbum ustum 183.
 polion v. iva.
 polium 168.
 Polygonum Bistorta L. v. bistorta;
 P. Hydropiper L. v. persicaria.
 polypodium 164.
 Polypodium vulgare L. v. coral-
 lina, polypodium.
 Polyporus officinalis L. v. agaricus.
 polytrichum v. trichomanes.
 pompholyx 179, v. tutia.
 populus 181.
 Populus nigra L. v. populus.
 porrum 177.
 portulaca 156.
 Portulaca oleracea L. v. portu-
 laca.
 potentilla v. valeriana.
 Potentilla reptans L. v. penta-
 phyllon.
 Poterium sanguisorba v. pimpi-
 nella.
 prassium 173.
 primula veris 180.

Primula officinalis Jacqu. v. *primula veris*.
prunella v. *consolida*.
Prunella vulgaris L. v. *consolida*.
prunus 173.
Prunus domestica L. v. *prunus*; *P. spinosa* L. v. *gummi*, *prunus*.
pseudonardus 182.
psimythion v. *cerusa*.
psyllium 171.
Pterocarpus santalinus L. fil. v. *santalum*.
pulegium 155; *p. cervinum* 178, v. *dictamnus*.
pulicaria 182.
pulmonaria 125.
Pulmonaria officinalis L. v. *pulmonaria*.
Punica Granatum L. v. *balaustium*.
pyretrum 157.
pytiusa v. *esula*.

Q.

quercula minor v. *chamaedrys*.
quercus 170.
Quercus L. v. *quercus*.
quinquefolium v. *pentaphyllon*.

R.

radix imperatoria v. *meu*.
rapa 126, v. *napus*.
raphanus 184.
Raphanus sativus L. v. *raphanus*.
rasura eboris 157.
resina alba 181; *r. pini* v. *pix navalis*.
rha v. *rhobarbarum*.
rhobarbarum 160.
rhaponticum, *rheuponticum* v. *rhobarbarum*.
Rheum palmatum, *Rh. Rhaponticum* L. v. *rhobarbarum*.
rhodiae radix 130.
Rhus coriaria L. v. *sumach*.
ribes 174.
Ribes rubrum L. v. *ribes*.

ricinus 181.
Ricinus communis L. v. *ricinus*.
rosa 153; *r. hierochuntica* v. *amomum*.
Rosa canina L. v. *rubus*; *R. centifolia* L. v. *rosa*.
rosmarinum 153.
Rosmarinus officinalis L. v. *rosmarinum*.
rubea tinctorum 164.
Rubia lucida L., *tinctorum* L. v. *rubea tinctorum*.
rubus caninus 128.
Rubus tomentosus Willd. v. *cimae rubi*.
Rumex Acetosa L., *Acetosella* L., *bucephalophorus* L., *crispus* L., *Patientia* L. v. *acetosa*.
ruscus 172.
Ruscus aculeatus L. v. *ruscus*; *R. Hypophyllum* L. v. *laurus*.
ruta 156.
Ruta graveolens L. v. *ruta*.

S.

sabina 164.
saccharum 152, *s. candi* 155.
sagapenum 163.
sal ammoniacum 180, *s. gemmae* 177, v. *ammoniacum*, *s. fossile*, *indus*, *nitri* v. *nitrum*.
saliunca 147.
salvia 160 v. *esbrium*, *s. agrestis* v. *eupatorium*.
Salvia Horminum L. v. *sclearea*; *S. officinalis* L. v. *salvia*; *S. silvestris* v. *eupatorium*.
sambucus v. *ebulus*.
Sambucus Ebulus L., *nigra* L. v. *ebulus*.
Samii Asteris 179.
sampsychon v. *majorana*.
sandalum v. *santalum*.
sanguis draconis 170; *hominis ruffi* 184.
sanguisorba v. *pimpinella*.

- sanicula v. consolida.
 santal rouge v. santalum.
 santalum 151 v. aspalathum.
 Santalum album L. v. santalum.
 santonicum 170.
 sapa vini dulcis 156.
 saphyrus 157. v. lapides quinque.
 Saponaria officinalis L. v. herba tunicae.
 sarcocolla 177.
 sardus 157. v. lapides quinque.
 Sarothamnus scoparius Wimm. v. myrica.
 satireja v. thymbra.
 Satureja capitata L. v. thymus; S. hortensis L., Thymbra L. v. thymbra.
 saxifraga v. pimpinella.
 Saxifraga granulata L. v. saxifragia.
 saxifragia 166.
 scabiosa 159.
 Scabiosa succisa L. v. scabiosa.
 scamonea 176.
 scariola 164.
 scatuncellum v. cymbalium.
 schakakul v. secacul.
 schoenanthum 158. v. juncus odoratus.
 Scilla maritima L. v. scylla.
 scineus 166.
 Scineus officinalis L. v. scineus.
 selarea 175.
 scolopendria 165.
 scordium 159.
 scoria ferri v. limatura chalybis.
 serophularia 125.
 Serophularia peregrina L. v. serophularia.
 scylla 174.
 sebesten 173.
 secacul 162.
 Secale cereale L. v. siligo.
 Sedum amplexicaule D. C. v. sempervivum; S. Rhodiola D. C. v. rhodiae radix; S. Telephium L. v. crassula.
 Semecarpus Anacardium L. fil. v. anacardium.
 semina quatuor etc. 155.
 sempervivum 171.
 Sempervivum arboreum L. v. sempervivum.
 sena 172.
 Senecio sarracenicus L. v. consolidida; S. vulgaris L. v. erigeron.
 Sepia officinalis v. os sepiae.
 serapinum v. sagapenum.
 sericum 152.
 serpentaria v. iarum.
 serpillum 175, v. valeriana.
 servus fugitivus v. argentum vivum.
 sesamum 128.
 Sesamum orientale L. v. sesamum.
 seseli 153 v. levisticum, meu.
 Seseli tortuosum L. v. seseli.
 sideritis 125.
 Sideritis scordioides L. v. sideritis.
 sigillum Salomonis 125.
 siler montanum v. seseli.
 silex quercinus v. polypodium.
 siligo 126.
 sinapis 177. v. eruca.
 Sinapis alba L. v. eruca.
 Sion Amomum L. v. amomum.
 siseris v. secacul.
 sisymbrium v. balsamita.
 Sium Sisarum L. v. secacul.
 smaragdus 157. v. lapides quinque.
 Smyrnum perfoliatum L. v. petroselinum.
 solanum 175.
 Solanum nigrum L. v. solanum.
 solatrum v. solanum.
 soldanella v. brassica.
 Solidago Virgo aurea v. tapsus.
 solsequium v. scariola.
 sonchus levis v. cicerbita.
 Sonchus oleraceus L. v. cicerbita.
 sorbus 167.
 Sorbus domestica L. v. sorbus.

spatula foetida v. calamus.
 Spartium junceum L. v. genista.
 spica aromatica 175; sp. celtica v.
 nardus, saliunca; sp. indica, 151;
 sp. nardi v. sp. aromatica; sp.
 silvestris v. valeriana.
 Spiraea filipendula L. v. filipen-
 dula.
 spodium v. antisodium, rasura
 eboris.
 Spongia panicea Pall. v. spuma
 maris.
 sponsa solis v. scariola.
 spuma argenti, auri 183, sp.
 maris 180.
 squama ferri v. limatura chalybis.
 squinanthum v. schoenanthum.
 stagonias v. thus.
 staphisagria 177.
 Statice Limonium L. v. been, pirola.
 stellaria v. alchimilla.
 stoechas 168.
 struthium citonium 169.
 Strychnos nux vomica L. v. nux
 vomica.
 styrax 155 v. thymiaia.
 Styrax officinalis L. v. styrax.
 succinum v. carabe.
 succisa v. scabiosa.
 sulphur vivum 184.
 sumach 170.
 symphytum v. consolida.
 Symphytum officinale L., Brochum
 Bory, v. consolida.

T.

tamarindus 173.
 Tamarindus indica v. tamarindus.
 tamariscus 166.
 Tamarix africana Desf. v. myrica;
 T. germanica L. v. tamariscus.
 tanacetum 170.
 Tanacetum vulgare L. v. tana-
 cetum.
 tapsus 160.
 taraxicon 172.

tartarus 176.
 terebinthina 168.
 Terebinthina communis L., laticina
 L. v. colophonina.
 Terminalia Bellerica Roxb., Che-
 bula Roxb., citrina Roxb., hor-
 rida Steud. v. mirobalani.
 terra lemnia, sigillata 161, v. Samii
 Asteris.
 testiculi canis, satyrii 166, sacer-
 dotales v. alkakengi.
 Teucrium capitatum L. v. iva; T.
 creticum L. v. polium, scordium;
 T. lucidum L. v. chamaedrys;
 T. Scordium L. v. scordium.
 thapsia 157.
 Thapsia Garganica L. v. thapsia.
 Thapsus L. v. tapsus.
 thlaspi 168, v. nasturtium.
 Thlaspi arvense L. v. nummu-
 laria.
 thus 168.
 thymbra 156.
 thymelaia v. mezereum.
 thymiaia 179 v. styrax.
 thymum vulgare v. hyssopum.
 thymus (thymum) 156.
 Thymus Calamintha L. v. cala-
 mintha domestica; Th. Serpyllum
 L. v. serpyllum; Th. vulgaris L.
 v. hyssopum.
 Tilia europaea L. v. carbo tiliae.
 tithymalus v. esula.
 tirus v. vipera.
 tormentilla 159.
 Tormentilla erecta L. v. tormen-
 tilla.
 tragacantha 153.
 Trappa natans L. v. tribulum.
 tribulum 182.
 trichomanes 172.
 Trigonella Foenum graecum L. v.
 foenugraecum.
 tripolion v. been.
 turbith 174, arundinaceum 179.
 tussilago v. ungula caballina.

Tussilago Farfara L. v. ungula
caballina; T. Petasites L. v. pe-
tasites.
tutia 183.

U.

ulmus 184.
Ulmus campestris L. v. ulmus.
umbilicus Veneris v. cymbalum.
Umbilicus erectus L. v. crassula.
unguis odoratus v. onyx.
ungula caballina 174, v. nymphaea.
unicornu 169.
urtica 167; u. mollis, pinguis 183,
u. mortua v. angelica.
Urtica pillulifera L., urens L. v.
urtica.
uva passa v. passula enucleata.

V.

Vaccinium Myrtillus L. v. myrtilli.
valeria v. valeriana.
valeriana 160.
Valeriana celtica L. v. nardus,
pseudonardus; V. Dioscoridis
Hawkins, officinalis L., Phu L. v.
valeriana.
Veratrum album L. v. elleborus.
verbascum v. tapsus.
Verbascum L., V. phlomoides L.,
thapsiforme Schrad., Thapsus L.
v. tapsus.
verbena 172.
Verbena officinalis L. v. verbena.
vermicularis v. sempervivum.
Vicia Ervilia L. v. orobus verus.

vinca pervinca 126.
vincetoxicon 126.
Vincetoxicon officinale Mnch. v.
vincetoxicon.
viola 153.
Viola odorata L., tricolor L. v.
viola.
violaria v. viola.
vipera 178.
Vipera ammodytes Dum. et Birr.,
Aspis Merr. v. vipera.
viride aeris v. aerugo.
viscum quercinum 169.
Vitex Agnus castus L. v. agnus
castus.
vitis alba v. bryonia.
Vitis silvestris L. v. labrusca.
vitriolum v. atramentum sutorium,
chalcitis usta.

X.

xylobalsamum v. opobalsamum.
xylum v. bombax.
xyris v. calamus.

Z.

zedoaria 150, rotunda v. zurumbeth.
zibethum 134.
zingiber 151.
Zingiber officinale Rosc. v. zingi-
ber; Z. Zerumbet Rosc. zurum-
beth.
zinziber v. zingiber.
Zizyphus sativa Gaertn. v. jujuba.
zopissa v. pix navalis.
zurumbeth 157.

Deutsches Register.

A.

achstein gelber v. carabe.
aichaphl v. quercus.

aichen klain- v. chamaedrys.
alantbuerczen v. enula campana.
ampferkraut v. acetosa.
andorn v. prassium.

attich v. *ebulus*.
 augmentrost v. *euphrasia*.
 axenzungen v. *buglossum*.

B. (Vergl. P.)

behrwurtz v. *meu*.
 beinwelle v. *consolida*.
 beyposs v. *arthemisia*.
 boretsch, borragen v. *borrago*.
 brodesplat v. *fumus terrae*.
 bruschkenwurtz v. *ruscus*.
 buggl. v. *arthemisia*.
 burgel-, burtzel-, bortzelkraut v.
portulaca.

C.

camilln v. *chamomilla*.
 cassa fistel v. *cassia*.
 christbuerzen v. *elleborus*.
 citrullensamen v. *citrullus*.
 czibeben v. *passula*.

E.

eissenkraut v. *verbena*.
 epich v. *apium*.
 erbselen v. *berberis*.
 erbturtzen v. *cyclamen*.
 ertpf Pfeffer v. *sempervivum*.
 erdt gesiegelt v. *terra sigillata*.
 erschriczen, eschritz v. *sorbus*.
 eybischkraut v. *althaea*.

F.

fetthenne v. *crassula*.
 fieberkraut v. *centaureum*.
 fleczkraut v. *epithymus*.
 flöhkraut v. *persicaria*.
 frauenhaar welsch v. *capillus Ve-*
neris.

G.

gachelkraut, gachheil, gach'l v.
millefolium.
 gaiffenchel v. *seseli*.
 galigunt v. *galanga*, wilder g. v.
cyperus.

gartenkres v. *nasturtium*.
 gechhayl v. *consolida*.
 gemsenbuerzen v. *doronicum*.
 gilgen gelber v. *calamus*.
 gochal v. *millefolium*.
 grallen v. *corallium*.
 graspapeln v. *althaea*.
 graskuniguntkraut v. *eupatorium*.

H.

habotten v. *jujuba*.
 haidnisch wundkraut v. *consolida*.
 haschwurcz, haselwurtz, hassel-
 wurcz v. *asarum*.
 hauswuerezen v. *sempervivum*.
 heiligeisterwuertz v. *angelica*.
 hennendarm v. *cymbalum*.
 herezinfreidt v. *borrago*.
 hermendel v. *chamomilla*.
 hierschenzungen v. *scolopendria*.
 himelbrandt v. *thapsus*.
 himelschlüssel v. *fumus terrae*.
 himelthau v. *manna*.
 hirsszungen v. *scolopendria*.
 hörmandl v. *chamomilla*.
 holder v. *ebulus*.
 holwuertzen v. *aristolochia*.
 huttrich gelber v. *arsenicum*.

I.

igelsamen v. *seseli*.
 imber v. *zingiber*.

K.

kemeltierhey v. *schoenanthum*.
 kichern v. *citrullus*.
 kim v. *carvum*.
 klingelmören v. *secacul*.
 knoffkraut v. *scabiosa*.
 knofflach v. *porrum*.
 kranaigel v. *nux vomica*.
 kraniper v. *juniperus*.
 kropffsalcz v. *sal gemmae*.
 küm welhischer v. *cuminum*.
 kürbsensamen v. *cucurbita*.
 kundelkraut v. *serpillum*.

L.

laugspeick v. nardus.
laussamen v. staphisagria.
lawskletten v. prassium.
leberkraut, leberkrut v. epatica.
leckawicz v. liquiritia.
liliginwurtzin gelb v. calamus.

M.

magen v. papaver.
malten huncz-, mist-, scheis- v.
mercurialis.
marichplaimen v. polium.
maulper v. morus.
meisterwurtz v. meu.
melaun v. melo.
merhiersch v. milium solis.
murrutten v. capillus Veneris.
muskatplat v. folium.
muscatplue v. macis.

N.

naterwurz v. bistorta.
negel v. caryophylli.
niestbuerzen v. elleborus.

P.

pachminezen v. balsamita, mentha-
strum.
perbuerzen v. meu.
perichtram v. pyretrum.
perntaczen v. branca ursina.
pfaffenhödl-, teschel v. alkakengi.
pisen v. moschus.
polay v. pulegium.
prasen vnser frauen v. semper-
vivum.
prein v. milium solis.
puechampfer v. acetosa.
puerzelkraut v. potulaca.

R.

rainfalkkraut v. tanacetum.
rasencken (hrozinky) v. passula.
ringelpleumel v. calendula.

röttelbuerzen v. rubea tinctorum.
rosmarinplaimen v. rosmarinum.
ruten wilde v. ruta.

S.

saffaran, saffran v. crocus.
salveyen wilder v. eupatorium.
samkrautblatt indianisch v. folium.
sant bernhardinkraut v. pras-
sium.
sant joansper v. ribes.
satrey v. thymbra.
saurach v. berberis.
saursenff v. acetosa.
schafmilch v. agnus castus.
scheibuerzen v. bryonia.
schlehinsafft v. gummi.
schwarzbuerzen v. consolida.
schwarezniessbuerzen v. elleborus.
segelpem v. sabina; wilder s. v.
tamariscus.

seidenkraut v. epithymum.
seniff weisser v. eruca.
seyffenbaum v. sabina.
seylpawm v. sabina.
sitichkorner v. carthamus.
speick indianischer, römischer v.
spica indica.
stainbuerzen v. polypodium.
stainpfeffer v. sempervivum.
stainsalcz v. sal gemmae.
stendelbuerzen v. testiculi satyrii.
sunibentguertel v. arthemisia.
sunnenhirs v. milium solis.
surempfer v. acetosa.
swarczburtz v. consolida.
swerdeln gele v. calamus.

T.

tannenschwam v. agaricus.
tatel v. dactylus.
teschelkraut v. thlaspi.
thymseyden v. epithymus.
thintengumi v. gumi.
tilln v. anethum.
tormentil v. tormentilla.

trackhenwurtzen v. calamus.
tropffenbuerzen v. polypodium.

U. V.

valdrian v. valeriana.
vielwuerczen v. iris.
vergies mein nit v. chamaepitys.
vmuercken v. cucumis.

W.

walwurtz v. consolida.
wanczenkraut v. melissa.
weholter v. juniperus.
wegradt v. plantago.
wegwardt v. scariola.
weinlegeln v. berberis.
weinperln welhische v. passula.
weinrutten v. ruta.

weinstein v. tartarus.
weintling v. berberis.
weinzepfel v. berberis.
weirichkraut v. asarum.
weispech v. resina alba.
widertodt v. capillus Veneris.
wildtillnwuerzen v. meu.
wintergrün v. consolida.
wolgemuett, wolmut v. origanum.
worras v. nitrum.

Z.

zeitlas v. hermodactylus.
ziernüssel v. pinea.
zirbelnuss v. pinea.
zitber v. zedoaria.
zuckerkandel v. saccharum candi.
zuckerpenat v. penidia.

Errata.

- p. 20, Nr. 37, Z. 5: nach Succī Eupatorii einzuschalten scr. II.
p. 28, Nr. 101, Z. 5: statt prunos lies prunas.
p. 29, Nr. 105, Z. 4: nach Eboris usti einzuschalten ana unc. s.
p. 62, Nr. 205, Z. 5: einzuschalten ana unc. I.
p. 72, Nr. 229, Z. 3: statt optimi lies optimaē.
p. 111, Nr. 361, Z. 2: statt unc. s. lies unc. I.

1. 1. 1848	2. 1. 1848
3. 1. 1848	4. 1. 1848
5. 1. 1848	6. 1. 1848
7. 1. 1848	8. 1. 1848
9. 1. 1848	10. 1. 1848
11. 1. 1848	12. 1. 1848
13. 1. 1848	14. 1. 1848
15. 1. 1848	16. 1. 1848
17. 1. 1848	18. 1. 1848
19. 1. 1848	20. 1. 1848
21. 1. 1848	22. 1. 1848
23. 1. 1848	24. 1. 1848
25. 1. 1848	26. 1. 1848
27. 1. 1848	28. 1. 1848
29. 1. 1848	30. 1. 1848
31. 1. 1848	32. 1. 1848
33. 1. 1848	34. 1. 1848
35. 1. 1848	36. 1. 1848
37. 1. 1848	38. 1. 1848
39. 1. 1848	40. 1. 1848
41. 1. 1848	42. 1. 1848
43. 1. 1848	44. 1. 1848
45. 1. 1848	46. 1. 1848
47. 1. 1848	48. 1. 1848
49. 1. 1848	50. 1. 1848
51. 1. 1848	52. 1. 1848
53. 1. 1848	54. 1. 1848
55. 1. 1848	56. 1. 1848
57. 1. 1848	58. 1. 1848
59. 1. 1848	60. 1. 1848
61. 1. 1848	62. 1. 1848
63. 1. 1848	64. 1. 1848
65. 1. 1848	66. 1. 1848
67. 1. 1848	68. 1. 1848
69. 1. 1848	70. 1. 1848
71. 1. 1848	72. 1. 1848
73. 1. 1848	74. 1. 1848
75. 1. 1848	76. 1. 1848
77. 1. 1848	78. 1. 1848
79. 1. 1848	80. 1. 1848
81. 1. 1848	82. 1. 1848
83. 1. 1848	84. 1. 1848
85. 1. 1848	86. 1. 1848
87. 1. 1848	88. 1. 1848
89. 1. 1848	90. 1. 1848
91. 1. 1848	92. 1. 1848
93. 1. 1848	94. 1. 1848
95. 1. 1848	96. 1. 1848
97. 1. 1848	98. 1. 1848
99. 1. 1848	100. 1. 1848

1848-1849

1. 1. 1848

2. 1. 1848

3. 1. 1848

4. 1. 1848

5. 1. 1848

6. 1. 1848

7. 1. 1848

8. 1. 1848

9. 1. 1848

10. 1. 1848

11. 1. 1848

12. 1. 1848

13. 1. 1848

14. 1. 1848

15. 1. 1848

16. 1. 1848

17. 1. 1848

18. 1. 1848

19. 1. 1848

20. 1. 1848

21. 1. 1848

22. 1. 1848

23. 1. 1848

24. 1. 1848

25. 1. 1848

26. 1. 1848

27. 1. 1848

28. 1. 1848

29. 1. 1848

30. 1. 1848

31. 1. 1848

32. 1. 1848

33. 1. 1848

34. 1. 1848

35. 1. 1848

36. 1. 1848

37. 1. 1848

38. 1. 1848

39. 1. 1848

40. 1. 1848

41. 1. 1848

42. 1. 1848

43. 1. 1848

44. 1. 1848

45. 1. 1848

46. 1. 1848

47. 1. 1848

48. 1. 1848

49. 1. 1848

50. 1. 1848

51. 1. 1848

52. 1. 1848

53. 1. 1848

54. 1. 1848

55. 1. 1848

56. 1. 1848

57. 1. 1848

58. 1. 1848

59. 1. 1848

60. 1. 1848

61. 1. 1848

62. 1. 1848

63. 1. 1848

64. 1. 1848

65. 1. 1848

66. 1. 1848

67. 1. 1848

68. 1. 1848

69. 1. 1848

70. 1. 1848

71. 1. 1848

72. 1. 1848

73. 1. 1848

74. 1. 1848

75. 1. 1848

76. 1. 1848

77. 1. 1848

78. 1. 1848

79. 1. 1848

80. 1. 1848

81. 1. 1848

82. 1. 1848

83. 1. 1848

84. 1. 1848

85. 1. 1848

86. 1. 1848

87. 1. 1848

88. 1. 1848

89. 1. 1848

90. 1. 1848

91. 1. 1848

92. 1. 1848

93. 1. 1848

94. 1. 1848

95. 1. 1848

96. 1. 1848

97. 1. 1848

98. 1. 1848

99. 1. 1848

100. 1. 1848