

Verzeichnuß solcher dauerhafter Bäume und Stauden, so im Winter ihre Blätter fallen lassen, und in Engeland in freyer Luft wachsen, nach ihren verschiedenen Wachsthum, so geordnet, daß leichtlich daraus zu ersehen, wie sie in Plantaschen, damit selbige um so viel zierlicher ausfallen, zu setzen seyn.

In Ordnung dieser Bäume, will ich alle diejenigen so funfzig Schuh hoch wachsen, unter diejenigen setzen, so am höchsten werden; diejenigen so von dreyßig bis funfzig Schuh wachsen, sollen die Bäume von mittelmäßigem Wachsthum ausmachen; die von funfzehn bis dreyßig Schuh wachsen, sind Bäume so am kleinsten bleiben, und was kleiner bleibt sind Stauden. Hierinnen aber werde ich mich nach ihrem ordentlichen Wachsthum, und nicht nach ihrer außerordentlichen Höhe richten, welche sie manchmal erreichen. Gleichwie aber im *Lexico* die Pflanzen nach ihren gewöhnlichsten lateinischen Namen hingesezt worden, so werde ich mich der nämlichen Ordnung auch hier bedienen, und die deutschen Namen dazu setzen.

ACER majus, multis falso Platanus. J. B. Der grosse Ahorn.
Acer maximum, foliis trifidis vel quinquedidis, Virginianum. Pluk. Der virginische eschenblättrige Ahorn.
Acer Platanoides. Munt. Hist. Der norwegische Ahorn.

Carpinus. Dod. p. Die gemeine Hagenbuche.
Castanea sativa. C. B. P. Der Castanienbaum.
Cerasus major ac sylvestris, fructu subdulci, nigro colore inficiente. C. B. Der schwarze Kirschbaum.
Cupressus Virginiana, foliis Acaciae deciduis. H. L. Der americanische Cypressenbaum.

Fagus. Dod. p. Die Buche.
Fagus Americana, latiore folio. Die americanische Buche.
Fraxinus excelsior. C. B. Die Esche.
Fraxinus ex Nova Anglia, pinnis foliorum in mucronem productioribus. Die Esche aus Newengeland.

Hippocastanum vulgare. I. B. Die Roscastanie.
Larix folio deciduo, conifera. I. B. Der Lerchenbaum.
Larix folio deciduo, rudimentis conorum candidissimis. Pluk. Alm. Der Lerchenbaum mit weißer männlicher Blume.

Malus sylvestris fructu valde acerbo. Inst. Der Holzapfelbaum.
Morus fructu nigro. C. B. P. Der gemeine schwarze Maulbeerbaum.

Nux juglans, five regia vulgaris. C. B. P. Der gemeine Wallnusbaum.
Nux juglans fructu maximo. C. B. P. Grosse französische Wallnus.
Nux juglans fructu tenero, & fragili putamine. C. B. P. Die dünnschalige Wallnus.
Nux juglans fructu perduro. Inst. Die hartschalige Wallnus.

II. Theil.

Nux juglans fructu serotino. C. B. P. Die späte reifende Wallnus.
Nux juglans Virginiana nigra. H. L. Die virginische schwarze Wallnus.
Nux juglans Virginiana nigra, fructu oblongo, profundissime insculpto. Rand. Virginische, schwarze Wallnus, mit langer tief eingekerbter Frucht.

Platanus orientalis verus. Park. Theat. Der wahre orientalische fremde Ahorn.
Platanus occidentalis, aut Virginienfis. Park. Theat. Der occidentalische oder virginische fremde Ahorn.

Platanus orientalis, aceris folio. Tourn. Cor. Der orientalische fremde Ahorn, mit gemeinen Ahornblättern.

Populus alba, majoribus foliis. C. B. P. Der weiße Pappelbaum mit grossen Blättern.
Populus alba, minoribus foliis. Lob. Icon. Der weiße Pappelbaum mit kleinen Blättern.
Populus nigra. C. B. P. Der schwarze Pappelbaum.

Populus tremula. C. B. P. Die Zitterpappel.
Populus nigra Caroliniana, folio maximo, gemmis balsamum odoratissimum fundentibus. Catesb. Hist. Car. Der schwarze Pappelbaum aus Carolina.

Pseudoacacia vulgaris. Inst. R. H. Gemeiner virginischer Schotendorn.
Pseudoacacia siliquis glabris. Boerh. Ind. Virginischer Schotendorn mit glatten Schoten.
Pyrus sylvestris. C. B. P. Der wilde Birnbaum.
Pyrus sativa, flore pleno. H. R. P. Der Birnbaum mit gefüllter Blume.

Quercus latifolia mas, quæ brevi pediculo est. C. B. P. Die breitblättrige Eiche, deren Eichel kurze Stiele haben.

Quercus latifolia femina. C. B. P. Breitblättrige Eiche mit langen Stielen.

Quercus calyce echinato, glande majore. C. B. P. Eiche mit grossen Eicheln, so stachelichte Nüsslein haben.

Quercus Virginiana, rubris venis, muricata. Pluk. Phyt. Virginische Scharlach-eiche.

Quercus castaneæ foliis, procera arbor Virginiana. Pluk. Phyt. Virginische Eiche mit Castanienblättern.

Quercus (forte) Marylandica, folio trifido ad cassafas accedente. Raii Hist. Die schwarze Eiche aus Maryland.

Quercus Caroliniensis, virentibus venis muricata. Catesb. Hist. Nat. Die weiße Eiche von Carolina.

Tilia foemina, folio majore. C. B. P. Der breitblättrige Lindenbaum.

Tilia foemina, folio minore. C. B. P. Schmalblättriger Lindenbaum.

Tilia foliis molliter hirsutis, viminibus rubris, fructu tetragono. Raii Hist. Die Linde mit rothen Schossen.

¶¶¶¶

Tilia

Ulmus Caroliniana, folio longius mucronato. Die carolinische Linde.

Ulmus Virginiana, tripartito aceris folio, media lacinia veluti abscissa. Pluk. Phyt. Der Eulpenbaum.

Ulmus campestris & Theophrasti. C. B. P. Der gemeine Ulmenbaum.

Ulmus folio latissimo scabro. Ger. Emac. Breitblättriger Ulmenbaum.

Ulmus vulgarissima, folio lato glabro. Ger. Emac. Der glattblättrige Ulmenbaum.

Ulmus major Hollandica, angustis & magis acuminatis samaris, folio latissimo scabro. Pluk. Alm. Der holländische Ulmenbaum.

Ulmus minor, folio angusto glabro. Der glatte schmalblättrige Ulmenbaum.

Ulmus folio lato scabro, cortice cinereo glabro. Der Ulmenbaum mit weißer Rinde.

Ulmus folio lato scabro, angustis samaris. Der französische Ulmenbaum.

Bäume von mittelmäßigem Wuchstum so ihre Blätter im Winter fallen lassen.

ACACIA-Americana, abruæ foliis, triacanthos, sive ad axillas foliorum spina triplici donata. Pluk. Mantiss. Die americanische Acacia mit dreyfachen Dornen.

Acacia Americana palustris, abruæ foliis, spinis rarioribus. Wasseracacia aus Carolina mit sehr wenigen Dornen.

Acacia Americana, abruæ foliis, triacanthos, capsula ovali semen unicum claudente. Catesb. Hist. Nat. Die americanische Acacia mit drey Dornen, und eiförmiger Saamencapsel, darinn nur ein Saamenkorn steckt.

Acer majus, folio rotundiore, minus laciniato, an opulus Italicum. Raii Hist. Der rundblättrige italienische Ahorn.

Acer virginianum, folio majore, subtus argenteo, supra viridi splendente. Pluk. Phyt. Der virginische blühende Ahorn.

Acer Virginianum, folio majore splendente. Der Zuckerahorn.

Alnus rotundifolia glutinosa viridis. C. B. P. Rundblättrige Erle.

Alnus folio oblongo viridi. C. B. P. Langblättrige Erle.

Betula. Dod. Der Birckenbaum.

Celtis fructu nigricante. Inst. Lotusbaum mit schwarzer Frucht.

Celtis fructu obscure purpurascante. Inst. R. H. Lotusbaum mit dunkelpurpurfarber Frucht.

Celtis orientalis, foliis minoribus & crassioribus, fructu flavo. Tourn. Cor. Der kleinere Lotusbaum, mit kleineren und dickeren Blättern und gelber Frucht.

Celtis fructu luteo ampliori. Der Lotusbaum mit grosser gelber Frucht.

Celtis orientalis, folio ampliore, magno fructu. Tourn. Cor. Der orientalische Lotusbaum mit dem grossen Blat und grosser Frucht.

Cerasus fativa. C. B. P. Der gemeine Kirschbaum.

Crataegus folio subrotundo serrato, subtus incano. Inst. R. H. Der wilde Speyerlingbaum, mit dem runden gezackten, unten grauem Blat.

Crataegus folio oblongo serrato, utrinque virente. Inst. R. H. Der wilde Speyerlingbaum, mit dem langen grünen gezackten Blat.

Crataegus folio laciniato. Inst. R. H. Der gemeine wilde Speyerlingbaum.

Eytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo. Inst. R. H. Der breitblättrige Baumbohnenbaum.

Fagus orientalis, ampliore folio. Tourn. Cor. Die orientalische Buche mit breitem Blat.

Fraxinus florifera botryoides. Mor. Hist. Blumentragende Esche.

Fraxinus rotundiore folio. C. B. P. Die Mannäse.

Fraxinus Caroliniana, latiori fructu. Rand. Die Esche aus Carolina mit breiter Frucht.

Fraxinus orientalis, longissimo folio, profunde serrato. Tourn. Cor. Orientalische Esche, mit langem tiefeingeschnittenem Blat.

Nux juglans Virginiana, foliis vulgari similis, fructu subrotundo, cortice duriore lavi. Pluk. Alm. Die weisse, virginische Wallnus.

Nux juglans Virginiana alba minor, fructu nucis moschatae similis, cortice glabro, summo fastigio veluti in aculeum producto. Pluk. Kleiner weisse, virginische Wallnus.

Nux juglans bifera. C. B. P. Die doppelte Wallnus.

Nux juglans folio serrato. C. B. P. Die Wallnus mit gezackten Blättern.

Platanus Americanus, foliis oblongis ex adverso sitis. Der Knopfsbaum.

Prunus sylvestris major. I. B. Der schwarze Schlehdorn.

Pyrus sativa biflora. Der Birnbaum, so im Jahr zweymal blühet.

Quercus foliis molli lanugine pubescentibus. C. B. P. Die Eiche mit weichen, wollichten Blättern.

Quercus orientalis, castaneæ folio, glande recondita in cupula crassa & squamosa. Tourn. Cor. Orientalische Eiche, mit dem Castanienblat deren Eichel in einem dicken schupichten Nüsslein verborgen stecken.

Quercus orientalis latifolia, glande maxima, cupula crinita. Tourn. Cor. Orientalische Eiche, mit breitem Blat und der größten Eichel, deren Nüsslein haarig ist.

Quercus orientalis latifolia, foliis ad costam pulchre incis, glande maxima, cupula crinita. Tourn. Cor. Orientalische breitblättrige Eiche, deren Blätter am Stiel schön ausgeschnitten, mit sehr grosser Eichel und haarigen Nüsslein.

Quercus Mariana, muricatis castaneæ foliis subtus villosis. Banist. Die Eiche mit spitzigem unten haarigen Castanienblat aus Maryland.

Quercus esculi divifura, foliis amplioribus aculeatis. Pluk. Phyt. Die Eiche aus Maryland.

Quercus,

Quercus, an potius *ilex Marylandica*, folio longo angusto falcis. Raii Hist. Die Eiche mit dem schmalen Weidenblatt aus Maryland.

Salix vulgaris alba arborescens. C. B. P. Der gemeine weisse Weidenbaum.

Salix vulgaris nigricans, folio non serrato. C. B. P. Die schwarze Weide.

Sorbus fativa. C. B. P. Der Sperberbaum.

Sorbus fativa, magno fructu nonnihil turbinato rubro. Inst. R. H. Der zahme Speyerlingbaum, mit etwas kreuselförmiger Frucht.

Sorbus fativa, magno fructu turbinato, pallide rubente. Inst. R. H. Der zahme Speyerlingbaum, mit grosser kreuselförmiger, blasrother Frucht.

Sorbus fativa, fructu pyriformi, medio rubente. H. Cath. Der zahme Speyerlingbaum, mit eiförmiger Frucht, so in der Mitte roth ist.

Sorbus fativa, fructu serotino minori turbinato rubente. Inst. Der Speyerlingbaum, dessen Frucht klein ist und spät reiffet.

Sorbus orientalis, fraxini folio. Tourn. Cor. Orientalischer Speyerlingbaum, mit dem Eschenblatt.

Sorbus orientalis, fructu magno, compresso & flavescente. Tourn. Cor. Orientalischer Speyerlingbaum, mit grosser, glatter, gelblicher Frucht.

Styrax arbor Virginiana, aceris foliis. Raii Hist. Der virginische Storaxbaum mit dem Ahornblatt, *Liquidambra*.

Verzeichniss der Bäume so am niedrigsten wachsen, und im Winter ihre Blätter fallen lassen.

A *CER* campestre & minus. C. B. P. Der gemeine kleinere Ahorn.

Acer trifolium. C. B. P. Dreyblättriger Ahorn.

Acer Creticum. Prosp. Alp. Cretischer Ahorn.

Acer orientale, hederæ folio. Tourn. Cor. Orientalischer Ahorn, mit dem Epheublatt.

Alnus folio incano. C. B. P. Erle mit dem grauen Blat.

Alnus montana, pallido glabro sinuato ulmi folio. Bocc. Mus. Bergerle mit dem Rüsterblatt.

*Alnus foliis eleganter incis*is D. Breman. Erle mit dem ausgeschnittenen Blat.

Amygdalus fativa, fructu majori. C. B. P. Gemeine grosse Mandel.

Amygdalus fativa, fructu minori. C. B. P. Gemeine kleine Mandel.

Amygdalus dulcis, putamine molliore. C. B. P. Süsser Mandel mit zarter Schale.

Armeniaca fructu majori, nucleo amaro. Inst. Grosse bittere Mandel.

Carpinus orientalis, folio minori, fructu brevi. Tourn. Cor. Orientalische Hagenbuche, mit kleinem Blat und kurzer Frucht.

Carpinus Virginiana florescens. Pluk. Phyt. Virginische blühende Hagenbuche.

Carpinus seu ostrya ulmo similis, fructu racemoso, lupuli similis. C. B. P. Hopfenhagenbuche.

Castanea humilis racemosa. C. B. P. Kleine traubichte Castanie.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli. C. B. P. Vogelkirschen.

Cerasus racemosa sylvestris, fructu non eduli rubro. H. R. Par. Rothe Vogelkirschen.

Cerasus racemosa hortensis. C. B. P. Gartenvogelkirschen.

Cerasus hortensis, flore pleno. C. B. P. Kirschen mit gefüllter Blüthe.

Cerasus hortensis, flore roseo. C. B. P. Grosse Kirschen mit gefüllter Blüthe.

Cornus hortensis mas. C. B. P. Cornelbaum das Männlein.

Cornus hortensis mas, fructu ceræ colore. C. B. P. Cornelbaum mit wachsfarber Frucht.

Cornus hortensis mas, fructu albo. C. B. P. Cornelbaum mit weisser Frucht.

Cornus hortensis mas, fructu saturatius rubente, cum ossiculo crassiore & brevior. C. B. P.

Cornelbaum mit dunkelrother Frucht.

Cornus foemina. C. B. P. Hundsbeeren.

Cornus orientalis sylvestris, fructu teretiformi. Tourn. Cor. Orientalischer Hundsbeerenbaum mit länglichtrunder Frucht.

Colutea vesicaria. C. B. P. Bläsleinsenna.

Colutea vesicaria vesiculis rubentibus. I. B. Bläsleinsenna mit rothen Schoten.

Corylus fativa, fructu albo minore, sive vulgaris. C. B. P. Kleine zahme Haselstaude.

Corylus fativa, fructu rotundo maximo. C. B. P. Zahme Haselstaude mit grosser runder Frucht.

Corylus fativa, fructu oblongo rubente. C. B. P. Rothe Haselnus.

Corylus fativa, fructu albo. Zahme Haselnus mit weisser Frucht.

Corylus Hispanica, fructu majore anguloso. Pluk. Alm. Spanische Haselnus mit eckichter Frucht.

Corylus Bizantina. H. L. Constantinopolitanische Haselnus.

Crataegus Virginiana, foliis arbuti. Inst. R. H. Virginischer wilder Speyerlingbaum mit Erdbeerblättern.

Cydonia fructu oblongo leviori. Inst. R. H. Birnquitten.

Cydonia fructu brevior & rotundior. Inst. R. H. Aepfelquitten.

Cydonia latifolia Lusitanica. Inst. R. H. Breitblättrige portugiesische Quitten.

Cydonia angustifolia vulgaris. Inst. R. H. Gemeine Quitten mit schmalen Blättern.

Cytisus Alpinus angustifolius, flore racemoso pendulo longiori. Inst. R. H. Schmalblättriger Baumbohnenbaum, mit langen abhängenden Blumen.

Cytisus Alpinus, flore racemoso pendulo breviori. Inst. R. H. Breitblättriger Baumbohnenbaum, mit kurzen abhängenden Blumen.

Elæagnus orientalis angustifolius, fructu parvo olivæformi subdulci. Tourn. Cor. Der orientalische wilde Delbaum mit schmalen Blättern, und kleiner, süsser, olivenförmiger Frucht.

Elæagnus orientalis latifolius, fructu maximo. Tourn. Cor. Der schmalblättrige wilde Delbaum, mit grosser Frucht.

Elæagnus orientalis angustifolius, fructu minimo rotundior & subacido. Tourn. Cor. Der orientalische, schmalblättrige, wilde Delbaum, mit kleiner, runder, saurerer Frucht.

Elæagnus non spinosa, foliis longis & angustis, fructu olivæformi. Der wilde Delbaum ohne Dornen,

==== 2

Dornen,

Dornen, mit schmalen langen Blättern, und kleiner olivenförmiger Frucht.

Evonymus vulgaris, granis rubentibus. C. B. P. Der gemeine Spindelbaum.

Evonymus granis nigris. C. B. P. Spindelbaum mit schwarzen Saamen.

Evonymus latifolius. C. B. P. Breitblättriger Spindelbaum.

Ficus sativa, fructu violaceo longo, intus rubente. Inst. R. H. Lange, blaue Feige.

Ficus sativa, fructu praecoci albedo fugaci. Inst. R. H. Frühe weisse Feige.

Ficus sativa, fructu globoso albo melliflavo. Inst. R. H. Grosse, runde, weisse Feige.

Ficus sativa, fructu parvo fusco, intus rubente. Inst. R. H. Kleine braune Feige.

Ficus sativa, fructu longo majori nigro, intus purpurascente. Inst. Grosse, lange, schwarze Feige.

Ficus sativa, fructu globoso, fusco, intus rubente. Die braunschweiger Feige.

Ficus orientalis, foliis laciniatis, fructu maximo albo. Orientalische Feige, mit zertheilten Blättern, und grosser, weisser Frucht.

Ficus orientalis, foliis variis. Orientalische Feige, mit scheidigen Blättern.

Ficus foliis robustioribus, & ramis erectioribus. H. L. Feige mit starcken Blättern, und aufrechten Zweigen.

Fraxinus humilior, sive altera *Theophrasti*, minore & tenuiore folio. C. B. P. Niedrige Esche, mit kleinem Blat.

Frutex Virginianus trifolius, ulmi samaris. Banist. Americanische Kleeblau, mit Rüsterbaamen.

Guaiacana. I. B. Der indianische Dattelbaum.

Guaiacana angustiore folio. Inst. R. H. Schmalblättriger indianischer Dattelbaum.

Guaiacana sive *Pishamin Virginianum*. Park. Virginischer Dattelpflaumenbaum.

Ligustrum. I. B. Hartriegel.

Lilac Matth. Syringenbaum.

Lilac flore albo. Inst. R. H. Weisser Syringenbaum.

Lilac flore saturate purpureo. Inst. Dunkelpurpurfarber Syringenbaum.

Malus sylvestris Virginiana, floribus odoratis. Virginischer, wilder Aepfelbaum mit wohlriechenden Blumen.

Mespilus Germanica, folio laurino, non ferrato, sive *mespilus sylvestris*. C. B. P. Gemeiner Mispelbaum.

Mespilus folio laurino, major. C. B. P. Grosser, holländischer Mispelbaum.

Mespilus folio laurino, major, fructu praecoci sapidiori oblongo, laxiori seu rariori substantia. Hort. Cath. Früher Mispelbaum mit länglicher Frucht.

Mespilus folio laurino, major, fructu minori, rariori substantia. Hort. Cath. Kleine italienische Mispeln.

Mespilus apii folio laciniato. C. B. P. Azarol oder neapolitanischer Mispelbaum.

Mespilus apii folio laciniato, flore pleno. H. L. Azarol mit gefüllter Blume.

Mespilus apii folio laciniato, fructu majore, intensius rubro, gratioris saporis. Hort. Cath. Grosse rothe Azarolen von sehr angenehmen Geschmack.

Mespilus apii folio laciniato, fructu ex albo lutescente minori. Hort. Cath. Azarol mit kleiner weissegelber Frucht.

Mespilus apii folio laciniato, fructu majore albo, grato sapore. Azarol mit grosser, weisser, angenehmer Frucht.

Mespilus spinosa, sive *oxyacantha Virginiana*. H. L. Virginischer Hagedorn.

Mespilus aculeata pyrifolia, denticulata, splendens, fructu insigni rutilo Virginianis. Pluk. Phyt. Virginischer Azarol, mit rother Frucht.

Mespilus Virginiana, apii folio, vulgari similis, major, grandioribus spinis. Pluk. Phyt. Virginischer Hagedorn, mit langen, starcken Dornen.

Mespilus Americana, apii folio, vulgari similis, major, fructu luteo. Gelber, americanischer Hagedorn.

Mespilus prunifolia Virginiana non spinosa, fructu nigricante. Pluk. Phyt. Virginischer Hagedorn mit Pflaumenblättern und schwarzer Frucht.

Mespilus apii folio, sylvestris spinosa, sive *oxyacantha*. C. B. P. Gemeiner Hagedorn, mit weisser Frucht.

Mespilus spinosa, sive *oxyacantha*, flore pleno. Inst. R. H. Hagedorn mit gefüllter Blume.

Mespilus Cretica, apii folio lucido, elegantius laciniato. Tourn. Cor. Cretischer Hagedorn, mit glänzendem und zierlich ausgeschnittenen Blat.

Mespilus orientalis, apii folio, sylvestris spinosa, sive *oxyacantha*, flore purpureo. Tourn. Cor. Orientalischer Hagedorn, mit purpurfarber Blume.

Mespilus Cretica, folio circinato & quasi cordiformi. Tourn. Cor. Cretische Mispeln, mit rundem herzförmigen Blat.

Mespilus orientalis, sive *oxyacantha*, foliis hirsutissimis. Tourn. Cor. Orientalischer Hagedorn mit rauhen Blättern.

Mespilus orientalis, apii folio villosa, magno fructu pentagono purpureo glabro. Tourn. Cor. Orientalischer, haariger Hagedorn, mit grosser, glatter, fünfseitiger, purpurfarber Frucht.

Mespilus orientalis, tanacetii folio villosa, magno fructu pentagono, e viridi flavescente. Tourn. Cor. Orientalischer Hagedorn, mit dem haarigen Reinfarnblat, und grosser fünfseitiger gelblichgrüner Frucht.

Morus fructu nigro minori, foliis eleganter lacinitatis. Inst. R. H. Kleine schwarze Maulbeeren, mit schön ausgesackten Blättern.

Morus fructu albo. C. B. P. Weisse Maulbeeren.

Morus fructu albo minori, ex albo purpurascente. Inst. R. H. Kleine, weisse, purpurfarbe Maulbeeren.

Morus alba, fructu minori insulso. Hort. Cath. Weisse, kleine, ungeschmacke Maulbeeren.

Morus Virginianis arbor, loti arboris instar racemosa, foliis amplissimis. Pluk. Phyt. Der virginische Maulbeerbaum mit grossen Blättern und schwärzlichen Aesten, so den Aesten des Lotusbaum gleichen.

Morus Caroliniana, foliis latissimis scabris, fructu rubro longiori. Carolinischer Maulbeerbaum mit langer rother Frucht.

Nux juglans foliis laciniatis. D. Reneal. Wallnus mit ausgeschnittenen Blättern.

Nux juglans fructu minimo. D. Breman. Die kleinste Wallnus.

Nux

Nux juglans Americana alba minor, fructu minimo anguloso. Kleine americanische Wallnus.

Opulus Ruellii. Wasserholder.

Opulus flore globosa. Inst. R. H. Schneeballen.

Opulus orientalis, folio amplissimo tridentato.

Tourn. Cor. Orientalische Schneeballen, mit grossem dreyspitzigen Blat.

Pavia. Boerh. Ind. alt. Die Roscastanie mit Scharlachfarber Blume.

Persica molli carne, & vulgaris, viridis & alba. C. B. P. Der Pfersichbaum.

Persica vulgaris, flore pleno. Inst. R. H. Pfersichbaum mit gefüllter Blume.

Prunus sylvestris, fructu majore albo. Raii Syn. Der weisse Schleendorn.

Prunus flore pleno. H. R. Par. Pflaumen mit gefüllter Blume.

Prunus sylvestris, fructu parvo serotino. Winter-schleen.

Prunus fructu subrotundo, cerasi forma. Kirschpflaumen.

Quercus calyce hispido, glande minore. C. B. P. Die Eiche mit kleinen, in stachelichten Nüsslein stehenden Eicheln.

Quercus Burgundica, calyce hispido. C. B. P. Die burgundische Eiche, mit rauen Nüsslein.

Quercus gallam exiguae nucis magnitudine ferens. C. B. P. Eiche so kleine, nussgrosse Eicheln trägt.

Quercus foliis muricatis, non lanuginosis, galla superiori similis. C. B. P. Die Eiche mit stachelichten Blättern, so nicht wollicht sind, und Galläpfeln gleich den vorigen.

Quercus Hispanica, foliis magis dissectis. Spanische Eiche mit zerschnittenen Blättern.

Quercus orientalis, glande cylindriciformi, longo pediculo insidente. Tourn. Cor. Orientalische Eiche, mit walzenförmiger Frucht, so einen langen Stiel hat.

Quercus orientalis angustifolia, glande minori, cupula crinita. Tourn. Cor. Orientalische Eiche, mit dem schmalen Blat, und kleiner Frucht in einem haarigen Nüsslein.

Quercus orientalis, folio subrotundo minori, glande magna striata. Tourn. Cor. Orientalische Eiche, mit kleinerem rundlichten Blat, und grosser gestreifter Eichel.

Quercus orientalis, folio subrotundo, leviter inciso, fructu minori cylindriciformi. Tourn. Cor. Orientalische Eiche, mit dem rundlichten, nicht stark eingeschnittenen Blat, und kleiner, walzenförmiger Frucht.

Quercus Mariana, olea folio, glande parva compressa, ad apiculam eleganter radiata. Pluk. Mantif. Spanische, in Sümpfen wachsende Eiche.

Rhamnus catharticus. C. B. P. Gemeiner, purgirender Stechdorn.

Rhus folio ulmi. C. B. P. Sumach mit Ulmenblättern.

Rhus Virginianum. C. B. P. Virginischer Sumach.

Salix vulgaris rubens. C. B. P. Rother Weide.

Salix fativa, lutea, folio crenato. C. B. P. Gelbe Weide.

Salix folio amygdalino, utrinque virente, aurito. C. B. P. Weide mit grünen Mandelblättern.

Salix folio amygdalino, utrinque aurito, corticem abiciens. Raii Syn. Weide mit dem Mandelblättern, so die Rinde ablegt.

Salix folio laureo, seu lato glabro odorato. Phyt. Brit. Die wohlriechende Weide mit dem Lorbeerblat.

Salix folio longo, utrinque virente, odorato. Langblättrige, wohlriechende Weide.

Salix folio longo latoque splendente, fragilis. Raii Syn. Die Bruchweide.

Salix latifolia, rotunda. C. B. P. Rundblättrige Weide.

Salix folio ex rotunditate acuminato. C. B. P. Spitzige rundblättrige Weide.

Salix latifolia, folio splendente. Raii Syn. Weide mit dem breiten glänzenden Blat.

Salix orientalis, flagellis deorsum pulchre pendentibus. Tour. Cor. Die Weide mit abhängenden Spizen.

Sambucus fructu in umbella nigro. C. B. P. Gemeiner Hollunder mit schwarzen Beeren.

Sambucus fructu in umbella viridi. C. B. P. Gemeiner Hollunder mit grünlichten Beeren.

Sambucus fructu albo. Lob. Hollunder mit weissen Beeren.

Sambucus laciniato folio. C. B. P. Peterleinhollunder.

Silquastrum. Cast Dur. Der Judasbaum.

Silquastrum flore albo. Inst. R. H. Judasbaum mit weisser Blume.

Silquastrum amplioribus siliquis, & foliis acuminatis. Inst. R. H. Judasbaum mit grossen Schoten und spitzigen Blättern.

Silquastrum Canadense. Inst. R. H. Judasbaum aus Canada.

Silquastrum quæ ceratia agrestis, mucronato folio, floribus parvis, Caroliniana. Pluk. Alm. Carolinischer Judasbaum mit spitzigen Blättern.

Sorbus aucuparia. L. B. Vogelbeeren.

Tacamahaca foliis crenatis, fadelhout seu lignum ad ephippia conficienda aptum. Par. Bat. prod. Tacamahaca.

Terebinthus vulgaris. C. B. P. Der Terpentinbaum.

Terebinthus peregrina, fructu majore, pistaciis simili eduli. C. B. P. Der Terpentinbaum mit grosser Frucht, so den Pistacien gleicht.

Terebinthus Cappadocica. H. R. Par. Terpentinbaum aus Cappadocien.

Terebinthus Indica Theophrasti, pistachia Dioscoridis. Lob. Adv. Der Pistacienbaum.

Terebinthus seu pistachia trifolia. Inst. R. H. Dreyspitziger Pistacienbaum.

Verzeichnis solcher Stauden, welche im Winter ihr Laub fallen lassen.

ALNUS Alpina minor. C. B. P. Kleine Erle der Alpen.

Alnus montana, crispo, glutinoso, & denticulato

II. Theil.

folio. Boec. Mus. Erle mit den krausen, flebrichten Blat.

Amygdalus Indica nana. H. R. Par. Zwergmandelbaum.

ffff fff

Aralia

- Aralia spinosa* arborescens. Vaill. Dis. Angelica-
baum.
Arbor Virginiana, pisaminis folio, baccata, ben-
zoinum redolens. Pluk. Phyt. Benzoebaum.
Arbor Zeylanica, cotini foliis subtus lanugine vil-
losis, floribus albis cuculi modo laciniatis. Pluk.
Phyt. Schneetropfenbaum.
Barba Jovis Americana, pseudoacaciae foliis, flo-
sculis minimis purpureis. Kand. Bastartindig.
Berberis dumetorum. C. B. P. Gemeine Berbers-
beeren.
Berberis sine nucleo. C. B. P. Berbersbeeren ohne
Kern.
Berberis latissimo folio, Canadensis. H. R. Par.
Breitblättrige Berbersstaude aus Canada.
Berberis Cretica, buxi folio. Tourn. Cor. Cretis-
sche Berbersstaude mit Buchsblättern.
Berberis orientalis procerior, fructu nigro suavis-
simo. Tourn. Cor. Orientalische Berbersstaude,
mit schwarzer süßer Frucht.
Bignonia Americana, urucu foliis, flore fordide
albo, intus maculis purpureis & luteis adperso,
siliqua longissima & angustissima. Catesb. Hist.
Catalpa.
Caprifolium Germanicum. Dod. Gemeines Geis-
blat.
Caprifolium Italicum. Dod. Welsches Geisblat.
Caprifolium Italicum perfoliatum praecox, Broff.
Frühzeitiges weißes Geisblat.
Caprifolium Germanicum, flore rubello, seroti-
num. Brast. Das späte, rothe Geisblat.
Caprifolium non perfoliatum, foliis sinuosis.
Inst. R. H. Das wilde Geisblat mit Eichen-
blättern.
Caprifolium perfoliatum sempervirens, floribus
speciosius. Das immergrüne Geisblat.
Caprifolium Creticum, non perfoliatum, foliis
cotini, floribus inodoris, partim albis, partim
flavescentibus. Tourn. Cor. Orientalisch Geis-
blat, mit Färberbaumbblättern, und theils weiß-
sen, theils gelben Blumen, so keinen Geruch ha-
ben.
Cassine vera perquam similis arbuscula phillyreae,
foliis antagonistis, ex provincia Caroliniensi.
Pluk. Mant. Der Cassioberrybusch.
Castanea pumilis Virginiana, racemoso fructu
parvo, in singulis capsulis echinatis unico. Ba-
nist. Virginische Zwergcastanie.
Cerasus sylvestris amara, mahaleb putata. I. B.
Steinweichsel.
Cerasus sylvestris Alpina, folio rotundiore. Inst.
Wilde Alpenfirschen, mit rundem Blat.
Chamaerhododendron Alpinum glabrum. Inst.
Glattes Bergröslein der Alpen.
Chamaerhododendron Alpinum serpyllifolium.
Inst. Bergröslein der Alpen mit Quendelblät-
tern.
Chamaerhododendron Alpinum villosum. Inst.
Raues Bergröslein der Alpen.
Chamaecerasus Alpina, fructu gemino rubro, duo-
bus punctis notato. C. B. P. Große rothbees-
richte Heckenfirsche.
Chamaecerasus dumetorum, fructu gemino rubro.
C. B. P. Heckenfirschen mit rothen Beeren.
Chamaecerasus Alpina, fructu nigro gemino. C.
B. P. Heckenfirschen mit schwarzen Beeren.
Chamaecerasus montana, fructu singulari caeruleo.
C. B. P. Blaubeerrichte Heckenfirsche.

- Chamaecerasus orientalis*, lauri folio. Tourn. Cor.
Orientalische Heckenfirsche mit Lorbeerblättern.
Colutea orientalis, flore sanguinei coloris, lutea
macula notato. Tourn. Cor. Orientalische Bläs-
leinsenna, mit blutfarben Blumen so einen gel-
ben Flecken haben.
Cornus foemina laurifolia, fructu nigro caeruleo,
ossiculo compresso, Virginiana. Pluk. Phyt. Der
virginische Hundsheerbaum.
Cornus mas, odorato folio, trifido margine plano,
sassafras dicta. Pluk. Phyt. Der Sassafrasbaum.
Cornus foemina Virginiana, angustiore folio. Der
virginische Hundsheerenbaum mit schmalen Blat.
Cornus mas Virginiana, foliis oblongis, fructu ru-
bro majore. Der virginische Hundsheerbaum, das
Männlein, mit länglichten Blättern und grosser
rother Frucht.
Cornus mas Virginiana, flosculis plurimis albidis
ex involucro tetrapetalo rubro irrupentibus.
Banist. Der virginische Hundsheerbaum, mit vie-
len kleinen weissen Blumen, so aus einer klein-
blättrigen rothen Caspel herfür kommen.
Coriaria. Act. Acad. Reg. Par. Sumach mit Myr-
tenblättern.
Cotinus coriaria. Dod. Der Färberbaum.
Cytisus glabris foliis subrotundis, pediculis bre-
vissimis. C. B. P. Geisklee mit runden glatten
Blättern und kurzen Stielen.
Cytisus glaber viridis. C. B. P. Geisklee mit glatten
grünen Blättern.
Cytisus glaber nigricans. C. B. P. Schwarzer Geis-
klee.
Diervilla Acadiensis fruticosa, flore luteo. Acad.
Reg. Par. Diervilla.
Empetrum montanum, fructu nigro. Inst. R. H.
Heide mit schwarzen Beeren, Krähenbeeren.
Empetrum Lusitanicum, fructu albo. Inst. R. H.
Weisse Krähenbeeren.
Emerus. Calsp. Scorpionsenne.
Emerus minor. Inst. R. H. Kleinere Scorpionsenne.
Erica vulgaris glabra. C. B. P. Gemeine glatte Heide.
Erica vulgaris glabra, flore albo. C. B. P. Gemeine
Heide mit weisser Blume.
Erica frutescens peregrina. C. B. P. Staudige frem-
de Heide.
Erica humilis, cortice cinereo, arbuti flore. C. B. P.
Zwergheide, mit dem Erdbeerbaumblat.
Erica tenuifolia. Ger. Schmalblättrige Heide.
Erica vulgaris hirsuta. C. B. P. Gemeine raublät-
trige Heide.
Frangula. Dod. Der Faulbaum.
Frangula rugosior & amplior folio. Inst. R. H.
Faulbaum mit rauem und grossen Blat.
Frangula montana pumila saxatilis, folio subro-
tundo. Inst. R. H. Der niedrige auf Bergen und
Klippen wachsende Faulbaum, mit rundem Blat.
Frangula montana pumila saxatilis, folio oblongo.
Inst. R. H. Der niedrige auf Bergen und Klip-
pen wachsende Faulbaum, mit länglichem Blat.
Gale frutex odoratus, septentrionalium, elagnus
Cordo, chamaelagnus Dodonaei. I. B. Nieder-
ländischer Myrtenbaum.
Gale quae myrto Brabanticae similis, Caroliniensis
baccata, fructu racemoso sessili monoppyreno.
Pluk. Phyt. Kerzenbeerenbaum.

- Gale quæ myrto Brabantica similis, Caroliniensis mas. Der carolinische Kersenbeerenbaum.
 Gale quæ myrto Brabantica similis, Caroliniensis humilior, foliis latioribus & magis serratis. Catesb. Hist. Der kleine breitblättrige Kersenbeerenbaum mit tief eingekerbten Blättern.
 Genista juncea. L. B. Gelber, spanischer Genster.
 Genista Hispanica pumila odoratissima. Inst. R. H. Niedriger, spanischer, wohlriechender Genster.
 Genista humilior Pannonica. Inst. R. H. Niedriger, ungerischer Genster.
 Genista Lusitanica, parvo flore luteo. Inst. R. H. Portugiesischer Genster mit kleiner gelber Blume.
 Genista tinctoria Germanica, C. B. P. Färberpfriemen.
 Genista tinctoria Austriaca maxima. Boerh. Großer österreichischer Färberpfriemen.
 Genista tinctoria Germanica, foliis angustioribus, C. B. P. Deutscher Färberpfriemen mit schmalen Blättern.
 Genista tinctoria latifolia Lucensis. Inst. R. H. Breitblättriger Färberpfriemen aus Lucca.
 Genista tinctoria frutescens, foliis incanis, C. B. P. Staudiger Färberpfriemen mit grauen Blättern.
 Genista tinctoria Lusitanica maxima, *Piurnia Lusitanorum*. Inst. R. H. Großer portugiesischer Färberpfriemen.
 Genista ramosa, foliis hyperici. C. B. P. Nestiger Genster, mit Johannisfrautblättern.
 Genista radiata, sive stellaris. L. B. Sterngenster.
 Genista sive spartium purgans. L. B. Purgiergenster.
 Genista minor asphalathoides, vel genista spinosa Anglica. C. B. P. Nadelgenster.
 Grossularia simpliciacino, vel spinosa sylvestris. C. B. P. Gemeiner Stachelbeerstrauch.
 Grossularia spinosa sativa. C. B. P. Großer zahmer Stachelbeerstrauch.
 Grossularia fructu obscure purpurascens. Clus. Stachelbeerstrauch mit rother haariger Frucht.
 Grossularia sive uva crispa alba, maxima rotunda. Hort. Ed. Der grosse, weisse, holländische Stachelbeerstrauch.
 Grossularia maxima sublava, oblonga. Hort. Ed. Grosse Bernsteinstachelbeeren.
 Grossularia fructu rotundo maximo virescente. Grosse, grüne Stachelbeeren.
 Grossularia fructu rubro maiore. Boerh. Ind. alt. Grosse, rothe Stachelbeeren.
 Grossularia spinosa sativa, foliis flavescentibus. Gelbblättriger Stachelbeerstrauch.
 Hypericum foetidum frutescens. Inst. R. H. Stinkend, staudiges Johannisfraut.
 Hypericum frutescens Canariense multiflorum. H. Amst. Staudiges Johannisfraut der canarischen Inseln, mit vielen Blumen.
 Jasminoides, sive rhamnus, spinis oblongis, flore candicante. C. B. P. Bastartjasmin, mit weissen Blumen.
 Ketmia Syrorum quibusdam. C. B. P. *Althæa frutex*. vulgo. Altheenstaude mit rother Blume.
 Ketmia Syrorum flore purpureo violaceo. Inst. R. H. Altheenstaude mit purpurfarber Blume.
 Ketmia Syrorum flore albo. Boerh. Ind. alt. Altheenstaude mit weissen Blumen.
 Ketmia Syrorum floribus ex albo & rubro variis. Inst. R. H. Altheenstaude mit roth und weis gestreiften Blumen.

- Lilac ligustri folio. Inst. R. H. Syringenbaum mit Hartriegelblättern.
 Lilac ligustri folio, flore albo. Syringenbaum mit weisser Blume.
 Lilac laciniato folio. Inst. R. H. Syringenbaum mit zerkerbten Blättern.
 Mespilus folio rotundiori, fructu nigro subdulci. Inst. R. H. Zwergmispel mit schwarzer Frucht.
 Mespilus folio subrotundo, fructu rubro. Inst. R. H. Kleiner Mispelbaum mit rother Frucht.
 Paliurus. Dod. p. Zudendorn, Christdorn.
 Periploca foliis oblongis. Inst. R. H. Virginische Seide.
 Persica Africana nana, flore incarnato simplici. Inst. R. H. Zwergpfersich mit einfacher Blüthe.
 Persica Africana nana, flore incarnato pleno. Inst. R. H. Zwergpfersich mit gefüllter Blüthe.
 Punica quæ malum granatum fert. Casalp. Gemeiner Granatenbaum.
 Punica sylvestris. Cord. Hist. Wilder Granatenbaum.
 Punica fructu dulci. Inst. R. H. Süßer Granatenapfel.
 Punica flore pleno minore. Inst. R. H. Granatenbaum mit kleiner gefüllter Blume.
 Punica flore pleno majore variegato. Inst. R. H. Granatenbaum mit grosser scheckiger Blume.
 Quercus pedem vix superans. C. B. P. Zwerg-eiche.
 Quercus humilis, gallis binis, ternis aut pluribus simul junctis. C. B. P. Zwerg-eiche mit zwey und mehr Galläpfeln.
 Quercus pumilis, castaneæ folio, Virginienis. Pluk. Phyt. Virginische Zwerg-eiche mit dem Castanienblat.
 Quercus humilior, salicis folio brevior. Catesb. Hist. Nat. Niedrige Eiche mit dem kurzen Weidenblat.
 Rhamnoides florifera, salicis folio. Inst. R. H. Seekreuzdorn mit Weidenblättern.
 Rhamnoides fructifera, foliis salicis, baccis leviter flavescentibus. Inst. R. H. Seekreuzdorn mit Weidenblättern und gelben Beeren.
 Rhamnoides catharticus minor. C. B. P. Kleiner purgierender Stechdorn.
 Rhamnus catharticus minor, folio longiori. Inst. R. H. Kleiner purgierender Stechdorn mit langem Blat.
 Rhamnus tertius, flore herbaceo, baccis nigris. C. B. P. Kreuzdorn mit grüner Blume.
 Rhamnus Hispanicus, buxi folio ampliore. Inst. R. H. Spanischer Kreuzdorn mit dem grossen Buchsblat.
 Rhamnus orientalis, amygdali folio ampliore. Tourn. (or. Orientalischer Kreuzdorn mit dem grossen Mandelblat.
 Rhus Americanus, panicula sparsa herbacea, ramis patulis glabris. Hort. Elth. Americanischer Sumach, mit lockerer grasartiger Blume.
 Rhus tenuifolius Virginianus humilis: rhus angustifolius. C. B. P. Schmalblättriger, virginischer Zwergsumach.
 Ribes vulgaris, fructu rubro. H. Eyst. Gemeine rothe Johannisbeeren.
 Ribes major, fructu rubro. H. Eyst. Grosse rothe Johannisbeeren.
 Ribes major, fructu incarnato. Champagner Johannisbeeren.

Bfff fff 2

Ribes

- Ribes fructu albo.* H. Eyst. Weiße Johannisbeeren.
Ribes fructu majore albo. Grosse weiße Johannisbeeren.
Ribes Alpinus dulcis. I. B. Johannisbeeren mit Stachelblättern.
Ribes nigrum vulgo dictum, folio olente. I. B. Schwarze Johannisbeeren.
Ribes Americana, fructu nigro. Americanische schwarze Johannisbeeren.
Ribes fructu parvo. Mer. Pin. Kleine englische wilde Johannisbeeren.
Rosa rubra simplex. C. B. P. Die einfache rothe Rose.
Rosa rubra multiplex. C. B. P. Gefüllte rothe Rose.
Rosa sylvestris inodora, seu canina. Park. Theat. Die Hundsgrose.
Rosa sylvestris, fructu majore hispido. Raii Syn. Die wilde Rose, mit grosser rauer Frucht.
Rosa sylvestris pomifera major nostras. Raii Syn. Die grosse, englische, Aepffel tragende Rose.
Rosa pumila spinosissima, foliis pimpinellæ glabris, flore albo. I. B. Kleine wilde Rose mit Pimpinellenblättern.
Rosa sylvestris, foliis odoratis. C. B. P. Wohlriechende wilde Rose.
Rosa sylvestris odora, sive eglanteria, flore duplici. Park. Par. Wohlriechende wilde Rose mit halbgefüllter Blume.
Rosa sylvestris, foliis odoratis, flore pleno. Wohlriechende wilde Rose mit gefüllter Blume.
Rosa pimpinella minor Scotica, floribus ex albo & carneo eleganter variegatis. Pluk. Alm. Die schottische Rose mit scheckiger Blume.
Rosa pimpinella minor Scotica, floribus rubris. Rothe schottische Rose.
Rosa Damascena. Park. Parad. Damascener Rose.
Rosa Provincialis sive Hollandica Damascena, Park. Parad. Damascener Provinzrose.
Rosa Provincialis major, flore pleno ruberrimo. Boerh. Ind. alt. Grosse rothe Provinzrose.
Rosa centifolia Batavica. Clus. Hist. Die holländische, hundertblättrige Rose.
Rosa Provincialis spinosissima, pedunculo muscoso. Boerh. Ind. Die moosichte Provinzrose.
Rosa Provincialis rubra. Park. Parad. Gemeine Provinzrose.
Rosa holosericea simplex. Park. Parad. Die einfache Sammetrose.
Rosa holosericea multiplex. Park. Parad. Die gefüllte Sammetrose.
Rosa odore cinnamomi, flore pleno. C. B. P. Gefüllte Zimmtrose.
Rosa odore cinnamomi, simplex. C. B. P. Einfache Zimmtrose.
Rosa lutea simplex. C. B. P. Einfache gelbe Rose.
Rosa lutea multiplex. C. B. P. Gefüllte gelbe Rose.
Rosa sylvestris Austriaca, flore phœnicio. Park. Theat. Die Oesterreichische Rose.
Rosa sylvestris Austriaca, flore luteo. Gelbe Oesterreichische Rose.
Rosa uno ramo luteos, cæteris puniceos flores gerens simplices. Boerh. Ind. Die Oesterreichische Rose mit gelben Blumen an einem Ast, und an den übrigen mit rothen.
Rosa alba vulgaris major. C. B. P. Gemeine weiße Rose.
Rosa alba minor. C. B. P. Kleine weiße Rose.
Rosa candida semiplena. I. B. Halbgefüllte weiße Rose.

- Rosa incarnata.* Park. Parad. Incarnatrose.
Rosa Prænestina variegata plena. Hort. Eyst. Nord- und Lancasterrose.
Rosa ex rubro & albo variegata, rosa mundi vulgo dicta Raii Hist. Die Weltrose.
Rosa Francofurtensis. Park. Parad. Franckfurterrose.
Rosa sempervirens. Park. Parad. Immergrüne Rose.
Rosa omnium calendarum. H. K. Par. Monatliche Rose.
Rosa omnium calendarum, flore variegato. Monatliche Rose mit scheckiger Blume.
Rosa sine spinis, flore minore. C. B. P. Rose sonder Dornen.
Rosa sine spinis, flore majore ruberrimo. Rose sonder Dornen, mit grossen sehr rothen Blumen.
Rosa sylvestris Virginienis. Raii Hist. Wilde virginische Rose.
Rosa moschata, simplici flore. C. B. P. Einfache Bisamrose.
Rosa moschata, flore pleno. C. B. P. Gefüllte Bisamrose.
Rosa moschata sempervirens. C. B. P. Immergrüne Bisamrose.
Rosa Belgica sive vitrea, flore rubro. Rea. Flor. Rothe niederländische Rose.
Rosa Belgica sive vitrea, flore rubicante. Rea. Flor. Blasse niederländische Rose.
Rosa marmorea. Rea. Flor. Die marmorirte Rose.
Rosa Damascena, flore simplici. Damascener Rose mit einfacher Blume.
Rosa sylvestris Virginiana, flore majore pallido. Wilde virginische Rose mit grosser blasser Blume.
Rosa Americana moschata, flore minore. Americanische Bisamrose mit kleiner Blume.
Rosa Americana odoratissima serotina, flore pallido pleno. Die lieblichste, spatblühende, americanische Rose mit blasser Blume.
Rosa campestris, spinis carens, biflora. C. B. P. Die Feldrose sonder Dornen, so zweymal blühet.
Rubus vulgaris major, fructu nigro. I. B. Gemeiner Brombeerstrauch.
Rubus minor, fructu cæruleo. I. B. Der kleinere Brombeerstrauch.
Rubus vulgaris major, fructu albo. Raii Syn. Gemeiner, grosser Brombeerstrauch mit weisser Frucht.
Rubus vulgaris, spinis carens. H. R. Par. Gemeiner Brombeerstrauch sonder Dornen.
Rubus flore albo pleno. H. R. Par. Brombeerstrauch mit weisser gefüllter Blume.
Rubus Idæus spinosus, fructu rubro. I. B. Der Himbeerstrauch.
Rubus Idæus spinosus, fructu albo. I. B. Weiße Himbeeren.
Rubus Idæus spinosus, fructu rubro serotino. Späte rothe Himbeeren.
Rubus Idæus, fructu nigro, Virginianus. Banist. Virginische, schwarze Himbeeren.
Rubus Americanus magis erectus, spinis rarioribus, stipite cæruleo. Pluk. Alm. Der aufrecht wachsende Brombeerstrauch aus Pensylvanien.
Rubus odoratus. Cornut. Virginischer blühender Himbeerenstrauch.
Rubus Alpinus humilis. I. B. Kleiner Brombeerstrauch der Alpen.
Rubus spinosus, foliis & flore eleganter laciniatis. Inst. R. H. Stachelichter Brombeerstrauch mit zierlich eingeschnittenen Blättern und Blumen.

Rubus

Rubus non spinosus, fructu nigro majore, Polonicus. Barr. Icon. Polnischer Brombeerstrauch ohne Dornen, mit grosser, schwarzer Frucht.

Salix folio longissimo angustissimo utrinque albedo. C. B. P. Weisse Weide mit sehr langen schmalen Blättern.

Salix humilis angustifolia. C. B. P. Kleine, schmalblättrige Weide.

Salix oblongo incano acuto folio. C. B. P. Weide mit dem länglichten, grauen, spitzigen Blat.

Salix fragilis. C. B. P. Bruchweide.

Salix subrotundo argenteo folio. C. B. P. Weide mit runden Silberblättern.

Salix humilis latifolia erecta. C. B. P. Kleine, aufrechte, breitblättrige Weide.

Salix latifolia repens. C. B. P. Breitblättrige, kriechende Weide.

Salix pumila Alpina rotundifolia repens, inferne subcinerea. C. B. P. Kleine, rundblättrige, kriechende Weide der Alpen, deren Blätter untenher aschfarb sind.

Salix pumila, folio rotundo. I. B. Kleine Weide, mit rundem Blat.

Salix Alpina, alni rotundo folio, repens. Bocc. Mus. Kriechende Alpenweide, mit dem runden Erlenblat.

Salix pumila, folio utrinque glabro. I. B. Kleine Weide, deren Blat auf beiden Seiten glatt ist.

Salix pumila latifolia incana. C. B. P. Kleine Weide mit breitem grauen Blat.

Salix pumila linifolia incana. C. B. P. Kleine Weide mit grauen Flachtblättern.

Salix pumila, brevi angustoque folio incano. C. B. P. Kleine Weide, mit kurzem, schmalen, grauen Blat.

Salix Alpina angustifolia repens non incana. C. B. P. Schmalblättrige, grüne kriechende Alpenweide.

Sambucus racemosa rubra. C. B. P. Hollunder mit rothen Beeren.

Spartium tertium, flore albo. C. B. P. Weisser, spanischer Pfriemen.

Spartium alterum monospermum, semine reni simile. C. B. P. Gelber spanischer Pfriemen, so in jeder Schote nur ein Saamenhorn hat.

Spiraea salicis folio. Inst. R. H. *Spiraea frutex*, vulgo. Die Spierstaude.

Spiraea opuli folio. Inst. R. H. Spierstaude mit Wasserholderblättern.

Spiraea hyperici folio non crenato. Inst. R. H. *Hypericum frutex*, vulgo. Die Johanniskrautstaude.

Spiraea Hispanica, hyperici folio crenato. Inst. R. H. Spanische Spierstaude, mit dem ausgekerbten Johanniskrautblat.

Staphylo dendron. Matth. Pimpernsteinbaum.

Staphylo dendron Virginianum trifoliatum. H. L. Drenblättriger, virginischer Pimpernsteinbaum.

Syringa alba, sive Philadelphus Athenæi. C. B. P. Gemeiner, weisser, spanischer Hollunder.

Syringa flore albo pleno. C. B. P. Gefüllter, weisser, spanischer Hollunder.

Thymelæa lauri folio deciduo, sive laureola fœmina. Inst. R. H. Gemeiner Kellerhals.

Thymelæa lauri folio deciduo, flore albedo, fructu flavescente. Inst. R. H. Kellerhals mit weislicher Blume und gelber Frucht.

Thymelæa lauri folio deciduo, flore rubente. Kellerhals mit blasrother Blume.

Thymelæa foliis lini. C. B. P. Kellerhals mit Flachtblättern.

Toxicodendron triphyllum glabrum. Inst. R. H. Drenblättriger, glatter Gifftbaum.

Toxicodendron triphyllum, folio sinuato pubescente. Inst. R. H. Drenblättriger Gifftbaum mit dem ausgeschweiften haarigen Blat.

Toxicodendron rectum, foliis minoribus glabris. Hort. Elth. Aufrecht wachsender Gifftbaum, mit kleinen glatten Blättern.

Toxicodendron rectum pentaphyllum glabrum, foliis latioribus. Fünfblättriger, glatter Gifftbaum, mit breiten Blättern.

Toxicodendron foliis alatis, fructu rhomboide. Catesb. Hist. Gifftbaum mit geflügelten Blättern, und rautenförmiger Frucht.

Viburnum Carolinianum, floribus purpurascen- tibus ex foliorum alis. Der kleine Mehlbaum aus Carolina mit purpurfarbenen Blumen, die aus den Winkeln der Blätter wachsen.

Vitis Idæa magna quibusdam, sive myrtillus grandis. I. B. Grosse Heidelbeeren.

Vitis Idæa, foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. C. B. P. Schwarze Heidelbeeren.

Vitex latiore folio. C. B. P. Reuschbaum mit breiten Blättern.

Vitex foliis angustioribus, cannabis modo dispositis. C. B. P. Reuschbaum mit schmalen Blättern.

Vitex foliis angustioribus, cannabis modo dispositis, floribus cœruleis. H. L. Bat. Reuschbaum mit schmalen Blättern und blauer Blume.

Vitex sive agnus, flore albedo. H. R. Par. Reuschbaum mit weisser Blume.

Vitex sive agnus minor, foliis angustissimis. H. R. Par. Reuschbaum mit sehr schmalen Blättern.

Xanthoxylum spinosum, lentisci longioribus foliis, evonymi fructu capsulari, ex insula Jamaicensi. Pluk. Phyt. Bertram, oder Zahnwehbaum.

Verzeichnis solcher dauerhafter Bäume und Stauden, so scheckige Blätter haben, die sie abwerffen.

Da das Scheckige der Blätter, an Bäumen und Stauden, von einer Krankheit der Pflanzen herkommet, so werden sie davon geschwächt, und wachsen nicht so gros, als die, so einfärbige Blätter haben; daher habe ich sie im vorhergehenden Verzeichnis ausgelassen; weil aber viele Liebhaber alle Sorten gestreifter Bäume und Stauden gerne sammeln; so habe ich zum Unterricht derselben ein besonderes Verzeichnis davon machen wollen, damit

II. Theil.

man solches eher durchlauffen könne, als wann sie durch das allgemeine Verzeichnis vertheilet stünden. Hier aber werde ich sie nicht, wie im vorigen, nach ihrem verschiedenen Wachstum ordnen; weil das vorige Verzeichnis denjenigen, so diese Bäume besonders pflanzen wollen, zu genugsamen Unterricht dienet: dann man darf nur die Bäume und Stauden der nämlichen Sorten mit einfärbigen Blättern ihrer Höhe nach betrachten, und diese darnach ordnen.

0999 999

ACER

ACER majus, foliis eleganter variegatis. Hort. Edin. Der scheckige Ahornbaum.
 Acer platanoides, foliis eleganter variegatis. Der scheckige, norwegische Ahornbaum.
 Acer campestre & minus, foliis variegatis. Der gemeine kleine Ahornbaum.
 Armeniaca malus, fructu majore, foliis ex luteo variegatis. Scheckiger Aprikosenbaum.
 Carpinus foliis ex luteo variegatis. Scheckige Hagbuche.
 Caprifolium non perfoliatum, foliis sinuosis & variegatis. Gestreiftes Geisblatt mit ausgeschnittenen Blättern.
 Caprifolium perfoliatum, foliis variegatis. Gestreiftes welsches Geisblatt.
 Castanea sativa, foliis eleganter variegatis. Scheckige Kastanie.
 Celtis orientalis minor, foliis minoribus & crassioribus, fructu flavo, foliis ex luteo variegatis. Orientalischer Lotusbaum mit scheckigen Blättern.
 Cerasus hortensis, foliis eleganter variegatis. Scheckiger Kirschbaum.
 Cornus foemina, foliis variegatis. H. L. Gestreifter Hundsheerenbaum.
 Cytisus Alpinus latifolius, flore racemoso pendulo, foliis variegatis. Inst. R. H. Gestreifter Geisslee.
 Euonymus vulgaris, granis rubentibus, foliis variegatis. Gemeiner scheckiger Spindelbaum.
 Fagus foliis variegatis. Scheckige Fichte.
 Fraxinus vulgaris, foliis ex luteo variegatis. Scheckige Esche.
 Frangula foliis variegatis. Scheckiger Faulbaum.
 Grossularia hortensis, foliis ex luteo variegatis. Gelbgestreifter Stachelbeerstrauch.
 Grossularia hortensis, foliis ex albo variegatis. Weissgestreifter Stachelbeerbaum.
 Hippocastanum vulgare, foliis ex luteo variegatis. Gelbgestreifte Roskastanie.
 Hippocastanum vulgare, foliis ex albo variegatis. Weissgestreifte Roskastanie.
 Jasminum vulgatum, flore albo, foliis ex luteo elegantissime variegatis. Der gelbgestreifte Jasmin.
 Jasminum vulgatum, flore albo, foliis ex albo elegantissime variegatis. Der weissgestreifte Jasmin.
 Ketmia Syrorum, foliis ex albo eleganter variegatis. Altheenstaude mit weissgestreiften Blättern.
 Ligustrum foliis ex luteo variegatis. H. R. Par. Gelbgescheckter Hartriegelstrauch.
 Ligustrum foliis ex luteo variegatis. Breyn. prod. Weissgescheckter Hartriegelstrauch.
 Lilac flore albo, foliis ex luteo variegatis. Der gelbgestreifte Syringenbaum.
 Lilac flore albo, foliis ex albo variegatis. Der weissgestreifte Syringenbaum.

Malus sylvestris, foliis ex albo eleganter variegatis. Der wilde Apfelbaum mit weisscheckigen Blättern.
 Malus sativa, foliis eleganter variegatis. Der Apfelbaum mit schön gescheckten Blättern.
 Nux juglans sive regia vulgaris, foliis ex luteo variegatis. Walnus mit gelbgestreiften Blättern.
 Opulus flore globoso, foliis variegatis. Schneeballen mit scheckigem Blat.
 Populus alba, majoribus foliis variegatis. Schneeballen mit grossen scheckigen Blättern.
 Populus alba, folio minore variegato. Schneeballen mit kleinen scheckigen Blättern.
 Prunus fructu nigro, carne dura, foliis eleganter variegatis. Die schwarze Pflaume mit hartem Fleisch und schön gescheckten Blättern.
 Pyrus sativa, foliis eleganter variegatis. Birnbaum mit scheckigen Blättern.
 Quercus vulgaris, foliis ex albo variegatis. Gemeine Eiche mit weiss gescheckten Blättern.
 Ribes vulgaris, foliis ex albo variegatis. Weissgescheckte Johannisbeerstaude.
 Ribes fructu albo, foliis ex luteo variegatis. Weissse Johannisbeeren, mit gelbgescheckten Blättern.
 Rosa pumila spinosissima, foliis pimpinellae glabris, ex luteo & viridi eleganter variegatis. Die kleine, wilde, zierlich gescheckte Rose mit Pimpinellenblättern.
 Rubus vulgaris major, folio variegato. Gemeiner Brombeerstrauch mit gescheckten Blättern.
 Salix latifolia rotunda variegata. Gestreifte Weide.
 Sambucus humilior frutescens, foliis eleganter variegatis. H. Edin. Kleiner gestreifter Hollunder.
 Sambucus vulgaris, foliis ex luteo variegatis. Gelbgescheckter Hollunder.
 Sorbus sylvestris, foliis ex luteo variegatis. Wilder Speyerlingbaum mit gestreiften Blättern.
 Syringa foliis ex luteo variegatis. Gelbgescheckter spanischer Hollunder.
 Thymelaea lauri folio deciduo, foliis ex albo variegatis. Kellerhals mit gestreiften Blättern.
 Tilia foemina, folio majore variegato. Linde mit scheckigen Blättern.
 Viburnum folio variegato. Mehlsbaum mit scheckigen Blättern.
 Ulmus minor, folio variegato. Kleiner Ulmenbaum mit scheckigen Blättern.
 Ulmus folio glabro, eleganter variegato. Ulmenbaum mit glatten, gestreiften Blättern.
 Ulmus major Hollandica, angustis & magis acuminatis samaris, folio latissimo scabro variegato. Gestreifter Holländischer Ulmenbaum.
 Ulmus minor, foliis flavescens, Gelbblättriger Ulmenbaum.

Verzeichnis solcher kriechender Stauden, so man an Bäume pflanzen soll, an welchen sie sich hinauf winden, oder die an Pfälen oder einer Wand etc. stehen wollen.

BIGNONIA Americana, fraxini folio, flore amplo phoenicio. Inst. R. H. Gemeine Trompetenblume.

Bignonia Americana minor, fraxini folio, flore coccineo. Catesb. Hist. Kleinere, scharlachfarbe Trompetenblume.

Bignonia

Bignonia Americana, capreolis donata, filiqua breviori. Inst. R. H. Trompetenblume, mit Säbeln und kurzer Schote.

Clematitis sylvestris latifolia. C. B. P. Große wilde Waldrebe.

Clematitis sylvestris latifolia, foliis non incis. Inst. R. H. Große wilde Waldrebe, deren Blätter nicht eingeschnitten sind.

Clematitis peregrina, foliis pyri incis. C. B. P. Fremde Waldrebe mit eingeschnittenen Birnblättern.

Clematitis caerulea, vel purpurea repens. C. B. P. Blaue oder purpurfarbe Waldrebe.

Clematitis caerulea, flore pleno. C. B. P. Blaue Waldrebe mit gefüllter Blume.

Clematitis purpureo-caerulea, flore pleno. C. B. P. Waldrebe mit gefüllter purpurfarbblauer Blume.

Clematitis Canadensis trifolia dentata, flore albo. H. R. Par. Dreiblättrige canadensche Waldrebe mit weißer Blume.

Clematitis purpurea repens, petalis florum coriaceis. Banist. Purpurfarbe, kriechende Waldrebe, mit steifen Blättern.

Frutex scandens, petroselinii foliis, Virginianus, claviculis donatus. Pluk. Man. Der Pfefferbaum.

Frutex scandens Americanus, foliis latis alternatis, fructu evonymi. Kriechender americanischer Spindelbaum.

Granadilla pentaphyllos, flore caeruleo magno. Boerh. Ind. alt. Breitblättrige Passionsblume.

Granadilla pentaphyllos, angustioribus foliis, flore minore pallide caeruleo. Schmalblättrige Passionsblume mit kleiner blasser Blume.

Granadilla Hispanis, flos passionis Italici. Col. in Rech. Dreiblättrige Passionsblume.

Granadilla folio tricuspidato, flore parvo flavescente. Inst. Kleine gelbe Passionsblume.

Hedera arborea. C. B. P. Gemeiner Baumepheu.

Hedera arborea, foliis cymis flavescens. Epheu mit gelben Blättern.

Hedera communis minor, foliis ex albo & viridi variis. Boerh. Ind. alt. Silbergestreifter Epheu.

Hedera communis minor, foliis ex luteo variegatis. Gelbgestreifter Epheu.

Jasminum vulgatum, flore albo. C. B. P. Gemeiner, weißer Jasmin.

Jasminum humile luteum. C. B. P. Gelber italienischer Jasmin.

Jasminum luteum, vulgo dictum bacciferum. C. B. P. Gemeiner gelber Jasmin.

Jasminum humilius, magno flore. C. B. P. Spanischer Jasmin.

Menispermum Canadense scandens, hederaceo folio. Act. R. Par. Kriechendes Mondsaamenkraut aus Canada mit dem Epheublat.

Menispermum Canadense scandens, umbilicato folio. Act. R. Par. Kriechendes Mondsaamenkraut aus Canada, dessen Blat einen Nabel hat.

Menispermum folio hederaceo. Hort. Elth. Mondsaamenkraut mit dem Epheublat.

Periclymenum perfoliatum Virginianum, semper-virens & florens. H. L. Virginische Specklinie.

Phaceloides frutescens Caroliniense, foliis pinnatis, floribus caeruleis spicatis. Der carolinische Fackelbaum.

Toxicodendron amplexicaule, foliis minoribus glabris. Hort. Elth. Kriechender Giftbaum.

Vitis sylvestris labrusca. C. B. P. Wilde Weinrebe.

Vitis laciniatis foliis. Cornut. Weinrebe mit Pestschäferblättern.

Vitis sylvestris Virginiana. Park. Theat. Wilde virginische Weinrebe.

Vitis vulpina dicta, Virginiana alba. Pluk. Alm. Fuchsebe.

Vitis quinquefolia Canadensis scandens. Inst. R. H. Fünfblättrige Rebe aus Canada.

Verzeichnuss solcher immergrüner Bäume und Stauden, so in England in offener Luft vorkommen, nach ihrem Wachstum in Ordnung gebracht.

Bäume so am höchsten wachsen.

ABIES taxi folio, fructu sursum spectante. Inst. R. H. Silberblättrige Tanne.

Abies tenuiori folio, fructu deorsum inflexo. Inst. R. H. Die norwegische Tanne.

Abies foliis praelongis, pinum simulans. Raii Hist. Langblättrige Tanne.

Abies picea foliis brevioribus, conis parvis biuncialibus laxis. Rand. Americanische Pechtanne.

Abies taxifolio, subtus argenteo, fructu longissimo deorsum inflexo. Farblättriger Tannenbaum, mit langen abwärts hangenden Zapfen.

Abies taxi foliis, odore balsami Gileadensis. Raii Hist. Die gileadische Balsamtanne.

Abies maxima Sinensis, pectinatis taxi foliis, apiculis non spinosis Pluk. Die größte sinesische Tanne mit Farblättern.

Cedrus magna, sive Libani, conifera. I. B. Die Ceder vom Libanon.

Ilex oblongo serrato folio. C. B. P. Die immergrüne Eiche mit dem länglichten gezackten Blat.

Ilex folio rotundiore molli, modiceque sinuato, sive Smilax Theophrasti. C. B. P. Die immergrüne Eiche, mit runden, weichen, ausgezackten Blättern.

Magnolia altissima, laurocerasi folio amplissimo, flore ingenti candido. Catesb. Hist. Der grosse Tulpenbaum mit Lorbeerblättern.

Pinus sativa. C. B. P. Die zahme Fichte.

Pinus sylvestris. C. B. P. Der Pinaster.

Pinus sylvestris, foliis brevibus glaucis, conis parvis albescentibus. Raii Hist. Die schottische Fichte.

Pinus sylvestris montana tertia. C. B. P. Die dritte wilde Bergfichte.

Pinus sylvestris montana altera. C. B. P. Die zweite wilde Bergfichte.

Pinus Americana, foliis praelongis, subinde ternis, conis plurimis confertim nascentibus. Rand. Americanische Trauben oder Büschelfichte.

Pinus conis erectis. Inst. R. H. Fichte mit aufrecht stehenden Zapfen.

Ö g g g g g g 2

Pinus

Pinus Hierosolymitana, prælongis & tenuissimis viridibus setis. Pluk. Alm. Die Fichte von Aleppo.

Pinus Virginiana, prælongis foliis tenuioribus, cono echinato. Pluk. Alm. Virginische Fichte, mit langen schmalen Blättern und flachlichten Zapfen.

Pinus Americana, ex uno folliculo setis longis tenuibus triquetris, ad unum angulum per totam longitudinem, minutissimis crenis asperatis. Pluk. Alm. Lord Weymoutsfichte.

Pinus sylvestris maritima, conis firmiter ramis ad-

herentibus. I. B. Wilde Meerfichte, deren Zapfen fest an den Zweigen hängen.

Quercus latifolia, perpetuo virens. C. B. P. Breitblättrige immergrüne Eiche.

Quercus latifolia, subtus argentea, glande minore, calyce hispido. Die Nottinghamseiche.

Suber latifolium perpetuo virens. C. B. P. Der breitblättrige Korkbaum.

Suber angustifolium, non serratum. C. B. P. Der schmalblättrige Korkbaum.

Bäume von mittlerem Wachstum.

A *BIES minor*, pectinatis foliis, Virginiana, conis parvis subrotundis. Pluk. Virginische Tanne mit Farblättern und kleinen runden Zapfen.

Abies piceæ foliis brevibus, conis minimis. Rand. Pechtanne mit den kleinsten Zapfen.

Abies pectinatis foliis, Americana, conis parvis laxis. Americanische Tanne mit Farblättern und kleinen lockern Zapfen.

Abies orientalis, folio brevi & tetragono, fructu minimo deorsum inflexo. Tourn. Cor. Orientalische Tanne mit dem kurzen viereckichten Blat und der kleinsten unter sich stehenden Frucht.

Alaternus. Clus. Hisp. Gemeiner Alaternus.

Alaternus Hispanica latifolia. C. B. P. Spanischer breitblättriger Alaternus.

Aquifolium baccis rubris. H. L. Gemeine Stechpalmen.

Arbutus folio serrato. C. B. P. Erdbeerbaum.

Arbutus fructu turbinato, folio serrato. Inst. R. Erdbeerbaum mit runder Frucht.

Arbutus folio serrato, flore oblongo, fructu ovato. D. Michel. Erdbeerbaum mit länglichter Blume, und eiförmiger Frucht.

Arbutus folio serrato, flore duplici. Erdbeerbaum mit gefüllter Blume.

Cedrus folio cupressi, major, fructu flavescente. C. B. P. Große beerentragende Eeder mit gelber Frucht.

Cedrus Hispanica procerior, fructu maximo nigro. Inst. R. H. Spanische beerentragende Eeder, mit der größten schwarzen Frucht.

Capressus metâ in fastigium convolutâ, quæ femina Plinii. Inst. R. H. Gemeiner aufrecht wachsender Cypressenbaum.

Cupressus ramos extra se spargens, quæ mas Plinii. Inst. R. H. Der sich ausbreitende Cypressenbaum das Männlein.

Ilex folio angusto, non serrato. C. B. P. Steineiche mit Olivenblättern.

Ilex folio agrifolii. Bot. Monsp. Steineiche mit Stechpalmenblättern.

Juniperus major, bacca rufescente. C. B. P. Großer Wacholder mit braunen Beeren.

Juniperus Virginiana, foliis inferioribus juniperinis, superioribus sabinam vel cupressum referentibus. Boerh. Ind. alt. Die virginische Eeder, oben mit Wacholder, unten mit Sevenbaumbblättern.

Juniperus Bermudiana. H. L. Die bermudische Eeder.

Juniperus Virginiana, folio ubique juniperino. Boerh. Ind. alt. Virginischer Wacholder oder Eeder, dessen Blätter überall den Wacholderblättern gleichen.

Laurus vulgaris. C. B. P. Gemeiner Lorbeerbaum.

Laurus vulgaris, flore pleno. H. R. Monsp. Gemeiner Lorbeerbaum mit gefüllter Blume.

Laurus vulgaris, folio undulato. H. R. Par. Gemeiner Lorbeerbaum mit wellenförmigen Blat.

Laurus latifolia, Dioscoridis. C. B. P. Breitblättriger Lorbeerbaum.

Laurocerasus. Clus. Hist. Kirschlorbeer.

Phillyrea latifolia laevis. C. B. P. Breitblättrige glatte welsche Linde.

Phillyrea latifolia spinosa. C. B. P. Breitblättrige flachlichte welsche Linde.

Pinus maritima minor. C. B. P. Die kleine Seefichte.

Pinus humilis, julis virentibus, aut pallentibus. Inst. R. H. Kleine Fichte mit grünluchten, blassen Kägeln.

Pinus humilis, julio purpurascens. Inst. R. H. Kleine Fichte mit purpurfarbenen Kägeln.

Pinus orientalis, foliis durioribus amaris, fructu parvo peracuto. Inst. Cor. Orientalische Fichte, mit harten bitteren Nadeln, und kleinen spitzigen Zapfen.

Pinus Virginiana, tripilis ternis plerumque ex uno folliculo setis, strobilis major. Pluk. Alm. Der Weyhrauchbaum.

Pinus Virginiana, binis brevioribus & crassioribus setis, minori cono, singulis squammarum capitibus aculeo donatis. Pluk. Alm. Jerseyfichte.

Quercus sempervirens, foliis oblongis non sinuatis. Banist. Die americanische beständig grüne Eiche.

Taxus. I. B. Der Farbaum.

Immergrüne Bäume vom dritten Wachstum.

A *LATERNUS* seu *Phylica*, foliis angustioribus & profundius serratis. H. L. Alaternus mit schmalen und tief gezackten Blättern.

Alaternus minore folio. Inst. R. H. Alaternus mit kleinerem Blat.

Aquifolium baccis luteis. H. L. Stechpalm mit gelben Beeren.

Aquifolium baccis albis. Stechpalm mit weißen Beeren.

Aquifolium echinata folii superficie. Corn. Zgelschpalm.

Aquifolium foliis parvis, interdum vix spinosis. Stechpalm mit kleinen und zuweilen ein wenig flachlichten Blättern.

Aqui-

Aquifolium Caroliniense, foliis dentatis, baccis rubris. Catesb. Hist. Carolinischer Stechpalm, mit ausgezackten Blättern, und rothen Beeren.

Buxus arborescens. C. B. P. Buchsbaum.

Buxus arborescens angustifolia. Buchsbaum mit schmalen Blättern.

Buxus longioribus foliis, in acumen luteum desinentibus. H. R. Par. Buchsbaum mit längern Blättern, so gelbe Spitzen haben.

Cedrus folio cupressi, media, majoribus baccis. C. B. P. Die mittlere Ceder, mit grossen Beeren.

Cerasi similis arbuscula Mariana, pædi folio, flore albo parvo racemoso. Pluk. Mant. Vogelfirschen aus Maryland, mit schwarzer Frucht.

Cupressus Lusitanica patula, fructu minore. Inst. R. H. Die ausgebreitete Eypresse, mit kleiner Frucht.

Evonymus Virginianus, pyracanthæ foliis, sempervirens, capsula verrucarum instar asperata, rubente. Pluk. Phyt. Der immergrüne, amerikanische Spindelbaum.

Juniperus vulgaris, arbor. C. B. P. Gemeiner Wacholder.

Juniperus major, bacca cærulea. C. B. P. Grosser Wacholder mit blauen Beeren.

Magnolia amplissimo flore albo, fructu cæruleo. Plum. Magnolia mit grosser weisser Blume, und blauer Frucht.

Olea maximo fructu. Inst. R. H. Spanischer Olivenbaum.

Olea fructu oblongo atro-virente. Inst. R. H. Olivenbaum mit langer dunkelgrüner Frucht.

Olea fructu albo. Inst. R. H. Olivenbaum mit weisser Frucht.

Olea fructu majusculo & oblongo. Inst. R. H. Olivenbaum mit grosser langer Frucht.

Olea fructu majori, carne crassa. Inst. R. H. Königsoliven.

Olea maxima subrotunda. H. R. Monsp. Grösste runde Oliven.

Olea sylvestris, folio duro, subtus incano. C. B. P. Wilder Olivenbaum.

Phillyrea folio leviter serrato. C. B. P. Die wahre welsche Linde mit etwas zackigem Blat.

Phillyrea angustifolia prima. C. B. P. Schmalblättrige welsche Linde.

Phillyrea angustifolia secunda. C. B. P. Die zweitste schmalblättrige welsche Linde.

Phillyrea folio ligustri. C. B. P. Die welsche Linde mit dem Hartriegelblat.

Phillyrea oleæ Ephesiæ folio. Pluk. Phyt. Welsche Linde mit dem Oehlblat.

Phillyrea angustifolia spinosa. H. R. Par. Schmalblättrige, stachelichte welsche Linde.

Phillyrea longiore folio, profunde crenato. H. R. Par. Langblättrige welsche Linde, mit dem tiefgerkerbten Blat.

Phillyrea folio buxi. H. R. Par. Welsche Linde mit dem Buchsblat.

Phillyrea Hispanica, lauri folio serrato & aculeato. Inst. R. H. Spanische welsche Linde, mit dem gezackten, stachelichten Lorbeerblat.

Phillyrea Hispanica, nerii folio. Inst. R. H. Spanische welsche Linde mit dem Oleanderblat.

Tamariscus Narbonensis. Lob. Icon. Der schmalblättrige Tamariscenbaum.

Tamariscus Germanicus. Lob. Icon. Der deutsche Tamariscenbaum.

Thuya Theophrasti. C. B. P. Der Baum des Lebens.

Verzeichniss solcher immergrünen Stauden, so in Engeland in freyer Luft fortkommen.

BUPLERUM arborescens, salicis folio. Inst. R. H. Seseli Aethiopicum frutex. Aethiopische Seselstaude.

Caprifolium perfoliatum sempervirens, floribus speciosius. Immergrüne Specklilie.

Calline vera Floridanorum, arbuscula baccifera, alaterni ferme facie, foliis alternatim sitis, tetrapylene. Pluk. Mant. Immergrüne Casine, oder Subseethee.

Chamaelea tricoccos. C. B. P. Zeyland.

Chamaerhododendron Ponticum maximum, folio laurocerasi, flore cæruleo purpurascete. Pontische Bergröslein, mit Kirschlorbeerblättern, und blaupurpurfarber Blume.

Chamaerhododendron Americanum, laurocerasi folio, floribus albis. Amerikanisch Bergröslein, mit dem Kirschlorbeerblat, und weissen Blumen.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore luteo. Inst. R. H. Gemeiner Fenster.

Cytiso-genista scoparia vulgaris, flore albo. Inst. R. H. Gemeiner Fenster mit weisser Blume.

Cytisus spinosus. H. L. Dornichter Geisklee.

Genista-spartium spinosum majus primum, flore luteo. C. B. P. Französisch Scorpionkraut.

Genista-spartium spinosum majus secundum, flore pallido. C. B. P. Scorpionkraut mit blasser Blume.

II. Theil.

Genista-spartium spinosum majus tertium, hirsutum. C. B. P. Raues Scorpionkraut.

Genista-spartium majus, brevioribus & longioribus aculeis. C. B. P. Gemein Scorpionkraut.

Genista-spartium minus Anglicum. Inst. R. H. Klein, englisch Scorpionkraut.

Hedera arborea. C. B. P. Gemeiner Epheu.

Ilex aculeata cocciglandifera. C. B. P. Der Kermesbaum.

Ilex media coccifera ilici plane suppar, folio aquifoliae. Lob. Ad. Kleine immergrüne Staudeneiche.

Juniperus vulgaris fruticosa. C. B. P. Gemeiner Wacholder.

Juniperus minor montana, folio latiore, fructuque longiore. C. B. P. Kleiner Bergwacholder mit breiterem Blat und längerer Frucht.

Laurocerasus Lusitanica minor. Inst. R. H. Portugiesischer Kirschlorbeerbaum.

Laurustinus Virginiana, floribus albidis eleganter bullatis. D. Banister. Wintergrün mit Epheublättern.

Magnolia lauri folio, subtus albicante. Catesb. Hist. Kleiner Zulpenbaum mit Lorbeerblättern.

Mespilus spinosa, pyri folio. H. L. Der Hagedorn.

h h h h h h

Myrtus

- Myrtus latifolia* Romana. C. B. P. Gemeiner breitblättriger Myrtenbaum.
Myrtus flore pleno. Corn. Myrtenbaum mit gefüllter Blume.
Myrtus communis Italica. C. B. P. Gemeiner italienischer Myrtenbaum.
Olea fructu oblongo minori. Inst. R. H. Olivenbaum mit kleiner länglicher Frucht.
Olea fructu minore & rotundiore. Inst. R. H. Olivenbaum mit schmaler runder Frucht.
Olea minor rotunda racemosa. H. R. Par. Kleiner Olivenbaum mit runder Frucht, so traubensweis wächst.
Olea minor rotunda rubro-nigricans. H. R. Par. Kleiner Olivenbaum mit schwarzrother Frucht.
Olea minor Lucensis, fructu odorato. Inst. R. H. Olivenbaum aus Lucca.
Olea Africana, folio buxi crasso atro-viridi lucido, cortice albo scabro. Boerh. Ind. alt. Der africanische Olivenbaum mit Buchsblättern.
Rosmarinus hortensis latiore folio. Mor. Hist. Breitblättriger Gartenrosmarin.
Rosmarinus hortensis, angustiore folio. C. B. P. Schmalblättriger Gartenrosmarin.
Ruscus myrtifolius aculeatus. Inst. R. H. Gemeiner Mäusdorn.
Ruscus myrtifolius aculeatus, folio angustiore. Der gemeine Mäusdorn mit schmalem Blat.
Ruscus vulgaris, folio ampliore. Hort. Pis. Breitblättriger Mäusdorn.
Ruscus latifolius, fructu folio innascente. Inst. R. H. Breitblättriger alexandrischer Lorbeer, dessen Frucht am Blat wächst.

- Ruscus angustifolius*, fructu folio innascente. Inst. R. H. Eben derselbe mit schmalen Blättern.
Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente. Inst. R. H. Eben derselbe mit der Frucht am Ende der Aeste.
Sabina folio tamarisci Dioscoridis. C. B. P. Der Sevenbaum.
Sabina folio cypressi. C. B. P. Sevenbaum mit Cypressblättern.
Senecio Virginianus arborescens, atriplicis folio. Par. Bat. Virginisch Kreuzkraut, mit dem Melidenblat.
Thymelæa laurifolia sempervirens, seu laureolamas. Inst. R. H. Kellershals.
Thymelæa Alpina linifolia humilior, flore purpureo odoratissimo. Inst. R. H. Euerum des Matthioli.
Tinus prior. Clus. Hist. Bastartlorbeer mit glänzenden Blättern.
Tinus alter. Clus. Hist. Raublättriger Einuslorbeer.
Tinus Tertius. Clus. Hist. Kleinblättriger Einuslorbeer.
Tinus prior Clusii, folio atroviridi splendente. Einuslorbeer mit glänzenden Blättern.
Vermicularis frutex major. Ger. Emac. Hauswurz, Ragenträublein.
Vitis Idæa sempervirens, fructu rubro. I. B. Rother Heidelbeeren.
Vitis Idæa Caroliniana, foliis subrotundis hirsutis ex adverso nascentibus, floribus minimis herbaceis, fructu pravo rubello. St. Petersburg'staude.
Uva Ursi. Clus. Hist. Spanische Heidelbeeren.

Verzeichnus immergrüner Bäume und Stauden mit scheckigen Blättern.

- A**LATERNUS aurea, seu foliis ex luteo variegatis. H. R. Par. Der gelbgescheckte Alaternus.
 Alaternus argentea, seu foliis ex albo variegatis. H. R. Par. Der weißgescheckte Alaternus.
 Alaternus foliis angustioribus & profundius serratis, limbis argenteis. Alaternus mit schmalen Blättern so eine weiße Einfassung haben.
 Alaternus foliis angustioribus & profundius serratis, limbis aureis. Alaternus dessen Blätter gelb eingefasset sind.
 Aquifolium foliis ex albo variegatis. H. L. Silberstreifiger Stechpalm.
 Aquifolium foliis ex luteo variegatis. H. R. Par. Gelbfleckichter Stechpalm.
 Aquifolium echinata folii superficie, foliis ex luteo variegatis. Igelsstechpalm mit gelbgestreiften Blättern.
 Aquifolium echinata folii superficie, foliis ex albo variegatis. Igelsstechpalm mit silberscheckigen Blättern.
 Aquifolium foliis longioribus, limbis & spinis ex unico tantum latere per totum argenteo pictis. Pluk. Brodericks Stechpalm.
 Aquifolium foliis subrotundis, limbis & spinis utrinque argentatis, acquifolium elegans. D. Doct. Eales. Pluk. Alm. Eales Stechpalm.
 Aquifolium foliis oblongis lucidis, spinis & limbis argenteis. Sir Thomas Franklins Stechpalm.
 Aquifolium foliis subrotundis, limbis argenteis, spinulis & marginalibus purpurascens. Bridgmanns Stechpalm.
 Aquifolium foliis oblongis, spinis & limbis flavescens. Longstaffs bester Stechpalm.
 Aquifolium foliis & spinis majoribus, limbis flavescens. Schöne Phyllis.
 Aquifolium foliis minoribus, spinis & limbis argenteis. Geschminkter Frauenstechpalm.
 Aquifolium foliis angustioribus, spinis & limbis flavescens. Fullers Rahmstechpalm.
 Aquifolium foliis oblongis, ex luteo & aureo elegantissime variegato. Milchmagd'stechpalm.
 Aquifolium foliis oblongis viridibus, maculis argenteis notatis. Capels scheckiger Stechpalm.
 Aquifolium foliis latissimis, spinis & limbi flavescens. Die Glorie des orientalischen Stechpalms.
 Aquifolium foliis oblongis, spinis majoribus, foliis ex aureo variegatis. Die Glorie des Weststechpalms.
 Aquifolium foliis oblongis, spinis & limbis argenteis. Herfordshire weißer Stechpalm.
 Aquifolium foliis longioribus, spinis & limbis argenteis. Der Einigkeitstechpalm.
 Aquifolium foliis parvis, interdum vix spinosis, limbis foliorum argentatis. Whitmills Stechpalm.
 Buxus foliis ex luteo variegatis. H. R. Par. Gelb eingefaster Buchs.
 Buxus major, foliis per limbum argenteis. Weiß eingefaster Buchs.

Hedera

Hedera communis minor, foliis ex albo & viridi variegatis. Weissgestreifter Epheu.
Hedera communis minor, foliis ex aureo variegatis. Gelbgestreifter Epheu.

Laurocerasus foliis ex luteo variegatis. Gelbgestreifter Kirschlorbeer.

Laurocerasus foliis ex albo variegatis. Weissgestreifter Kirschlorbeer.

Phillyrea latifolia laevis, foliis ex luteo variegatis. Weissche Linde mit gelbgestreiften Blättern.

Rosmarinus angustiore folio, argenteus. H. R. Par. Silberner Rosmarin.

Rosmarinus striatus sive aureus. Park. Theat. Goldstreifiger Rosmarin.

Sabina folio variegato. Gestreifter Sevenbaum.

Taxus foliis variegatis. Scheckiger Farnbaum.

Thuya Theophrasti, foliis eleganter variegatis. Scheckiger Baum des Lebens.

Thymelæa laurifolia, sempervirens, foliis ex luteo variegatis. Gestreifter Kellerhals.

Tinus prior Clusii, foliis ex albo variegatis. Gestreifter Zinuslorbeer.

Tinus secundus Clusii, foliis ex luteo variegatis. Gelbstreifiger Zinuslorbeer.

Hier will ich ein Verzeichnis solcher immergrüner Stauden beifügen, so in England im freyen Feld wachsen, wann sie in einem trockenen Boden und warm stehen; weil sie aber gar oft in strengen Wintern drauf gehen, so können sie nicht unter vorangeführte Stauden gesetzt werden: dann wann diese nach sechs oder acht Jahren verdürben, würde dadurch die Plantasche so leer werden, daß sie ein sehr schlechtes Ansehen machte. Daher ist es besser man setzet sie Klumpenweis an einen warmen Ort zusammen, wo sie etliche Jahre dauern und ein feines Ansehen machen werden; sollten sie aber verderben, könnten selbige bald wieder ersetzt werden, wann man von jeder Sorte einige Pflanzen verwahret behalten.

Absointhium arborefcens. Lob. Icon. Der Wermuthsbaum.

Alaternoides Africana, ericæ foliis, floribus albicantibus & muscosis. H. Amst. Africanische Alaternoides.

Althæa frutescens, folio acuto, parvo flore. C. B. P. Staudige Althee, mit dem spizigen Blat und kleiner Blume.

Althæa frutescens Lusitanica, folio ampliore, minus incano. Inst. R. H. Portugiesische, staudige Althee, mit größerem und nicht so grauem Blat.

Althæa frutescens, folio bryoniae. C. B. P. Staudige Althee mit dem Zaunrübenblat.

Althæa frutescens Lusitanica, folio rotundiori undulato. Inst. R. H. Portugiesische, staudige Althee, mit dem runden wellenförmigen Blat.

Althæa maritima arborea Gallica. Inst. R. H. Der Altheenbaum.

Anagyris vera foetida. I. B. Der Stinckbaum.

Anonis purpurea verna, seu præcox, perennis frutescens, flore rubro amplo. Mor. Hist. Staudige Frühlings Hauhechel, mit grosser rother Blume.

Atriplex latifolia, sive halimus fruticosus latifolius. Mor. H. Staudige Melde, Meerportulac genannt.

Barba Jovis pulchre lucens. J. B. Der Silberbusch.

Cistus mas major, folio rotundiore. J. B. Grosse Eistenröslein, mit rundem Blat.

Cistus mas, folio brevior. C. B. P. Eistenröslein mit kurzem Blat.

Cistus mas Lusitanica, folio amplissimo incano. Inst. R. H. Portugiesisch Eistenröslein, mit dem grossen grauen Blat.

Cistus mas, folio oblongo incano. C. B. P. Eistenröslein, mit dem länglichten grauen Blat.

Cistus mas, foliis undulatis & crispis. Inst. Eistenröslein mit wellenförmigen, krausen Blättern.

Cistus ladanifera Monspeliensis. C. B. P. Eistenröslein, so das Ladanum bringt, von Montpellier.

Cistus ladanifera Cretica, flore purpureo. Tourn. Cor. Wohlriechend Gummitragend Eistenröslein aus Creta mit purpurfarber Blume.

Cistus ladanifera, latiore folio acuminato, flore majore albo. Gummitragend Eistenröslein, mit dem breiten spizigen Blat, und grosser weisser Blume.

Colutea Aethiopica, flore phœnicio, folio barbae Jovis. Breyn. Cent. Aethiopische Bläsleinsenna mit scharlachfarben Blumen und Jupitersbartblättern.

Coronilla maritima, glauco folio. Inst. R. H. Silberblättriges Weifraut.

Cytisus hirsutus. J. B. Haariger Geisklee.

Dorycnium Monspeliensis. Lob. Icon. Stauden-klee aus Montpellier.

Jasminoides Africanum, jasmini aculeati foliis & facie. Raii. Africanischer Bastartjasmin.

Medicago trifolia frutescens incana. Inst. R. H. Staudiger, dreyblättriger, grüner Mondklee.

Melanthus Africanus. H. L. Die grosse Honigblume.

Phlomis fruticosa, salviae folio latiore & rotundiore. Inst. R. H. Breitblättriger Salbeybaum.

Phlomis fruticosa, salviae folio longiore & angustiore. Inst. R. H. Schmalblättriger Salbeybaum.

Phlomis fruticosa humilis, latifolia, candidissima, floribus luteis. Rand. Niedriger, staudiger Salbeybaum mit breiten weissen Blättern und gelber Blume.

Siliqua edulis. C. B. P. Johannisbrod.

Teucrium Hispanicum, latiore folio. Inst. R. H. Spanisch Baumgamanterlein, mit breitem Blat.

Teucrium multis. J. B. Gemein Baumgamanterlein.

Teucrium Baticum. Clus. Hisp. Spanisch Baumgamanterlein.

Trifolium bitumen redolens. C. B. P. Harzklee.

Trifolium bituminosum arboreum, angustifolium ac sempervirens. H. Cath. Schmalblättriger Baumharzklee.

h h h h h h

Verzeich-

Verzeichnuss solcher dauerhafter, beständiger, blühender Pflanzen, so in gemeinen Rabatten, ohne Bedeckung wachsen, und für den Blumengarten nicht zu gros sind, noch auch mit den Wurzeln weit um sich kriechen, auch nicht alle Jahre ausgehoben werden müssen.

- A**CONITUM lycoctonum luteum. C. B. P. Gelbe, giftige Wolfswurz.
 Aconitum saluterum seu anthora. C. B. P. Giftheil.
 Aconitum Pyrenaicum, ampliore folio tenuius laciniato. Inst. R. Die Wolfswurz vom pyrenäischen Gebürg mit breiten zart zerschnittenen Blättern.
 Aconitum coma inflexa, foliis angustioribus. C. B. P. Wolfswurz mit gebogenen Spitzen, und schmalen Blättern.
 Aconitum violaceum, seu napellus 2. C. B. P. Wolfswurz mit violenblauer Blume.
 Adonis hellebori radice, buphthalmi flore. H. L. Adonisröslein mit einer Wurzel wie die Nieswurz hat.
 Anonis Caroliniana perennis non spinosa, foliorum marginibus integris, floribus in thyrsis candidis. Martyn. Cent. Glatte, beständige Hauhechel aus Carolina, mit ganzen Blättern, und weissen Blumen, so eine länglichte Aehre machen.
 Apocynum erectum Canadense angustifolium. Par. Bat. Aufrecht wachsender, schmalblättriger Hundskohl aus Canada.
 Aquilegia hortensis multiplex, flore magno caeruleo. C. B. P. Gefüllter Gartenachley, mit grosser grauer Blume.
 Aquilegia hortensis multiplex, flore magno violaceo. C. B. P. Gefüllter Gartenachley, mit grosser violetblauer Blume.
 Aquilegia hortensis multiplex, flore magno saturate rubente. C. B. P. Gefüllter Gartenachley, mit grosser dunkelrother Blume.
 Aquilegia hortensis multiplex, flore magno variegato. C. B. P. Großer Gartenachley, mit grosser, scheckiger Blume.
 Aquilegia flore roseo multiplici. Agley mit gefüllter rosenfarber Blume.
 Aquilegia stellata, flore pleno purpureo. Sternagley mit violblauer Blume.
 Asphodelus albus ramosus mas. C. B. P. Grosse, weisse, ästige Asfodillen.
 Asphodelus albus ramosus minor, seu ramosus alter. H. R. Par. Kleine weisse, ästige Asfodillen.
 Asphodelus albus non ramosus. C. B. P. Weisse Asfodillen.
 Aster Atticus caeruleus vulgaris. C. B. P. Italiänisches blaues Sternkraut.
 Aster tripolii flore. C. B. P. Das Sternkraut mit Tripoliumblumen.
 Aster Virginianus pyramidatus, hyssopi foliis asperis, calycis squamulis foliaceis. Rand. Das virginische Sternkraut, mit hyssopähnlichen Blättern, und grossen Blumen mit schuppichten Kelchen.
 Aster Novae Angliae, linariae folio, chamamelis floribus. Par. Bat. Das Sternkraut aus Neuengland, mit Leinfrautblättern und Blumen so den Camillenblumen gleichen.
 Asteroides Alpina, salicis folio. Cor. Inst. Unächtes Sternkraut der Alpen mit Weidenblättern.
 Buphthalmum tanacetii minoris foliis. C. B. P. Gemeines Rindsaug mit Rainfarrenblättern.
 Buphthalmum orientale, tanacetii minoris folio, flore luteo amplissimo. Tourn. Cor. Orientalisches Rindsaug mit grossen gelben Blumen.
 Buphthalmum orientale, tanacetii minoris folio incano, flore sulphureo amplissimo. Boerh. Rindsaug mit grauen Rainfarrenblättern, und grossen schwefelgelben Blumen.
 Buphthalmum orientale, tanacetii minoris folio, flore albo amplissimo. Tourn. Cor. Orientalisches Rindsaug mit grossen, weissen Blumen.
 Campanula pyramidata altissima. Inst. R. H. Die höchste pyramidenförmige Glockenblume.
 Campanula persicae folio. Clus. Hist. Glockenblume mit Pfersichblättern.
 Campanula persicae folio, flore albo. H. Eyst. Weisse Glockenblume mit Pfersichblättern.
 Campanula persicae folio, flore pleno caeruleo. Inst. R. H. Gefüllte blaue Glockenblume mit Pfersichblättern.
 Campanula persicae folio, flore albo pleno. Inst. R. H. Gefüllte weisse Glockenblume mit Pfersichblättern.
 Cardamine pratensis, magno flore pleno. Inst. R. H. Gefüllte Kresse.
 Clematidis caerulea erecta. C. B. P. Die blaue Waldrebe.
 Clematidis sive flammula surrecta alba. C. B. P. Aufrecht wachsende weisse Waldrebe.
 Clematidis Hispanica surrecta, altera & humilior, flore albicante. H. R. Par. Niedrige, spanische Waldrebe mit weisslichter Blume.
 Cyanus angustiore folio & longiore, Belgicus. H. R. Par. Grosse, schmalblättrige Kornblume.
 Cyclamen hederæ folio. C. B. P. Gemeines Herbstsaubrod.
 Cyclamen hederæ folio, flore albo. Herbstsaubrod mit weisser Blume.
 Digitalis latifolia, flore ferrugineo. H. R. Par. Breitblättriger Fingerhut mit eisenfarbenen Blumen.
 Digitalis angustifolia, flore ferrugineo. C. B. Par. Schmalblättriger Fingerhut, mit eisenfarbenen Blumen.
 Ephemerum Virginianum, flore caeruleo majori. Inst. R. H. Virginisch Spinnenkraut mit kleiner blauer Blume.
 Ephemerum Virginianum, flore purpureo majori. Inst. R. H. Virginisch Spinnenkraut mit grosser, purpurfarber Blume.
 Ephemerum Virginianum, flore albo majori. Inst. R. H. Virginisch Spinnenkraut, mit grosser weisser Blume.
 Eryngium montanum, amethystinum. C. B. P. Purpurviolettfarbe Bergmanstreu.
 Eryngium Alpinum amethystinum, capitulo majore pallescente. Inst. R. H. Die Manstreu der Alpen mit grossen, blassen, Hauptlein.
 Fraxinella. Clus. Hist. Weisser Diptam.
 Fraxinella purpurea major multiflora. H. R. Par. Großer purpurfarber Diptam, mit vielen Blumen.
 Fraxinella minor purpurea Belgarum. H. P. Par. Der kleine, purpurfarbe, holländische, weisse Diptam.

Fraxinella

- Fraxinella niveo flore.* Clus. Hist. Weisser Diptam mit schneeweisser Blume.
Fumaria sempervirens & floreus, flore albo. Flor. Immergrüner Erdrauch, mit weisser Blume.
Fumaria lutea. C. B. P. Gelber Erdrauch.
Fumaria bulbosa, radice cava, major. C. B. P. Großer Bollenwurzlicher Erdrauch, oder Holzwurz.
Fumaria bulbosa, radice non cava, major. C. B. P. Großer bollenwurzlicher Erdrauch, dessen Wurzel nicht hol ist.
Gentiana major lutea. C. B. P. Großer Enzian mit gelber Blume.
Gentiana Alpina, magno flore. L. B. Grosblumiger Enzian der Alpen.
Gentiana asclepiadis folio. C. B. P. Enzian mit Schwalbenwurzblättern.
Gentiana palustris angustifolia. C. B. P. Schmalblättriger Enzian der Sümpfe.
Gentiana pratensis, flore lanuginoso. C. B. P. Wiesenzian mit dem wollichten Blat.
Geranium batrachoides, Gratia Dei Germanorum. C. B. P. Storchenschnabel mit dem Frochypotenblat.
Geranium sanguineum, maximo flore. C. B. P. Blutiger Storchenschnabel mit grosser Blume.
Geranium haematodes Lancastriense, flore eleganter striato. Raii Hist. Blutiger Storchenschnabel mit scheckiger Blume.
Geranium nodosum. Knotiger Storchenschnabel.
Geranium orientale columbium, flore maximo, asphodeli radice. Cor. Inst. Orientalischer Taubenfuß, mit grosser Blume, und Asphodillwurzblättern.
Geranium Alpinum, coriandri folio, longius radicatum, flore purpureo maximo. Michel. Storchenschnabel der Alpen, mit dem Corianderblat, langer Wurzel und grosser purpurfarber Blume.
Geranium Romanum versicolor, live striatum. Park. Parad. Römischer Storchenschnabel mit gestreiften Blumen.
Geum folio subrotundo, majori, pistillo floris rubro. Inst. R. H. Der Londnerstolz, Nichts so schön.
Geum folio subrotundo minori, pistillo floris rubro. Inst. R. H. Kleiner Londnerstolz.
Geum rotundifolium majus. Inst. R. H. Kleiner, rundblättriger Bergsanickel.
Hedysarum triphyllum Canadense. Cornut. Dreyblättriger, spanischer Klee aus Canada.
Heleniastrum folio longiore & angustiore. Vaill. Bastartaland mit langem, schmalen Blat.
Heleniastrum folio brevior & latiore. Vaill. Bastartaland mit breitem, kurzen Blat.
Helenium cistifolium, non crenato, magno flore. Vaill. Gelbes Sternkraut, mit dem Cistusblat und grosser Blume.
Helleborus niger flore albo, etiam interdum valde rubente. L. B. Wahre, schwarze Niesewurz.
Helleborus niger, angustifolius. Inst. R. H. Schmalblättrige, schwarze Niesewurz.
Helleborus niger trifolius. Hort. Farn. Dreyblättrige, schwarze Niesewurz.
Helleborus niger, ranunculi folio, flore globoso majore. Inst. R. H. Gelbe Kugelblume.
Hepatica trifolia, caeruleo flore. Clus. H. Das einfache, edle Leberkraut.
Hepatica trifolia, caeruleo flore pleno. Clus. H. Gefülltes edles Leberkraut mit blauer Blume.

II. Theil.

- Hepatica trifolia, rubro flore.* Clus. Hist. Edel Leberkraut mit rother Blume.
Hepatica trifolia, flore rubro pleno. Boerh. Ind. Edel Leberkraut mit rother gefüllter Blume.
Hepatica trifolia, flore albo simplici. Boerh. Ind. Edel Leberkraut mit weisser Blume.
Hermodactylus folio quadrangulo. Tourn. Cor. Schlangenkopsiris.
Hesperis flore purpureo pleno. H. R. Par. Nachtheil mit gefüllter purpurfarber Blume.
Hesperis flore albo pleno. H. R. Par. Nachtheil mit gefüllter, weisser Blume.
Iris vulgaris violacea, five purpurea silvestris. L. B. Gemeine purpurfarbe Schwertlilie.
Iris hortensis latifolia. C. B. P. Breitblättrige Gartenschwertlilie.
Iris hortensis alba Germanica. C. B. P. Weisse, deutsche Gartenschwertlilie.
Iris alba Florentina. C. B. P. Weisse, florentinische Iris.
Iris Sufiana, flore maximo, ex albo nigricante. C. B. P. Calcedonische Iris mit grosser, schwarzer und weisser Blume.
Iris Dalmatica major. C. B. P. Grössere Iris aus Dalmatien.
Iris latifolia Pannonica, colore multiplici. C. B. P. Breitblättrige, ungarische Iris, mit vielfarbiger Blume.
Iris angustifolia maritima major. C. B. P. Grössere, schmalblättrige, Seeiris.
Iris angustifolia maritima minor. C. B. P. Kleinere, schmalblättrige Seeiris.
Iris angustifolia hortensis versicolor. C. B. P. Schmalblättrige, vielfarbige Garteniris.
Iris angustifolia prunum redolens minor. C. B. P. Kleine, schmalblättrige, wie Pflaumen riechende Iris.
Iris Americana versicolor, stylo non crenato. Hort. Elth. Vielfarbige americanische Iris mit eingekerbten Griffel.
Iris Americana versicolor, stylo crenato. Hort. Elth. Vielfarbige americanische Iris, mit gekerbten Griffel.
Iris humilis minor, flore purpureo. Inst. R. H. Kleine, niedrige Iris, mit purpurfarber Blume.
Iris Asiatica caerulea polyanthos. C. B. P. Vielblumige, blaue, asiatische Iris.
Iris peregrina subrubens inodora. C. B. P. Rötliche, ausländische Iris, ohne Geruch.
Iris peregrina, odore oxyacanthæ. C. B. P. Fremde Iris, so wie der Hagedorn riecht.
Iris Dalmatica minor. C. B. P. Kleine, dalmatische Iris.
Iris Byzantina purpureo-caerulea. C. B. P. Purpurblaue Iris von Constantinopel.
Iris latifolia Germanica ochroleucos. C. B. P. Breitblättriger, deutscher Schwertel, mit gelblicht weisser Blume.
Iris latifolia humilior versicolor. C. B. P. Niedere, breitblättrige scheckige Iris.
Lilio-asphodelus luteus. Par. Gelbe Affodillilie.
Lilio-narcissus luteus autumnalis minor. Inst. R. H. Grosse, gelbe, Herbstnarcissilie.
Lilio-narcissus luteus autumnalis minor. Inst. R. H. Kleine, gelbe Herbstnarcissilie.
Lilio-hyacinthus vulgaris, flore caeruleo. Inst. R. H. Gemeiner Lilienhyacinth, mit blauer Blume.
Lilio-hyacinthus vulgaris, flore niveo. Inst. R. H. Gemeiner Lilienhyacinth, mit weisser Blume.

- Lilio - hyacinthus vulgaris, flore rubello. Inst. R. H. Gemeiner Lilienhyacinth, mit röthlicher Blume.
- Lychnis hirsuta, flore coccineo, major. C. B. P. Scharlachfarbe Lychnis.
- Lychnis Chalcedonica, flore pleno miniato, seu aurantiaco. Mor. Gefüllte, scharlachfarbe Lychnis.
- Lychnis coronaria sativa multiplex. C. B. P. Gefüllte Sammttröselein.
- Lychnis alba multiplex. C. B. P. Gefüllte, weisse, Sammttröselein.
- Lychnis purpurea multiplex. C. B. P. Gefüllte, rothe Sammttröselein.
- Lychnis pratensis, flore laciniato pleno ampliore purpureo. Inst. R. H. Gefüllte, grosse Wiesensammttröselein.
- Lychnidea Virginiana, holostii ampliore folio, floribus umbellatis purpureis. Act. Phil. Virginische Lychnidea mit purpurfarben, doldenweis wachsenden Blumen.
- Lychnidea Caroliniana, floribus quasi umbellatis dispositis, foliis lucidis crassis acutis. Martyn. Carolinische Lychnidea.
- Lythymachia spicata, flore albo, salicis folio. Inst. R. H. Weiderich mit weisser, ährenförmiger Blume.
- Moly latifolium liliflorum. C. B. P. Breitblättriges Moly des Theophrast.
- Moly latifolium Indicum. C. B. P. Breitblättriges, indianisches Moly.
- Moly latifolium Hispanicum. C. B. P. Breitblättriges, spanisches Moly.
- Moly latifolium, flavo flore. Clus. App. Breitblättriges Moly, mit gelber Blume.
- Moly angustifolium umbellatum. C. B. P. Homers Moly.
- Moly angustifolium, foliis reflexis. C. B. P. Schlangemoly.
- Moly moschatum, capillaceo folio. C. B. P. Moly von Montpellier.
- Moly narcissinis foliis 1. Clusii Hist. Moly mit Asfodillblättern.
- Moly narcissinis foliis, altera species. Clus. Hist. Ein anderes Moly mit Asfodillblättern.
- Narcisso - leucoium trifolium majus. Inst. R. H. Größeres Schneetropflein.
- Narcisso - leucoium flore patulo. Inst. R. H. Schneetropflein mit offener Blume.
- Narcisso - leucoium pratense multiflorum. Inst. R. H. Vielblumiges Mattenschneetropflein.
- Obeliscotheca integrifolia, radio aureo, umbone atro - rubente. Hort. Elth. Kleine Sonnenblume mit ganzen Blättern, deren Blättlein goldfarb sind, und eine dunkelrothe Scheibe haben.
- Omphalodes pumila verna, symphyti folio. Das niedrige Frühlingsnabelsaamenkraut, mit dem Wollwurzblatt.
- Ornithogalum angustifolium majus, floribus ex albo virescentibus. C. B. P. Hünermilch mit grünlicher Blume.
- Ornithogalum majus spicatum album. C. B. P. Grosse, weisse ährige Hünermilch.
- Ornithogalum latifolium maximum. C. B. P. Die größte, breitblättrige, Hünermilch.
- Ornithogalum medium umbellatum angustifolium. C. B. P. Gemeine Hünermilch.
- Ornithogalum luteum. C. B. P. Gelbe Hünermilch.

- Ornithogalum angustifolium spicatum maximum. C. B. P. Die größte, schmalblättrige, ährentragende Hünermilch.
- Ornithogalum spicatum, seu comosum, flore lacteo. C. B. P. Ährige, oder buschichte Hünermilch, mit milchweisser Blume.
- Ornithogalum luteum, magno flore. Gelbe Hünermilch mit grosser Blume.
- Ornithogalum umbellatum maximum. C. B. P. Der Stern aus Alexandria.
- Orobis Venetus. Clus. Hist. Venetianische Waldserven.
- Orobis sylvaticus, foliis vicia. C. B. P. Waldserven mit Wickenblättern.
- Paeonia folio nigricante splendido, quæ mas. C. B. P. Gichtrosenmännlein.
- Paeonia foemina, flore pleno rubro majore. C. B. P. Gichtrosenweiblein mit gefüllter, grosser, rother Blume.
- Paeonia flore pleno rubro minore. C. B. P. Gichtrosen mit gefüllter, rother, kleiner Blume.
- Paeonia foemina, flore albo pleno majore. C. B. P. Gichtrosenweiblein, mit grosser, gefüllter, weisser Blume.
- Pancratium maritimum, floribus albis. Weisse Meerlilie.
- Pancratium floribus rubris. Lob. Rothe Meerlilie.
- Papaver orientale hirsutissimum, magno flore. Tourn. Cor. Rauer, orientalischer Mohn mit grosser Blume.
- Phalangium parvo flore, ramosum. C. B. P. Nestiges, Erdspinnenkraut mit kleiner Blume.
- Phalangium parvo flore, non ramosum. C. B. P. Erdspinnenkraut, ohne Nester, mit blauer Blume.
- Polemonium vulgare cæruleum. Inst. R. H. Griechischer Baldrian mit blauer Blume.
- Polemonium vulgare album. Inst. R. H. Griechischer Baldrian mit weisser Blume.
- Populago flore pleno. Inst. R. H. Gefüllte Dotterblume.
- Primula veris flore pleno. Hort. Eyst. Gefüllte Schlüsselblume.
- Primula veris flore rubro pleno. Kethe, gefüllte Schlüsselblume.
- Ptarmica vulgaris, pleno flore. Clus. Hist. Gemeines Nieskraut mit gefüllter Blume.
- Pulsatilla folio crassiore, & majore flore. C. B. P. Ruchenschelle mit dicken Blättern und grosser Blume.
- Pulsatilla flore minore nigricante. C. B. P. Ruchenschelle mit kleiner, schwärzlicher Blume.
- Pulsatilla flore albo. C. B. P. Weisse Ruchenschelle.
- Pulsatilla flore violaceo duplici fimbriato. H. R. Par. Ruchenschelle, mit gefüllter, gefranzter, violetter Blume.
- Ranunculus radice tuberosa, flore pleno & proli-fero. C. B. P. Gefüllter Hahnenfuss mit Kindern.
- Ranunculus montanus, aconiti folio, albo flore minore. C. B. P. Berghahnenfuss mit weisser Blume.
- Ranunculus folio aconiti, flore albo multiplici. C. B. P. Hahnenfuss mit Wollwurzblättern, und gefüllter weisser Blume.
- Ranunculus hortensis erectus, flore pleno. C. B. P. Gemeiner gelber Hahnenfuss, mit gefüllter Blume.
- Ranunculus magnus hirsutus repens, flore pleno. L. B. Großer, haariger, kriechender Hahnenfuss mit gefüllter Blume.

Ruyfchiana flore cœruleo magno. Boerh. Ind. alt.
Die Ruyfchiana mit grosser, blauer Blume.

Saxifraga rotundifolia alba, flore pleno. Boerh. Ind. alt. Weisser, rundblättriger, Steinbrech mit gefüllter Blume.

Saxifraga Alpina ericoides, flore cœruleo. Inst. R. H. Bergsteinbrech, so der Heide gleicht, mit blauer Blume.

Saxifraga fedi folio angustiore ferrato. Tourn. Steinbrech mit dem schmalen ausgezackten Hauswurzelblatt.

Saxifraga fedi folio, flore albo multiplici. Inst. R. H. Steinbrech mit Hauswurzelblättern, und weisser vielfacher Blume.

Saxifraga foliis subrotundis ferratis. Inst. R. H. Steinbrech mit runden zackigen Blättern.

Scrophularia Hispanica, sambuci folio glabro. Inst. R. H. Das grösste, spanische Feigwarzenkraut, mit dem glatten Hollunderblatt.

Scrophularia maxima Lusitanica, sambuci folio lanuginoso. Inst. R. H. Das grösste, portugiesische Feigwarzenkraut, mit dem wollichten Hollunderblatt.

Thalictrum Alpinum, aquilegiae foliis, florum staminibus purpurascens. Inst. R. H. Die Wiesensekraute der Alpen mit Agleyblättern, und purpurfarbenen Blumensäden.

Thalictrum Alpinum majus, aquilegiae foliis, florum staminibus albis, caule viridi. Inst. R. H. Grosse Wiesensekraute der Alpen, mit Agleyblättern, weissen Blumensäden und grünem Stengel.

Thalictrum Canadense, caule purpurascens, aquilegiae foliis, florum staminibus albis. Inst. R. H. Wiesensekraute aus Canada, mit purpurfarbenen Stengel, Agleyblättern und weissen Blumensäden.

Valeriana rubra. C. B. P. Rother Baldrian.

Valeriana rubra angustifolia. C. B. P. Rother, schmalblättriger Baldrian.

Valeriana marina latifolia, sive major alba. Mor. Hist. Grosser, weisser Baldrian.

Veratrum flore subviridi. Inst. R. H. Weisse Niesewurz mit grünlicher Blume.

Veratrum flore atro-rubente. Inst. R. H. Weisse Niesewurz mit dunkelrother Blume.

Veronica spicata Cambro-Britannica, bugulae subhirsuto folio. Raii Syn. Ehrenpreis aus Wales, mit dem haarigen Günselblatt.

Veronica erecta angustifolia Park. Theat. Aufrechter, schmalblättriger Ehrenpreis.

Veronica major latifolia erecta. Mor. Hist. Aufrechter grosser, breitblättriger Ehrenpreis.

Veronica multicaulis Pannonica. Inst. R. H. Ungarischer Ehrenpreis mit vielen Stengeln.

Veronica longifolia Virginiana altissima, foliis ternis profundis serratis caulem amplexantibus,

spica multiplici cœrulea. Royen. Der höchste, langblättrige, virginische Ehrenpreis, mit drey und drey beisammen wachsenden, ausgezackten Blättern und vielen Aehren blauer Blumen.

Veronica Virginiana altissima, spica multiplici, floribus candidis. Flor. Bat. Virginischer hoher Ehrenpreis mit vielen Aehren und weissen Blumen.

Virga aurea angustifolia, panicula speciosa, Canadensis. H. R. Schmalblättrige Goldruthe aus Canada, mit dem schönen Strauß.

Virga aurea rugosis foliis, Virginiana, panicula, florum amplissima. Pluk. Raublättrige, virginische Goldruthe, mit dem grossen Blumenstrauss.

Virga aurea Canadensis, asterisci folio. Par. Bat. Goldruthe aus Canada mit Sternkrautblättern.

Virga aurea Marylandica caesia, glabra. Hort. Elth. Glatte Goldruthe aus Maryland.

Virga aurea Americana serrata, floribus ad foliorum alas conglobatis. Breyn. Amerikanische, zackichte Goldruthe, deren Blumen aus den Winkeln der Blätter wachsen.

Virga aurea limonii folio, panicula uno versu disposita. H. R. Par. Goldruthe mit Limonienblättern deren Blumen an einer Seite des Stengels wachsen.

Virga aurea foliis angustis, levibus non serratis, panicula speciosa, floribus magnis. Boerh. Ind. Die Goldruthe, mit schmalen, glatten Blättern, so nicht gezackt sind, und einem schönen grossblumigen Busch.

Virga aurea Americana hirsuta, radice odorata. Joncq. Amerikanische raue Goldruthe, mit wohlriechender Wurzel.

Ulmaria flore pleno. Juss. Geisbart mit gefüllter Blume.

In diesem Verzeichnis, hab ich nur alleine solche besondere Pflanzensorten angeführet, so schöne Blumen haben, und also in den Rabatten des Blumen Gartens einen Platz verdienen; alle diejenigen Sorten aber, welche für den Blumengarten zu kriechend sind, und nur allein in grossen Waldwegen einen Platz verdienen, will ich in ein besonderes Verzeichnis bringen. Auch habe ich in diesem Verzeichnis die gemeinen Zwiebel- und Knollenblumen ausgelassen, indem sie einem jeden bekannt sind, der sich nur etwas im Blumengarten umgesehen; weil solches davon zu gros geworden wäre. Diesemnach habe ich nur alleine solche angeführet, die ohne viele Besorgung wachsen, und nicht alle Jahre, wie die meisten Zwiebelgewächse ausgehoben werden müssen, noch auch wie die Nelcken zc. des Einlegens nöthig haben, wann man sie vermehren will. Wann man also die Rabatten zwischen ihnen umgraben will, hat man Acht zu geben, daß die Wurzeln nicht beschädiget werden, auch können sie drey bis vier Jahr unversehrt stehen bleiben.

Verzeichnis solcher Pflanzen, die im Schatten unter Bäumen in Büschen und Wäldereyen wachsen.

ACONITUM pyramidale multiflorum. H. R. Par. Mönchskappe.

Agrimonia officinarum. Inst. R. H. Die Ottermennige der Aemlädien.

Anapodophyllon Canadense Morini. Inst. R. H. Der Mayapfel oder Entenfuss.

Androsæum maximum frutescens. C. B. P. Grundheil.

Anemonoides flore albo. Boerh. Ind. Wilde Anemone mit weissen Blumen.

Anemonoides flore ex purpura rubente. Boerh. Ind. Wilde Anemone mit purpurrothen Blumen.

Ziii iii 2

Anemo-

- Anemonoides flore majore intensiore coeruleo. Boerh. Ind. Wilde Anemone mit grosser dunkelblauer Blume.
 Anemonoides flore albo pleno. Boerh. Ind. Wilde Anemone mit gefüllter, weisser Blume.
 Aquilegia sylvestris. C. B. P. Wilde Agle.
 Aristolochia clematitis recta. C. B. P. Aufrechte, kriechende Osterluzey.
 Ascyrum magno flore. C. B. P. Hartheu mit grosser Blume.
 Asperula odorata, flore albo. C. B. P. Wohlriechend Sternleberkraut mit weisser Blume.
 Betonica purpurea. C. B. P. Wilde Betonie.
 Betonica major Danica. Park. Theat. Grosse, dänische Betonie.
 Buglossum latifolium sempervirens. C. B. P. Breitblättrige immergrüne Ohrenzunge.
 Bugula. Dod. Gemeiner Günsel.
 Campanula maxima, foliis latissimis, flore coeruleo. C. B. P. Grösste Glockenblume mit breiten Blättern und blauen Blumen.
 Campanula vulgator, foliis urticae, vel major & asperior. C. B. P. Glockenblume mit Nesselsblättern.
 Campanula rotundifolia. Cer. Rundblättrige Glockenblume.
 Caryophyllata vulgaris. C. B. P. Gemeine Garasfel.
 Caryophyllata montana, flore luteo nutante. H. R. Par. Berggarasfel mit grosser gelber Blume.
 Caryophyllata Alpina lutea. C. B. P. Gelbe Alpengarasfel.
 Chamænerion glabrum majus. Inst. R. H. Glatter grosser Weiderich.
 Chamænerion glabrum minus. Inst. R. H. Glatter kleiner Weiderich.
 Chamænerion angustifolium glabrum. Inst. H. R. Glatter schmalblättriger Weiderich.
 Chelidonium majus vulgare. C. B. P. Gemeines grosses Schellkraut.
 Chelidonium majus, foliis quernis. C. B. P. Grosses Schellkraut mit Eichenblättern.
 Chelone Acadensis. Aët. R. Par. Die acadische Chelone.
 Christophoriana vulgaris nostras, racemosa & ramosa. Mor. Hist. Gemeines Christophskraut.
 Circaea Lutetiana. Lob. Icon. Herenkraut.
 Circaea minima. Col. Das kleinste Herenkraut.
 Cyanus montanus latifolius, vel verbasculum cyanoides. C. B. P. Grosse, breitblättrige Kornblume.
 Dentaria pentaphyllos, foliis mollioribus. C. B. P. Fünfblättrige Zahnwurz, mit weichen Blättern.
 Dentaria heptaphyllos baccifera. C. B. P. Siebenblättriges Zahnkraut.
 Digitalis purpurea. I. B. Der purpurfarbe Fingerhut.
 Digitalis flore magno candido. I. B. Fingerhut mit grosser weisser Blume.
 Doronicum radice scorpii. C. B. P. Gemswurz mit Scorpionswurzeln.
 Doronicum plantaginis folio. C. B. P. Gemswurz mit Wegbreitblättern.
 Doronicum plantaginis folio, alterum. C. B. P. Eine andere Gemswurz mit Wegbreitblättern.
 Dracunculus polyphyllus. C. B. P. Vielblättrichte Drachenwurz.

- Elichrysium Americanum latifolium. Inst. R. H. Breitblättrige, americanische, ewige Blume.
 Ephedra maritima major. Inst. R. H. Der grössere Seerosschwanz.
 Epimedium. Dod. Bischoffsmüge.
 Galeopsis procerior foetida, spicata. Inst. R. H. Gemeine, taube Heckennessel.
 Galeopsis five urtica iners, flore luteo. I. B. Gelbe, oder taube Nessel.
 Geranium batrachoides montanum nostras. Ger. Bergstorchenschnabel, mit Froschpfeotenblättern.
 Geranium sanguineum, maximo flore. C. B. P. Blutiger Storchenschnabel, mit grosser Blume.
 Geranium phaeum five fuscum, petalis reflexis. Mor. Hist. Brauner Storchenschnabel mit zurückgebogenen Blättern.
 Helleborine latifolia montana. C. B. P. Gemein Helleborinkraut.
 Helleborine altera, atro-rubente flore. C. B. P. Helleborinkraut mit dunkelrother Blume.
 Helleborine flore albo. Ger. Helleborinkraut mit weisser Blume.
 Helleborine latifolia, flore albo clauso. Raii Syn. Breitblättrig Helleborinkraut, mit weisser geschlossener Blume.
 Helleborine foliis praelongis angustis acutis. Raii Syn. Helleborinkraut mit langen, schmalen, spitzigen Blättern.
 Helleborine montana angustifolia purpurascens. C. B. P. Schmalblättrig, purpurfarbes Berg Helleborinkraut.
 Helleborus niger foetidus. C. B. P. Stinkende, schwarze, Niesewurz.
 Helleborus niger hortensis, flore viridi. C. B. P. Schwarze Niesewurz oder Bärensüß mit grüner Blume.
 Helleborus niger tuberosus, ranunculi folio, flore luteo. Inst. R. H. Schwarze Niesewurz mit dem Ranunkelblatt, und gelber Blume.
 Herba Paris. Dod. Einbeer.
 Hieracium minus, praemorsa radice. Park. Theat. Gelber Teuffelsabbis.
 Hieracium fruticosum latifolium hirsutum. C. B. P. Buschichtes Habichtkraut, mit breiten rauhen Blättern.
 Hieracium fruticosum latifolium glabrum. Park. Theat. Glattes, breitblättriges, buschichtes Habichtkraut.
 Hieracium fruticosum angustifolium majus. C. B. P. Staudiges grosses Habichtkraut, mit schmalen Blättern.
 Hieracium Sabaudum altissimum, foliis latis brevibus, crebrius nascentibus. Mor. Hist. Das höchste savoische Habichtkraut, mit breiten Blättern.
 Hieracium murorum, folio longiore dissecto, maculis lividis asperso. Vaill. Gulden Lungenkraut, mit langen, eingeschnittenen, fleckichten Blättern.
 Hyacinthus Anglicus. Ger. Blauer, englischer Hyacinth.
 Hyacinthus non scriptus, flore candido. Dod. Weisses englischer Hyacinth.
 Hyacinthus Anglicus, flore incarnato. Hort. Eyst. Leibfarber englischer Hyacinth.
 Hypericum elegantissimum non ramosum, folio lato. I. B. Schönes, nicht ästiges Johanniskraut, mit breitem Blat.
 Hypericum minus erectum. C. B. P. Kleines aufrechtes Johanniskraut.

Hyper-

Hypericum villosum erectum, caule rotundo. Inst. R. H. Aufrechtes, haariges Johannisraut, mit rundem Stengel.

Jacea nigra vulgaris laciniata. Park. Theat. Gemeine schwarze Glockenblume, mit zerkerbten Blättern.

Iris foetidissima, seu *xyris*. Inst. R. H. Stinkende Iris.

Leucanthemum vulgare. Inst. R. H. Gemeine Rindsaugmaslieben.

Leucanthemum Alpinum majus, rigido folio. Inst. R. H. Große Rindsaugmaslieben der Alpen, mit dem steifen Blat.

Leucanthemum radice repente, foliis latioribus ferratis. Inst. R. H. Rindsaugmaslieben, mit kriechender Wurzel und breiten ausgezackten Blättern.

Lilio-asphodelus puniceus. Park. Parad. Rothe Affodillilie.

Lilium purpureo-croceum majus. C. B. P. Orangegelilie.

Lilium purpureo-croceum minus. C. B. P. Kleine Orangelilie.

Lilium bulbiferum latifolium majus. C. B. P. Große bollentragende Lilie.

Lilium convallium album. C. B. P. Weiße Meyenblume.

Lilium convallium latifolium. C. B. P. Breitblättrige Meyenblume.

Lilium convallium flore rubente. C. B. P. Rothe Meyenblume.

Lilium convallium latifolium, flore pleno variegato. Didac. Inst. R. H. Gefüllte, scheckige, breitblättrige Meyenblume.

Lychnis sylvestris quæ saponaria, vulgo. Inst. R. H. Seifenkraut.

Lychnis seu saponaria flore pleno. Inst. R. H. Seifenkraut mit gefüllter Blume.

Lysimachia bifolia, flore globoso luteo. C. B. P. Weiderich mit zwey Blättern, und gelben kugelförmigen Blumen.

Melampyrum luteum latifolium. C. B. P. Gelber, breitblättriger Ruhweizen.

Melampyrum luteum angustifolium. C. B. P. Gelber schmalblättriger Ruhweizen.

Melampyrum purpurascens coma. C. B. P. Ruhweizen mit purpurfarbenen Spizen.

Mercurialis montana testiculata. C. B. P. Hodenförmiges Bergbingelkraut.

Mercurialis montana spicata. C. B. P. Aehrentragendes Bergbingelkraut.

Moschatellina foliis fumarie bulbosæ. I. B. Bisamkräutlein mit Blättern des bollenwurzlichen Erdsrauchs.

Narcissus sylvestris pallidus, calyce luteo. C. B. P. Wilde englische Narzisse.

Narcissus medio-luteus vulgaris. Park. Theat. Gemeine blasse Narzisse.

Narcissus latifolius pallidus, calyce amplo aureo. C. B. P. Breitblättrige blasse Narzisse, mit großem goldfarbenen Kelch.

Narcissus major totus luteus, calyce prælongo. C. B. P. Große ganz gelbe Narzisse, mit langem Kelch.

Narcissus multiplex totus flavus. C. B. P. Ganz gelbe, gefüllte Narzisse.

II. Theil,

Numularia lutea minor. C. B. P. Großes, gelbes Pfennigkraut.

Onagra latifolia. Inst. R. H. Breitblättriges Lysimachakraut.

Onagra latifolia, floribus amplis. Inst. R. H. Breitblättriges Lysimachakraut, mit grossen Blumen.

Onagra angustifolia. Inst. R. H. Schmalblättriges Lysimachakraut.

Onagra angustifolia, caule rubro, flore minori. Inst. R. H. Schmalblättriges Lysimachakraut, mit rothen Stengel, und kleiner Blume.

Ophris bifolia. C. B. P. Gemeines Zweyblatt.

Orchis morio mas, foliis maculatis. C. B. P. Das Knabenkrautmännlein.

Orobus sylvaticus nostras. Raii Syn. Englische Walderven.

Orobus purpureus sylvaticus vernus. C. B. P. Purpurfarbe Frühlingswalderven.

Oxys flore albo. Inst. R. H. Gemeiner Sauerklee mit weißer Blume.

Oxys flore purpurascens. Inst. R. H. Gemeiner Sauerklee mit purpurfarber Blume.

Pervinca vulgaris latifolia, flore cœruleo. Inst. R. H. Gros Sinngrün mit blauer Blume.

Pervinca vulgaris latifolia, flore albo. Inst. R. H. Gros Sinngrün mit weißer Blume.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore cœruleo. Inst. R. H. Schmalblättrig Sinngrün mit blauer Blume.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore albo. Inst. R. H. Schmalblättrig Sinngrün mit weißer Blume.

Pervinca vulgaris angustifolia, flore pleno saturate purpureo. Inst. R. H. Schmalblättrig Sinngrün, mit gefüllter purpurfarber Blume.

Polygonatum latifolium vulgare. C. B. P. Breitblättrige Weiswurz.

Polygonatum hellebori albi folio, caule purpurascens. Raii Syn. Weiswurz mit dem schwarzen Nieswurzblatt, und purpurfarbenen Stengel.

Primula veris vulgaris. Park. Theat. Gemeine Schlüsselblume.

Primula veris Constantinopolitana, flore albo. Inst. R. H. Constantinopolitanische Schlüsselblume mit weißer Blume.

Primula veris flore pleno. Hort. Eyst. Gefüllte Schlüsselblume.

Parmica vulgaris, folio longo serrato, flore albo. I. B. Gemein Nieskraut mit langem ausgezackten Blat, und weißer Blume.

Parmica vulgaris, pleno flore. Clus Hist. Gemein Nieskraut mit gefüllter Blume.

Pyrola rotundifolia major. C. B. P. Gros, rundblättrig Wintergrün.

Pyrola minor. Riv. Wintergrün.

Pyrola folio mucronato serrato. C. B. P. Wintergrün mit spitzigem ausgezackten Blat.

Ranunculus nemorosus dulcis secundus Tragi. Park. Theat. Süßer Waldhahnenfuss.

Scabiosa folio integro glabro, flore cœruleo. Inst. R. H. Waldscabiose, oder Teuffelsabbis.

Scabiosa virgæ pastoris folio. C. B. P. Scabiose mit Kartendistelblättern.

Scabiosa Alpina, foliis centaurei majoris. C. B. P. Scabiose mit dem grossen Tausendguldenkrautblat.

Scordium alterum, sive *salvia* agrestis. C. B. P. Wilde Salben.

RIII III

Scrophu-

- Scrophularia nodosa foetida*. C. B. P. Stinkend, knotig Feigwarzenkraut.
Scrophularia scorodonia folio. Mor. Hist. Feigwarzenkraut mit dem Baldsalbeyblatt.
Scrophularia nemorensis, folio urticae rugoso, flore atropunicante. Hort. Cath. Feigwarzenkraut der Wälder, mit dem rauhen Nesselblatt und dunkelrother Blume.
Senecio Jacobae folio. Mor. H. R. Blaf. Kreuzkraut mit dem Jacobskrautblatt.
Serratula. C. B. P. Schartenkraut.
Serratula flore candido. C. B. P. Schartenkraut mit weisser Blume.
Sium aromaticum, sison officinarum. Inst. R. H. Steinpeterlein.
Smilax unifolia humillima. Inst. R. H. Das Einblatt.
Smilax aspera, fructu rubente. C. B. P. Raue Stechweide mit rother Frucht.
Smilax aspera, minus spinosa, fructu nigro. C. B. P. Raue, weniger dornichte Stechweide, mit schwarzer Frucht.
Smilax viticulis asperis, foliis longis angustis mucronatis laevibus, auriculis ad basin rotundioribus. Pluk. Phyt. Raue Stechweide, mit langen, schmalen, spitzigen, glatten Blättern, so unten runde Ohrlein haben.
Smilax foliis latis, in margine spinosis, Carolinae, stipite levi quadrato. Pluk. Phyt. Raue, carolinische Stechweide, mit breitem Blat.
Solanum scandens, seu dulcamara. C. B. P. Waldnachtschatten, oder Bittersüß.
Solanum scandens, seu dulcamara, flore albo. C. B. P. Waldnachtschatten mit weisser Blume.
Tamnus racemosa, flore minore luteo-pallescens. Inst. R. H. Gemeine, schwarze Stiekwurz.
Tamnus baccifera, flore majore albo. Inst. R. H. Die beerentragende, schwarze Stiekwurz, das Weiblein.
Tanacetum vulgare luteum. C. B. P. Gemein Rheinfarrenkraut.
Tithymalus characias amygdaloides. C. B. P. Wolfssmilch mit Mandelblättern.
Tithymalus marinus, folio retuso, Terracinenfis. Bar. Obs. Seewolfssmilch mit stumpfen Blat.

Verzeichnis solcher hoher blühender Pflanzen, so unter grossen Bäumen in luftigen Gebüsch, oder an den Seiten der Wege der Lustwälder wachsen, wo sie nicht zu sehr im Schatten der Bäume stehen.

- A** *Canthus fativus*, vel mollis Virgillii. C. B. P. Weichblättrige Bärenklau.
Acanthus aculeatus. C. B. P. Stachelige Bärenklau.
Acanthus Lusitanicus, amplissimo folio lucido. Jussieu. Portugiesische Bärenklau, mit dem grossen, glänzenden Blat.
Acanthus rarioribus & brevioribus aculeis munitus. Inst. R. H. Bärenklau mit kürzern, und weniger Stacheln.
Aconitum lycoctorum luteum. C. B. P. Gelbe Wolfsswurz.
Aconitum Pyrenaicum, ampliore folio tenuius laciniato. Inst. R. H. Pyrenäische Wolfsswurz, mit dem breiten und zart eingeschnittenen Blat.
Aconitum violaceum seu napellus secundus. C. B. P. Wolfsswurz mit violenblauer Blume.
Aquilegia hortenensis multiplex, flore magno caeruleo. C. B. P. Gefüllter Gartenagley, mit grossen blauen Blumen.
Aquilegia hortenensis multiplex, flore magno variegato. C. B. P. Gefüllter Gartenagley, mit grossen, scheckigen Blumen.
Asphodelus albus ramosus mas. C. B. P. Grosse, weisse, ästige Affodillen.
Asphodelus albus ramosus minor, seu ramosus alter. H. R. Par. Kleine, weisse, ästige Affodillen.
Asphodelus albus non ramosus. C. B. P. Weisse Affodillen, ohne Aeste.
Asphodelus luteus & flore & radice. C. B. P. Affodille mit gelber Blume und Wurzel.
Aster Novae Angliae umbellatus, floribus dilute violaceis. H. L. Sternkraut aus Neuengland, mit hellviolblauen Doldenblumen.
Aster Novae Angliae latifolius paniculatus, floribus saturate violaceis. H. L. Das breitblättrige, buschichte Sternkraut, mit dunkelviolettblauen Blumen.

Aster

- Tithymalus foliis pini*, forte Dioscoridis ptyusa. C. B. P. Wolfssmilch mit Fichtenblättern.
Tormentilla sylvestris. C. B. P. Wilde Tormenthille.
Valeriana sylvestris major montana. C. B. P. Wilde Bergbaldrian.
Veronica mas supina & vulgatissima. C. B. P. Ehrenpreis männlein.
Veronica chamaedrys sylvestris dicta. Raii Syn. Wilde Gamanderlein.
Vicia multiflora maxima. Phyt. Brit. Die grösste vielblumige wilde Wicke.
Viola Martia purpurea, flore simplici odore. C. B. P. Gemein purpurfarb Beilgen, mit wohlriechender Blume.
Viola Martia alba. C. B. P. Weisses, wohlriechendes Beilgen.
Viola Martia, obsoleto flore. Park. Purpurfarb Beilgen.
Viola Martia major, hirsuta, inodora. Mor. Hist. Grosses raues Beilgen sonder Geruch.
Viola Martia inodora, sylvestris. C. B. P. Wildes Beilgen ohne Geruch.
Virga aurea vulgaris. Park. Theat. Gemeine Goldrute.

In diesem Verzeichnis kommen verschiedene Pflanzen vor, so für gemeines Unkraut gehalten werden, weil weder ihre Blumen noch Blätter etwas schönes haben, weswegen sie dann auch viele verwerffen. Weil sie aber in solchen verschlossenen, schattigen Plätzen wachsen, wo bessere Pflanzen nicht fortkommen, so sind sie eben nicht zu verachten, weil doch etwas Grünes unter den Bäumen ein viel besserer Ansehen machet, als die bloße Erde, und deswegen sind sie auch von mir angeführt worden. Da sich die meisten derselben in Engeland in den Wäldern finden, so kan man ihre Wurzeln aus selbigen um Michaelis versehen, und wann sie einmal Wurzel geschlagen, breiten sie sich stark aus und vermehren sich, ohne Besorgung; theils durch ihre kriechende Wurzeln, theils durch den Saamen, der auf den Boden fällt, die meisten wachsen besser in einem derben schlechten Boden, als in einem feuchten, fetten.

- Aster Americanus latifolius*, puniceis caulibus. H. L. Breitblättrig, americanisch Sternkraut, mit rothen Stengeln.
- Aster coeruleus serotinus*, fruticescens, Tradescanti. Raii Hist. Tradescanti's spatblühendes, staudiges Sternkraut.
- Aster Virginianus serotinus*, parvo albente flore. Park. Virginisch, spatblühend Sternkraut, mit kleiner weißlicher Blume.
- Aster Americanus*, belviderae foliis, floribus ex coeruleo albicantibus, spicis praelongis. Pluk. Alm. Americanisch Sternkraut mit flachblättrigen Meltenblättern, und blauweißlichten Blumenähren.
- Centaureum majus*, folio in lacinias plures diviso. C. B. P. Gros Tausendguldenkraut, mit stark zerschnittenem Blat.
- Centaureum foliis cinaræ*. Cornut. Tausendguldenkraut mit Artischockenblättern.
- Centaureum Alpinum luteum*. C. B. P. Gelbes Tausendguldenkraut der Alpen.
- Chamaenerion latifolium vulgare*. Inst. R. H. Breitblättriger Weiderich.
- Chamaenerion latifolium vulgare*, flore albo. Inst. R. H. Breitblättriger Weiderich, mit weißer Blume.
- Corona imperialis*, flore e luteo pallescente. Inst. R. H. Kaiserkrone, mit blasgelber Blume.
- Corona imperialis*, flore luteo striato. Inst. R. H. Kaiserkrone mit gelbgestreifter Blume.
- Corona imperialis major*. Inst. R. H. Große Kaiserkrone.
- Corona imperialis*, duplici corona. Inst. R. H. Doppelte Kaiserkrone.
- Corona imperialis*, flore pleno. Inst. R. H. Kaiserkrone mit gefüllter Blume.
- Corona solis perennis & vulgaris*. Vaill. Gemeine beständige Sonnenblume.
- Corona solis trachelii folio*, radice repente. Inst. R. H. Die Sonnenblume mit Halskrautblättern, und kriechender Wurzel.
- Corona solis altissima*, vofacan dicta. Vaill. Die höchste Sonnenblume, Vofacan genannt.
- Corona solis altissima*, caule alato. Inst. R. H. Die höchste Sonnenblume, mit geflügeltem Stengel.
- Corona solis foliis asperis*, tribus vel quaternis ad genicula sitis. Mor. Hist. Sonnenblume mit rauen Blättern die zu dreien oder viere an den Knoten stehen.
- Corona solis foliis amplioribus laciniatis*. Inst. R. H. Sonnenblume, mit schmalen zerkerbten Blättern.
- Doria Narbonensium*. H. Eyst. Narbonnische Doria.
- Doria quæ Jacobæa*, foliis integris & mucronatis. Mor. Hist. Doria mit ganzen und spitzigen Blättern.
- Doria quæ Jacobæa orientalis*, limonii folio. Tourn. Cor. Die orientalische Doria mit Limonienblättern.
- Echinopus major*. I. B. Große Kugeldistel.
- Eupatorium cannabinum*. C. B. P. Gemeine Wasserdosten.
- Eupatorium folio oblongo rugoso*, caule purpurascens. Inst. R. H. Wasserdosten mit dem länglichten, rauen Blat und purpurfarben Stengel.
- Eupatorium Novæ Angliæ urticæ foliis*, floribus purpurascens, maculato caule. Par. Bat. Wasserdosten aus Neuengeland, mit Nesseltblättern.

tern, purpurfarben Blumen, und fleckichten Stengeln.

- Gladiolus major Byzantinus*. C. B. P. Großer, constantinopolitanischer Schwerdtel.
- Gladiolus utrimque floridus*. C. B. P. Schwerdtel mit Blumen zu beeden Seiten.
- Gladiolus floribus uno versu dispositis*, major & procerior, flore purpureo-rubente. C. B. P. Großer Schwerdtel, mit rötlichtpurpurfarben Blumen, so an einer Seite des Stengels stehen.

Iris vulgaris violacea, sive purpurea sylvestris. I. B. Gemeine violettblaue Iris.

Iris hortensis latifolia. C. B. P. Breitblättrige Garteniris.

Iris palustris lutea. Tab. Icon. Gelber gemeiner Schwerdtel.

Lilium album, flore erecto, & vulgare. C. B. P. Gemeine weiße Lilie.

Lilium album, floribus dependentibus, sive peregrinum. C. B. P. Fremde weiße Lilie mit herabhängenden Blumen.

Lilium floribus reflexis, montanum, flore rubente. C. B. P. Türkischer Bund, mit rother Blume.

Lilium floribus reflexis, montanum, flore pleno. H. R. Monsp. Gefüllter, türkischer Bund.

Lilium floribus reflexis, montanum, flore maculis rubris inordinatis asperso. C. B. P. Geseckter türkischer Bund.

Lilium floribus reflexis, flore flavo, maculis nigris asperso. Gelber türkischer Bund, mit schwarzen Flecken.

Lythymachia lutea minor, quæ Dioscoridis. C. B. P. Großer, gelber Weiderich.

Lythymachia Canadensis, folio jalappæ. Cornut. Weiderich aus Canada.

Malva rosea. C. B. P. Rosenpappel aller Arten.

Narcissus. Die meisten Narcissforten.

Pæonia foemina, flore pleno rubro majore. C. B. P. Große, gefüllte, rothe Gichtrose.

Pæonia flore exalbido pleno, major. C. B. P. Große, gefüllte, blasse Gichtrose.

Pæonia flore pleno rubro minore. C. B. P. Kleine, gefüllte, rothe Gichtrose.

Polygonatum latifolium hellebori albi foliis. C. B. P. Breitblättrige Schminckwurz, mit weißen Nieswurzblättern.

Polygonatum latifolium, flore duplici odore H. R. Par. Breitblättrige Schminckwurz, mit gefüllter wohlriechender Blume.

Ruscus latifolius, fructu folio innascente. Inst. R. H. Gemeiner, Mäusdorn.

Ruscus latifolius, fructu folio innascente. Inst. R. H. Breitblättriger Mäusdorn, so die Frucht auf den Blättern trägt.

Ruscus angustifolius, fructu folio innascente. Inst. R. H. Schmalblättriger Mäusdorn, so die Frucht auf den Blättern trägt.

Ruscus angustifolius, fructu summis ramulis innascente. Inst. R. H. Schmalblättriger Mäusdorn, dessen Frucht oben an den Zweigen wächst.

Valeriana hortensis, phu folio olusatri Dioscoridis. C. B. P. Gartenbaldrian.

Veronica major latifolia erecta. Mor. Hist. Großer, breitblättriger, aufrechter Ehrenpreis.

RRR RRR 2

Veroni-

- Veronica erecta angustifolia*, Park. Theat. Schmalblättriger, aufrechter Ehrenpreis.
Veronica multicaulis Panonica, Inst. R. H. Vielstenglicher Ehrenpreis.
Virga aurea Novae Angliae altissima, paniculis nunquam reflexis. Flor. Bat. Die höchste Goldruthe aus Neuengeland, mit gebogenen Straußen.
Virga aurea altissima serotina, panicula speciosa patula. Rand. Die höchste, späte Goldruthe, mit schönem ausgebreiteten Strauß.
Virga aurea Marylandica, spicis florum racemosis, foliis integris scabris. Martyn. Goldruthe aus Mariland mit ästigen Blumenähren, und ganzen, rauhen Blättern.
Virga aurea Virginiana, foliis angustioribus asperis, panicula minus speciosa. Pluk. Alm. Virginische Goldruthe, mit schmalen rauhen Blättern, und nicht so schönem Blumenstrauss.
Virga aurea rugosis foliis, Virginiana, panicula florum amplissima. Pluk. Virginische Goldruthe mit rauhen Blättern und gressen Blumenstrauss.
Virga aurea Canadensis, asterisci folio. Par. Bat. Goldruthe aus Canada mit, mit Sternkrautblättern.

- Virga aurea Americana serrata*, floribus ad foliorum alas conglobatis. Breyn. prod. Amerikanische ausgezackte Goldruthe, deren Blumen aus den Winkeln der Blätter, büschelweis wachsen.
Virga aurea Noveboracensis glabra, caulibus rubentibus, foliis angustis glabris. Flor. Bat. Glatte Goldruthe aus Neuengeland, mit rothen Stengeln, und schmalen, glatten Blättern.
Virga aurea floribus fistulosis, senecionis instar, foliis angustioribus non serratis. Hist. Ox. Goldruthe mit röhrichten Blumen, wie am Kreuzkraut, und schmalen ungezackten Blättern.
Virga aurea Novae Angliae, foliis longissimis glabris. Flor. Bat. Goldruthe aus Neuengeland, mit langen glatten Blättern.

Da diese Pflanzen beständige Wurzeln haben, so vermehren sie sich ohne Besorgung, wann man sie nur gegen grosses Unkraut verwahret, daß es von selbigem nicht überlossen werde; und wann man alle Frühling den Boden um sie herum aufgräbt, so blühen sie stark.

Verzeichnis solcher Pflanzen, so im Winter in offener Luft nicht dauern, aber nur gegen strenge Kälte verwahret seyn wollen, und also bey gelindem Wetter, so viel möglich frische Luft haben müssen.

- A**CETOSA arborescens, subrotundo folio, ex Infulis Fortunatis. Pluk. Phyt. Staudiger Sauerampfer.
Adhatoda Zeylanensium. H. L. Die malabarische Nus.
Adhatoda Indica, folio saligno, flore albo. Boerh. Ind. Klappbaum.
Alaternoides Africana, lauri serratae folio. Com. Przl. Africanische Alaternoides, mit zackigen Lorbeerblättern.
Alaternoides Africana, ericae foliis, floribus albicantibus & muscosis. H. A. Africanische Alaternoides mit Heidelblättern, und weissen Blumen.
Alaternoides Africana, telephii legitimi Imperati folio, flore viridi. H. A. Africanische Alaternoides, mit Blättern des wahren Wundkrauts von Imperati, und grüner Blume.
Alcea Afra frutescens, folio grossulariae, flore parvo rubro. Boerh. Ind. alt. Africanische, staudige Alcea, mit Stachelbeerblättern, und kleiner rother Frucht.
Alkekengi fructu parvo verticillato. Inst. R. H. Judenfirschen mit kleiner Frucht, so wirtelweis um den Stengel wächst.
Aloe Americana muricata. I. B. Gemeine, grosse, amerikanische Aloe.
Anemonospermum Africana, folio jacobae, flore luteo extus puniceo. Boerh. Ind. Africanische Anemonospermum, mit Jacobskrautblättern, und einer Blume die innen gelb, aussen aber roth ist.
Anemonospermum Africana, cardui benedicti folio, florum radiis intus albicantibus. H. A. Africanische Anemonospermum, mit Cartobenedictenblättern, und Blumenstrahlen so innenher weiss sind.
Anemonospermum Afra, folio jacobae tenuiter laciniato, flore aurantio pulcherrimo. Boerh. Ind. alt. Africanische Anemonospermum, mit gartzerferten Jacobskrautblättern, und schöner orangefarbener Blume.
Anemonospermum Afra, folio oblongo serrato rigido, flore intus sulphureo, extus puniceo.

- Boerh. Ind. alt. Anemonospermum aus Africa, mit dem länglichten, steifen, zackigen Blat, und einer Blume so innen schwefelgelb, aussen aber roth ist.
Apocynum erectum fruticosum, folio subrotundo viridante. Par. Bat. Der staudige aufrecht wachsende Hundskohl, mit runden grünen Blättern.
Apocynum erectum Africanum, folio salicis angusto glabro, fructu villosa. Par. Bat. Der aufrechte, africanische Hundskohl mit Weidenblättern, und haariger Frucht.
Apocynum Afrum scandens, folio rotundo subincano nummulariae. Boerh. Ind. alt. Africanischer, kletterender Hundskohl mit Pfennigkrautblättern.
Aristolchia pistolochia dicta. C. B. P. Immergrüne Osterluzey.
Aristolchia pistolochia altera. I. B. Eine andere immergrüne Osterluzey.
Aristolchia violae fruticosa foliis Virginiana, cujus radix serpentaria dicitur. Pluk. Phyt. Virginische Natterwurz.
Arum Africanum, flore albo odorato. Par. Bat. prod. Africanische Aronswurz mit weissen, wohlriechenden Blumen.
Arundo Indica variegata, seu Laconica Theophrasti. C. B. P. Scheekiges Rohr.
Ascyron Balearicum frutescens, maximo flore luteo, foliis minoribus subtus verrucosis. Salvador. Staudiges Hartheu, mit grosser gelber Blume, und kleinen warzigen Blättern.
Asparagus aculeatus, spinis horridus. C. B. P. Stachelichter Spargel.
Asparagus Africanus scandens, myrti folio angustiore. Hor. Piss. Kriechender, africanischer Spargel mit schmalen Myrtenblättern.
Asparagus Africanus tenuifolius, viminalibus virgis, foliis loricis instar ex uno puncto numerosis, stellatim dispositis. Pluk. Al. Schmalblättriger, africanischer Spargel mit dünnen Reisern und Blättern wie der Lerchenbaum, deren viele aus einem Punct wachsen, und sich gleich einem Stern ausbreiten.

Asteri-

Asteriscus frutescens, leucorii foliis sericeis & incanis. Hort. Elth. Staudiges, gelbes Sternkraut, mit silberfarbenen Blättern.

Asteriscus frutescens, leucorii foliis viridibus & splendidibus. Hort. Elth. Staudiges gelbes Sternkraut, mit glänzendgrünen Blättern.

Barba Jovis pulchre lucens. I. B. Der Silberbusch.

Barba Jovis Africana, foliis viridibus pinnatis, flore caeruleo. Boerh. Ind. alt. Africanischer Jupitersbart, mit dunkelgrünen Blättern und blauen Blumen.

Barba Jovis Græca, linariæ folio argenteo, ampliori flore luteo, parvo. Tourn. Cor. Griechischer Jupitersbart, mit dem silbernen Leinkrautblatt, und kleinen gelben Blumen.

Bryonia Africana glabra, foliis in profundas lacinias divisis, flore luteo. Olden. Glatte africanische Bryonia, mit tief eingeschnittenen Blättern und gelben Blumen.

Calamintha incana, ocymi foliis. C. B. P. Graue Calamenth mit Basilienblättern.

Caltha Africana, foliis croci angustis, florum petalis externe purpurascens, interne albis. Boerh. Ind. alt. Africanische Ringelblume, mit schmalen Saffranblättern, deren Blumenblättlein außen purpurfarb innen aber weiß sind.

Calthoides Africana, glasti folio. Justieu. Africanische Bastardringelblume, mit Waidblättern.

Cannacorus latifolius vulgaris. Inst. R. H. Gemeines breitblättriges, indianisches Blumenrohr.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum. Inst. R. H. Mexicanische Melte.

Chenopodium ambrosioides Mexicanum fruticosum. Boerh. Ind. alt. Mexicanische, staudige Melte.

Chenopodium sempervirens, foliis tenuiter lacinatis. Hort. Elth. Immergrüne Jerusalemseiche, mit zart zerkerbten Blättern.

Crysanthemoides Africanum, populi albæ foliis. Mem. Acad. Scien. Africanische Goldblume, mit weißen Pappelbaumblättern.

Cistus ladanifera Hispanica, salicis folio, flore candido. Inst. R. H. Spanisches Eistenröslein, so Ladanum bringt, mit dem Weidenblatt und weißer Blume.

Cistus ladanifera Hispanica, salicis folio, flore albo macula punicante insignito. Inst. R. H. Spanisches Eistenröslein, so Ladanum bringt, mit Weidenblättern, und weißer Blume.

Cistus fœmina, folio salviæ, elatior & rectis virgis. C. B. P. Breitblättrige Gummieistenröslein.

Cistus ledon, foliis populi nigrae, major. C. B. P. Grosses wohlriechendes Eistenröslein, mit schwarzen Pappelblättern.

Cistus ledon, foliis populi nigrae, minor. C. B. P. Kleines wohlriechendes Eistenröslein, mit schwarzen Pappelblättern.

Cistus ledon latifolium Creticum. I. B. Breitblättrig, cretisches Eistenröslein.

Cistus ledon hirsutum. C. B. P. Raues Eistenröslein.

Clusia Aethiopica frutescens, portulacæ folio, flore ex albido virescente. Boerh. Ind. alt. Aethiopische, staudige Clusia, mit Portulacblättern, und grünlichweißer Blume.

Colutea Aethiopica, flore phœnicio, folio barbæ Jovis. Breyn. Cent. Aethiopische Bläuleins.

II. Theil.

fenna, mit scharlachfarbenen Blumen und Jupitersbartblättern.

Coma aurea Africana fruticans, foliis linariæ angustis, major. Hort. Amst. Grosses africanisches staudiges Goldhaar, mit schmalen Leinkrautblättern.

Coma aurea Africana fruticans, foliis glaucis in extremitate trifidis. Hort. Amst. Africanisches Goldhaar, mit meergrünen Blättern, so am Ende in drey Theile getheilet sind.

Coma aurea Africana fruticans, foliis crithmi marini. Hort. Amst. Africanisch staudiges Goldhaar, mit Meerfenchelblättern.

Coma aurea Africana fruticans, foliis glaucis longis tenuibus multifidis, apice pinnularum trifido. Boerh. ind. alt. Africanisch, staudiges Goldhaar, mit langen, schmalen, meergrünen Blättern, so in viele Theile getheilet sind, davon jeder wieder dreysfach gespalten ist.

Convolvulus major rectus, Creticus, argenteus. Mor. Hist. Große aufrecht wachsende Winde aus Creta, mit silberfarbenen Blättern.

Convolvulus Canariensis sempervirens, folio molli incano, flore ex albo purpurascens. Hort. Amst. Beständige canarische Winde, mit weichen, grauen Blättern, und weißlich purpurfarber Blume.

Conyza Africana frutescens, foliis salviæ, odore camphoræ. Inst. R. H. Das africanische, staudige Flohkraut, mit Salbeyblättern, und einem Camphergeruch.

Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo, flore albo, basi purpurea, Persicum dictum. H. R. Par. Das persianische im Winter und Frühling blühende Saubrod, mit grossen, weissen Blumen, so einen purpurfarbenen Boden haben.

Cyclamen hyeme & vere florens, folio anguloso, amplo flore carneo, basi purpurea. H. R. Par. Persisches Saubrod mit fleischfarber Blume, die einen purpurfarbenen Boden hat.

Cytisus hirsutus. I. B. Haariger Geisklee.

Cytisus spinosus. H. L. Dornichter Geisklee.

Cytisus minoribus foliis, ramulis tenellis villosis. C. B. P. Geisklee mit kleinen Blättlein, dessen zarte Aestlein haarig sind.

Cytisus Monspessulanus, medicæ folio, siliquis dense congestis & villosis. Inst. R. H. Geisklee von Montpellier, mit Blättern, wie die Medica hat, und haarigen Schoten, so dichte beysammen stehen.

Cytisus foliis argenteis. Wheel. Itin. Geisklee mit Silberblättern.

Cytisus Africanus hirsutus angustifolius. Old. Africanischer, haariger, schmalblättriger Geisklee.

Cytisus Africanus argenteus, flore atro angustifolius. Old. Africanischer, haariger, schmalblättriger Geisklee.

Cytisus Africanus argenteus, flore atro purpureo. Old. Africanischer Geisklee mit Silberblättern, und dunkelpurpurfarber Blume.

Cytisus spinosus, siliqua villosa incana. Tourn. Cor. Dornichter Geisklee, mit grauer haariger Schote.

Dictamnus Creticus. C. B. P. Cretischer Diptam.

Dictamnus Montis Sipyli, origani foliis. Flor. Bat. Diptam vom Berg Sipyli, mit Wohlgemuthblättern.

Doria Africana arborescens, crassis & succulentis foliis atriplicem referentibus. Boerh. Ind. alt.

IIII III

Naume

Baumartige africanische Doria, mit dicken, saftigen Melidenblättern.

Doria quæ jacobæa Africana, frutescens, coronopifolio. Hort. Amst. Die africanische staudige Doria, mit Krähenfußblättern.

Doria quæ jacobæa Africana, hederæ terrestris folio, repens. Hort. Amst. Africanische, kriechende Doria mit Gundermansblättern.

Elichrysum orientale. C. B. P. Orientalische ewige Blume.

Elichrysum Africanum, folio oblongo, subtus cano, supra viridi, flore luteo. Boerh. Ind. alt. Die africanische, ewige Blume, mit länglichtem Blat, so unten grau, oben grün ist, mit gelber Blume.

Elichrysum Africanum, folio oblongo angusto, flore rubello, postea aureo. Boerh. Ind. alt. Africanische, ewige Blume mit schmalen, länglichten Blat, und röthlichter Blume, so nachgehends gelb wird.

Euonymo adfinis Aethiopica sempervirens, fructu globoso scabro, foliis salicis rigidis ferratis. H. L. Immergrüner aethiopischer Spindelbaum, mit rauer runder Frucht, und steiffen, sackichen Weidenblättern.

Eupatorium Americanum scandens, hastato magis acuminato folio. Vaill. In die Höhe steigende americanische Wasserdoften, mit dem spitzigen Lanzenblat.

Eupatorium Americanum, teucris folio, flore niveo. Vaill. Americanische Hanfodermennige, mit Baumgamanderleinblättern und weißer Blume.

Fabago Africana arborescens, flore sulphureo, fructu rotundo. Com. Rar. Africanische, baumartige Bohnencapper, mit schwefelfarber Blume und runder Frucht.

Fabago Afra frutescens minor, flore flavo magno, unguibus petalorum fuscis. Boerh. Ind. alt. Kleine, africanische, staudige Bohnencapper, mit grosser, gelber Blume, deren Blättlein unten braun sind.

Frangula sempervirens, folio rigido subrotundo. Hort. Elth. Immergrüner Faulbaum, mit dem steifen runden Blat.

Geranium Africanum arborescens, ibisci folio rotundo, carinz odore. H. L. Africanischer, baumartiger Storchenschnabel, mit dem runden Eibischblat, und Eberwurzgeruch.

Geranium Africanum arborescens, ibisci folio anguloso, flore amplo purpureo. Aët. Phil. Africanischer, baumartiger Storchenschnabel, mit dem eckichten Eibischblat, und grosser purpurfarber Blume.

Geranium Africanum arborescens, alchimillæ hirsuto folio, floribus rubicundis. Com. Præl. Africanischer, baumartiger Storchenschnabel, mit dem rauen Sinaublat, und rothen Blumen.

Geranium Africanum arborescens, alchimillæ hirsuto folio elegantissime variegato, floribus rubicundis. Com. Præl. Africanischer, baumartiger Storchenschnabel, mit dem rauen, schöngescheckten Sinaublat, und rothen Blumen.

Geranium Africanum arborescens, malvæ folio plano lucido, flore elegantissimo Kermesino. Di Van Leur. Boerh. Ind. Africanischer, baumartiger Storchenschnabel, mit dem platten, glänzenden Pappelblat, und carmesinrother Blume.

Geranium Africanum frutescens, malvæ folio odorato laciniato. H. L. Africanischer, staudiger

Storchenschnabel, mit dem zerschnittenen, wohlriechenden Pappelblat.

Geranium Africanum frutescens, malvæ folio laciniato instar melissæ, flore purpurascens. H. L. Staudiger, africanischer Storchenschnabel, mit dem zerschnittenen und wie Melissen riechenden Blat, und purpurfarber Blume.

Geranium Africanum frutescens, folio crasso & glauco, acetosæ sapore. Com. Præl. Africanischer staudiger Storchenschnabel, mit dem dicken, meergrünen Blat, so wie Sauerampfer schmeckt.

Geranium Africanum, folio alceæ, flore coccineo fulgidissimo. Boerh. Ind. Africanischer Storchenschnabel mit Sigmariskrautblättern und hochscharlachfarber Blume.

Geranium Africanum, foliis inferioribus asari, superioribus staphidis agriz maculatis splendentibus, & acetosæ sapore Com. Præl. Africanischer Storchenschnabel, dessen untere Blätter den Haselwurz, die obern aber den Läusekrautblättern gleichen, glänzend und fleckicht sind, auch wie Sauerampfer schmecken.

Geranium Africanum, alchimillæ hirsuto folio, floribus albidis. H. L. Africanischer Storchenschnabel, mit dem rauen Sinaublat, und weißlichten Blumen.

Geranium Africanum, folio malvæ crasso molli odoratissimo, hirculo albo. Boerh. Ind. alt. Africanischer Storchenschnabel mit dem dicken, weichen, wohlriechenden Pappelblat, und weissen Blümlein.

Geranium Africanum arborescens, malvæ folio mucronato, petalis florum inferioribus vix conspicuis. Aët. Phil. Africanischer baumartiger Storchenschnabel, mit dem spitzigen Pappelblat, dessen untere Blumenblättlein kaum zu sehen sind.

Geranium Africanum frutescens, chelidonii folio, petalis florum angustis albidis, caudice carnosio. Aët. Phil. Africanischer staudiger Storchenschnabel, mit Schellkrautblättern, an welchen die Blumenblättlein schmal und weißlicht, der Stengel aber fleischicht ist.

Geranium Africanum noctu olens, tuberosum & nodosum, aquilegiæ foliis. H. L. Der bey Nacht riechende africanische Storchenschnabel, mit Agleysblättern und knollichter Wurzel.

Geranium Africanum noctu olens, radice tuberosa, triste. Corn. Der bey Nacht riechende africanische Storchenschnabel, mit knollichter Wurzel.

Geranium Africanum noctu olens, radice tuberosa, foliis pastinacæ incanis lanuginosis angustioribus, flore pallide flavescens. H. L. Africanischer, bey Nacht riechender Storchenschnabel, mit knollichter Wurzel, grauen wollichten, schmalen Pastinakblättern, und blasgelber Blume.

Geranium Africanum noctu olens, folio vitis hirsuto, tuberosum. Hort. Amst. Africanischer, bey Nacht riechender Storchenschnabel, mit dem rauen Weinblat, und knollichter Wurzel.

Guidonia ulmi foliis, flore roseo. Plum. Nov. Gen. Guidonia mit Ulmenblättern, und rosenfarber Blume.

Heliotropium Canariense arborescens, scorodoniz folio. Hort. Amst. Canarische, baumartige Sonnenwende, mit Baldsalbeyblättern.

Heliotropium arborescens, folio teucris, flore albo, in capitula densa congesto. Boerh. Ind. alt. Die baumartige Sonnenwende, mit Baumgamanderleinblättern, und Blumen die in kurzen dicken Häuptlein wachsen.

Herman-

- Hermannia frutescens*, folio oblongo serrato. Inst. R. H. Staudige Hermannia mit dem länglichten, gezackten Blat.
- Hermannia frutescens*, folio oblongo serrato latiori. Boerh. Ind. Staudige Hermannia, mit dem länglichten gezackten, breiten Blat.
- Hermannia frutescens*, folio ibisci hirsuto molli, caule piloso. Boerh. Ind. Staudige Hermannia, mit dem weichen, rauhen Eibischblat, und haarigem Stengel.
- Hermannia frutescens*, folio grossulariae parvo hirsuto. Boerh. Ind. alt. Staudige Hermannia, mit dem kleinen rauhen Stachelbeerblat.
- Hermannia frutescens*, folio lavendulae latiori & obtuso, flore parvo aureo. Boerh. Ind. alt. Die Staudige Hermannia, mit dem breiten, stumpfen Lavendelblat und kleiner goldfarber Blume.
- Jacea Epidaurica*, candidissima & tomentosa. Inst. R. H. Weiße, wollige Flockenblume von Ragusa.
- Jacobaea Africana frutescens*, foliis incis. & subtus cineraceis. Com. Prælud. Staudiges, africanisches Jacobskraut, mit eingeschnittenen und unten aschfarben Blättern.
- Jasminum Hispanicum*, flore majore, externe rubente. L. B. Der spanische Jasmin.
- Jasminum Azoricum trifoliatum*, flore albo odoratissimo. H. Amst. Azorischer Jasmin mit Epheu- blättern.
- Jasminum Africanum*, folio ilicis, flore solitario, ex alis foliorum proveniente, albo. Com. Præl. Africanischer Jasmin mit Steineichenblättern.
- Laurus latifolia* *πλάτυνα* Dioscoridis. C. B. P. Breitblättriger indianischer Lorbeerbaum.
- Laurus Indica*. Ald. Hort. Königs Lorbeer.
- Laurus tenuifolia*. Tab. Icon. Schmalblättriger Lorbeerbaum.
- Lentiscus vulgaris*. C. B. P. Der Mastixbaum.
- Leonurus perennis Africanus*, sideritidis folio, flore phœnicio majore. Breyn. prod. Africanischer Löwenschwanz mit Gliedkrautblättern, und grosser, rother Blume.
- Leonurus minor*, Capitis Bonae Spei, vulgo. Boerh. Ind. alt. Kleiner Löwenschwanz vom Vorgebürg der guten Hoffnung.
- Leonurus perennis Africanus*, sideritidis folio variegato, flore phœnicio majore. Scheffiger Löwenschwanz.
- Leucanthemum Canariense*, foliis chrysanthemi, pyrethri sapore. Inst. R. H. Canarische Rindsaugmaslieben, mit Goldblumenblättern, und dem Bertramgeschmack.
- Limonium Siculum lignosum*, gallas ferens & non ferens. Bocc. Rar. Plant. Holziger, sicilianischer Seelavendel.
- Limonium Aegyptiacum lignosum*, halimi folio. Jussieu. Holziger, egyptischer Seelavendel, mit dem Meerportulacblat.
- Lotus polyceratos fruticosa Cretica*, argentea, siliquis longissimis propendentibus, rectis. Mor. Hist. Staudiger cretischer Silbersteinklee, mit langen, geraden, herabhängenden Schoten.
- Majorana rotundifolia*, scutellata, exotica. H. R. Par. Fremder Majoran mit runden, näpfelförmigen Blättern.
- Marrubium Hispanicum supinum*, calyce stellato & aculeato. Inst. R. H. Niederiger, spanischer Andorn, mit sternförmigen, stachelichten Kelch.

Marum Syriacum vel Creticum. H. L. Syrisch Mastichkraut.

Medicago trifolia frutescens, incana. Inst. H. R. Staudiger, dreyblättriger, grauer Mondklee.

Moldavica Americana trifolia, odore gravi. Inst. R. H. Dreyblättrige, americanische Melisse, mit starkem Geruch.

Nerium floribus rubescentibus. C. B. P. Oleander mit rothen Blumen.

Nerium floribus albis. C. B. P. Oleander mit weissen Blumen.

Polygala Africana frutescens, buxi folio, maximo flore. Olden. Staudige, africanische sehr grosse Kreuzblume, mit dem Buchsblat.

Parmica incana, pinnulis cristatis. Tourn. Cor. Graues Nieskraut, mit buschichten Blättern.

Parmica orientalis, foliis cristatis. Tourn. Cor. Orientalisch Nieskraut, mit buschichten Blättern.

Parmica orientalis, santolinae folio, flore majore. Tourn. Cor. Orientalisch Nieskraut, mit Cypressenkrautblättern, und grosser Blume.

Parmica orientalis, foliis tanacetii incanis, flore aureo. Tourn. Cor. Orientalisch Nieskraut, mit grauen Rainfarenblättern, und goldfarber Blume.

Parmica orientalis, foliis argenteis conjugatis. Tourn. Cor. Orientalisch Nieskraut, mit silbernen, paarweis wachsenden Blättern.

Parmica Cretica frutescens, santolinae facie. Inst. R. H. Staudig, cretisches Nieskraut, so dem Cypressenkraut gleichet.

Rapuntium maximum, coccineo spicato flore. Col. in Recc. Grosse, scharlachfarbe Cardinalsblume.

Rapuntium Americanum, flore dilute coeruleo. Acad. Reg. S. Blaue Cardinalsblume.

Rhus Africanum trifoliatum majus, foliis subtus argenteis, acutis, margine incis. Pluk. Phyt. Africanischer, dreyblättriger Sumach, mit Blättern so unten silberfarb, spizig und am Rand eingeschnitten sind.

Rhus Africanum trifoliatum minus, glabrum, splendens folio subrotundo, integro, forte lentiscus Africanus triphyllos quorundam. Pluk. Phyt. Kleiner, dreyblättriger africanischer Sumach, mit dem glänzenden, ganzen, platten, rundlichten Blat.

Rhus Africanum trifoliatum majus, folio subrotundo integro. Großer, dreyblättriger, africanischer Sumach, mit dem runden, ganzen Blat.

Ruscus latifolius, foliorum sinu florifer & fructifer. Hort. Elth. Breitblättriger Mäusdorn, so am Rand der Blätter Blumen und Früchte trägt.

Salvia orientalis latifolia, absinthium redolens, flore carneo magno. Boerh. Ind. alt. Orientalischer, breitblättriger Salbey, mit grosser fleischfarber Blume.

Salvia Africana frutescens, folio subrotundo glauco, flore aureo magno. Hort. Amst. Africanischer, staudiger Salbey, mit dem rundlichten, meergrünen Blat, und grosser goldfarber Blume.

Salvia Africana frutescens, folio scorodoniae, flore violaceo. Hort. Amst. Africanischer staudiger Salbey, mit Baldsalbeyblättern, und violetter Blume.

Scabiosa Africana frutescens. Par. Bat. Africanische, staudige Scabiose.

Scabiosa stellata, folio non dissecto. C. B. P. Sternscabiose mit unzerschnittenem Blat.

2111 111 2

Scabiosa

- Scabiosa Sicula fruticans, laureolæ folio subtus incano. Inst. R. H. Staudige, sicilianische Scabiose, mit Kellershalsblättern, so unten grau sind.
- Scilla vulgaris, radice rubra. C. B. C. Gemeine rothe Meerzwiebel.
- Scilla radice alba. C. B. P. Weiße Meerzwiebel.
- Senecio Africanus, folio retuso. Hort. Cath. Africanisch Kreuzkraut, mit stumpfen Blättern.
- Senecio Africanus arboreus, folio serrato. Bærh. Ind. alt. Africanisch, baumartig Kreuzkraut, mit dem ausgezackten Blat.
- Siliqua edulis. C. B. P. St. Johannisbrod.
- Solanum pomiferum frutescens, Africanum, spinosum, nigricans, borraginis flore, foliis profunde laciniatis. H. L. Staudiger, africanischer, aepfeltragender Nachtschatten mit schwarzen Dornen, Boretschblumen, und tief zerkerbten Blättern.
- Solanum dulcamarum scandens Africanum, foliis crassis hirsutis. Hort. Elth. In die Höhe laufender, africanischer Nachtschatten, mit dicken, rauhen Blättern.
- Solanum fruticosum bacciferum. C. B. P. Staudiger, beerentragender Nachtschatten.
- Spartium tertium, flore albo. C. B. P. Weißer, spanischer Psriemen.
- Spartium orientale humile, fructu villosa & rostrato. Tourn. Cor. Orientalischer, niedriger Psriemen, mit haariger schnabelförmiger Frucht.
- Spartium orientale, siliqua compressa glabra & annulata. Tourn. Cor. Orientalischer Psriemen, mit glatter, ringförmiger Schote.
- Spirea Africana, foliis pilosis. Com. Rar. Plant. Africanische Spierstaude, mit haarigen Blättern.
- Staphylodendron Africanum, folio singulari lucido. Par. Bat. Africanischer Wimpernästleinbaum, mit einzeln, glänzenden Blättern.
- Styrax folio mali cotonei. C. B. P. Der Storaxbaum mit dem Quittenblat.
- Tanacetum Africanum arboreus, foliis lavendulae, multifido folio Hort. Amst. Africanischer, staudiger Rainfaren, mit zertheilten Lavendelblättern.
- Tanacetum Africanum fruticans multiflorum, foliis tanaceti vulgaris, decuplo minoribus. Bærh. Ind. Africanischer, staudiger Rainfaren mit vielen Blumen, und Blättern, so zehnmal kleiner als am gemeinen Rainfaren sind.
- Tetragonocarpos Africana fruticans, foliis longis & angustis Hort. Amst. Africanischer, staudiger Viereckfruchtbaum, mit langen, schmalen Blättern.
- Teucrium Boeoticum. Clus. Hisp. Spanisch Baumgamanterlein.
- Teucrium Hispanicum, latiore folio. Inst. R. H. Spanisch Baumgamanterlein mit breitem Blat.
- Thlaspi montanum sempervirens. C. B. P. Immergrüner Bergbauernsens.
- Thlaspidium fruticosum, leucoii folio, semper florens. Inst. R. H. Staudiger, immerblühender Bastartbauernsens, mit dem Leucoienblat.
- Thlaspidium Hispanicum, ampliore flore, folio crasso dentato. Hort. Elth. Spanischer Bastartbauernsens, mit grosser Blume, und dickem, zackigem Blat.
- Thymra legitima. Clus. Hist. Wahrer, frembder Thymian.
- Thymra Sancti Juliani, sive satureia vera. Lob. Icon. Frembder Thymian vom St. Juliansberg, oder der wahre, frembde Thymian des Lobels.

- Tithymalus Creticus characias angustifolius, villosus & incanus. Tourn. Cor. Holzige, cretische Wolfsmilch, mit schmalen, haarigen, grauen Blättern.
- Tithymalus arboreus. Alp. Exot. Baumartige Wolfsmilch.
- Tithymalus arboreus altissimus, folio salicis, caulibus rubentibus. Bærh. Ind. Die höchste, baumartige Wolfsmilch, mit dem Weidenblat und röthlichten Stengeln.
- Tithymalus arboreus, caule corallino, folio hyperici, pericarpio barbato. Bærh. Ind. alt. Baumartige Wolfsmilch mit rothem Stengel, Johannekrautblätter, und bärtiger Decke der Frucht.
- Yucca foliis aloes. C. B. P. Yucca mit Aloeblättern.
- Yucca arboreus, foliis rigidioribus rectis serratis. Hort. Elth. Baumartige Yucca, mit steifen, geraden, zackigen Blättern.
- Yucca draconis folio serrato reflexo. Hort. Elth. Yucca mit dem zackigen, zurückgebogenen Drachenbaumblat.
- Ziziphus. Dod. Brustbeerleinstrauch.

Die hier angeführten Pflanzen wachsen viel besser in einer offenen Glascafse, als in einem Gewächshaus unter Pomeranzenbäumen: dann da sie gerne im Winter bey gelindem Wetter treiben, so werden ihre Schossen schwach und schimmeln leicht, wann sie zu solcher Zeit nicht Luft genug haben. Und da sie nur alleine für dem Frost verwahrt seyn wollen, so hat man keiner durch Kunst gemachten Wärme bey ihnen nöthig, den Thermometer aber kan man nur deswegen im Haus aufhängen, damit er anzeigen, wann es gefrieren will, daß man die Fenster mit Läden oder Matten bedecken könne, wann es wann zu befürchten wäre, daß der Frost zu den Pflanzen kommen mögte. Da die meisten Pflanzen dieses Verzeichnisses, viel Masse haben wollen, als habe ich aus selbigem diejenigen safftigen Pflanzen weggelassen, die im Winter gerne faulen, wann sie zu feucht stehen, ob sie gleich sonst nicht zarter als obige sind. Daher soll man sie in einer solchen luftigen Glascafse, an einen Ort zusammenstellen, damit sie nicht zu viel Wassers bekommen, oder die von den andern Pflanzen entstehende Feuchtigkeiten in sich ziehen, und deswegen will ich diese safftigen Pflanzen in folgendem Verzeichnis anführen.

- Asclepias Africana aizoides. Inst. R. H. Africanische Schwalbenwurz, insgemein Fritillaria crassa.
- Asclepias Africana aizoides, flore pulchre fimbriata. Com. Præl. Africanische Schwalbenwurz, mit schönen haarigen Blumen.
- Cacalanthemum folio nerii glauco. Horth. Elth. Calcalanthemum mit dem meergrünen Oleanderblat.
- Calcalanthemum Africanum, ficoidis folio. Africanisch Calcalanthemum, mit dem Ficoidesblat.
- Cotyledon Africana frutescens, foliis orbiculatis, limbo purpureo cinctis. Inst. R. H. Africanisches, staudiges Nabelkraut, mit runden Blättern, die einen purpurfarbenen Rand haben.
- Cotyledon Africana arboreus major, foliis glaucis oblongioribus, flore luteo. Bærh. Ind. alt. Das grosse, baumartige, africanische Nabelkraut, mit länglichten meergrünen Blättern, und gelber Blume.

Cotyledon

Cotyledon major arborescens Afrā, foliis orbiculatis glaucis, limbo purpureo, & maculis viridibus ornatis. Boerh. Ind. alt. Das grosse, baumartige, africanische Nabelkraut, mit runden meergrünen Blättern, so einen purpurfarbenen Saum haben, und grün gefleckt sind.

Cotyledon Africana frutescens, folio longo & angusto, flore flavescente. Com. Rar. Plant. Das staudige, africanische Nabelkraut, mit langen, schmalen Blättern und gelber Blume.

Cotyledon Africana frutescens, flore umbellato coccineo. Com. Rar. Plant. Das staudige, africanische Nabelkraut, mit scharlachfarbenen doldenweis wachsenden Blumen.

Cotyledon Capensis, folio semiglobato. Hort. Elth. Das Nabelkraut vom Vorgebürg der guten Hoffnung, mit dicken halbrunden Blättern.

Crassula anacampserotis folio. Hort. Elth. *Crassula* mit Rosenwurzelblättern.

Crassula portulacæ facie, arborescens. Hort. Elth. Baumartige *Crassula*, so wie *Portulac* aussieht.

Crassula ceposa longifolia. Hort. Elth. Zwiefels-*crassula* mit langen Blättern.

Crassula caulescens, foliis sempervivi cruciatis. Hort. Elth. Stengeltreibende *Crassula*, mit Hauswurzelblättern.

Crassula mesembryanthemi facie, foliis longioribus asperis. Hort. Elth. *Crassula* so der *Ficoides* gleicht, mit langen, rauen Blättern.

Crassula orbicularis repens, foliis sempervivi. Hort. Elth. Runde kriechende *Crassula*, mit Hauswurzelblättern.

Crassula portulacæ facie, repens. Hort. Elth. Kriechende *Crassula*, so wie *Portulac* aussieht.

Ficoides. Alle im Perico benannte *Ficoides*.

Opuntia vulgo herbariorum. I. B. Gemeine, indianische Feige.

Phalangium Africanum, foliis cepaceis floribus spicatis aureis. Boerh. Ind. alt. Das africanische Erdspinnenkraut, mit Zwiebelblättern und goldfarbenen Blumenähren.

Phalangium Africanum, foliis aloes, floribus luteis spicatis. Hort. Elth. Das africanische Erdspinnenkraut mit Aloesblättern, und gelben Blumenähren.

Phalangium Aethiopicum ramosum, floribus albis, petalis reflexis. Hort. Amst. Aethiopisches, ästiges Erdspinnenkraut, mit weissen Blumen, so zurückgebogene Blättlein haben.

Sedum majus arborescens. I. B. Baumartige Hauswurz.

Sedum majus arborescens, foliis elegantissime variegatis tricoloribus. Boerh. Ind. alt. Baumartige, grosse Hauswurz, mit dreifarbigen schöngefleckten Blättern.

Sedum Canarium, foliis omnium maximis. Hort. Amst. Canarische Hauswurz mit den größten Blättern.

Sedum Afrum montanum, foliis subrotundis, dentibus albis serratis, confertim natis. Boerh. Ind. alt. Africanische Berghauswurz, mit rundlichten Blättern, so am Rand Zähne und Zacken haben.

Sedum Afrum saxatile, foliolis sedi vulgaris, in rosam vere compositis. Boerh. Ind. alt. Africanische Steinhäuswurz, mit gemeinen Hauswurzelblättern, die rosenförmig beysammen stehen.

Verzeichnis solcher Pflanzen, so in einem warmen Gewächshaus unter den Pomeranzenbäumen stehen können, und im Winter keiner durch Kunst gemachten Wärme nöthig haben, aber auch nicht so viel Luft brauchen, als die vörangeführten Pflanzen.

A BUTILON *Altheoides*, flore carneo, fructu globofo. Hort. Elth. Abutilon, so wie die Althee aussieht, mit fleischfarber Blume, und runder Frucht.

Aloe Africana minor. Munt. Kleine americanische Aloe.

Aloe Africana caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis. Hort. Amst. Africanische Stengelaloe, mit stachelichten Blättern, so an beeden Seiten weisse Flecken haben.

Aurantium acri medulla, vulgare. Fer. Hesp. Gemeine sicilianische Pomeranze.

Aurantium medulla dulci vulgare. Fer. Hesp. Süssse sicilianische Pomeranze.

Aurantium Sinense. Fer. Hesp. Pomeranze von China.

Aurantium crispo folio. Fer. Hesp. Pomeranzenbaum mit krausen Blät.

Aurantium crispo folio, elegantissime variegato. Boerh. Ind. alt. Pomeranzenbaum mit krausen, schöngefleckten Blät.

Aurantium corniculatum. Fer. Hesp. Gehörnter Pomeranzenbaum.

Aurantium folio variegato, vulgare, Anglicum dictum. Boerh. Ind. alt. Gemeiner, gestreifter Pomeranzenbaum.

Aurantium hermaphroditum, partim aurantium, partim citreum. Hesp. Nor. Der Zwitterpomeranzenbaum.

Aurantium angusto folio, elegantissime variegato. Pomeranzenbaum mit schmalen Weidenblättern.

Aurantium angusto & acuminato folio, fructu parvo odoratissimo, mela rosa dictum. Claric. cult. Plant. Pomeranzenbaum mit dem schmalen, spitzigen Blät, und kleiner wohlriechender Frucht, so Mela rosa genennet wird.

Aurantium flore pleno. Pomeranzenbaum mit gefüllter Blume.

Aurantium foetiferum. Fer. Hesp. Pomeranzenbaum, dessen Früchte junge tragen.

Aurantium fructu multiplici. Inst. R. H. Büschelapomeranzen.

Aurantium Sinicum pumilum. Camell. Syll. Kleine chinesische Pomeranze.

Citream vulgare. Inst. R. H. Gemeiner Citronenbaum.

Citream dulci medulla. Inst. R. H. Süsser Citrone.

Citream magno fructu. Inst. R. H. Grosse Citrone.

Citream Florentinum, fructu suavissimo. Till. Chedrat.

Citream Florentinum, folio sinuato & serrato, fructu oviformi. Hort. Maur. Florentinische Citrone, mit dem ausgeschweiften, zackigen Blät, und eiförmiger Frucht.

Citream moschum redolens, fructu multiformi. Claric. cult. Pl. Citronenbaum, so wie Bisam riecht, und eine vielförmige Frucht hat.

M u m m m m

Ligustrum

- Ligustrum Capense* sempervirens, folio crasso subrotundo. Hort. Elth. Hartriegel vom Vorgebürg der guten Hoffnung, mit dicken, runden Blättern, Hottentotenfirschen.
- Limon vulgaris*. Fer. Hesp. Gemeiner Limonienbaum.
- Limon dulci medulla*, vulgaris. Fer. Hesp. Gemeine süsse Limonie.
- Limon acris*. Fer. Hesp. Saure Limonie.
- Limon pyri effigie*. Fer. Hesp. Birnförmige Limonie.
- Limon citratus*. Fer. Hesp. Citronenlimonie.
- Limon citratus*, altero foetus. Inst. R. H. Limonie so junge trägt.
- Limon fructu racemoso*. Inst. R. H. Büschellimonie.
- Limon flore pleno*. Boerh. Ind. alt. Limonienbaum mit gefüllter Blume.
- Limon vulgaris*, foliis ex aureo variegatis. Goldstreifiger Limonienbaum.
- Limon incomparabilis*. Fer. Hesp. Unvergleichlicher Limonienbaum.
- Limon imperialis*. Fer. Hesp. Kaiserlimonie.
- Molle. Glus. in Monard. Peruvianischer Mastixbaum.
- Myrtus laefolia* Baetica 1. vel foliis laurinis. C. B. P. Breitblättriger, spanischer Myrtenbaum, Lorbeermyrten.
- Myrtus laefolia* Baetica 2. vel foliis laurinis, confertim nascentibus. C. B. P. Breitblättriger, spanischer Myrtenbaum.

- Myrtus balsamica*, foliis mali granata. H. L. Myrtenbaum mit Granatenblättern.
- Myrtus foliis odore nucis moschata*, cauliculis rubentibus, vulgo odore citri. Schuyt. Cat. Muscatmyrten.
- Myrtus angustifolia* Baetica. C. B. P. Rosmarinmyrten.
- Myrtus odore nucis moschata*, cauliculis rubentibus, foliis ex luteo variegatis. Scheffige Muscatmyrten.
- Myrtus minor vulgaris*. C. C. P. Buchsblättriger Myrten.
- Myrtus minor vulgaris*, foliis ex albo variegatis. Scheffige, buchsblättriger Myrten.
- Myrtus foliis minimis & mucronatis*. C. B. P. Myrten mit Thymianblättern.
- Nerium Indicum angustifolium*, floribus odoratis simplicibus. H. L. Bat. Schmalblättriger, wohlriechender indianischer Oleander.
- Nerium Indicum latifolium*, floribus odoratis plenis. H. L. Breitblättriger, wohlriechender, gefüllter Oleander, mit scheffiger Blume.
- Staphylodendron Americanum*, foliis lauri angustis. Plum. Pimpernüssleinbaum, mit schmalen Lorbeerblättern.
- Ziziphus argentea* Zeylanica, spinis carens, Walambilla Zeylanensibus dicta. B. P. C. Silberner Brustbeerstrauch aus Ceylon ohne Dornen.

Verzeichnus solcher Pflanzen, so zwar im Glashaus stehen müssen, aber nur des geringsten Grades von Wärme im Winter nöthig haben. Diese gehören zur ersten Classe der an Herrn Fowlers botanischen Thermometer bemerkten Glashauspflanzen, und wollen eine solche Wärme haben, die den Spiritum nicht viel über den bemerkten Punct herunter fallen läßt, auch darf er nicht über acht oder zehn Grad im Winter darüber steigen.

- A**CACIA vera, L. B. Die wahre, egyptische Acacia.
- Acacia Indica* Farnesiana. Ald. Indianische Acacie mit harzigten Schoten.
- Acacia non spinosa*, flore albo, foliorum pinnis latiusculis glabris, siliquis longis planis. Houst. Weissblühende Acacie ohne Dornen, mit breiten glatten Blättern, und langen platten Hülsen.
- Acacia cornigera*, floribus globosis. Houst. Gehörnte Acacie mit runden Blumen.
- Acacia cornigera*, floribus oblongis. Houst. Gehörnte Acacie, mit langen Blumen.
- Alkekengi Bonariense* repens, bacca turbinata viscosa. H. Elth. Judenfirsche von Buenos Ayres, mit flebrichter, kreiselförmiger Frucht.
- Alkekengi Americanum* frutescens, fructu globoso rubro, vesica atropurpurea. Houst. Straudige Judenfirsche, mit runder rother Frucht, und purpurfarber Blase.
- Aloe vulgaris*. C. B. P. Gemeine Aloe.
- Aloe succotrina angustifolia* spinosa, flore purpureo. Breyn. prod. Sucotrinische oder Purgieraloe.
- Aloe Africana* caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus obscurioribus, magis glaucis. Boerh. Ind. alt. Die africanische Stengelaloe, mit stachlichten dunkelgrünen Blättern, so an beeden Seiten weisse Flecken haben.
- Aloe Africana*, foliis glaucis, margine & dorsi parte superiore spinosis, flore rubro. Com. Prälud.

- Africanische Aloe, mit grünen zackichten Blättern und rothen Blumen.
- Aloe Africana* arborecens montana, non spinosa, folio longissimo plicatili, flore rubro. Hort. Amst. Africanischer Aloebaum, mit glatten, langen, weichen Blättern ohne Stacheln, und rother Blume.
- Aloe Africana* caulescens, foliis glaucis caulem amplectentibus. Hort. Amst. Africanische Stengelaloe, mit meergrünen, den Stengel umgebenden Blättern.
- Aloe Africana* caulescens, foliis minus glaucis, caulem amplectentibus, dorsi arte suprema spinosa. Com. Prälud. Africanische Stengelaloe, mit Blättern die den Stengel umfassen, und oben am Rucktheil Dornen haben.
- Aloe Africana* caulescens, foliis glaucis, caulem amplectentibus, latioribus & undequaque spinosis. Com. Präl. Africanische Stengelaloe, mit meergrünen den Stengel umfassenden, breiten, Blättern, so über und über Dornen haben.
- Aloe Africana* caulescens, foliis glaucis brevioribus, caulem amplectentibus, foliorum parte interna & externa nonnihil spinosa. Com. Präl. Africanische Stengelaloe, mit sehr kurzen meergrünen Blättern, an welchen der obere Theil innen und aussen etwas stachlicht ist.
- Aloe Africana*, flore rubro, folio maculis albicantibus ab utraque parte notato. H. A. Africanische

- sche Aloe mit rother Blume, und Blättern, so innen und aussen weißlichte Flecken haben.
- Aloe Africana caulescens*, folio crasso obscure viridi, spinis ad latera & in dorso armato. Boerh. Ind. alt. Africanische Stengelaloe, mit dickem dunkelgrünen Blat, so an den Seiten und am Rücken Stacheln hat.
- Aloe Africana*, flore rubro, folio triangulari, & verrucis albicantibus ab utraque parte notato. Hort. Amst. Africanische Aloe mit rother Blume und dreyeckichtem Blat, so innen und aussen mit weißlichten Warzen besetzt.
- Aloe Africana*, foliis planis conjugatis carinatis verrucosis, caule & flore corallii colore. Boerh. Ind. alt. Die schmalblättrige Zungenaloe.
- Aloe Africana*, foliis planis latioribus conjugatis carinatis, flore rubro. Die breitblättrige Zungenaloe.
- Aloe Africana*, foliis longis conjugatis, supra cavis margaritiferis, flore rubro elegantissimo. Boerh. Ind. alt. Perlenzungenaloe.
- Aloe Africana erecta*, rotundo folio parvo, & in acumen acutissimum exeunte. Com. Præl. Aufrechte Aloe mit dem scharfspitzigen Blat.
- Aloe Africana erecta triangularis*, & triangulari folio viscoso. Com. Præl. Aufrechte, dreyeckige Aloe.
- Aloe Africana minima atroviridis*, spinis herbaceis numerosis ornata. Boerh. Ind. alt. Die kleinste grasartige Aloe.
- Aloe Africana humilis*, foliis ex albo & viridi variegatis. Com. Præl. Insgemein die Rebhünersbrustaloe.
- Aloe Africana humilis*, spinis inermibus & verrucis obtusa. Com. Præl. Die Zigelaloe.
- Aloe Africana margaritifera minor*. Hort. Amst. Kleine Perlenaloe.
- Aloe Africana*, folio in summitate triangulari, margaritifera, flore subviridi. Hort. Amst. Größte Perlenaloe.
- Aloe Africana*, brevissimo crassissimoque folio, flore subviridi. Hort. Amst. Insgemein die Polsteraloe.
- Aloe Africana humilis arachnoidea*. Com. Par. Africanische Spinnenwebenaloe.
- Apocynum Americanum erectum*, foliis oblongis acuminatis, floribus ex albo virentibus. Houst. Aufrechter americanischer Hundskohl, mit länglicht spitzigen Blättern und weißlichtgrünen Blumen.
- Apocynum Americanum*, foliis amygdali longioribus. Plum. Americanischer Hundskohl, mit langen Mandelblättern.
- Apocynum Americanum scandens* hirsutissimum, foliis oblongis, filiquis maximis glabris. In die Höhe laufender, rauer Hundskohl, mit länglichten Blättern, und sehr grossen glatten Schoten.
- Asteriscus frutescens*, laureolæ folio. Houst. Cat. Staudig Sternkraut mit Kellerhalsblättern.
- Aurantium fructu maximo*, Indiarum orientalis. Boerh. Ind. alt. Ostindischer Pomeranzenbaum, mit der größten Frucht.
- Camara spinosa*, flore variegato. Plum. Nov. Gen. Americanischer Mehlbaum mit scheckiger Blume.
- Camara melissæ folio*, flore variabili. Hort. Elth. Americanisch Biburnum mit dem Melissenblat, und veränderlicher Blume.
- Camara trifolia*, purpurascens flore. Plum. Nov. Gen. Americanischer Mehlbaum mit drey Blättern und purpurfarber Blume.

- Camara salviae foliis mucronatis*, subtus villosis, flore minore luteo. Houst. Americanischer Mehlbaum mit spizigen Salbeyblättern, so unten haarig sind, und kleiner gelber Blume.
- Camara non spinosa*, salviae folio, rotundo & rugoso, flore minore pallido. Houst. Americanischer Mehlbaum ohne Dornen, mit dem runden rauhen Salbeyblat, und kleiner blasser Blume.
- Camara salviae foliis*, floribus incarnatis. Americanischer Mehlbaum, mit leibfarben Blumen.
- Camara non spinosa*, urticae folio bullato, flore aureo. Houst. Americanischer Mehlbaum ohne Dornen, mit dem knopfigten Nesselblat, und goldfarberblume.
- Camara non spinosa*, urticae folio minore, flore albo. Houst. Glatter americanischer Mehlbaum, mit dem kleinen Nesselblat, und weisser Blume.
- Camara non spinosa*, salviae folio rugoso, flore purpurascens. Houst. Glatter americanischer Mehlbaum, mit dem rauhen Salbeyblat, und purpurfarber Blume.
- Campanula Canariensis*, atriplicis folio, radice tuberosa. Inst. R. H. Canarische Glockenblume.
- Camphora officinarum*. C. B. P. Der Campherbaum.
- Cannacorus flore coccineo splendens*. Inst. R. H. Indianisch Blumenrohr mit scharlachfarber Blume.
- Cannacorus flore luteo punctato*. Inst. R. H. Indianisch Blumenrohr mit gelber fleckichter Blume.
- Cannacorus amplissimo folio*, flore rutilo. Inst. R. H. Indianisch Blumenrohr mit sehr grossem Blat und rother Blume.
- Cannacorus latifolius vulgaris*, foliis ex albo variegatis. Gemein breitblättrig indianisch Blumenrohr, mit weissgescheckten Blättern.
- Cannacorus longissimo folio*, flore luteo majore. Das indianische Blumenrohr mit dem längsten Blat, und grösser gelber Blume.
- Cereus erectus altissimus* Syriamensis. Par. Bat. Die höchste, aufrechte, surinamische Jackeldistel.
- Corallo dendron Carolinianum*, floribus spicatis coccineis, radice crassissima. Carolinischer Corallenbaum mit scharlachfarben Blumenähren, und sehr dicker Wurzel.
- Cotyledon Afra*, folio crasso lato laciniato, flosculo aureo. Boerh. Ind. alt. Africanisch Nabelkraut, mit dem breiten dicken zackichten Blat, und goldfarben Blümlein.
- Crassula altissima perforata*. Hort. Elth. Die höchste Crassula mit Durchwasblättern.
- Digitalis Canariensis acanthoides frutescens*, flore aureo. Hort. Amst. Staudiger, canarischer Fingerhut, mit goldfarber Blume.
- Euphorbium tetragonum & pentagonum spinosum* Canarium. Boerh. Ind. alt. Das canarische Euphorbium, mit vier oder fünf Ecken, und mit Dornen.
- Euphorbium Afrum*, caule crasso squamoso, ramis in capitis Medusæ speciem cincto. Boerh. Ind. alt. Africanisches Euphorbium, mit dickem schuppichten Stengel, dessen Zweige ein Medusenhaupt vorstellen.
- Euphorbium Afrum*, caule squamoso tuberoso, minus. Boerh. Ind. alt. Africanisches kleines Euphorbium, mit schuppichten, knottichten Stengel.
- Euphorbium quod anteuphorbium*. Dod. Anteusphorbium.

M m m m m m m 2

Ficus

Ficus Bengalenfis, folio subrotundo, fructu orbiculato. Hort. Amst. Der rundblättrige Feigenbaum aus Bengala, mit rundem Blat, und runder Frucht.

Hamantus Africanus. H. L. Africanische Blurbiume.

Hamantus colchici foliis, perianthio herbaceo. Hort. Elth. Blurbiume mit Mattensafranblättern, und grasartiger Blumendecke.

Ketmia Sinensis, fructu subrotundo, flore simplici. Inst. R. H. Die sinesische Rose.

Ketmia Sinensis, fructu subrotundo, flore pleno. Inst. R. H. Gefüllte sinesische Rose.

Ligustroides, quod *ligustrum Americanum aculeatum*, fructu testiculato. Plum. Cat. Der stachelichte, americanische Hartriegelstrauch, mit hodenförmiger Frucht.

Malpighia mali punici facie. Nov. Gen. Barbadosfirschen.

Montia arborescens, abutili folio serrato, fructu racemoso. Houst. Baumartige Montia mit dem sacklichten Samtpappelblat, und traubichter Frucht.

Opuntia major, validissimis spinis munita. Inst. R. H. Die indianische Feige mit starken Dornen.

Opuntia folio oblongo, media. Inst. R. H. Die mittlere indianische Feige, mit länglichten Blat.

Opuntia maxima, folio spinoso latissimo & longissimo. Inst. R. H. Die größte indianische Feige, mit dem breiten und langen, stachelichten Blat.

Opuntia latifolia, crassiori folio, spinis albis numerosis armato. Boerh. Ind. alt. Breit und dickblättrige indianische Feige, mit vielen weissen Dornen.

Opuntia folio spinoso longissimo & angusto. H. L. Die indianische Feige, mit dem langen, schmalen dornichten Blat.

Palma dactylifera major vulgaris. Johnst. Dend. Der grosse datteltragende Palmenbaum.

Palma humilis, seu *chamæriphe*. I. B. Kleiner Palmenbaum.

Periploca Americana scandens, folio convolvuli, fructu alato. Plum. Cat. Americanische Windrebe, mit dem Windenblat und geflügelter Frucht.

Petiveria salani foliis, loculis spinosis. Plum. Nov. Gen. Petiveria mit Nachtschattenblättern, und stachelichten Saamenbehältnissen.

Plumbago Americana, betæ folio ampliore. Plum.

Cat. Americanische Blenwurz mit dem breiten Mangoiblat.

Sclarea Mexicana altissima, facie heliotropii. Hort. Elth. Mericanisches hohes Scharlachkraut, mit dem Sonnenwendenblat.

Solanoides Americana, circææ foliis glabris. Aet. Reg. S. Americanischer Nachtschatten, mit glatten Stephanskrautblättern.

Solanoides Americana, circææ foliis hirsutis. Aet. Reg. S. Americanischer Bastardnachtschatten, mit rauhen Stephanskrautblättern.

Solanum spinosum maxime tomentosum. Bocc. Pl. Dornichter Nachtschatten, mit sehr wollichten Blättern.

Solanum Americanum frutescens tomentosum, flore albo umbellato, fructu parvo rubro. Houst. Americanischer, staudiger Nachtschatten, mit weissen Doldenblumen, und kleiner rother Frucht.

Solanum Americanum frutescens & spinosum, quercus folio. Houst. Americanischer, staudiger, dornichter Nachtschatten mit dem Eichenblat.

Solanum arborescens & spinosum, foliis tomentosis, flore magno cœruleo. Houst. Staudiger, dornichter Nachtschatten, mit wollichten Blättern, und grosser blauer Blume.

Solanum lignosum Africanum sempervirens, laurinis foliis. Hort. Amst. Africanischer, holziger immergrüner Nachtschatten mit Lorbeerblättern.

Solanum Bahamense arborescens, folio sinuato. Hort. Elth. Baumartiger Nachtschatten aus Bahama, mit dem ausgezackten Blat.

Tithymalus arboreus Africanus. Inst. R. H. Baumartige africanische Wolfsmilch.

Urtica racemifera maxima Sinarum, foliis subtus argenteis, lanugine villosis. Pluk. Amalth. Die größte sinesische ästige Nessel, deren Blätter mit silberfarber Woll überzogen sind.

Zitharexylum arbor laurifolia Americana, foliorum venis late candicantibus, ex ejus ligno citharæ & panduræ fiunt. Pluk. Phyt. Das Geigenholz von Barbados.

Verschiedene dieser jetzt angeführten Pflanzen, können in einem guten Gewächshaus verwahrt werden, ohne daß sie einer durch Kunst gemachten Wärme nöthig hätten; aber sie blühen alsdann nicht so gut, werden auch nicht so stark, als wann sie die am Thermometer bemerkte Wärme haben; und diese kan man mit wenigem Holz in einem ziemlich grossen Glashaus zuwege bringen.

Verzeichnus solcher ausländischer Pflanzen, welche derjenigen Wärme nöthig haben, so auf Herrn Fowlers Thermometer, für die zweite Classe der Pflanzen bestimmt ist.

A CACIA arborea major spinosa, pinnis quatuor maioribus subrotundis, siliquis varie intortis. Sloan. Cat. Die breit und vierblättrige Acacia, mit gedrehten Hülsen.

Acacia Americana, humilis & spinosa, pinnis foliorum acuminatis, floribus herbaceis, siliquis varie intortis. Kleine stachelichte Acacia, mit spitzigen Blättern, grünlichen Blumen, und gedrehten Hülsen.

Acacia spinosa humilis, siliquis teretibus & resinosis. Houst. Die kleine dornichte Acacia, mit runden harzigen Hülsen.

Acacia non spinosa, floribus globosis albis, foliorum pinnis tenuissimis glabris, siliquis ad singula grana tumidis. Houst. Glatte Acacia mit runden, weissen Blumen, sehr zarten glatten Blättern, und Hülsen die bey jedem Saamenkorn dick sind.

Acacia Americana spinosa, siliquis longis recurvis luteis. Houst. Americanische, dornichte Acacia, mit langen, gelben, krummen Hülsen.

Acacia non spinosa, flore albo, flaminibus longis, foliorum pinnis latiusculis glabris & auritis. Houst. Glatte Acacia, mit weisser Blume, langen Fasern, und breiten glatten, gehörten Blättern.

Acacia

- Acacia humilis* non spinosa, foliis subtus incanis, florum staminibus longis rubentibus. Houst. Niedrige glatte *Acacia*, deren Blätter unten grau sind, und die lange rothe Blumenfäden hat.
- Acacia Americana* non spinosa, flore purpureo, staminibus longissimis, siliquis planis villosis, pinnis foliorum tenuissimis. Houst. Americanische glatte *Acacia* mit purpurfarber langfaseriger Blume, glatten haarigen Schoten, und sehr kleinen Blättern.
- Acacia spinosa*, foliorum pinnis tenuissimis glabris, floribus globosis luteis, spinis longissimis. Houst. Dornichte *Acacia*, mit sehr kleinen glatten Blättern, runden gelben Blumen, und sehr langen Dornen.
- Acacia* non spinosa tenuifolia villosa, floribus globosis albis, siliquis brevibus hirsutis. Houst. Glatte *Acacia*, mit zarten haarigen Blättern, runden, weissen Blumen, und rauen, kurzen Schoten.
- Acacia* non spinosa, latiore folio villosa, floribus globosis albis, siliquis brevibus hirsutis. Houst. Glatte *Acacia*, mit dem breiten, haarigen Blat, runden weissen Blumen, und kurzen rauen Schoten.
- Acacia Americana*, flore luteo globoso, spinis exiguis, foliorumque pinnis tenuissimis pubescentibus. Houst. Americanische *Acacia*, mit gelber, runder Blume, kleinen Dornen, und zarten haarigen Blättern.
- Acacia spinosa* tenuifolia, floribus spicatis luteis, siliquis longissimis compressis flavis. Houst. Dornichte zartblättrige *Acacia*, mit gelben Blumenähren, und langen, platten, gelben Schotten.
- Acacia spinosa* tenuifolia, spinis singulis cornu bovinum per longitudinem fissum referentibus. Houst. Dornichte, zartblättrige *Acacia*, deren Dornen nach der Länge gespaltene Ochsenhörner vorstellen.
- Acacia Americana*, faginis foliis tetraphylla, flosculis staminosis, in spicam dispositis. Pluk. Amalth. Americanische breit- und vierblättrige *Acacia*, mit Fadenblumen, so eine Aehren machen.
- Acacia humilis* latifolia, non spinosa, staminibus florum longissimis rubentibus. Houst. Die niedrige breitblättrige *Acacia* ohne Dornen, mit langen, rothen Fadenblumen.
- Acacia Americana* non spinosa latifolia, siliquis marginatis & ad singula grana tumidis. Houst. Die breitblättrige, americanische *Acacia* ohne Dornen, mit Hülsen, so einen Rand haben, und bey jedem Saamenkorn dick sind.
- Acacia spinosa* tenuifolia, siliquis latis, spinis minimis recurvis solitariis. Houst. Die dornichte schmalblättrige *Acacia*, mit breiten Schoten, kleinen, krummen und einzeln stehenden Dornen.
- Acacia* non spinosa tetraphylla latifolia, staminibus florum longissimis rubentibus. Die vierblättrige *Acacia* ohne Dornen, mit breiten Blättern und langen, rothen Blumenfäden.
- Acacia* non spinosa tenuifolia, siliquis varie intortis. Schmalblättrige, glatte *Acacia*, mit gedrehten Hülsen.
- Acacia Americana* tetraphylla & spinosa, floribus globosis, staminibus florum longis rubentibus. Houst. Americanische, vierblättrige glatte *Acacia*, mit runden Blumen, und langen rothen Blumenfäden.
- Aloe Americana* sobolifera. H. L. Die americanische *Aloe*, so aus den Stengeln junge Pflanzen treibt.

II. Theil.

- Aloe Americana*, ex Vera Cruce, foliis angustioribus, minus glaucis. Hort. Beaum. Die breite blättrige *Aloe* aus Veracruz.
- Aloe Americana*, folio viridi rigidissimo foetido, piet dicta indigenis. Hort. Beaum. Die breite grünblättrige *Aloe* aus Curacao, mit schwarzen Stacheln.
- Aloe Americana*, folio viridi rigidissimo, margine spinoso silk-gras dicta. Americanische *Aloe*, mit steifen grünen Blat, so am Rand Dornen hat, und sonst Silk-gras genennet wird.
- Aloe Guineensis*, radice geniculata, foliis e viridi & atro undulatis variegatis. Hort. Amst. Die guineische *Aloe*.
- Aloe Zeylanica* pumila, foliis variegatis. Par. Bat. prod. Die kleine *Aloe* aus Ceylon.
- Apocynum fibrosa* radice, petalis coccineis, corniculis croceis. Hort. Amst. Hundskohl mit faseriger Wurzel, rothen Blumen, deren mittlere Theile saffrangelb sind, insgemein *Spacacuana*.
- Apocynum Americanum* scandens, foliis citri, siliquis maculatis. Plum. Americanischer in die Höhe steigender Hundskohl, mit Citronenblättern, und fleckichten Hülsen.
- Aristolochia Americana* scandens, foliis cordatis, fructu tereti. Americanische Osterluzen, so in die Höhe steigt, herzförmige Blätter, und eine länglichtrunde Frucht hat.
- Aristolochia Americana* scandens, foliis laurinis angustis, fructu maximo. Americanische, in die Höhe steigende Osterluzen, mit schmalen Lorbeerblättern, und sehr grosser Frucht.
- Aristolochia Americana* erecta, flore atropurpureo, foliis angustis, radice repente. Plum. Aufrechte americanische Osterluzen, mit dunkelpurfarber Blume, schmalen Blättern, und kriechender Wurzel.
- Arum maximum* Aegyptiacum, quod vulgo colocasia. Sloan. Cat. Die aegyptische Aronswurz, insgemein *Colocasia* genannt.
- Arum minus*, nymphææ foliis, esculentum. Sloan. Cat. Kleine esbare Aronswurz, mit Seeblumenblättern.
- Arum maximum* Aegyptiacum, quod vulgo colocasia, cauliculis nigricantibus, Zeylanica. H. L. Grosse aegyptische Aronswurz mit schwärzlichten Stengeln.
- Arundo saccharifera*. C. B. P. Zuckerrohr.
- Arundo Indica* arborea, Mambu vel Bambu dicta. Bambusrohr.
- Arundo arborea* Indica, amplo pediculado folio, Bambu altera species. Raii Hist. Undächt's Bambusrohr.
- Banisteria* scandens, foliis laurinis. Houst. Die in die Höhe steigende *Banisteria*, mit Lorbeerblättern.
- Banisteria Americana* scandens, folio subrotundo, flore ex aureo coccineo. Houst. Americanische *Banisteria*, mit rundlichtem Blat und goldscharlachfarber Blume.
- Banisteria Americana* scandens, foliis citri, flore cœruleo spicato. Houst. Americanische *Banisteria*, mit Citronenblättern, und blauen Blumenähren.
- Banisteria Americana* scandens, foliis subrotundis, subtus pubescentibus. Houst. Americanische *Banisteria*, mit rundlichten Blättern, so unten wollicht sind.
- Banisteria Americana* scandens, pseuodoacacia folio, flore purpurascens. Houst. Americanische

M n n n n n

Bani

- Banisteria*, mit Baumbohnenbaumblättern, und purpurfarber Blume.
- Barba Jovis Americana* scandens, floribus caeruleis, ad alas foliorum conglobatis. Americanischer, in die Höhe steigender Jupitersbart, mit blauen Blumen, so büschelweis aus den Winkeln der Blätter wachsen.
- Bernardia folio subrotundo*, mas. Houst. *Bernardia* mit rundlichem Blat, das Männlein.
- Bernardia folio subrotundo*, foemina. Houst. *Bernardia* mit rundlichem Blat, das Weiblein.
- Bassella*. Hort. Mal. Kletterender Nachtschatten aus Malabar.
- Bassella flore albo*, foliis & caulibus viridibus. Kletterender Nachtschatten aus Malabar, mit grünen Stengeln und Blättern.
- Bassella Sinica*, foliis & caulibus viridibus, minus succulentis, fructu minore. Justieu. Sinesischer Nachtschatten, mit grünen, nicht gar saftigen Blättern und Stengeln, und kleiner Frucht.
- Bauhinia non aculeata*, folio ampliori & bicorni. Plum. Nov. Gen. Bergehenholz.
- Bauhinia non aculeata*, folio nervoso bicorni, floribus albicantibus. Houst. Glatte *Bauhinia* mit dem nervichten Blat, und weislichten Blumen.
- Bauhinia non aculeata*, folio subrotundo majore rigido & bicorni, flore purpurascens. Houst. Glatte *Bauhinia* mit dem breiten, steifen, oben getheilten Blat, und purpurfarber Blume.
- Bauhinia scandens* & frutescens, folio subrotundo & bicorni, flore albo. Kriechende staudige *Bauhinia*, mit dem rundlichten getheilten Blat.
- Bermudiana palmæ folio*, radice bulbosa. D. Lign. *Bermudiana* mit dem Palmenblat, und knollichter Wurzel.
- Bignonia scandens tetraphylla*, fructu maximo echinato. Houst. Die sich windende vierblättrige *Bignonia*, mit grosser stachelichter Schote.
- Bignonia Americana arborescens pentaphylla*, flore roseo, major, siliquis planis. Plum. Cat. Insgemein die weisse Holz- oder Tulipanenblume.
- Bignonia scandens tetraphylla*, flore racemoso carneo. Houst. Die sich windende, vierblättrige *Bignonia* mit Fleischfarben Blumen, die in grossen Büscheln wachsen.
- Bignonia Americana*, scandens, foliis pinnatis hirsutis & marginibus sinuatis, siliquis longissimis & angustissimis. Die sich windende, americanische Trompetenblume mit gefiederten haarigen Blättern, so am Rand ausgeschweift sind, und langen, schmalen Schoten.
- Bignonia Americana*, scandens, tryphilla & pentaphylla, lobis amplioribus, mucronatis & serratis, siliquis longis compressis marginatis. Die sich windende americanische Trompetenblume mit drey und fünf Blättern, welche breit, spizig und am Rand zackicht sind, nebst langen platzen Schoten, so einen Rand haben.
- Bontia Laureolæ facie*. Horth. Elth. Wilde Olive aus Barbados.
- Brunfelsia flore albo*, fructu croceo molli. Plum. Nov. Gen. *Brunfelsia* mit weisser Blume, und weicher saffranfarber Frucht.
- Caapeba folio orbiculari & umbilicato laevi*. Plum. Nov. Gen. *Caapeba* mit runden, glatten Blat, so einen Nabel hat.
- Caapeba folio orbiculari & umbilicato tomentoso*. Plum. Nov. Gen. *Caapeba* mit runden Blat, so einen Nabel hat und wollicht ist.
- Caapeba folio orbiculari non umbilicato*. Plum. Nov. Gen. *Caapeba* mit runden Blat, so keinen Nabel hat.
- Casalpina polyphylla*, aculeis horrida. Plum. Nov. Gen. Vielblättrige mit Dornen besetzte *Casalpina*.
- Cainito folio subtus aureo*, fructu Maliformi. Plum. Nov. Gen. Insgemein der Sternapfel.
- Cainito folio subtus aureo*, fructu olivæformi. Plum. Nov. Gen. *Cainito* mit olivenförmiger Frucht.
- Calaba folio Citrii splendente*. Plum. Nov. Gen. Indianischer Mastixbaum mit dem glänzenden Citronenblat.
- Cassia fistula*, Alexandrina. C. B. P. *Purgiercassia*.
- Cassia fistula*, Brasiliana. C. B. P. Wilde americanische *Cassia*.
- Cassia Americana*, tetraphylla, latifolia. Houst. Vierblättrige americanische *Cassia*, mit breiten Blättern.
- Castorea repens*, spinosa. Plum. Nov. Gen. Stachelichte, kriechende *Castorea*.
- Castorea racemosa*, flore caeruleo, fructu erocio. Plum. Nov. Gen. Aestige *Castorea*, mit blauer Blume, und saffranfarber Frucht.
- Ceiba Vitis foliis*, caudice aculeato. Plum. Nov. Gen. Seidenwollenbaum, mit dornichten Stamm.
- Ceiba Vitis foliis*, caudice glabro. Plum. Nov. Gen. Seidenwollenbaum, mit glatten Stamm.
- Centaurium minus*, maritimum, amplo flore caeruleo. Plum. Cat. Americanisch, am Meer wachsendes, kleines Tausendguldenkraut, mit grosser blauer Blume.
- Chamaerhododendron Indicum*, flore amplo coccineo. Inst. R. H. Indianisch Bergröslein, mit grosser, scharlachfarber Blume.
- Cereus erectus*, altissimus, Syriamensis, spinis albis. Boerh. Ind. alt. Die höchste, surinamische, aufrechte *Fackeldistel*, mit weissen Stacheln.
- Cereus erectus*, quadrangulus, costis alarum instar assurgentibus. Boerh. Ind. alt. Viereckichte *Fackeldistel*.
- Cereus maximus*, fructu spinoso, rubro. Dadus. Par. Bat. Grösste *Fackeldistel*, mit dornichter, rother Frucht.
- Cereus erectus*, fructu rubro, non spinoso. Par. Bat. Aufrechte *Fackeldistel*, mit rother Frucht, so nicht dornicht ist.
- Cereus erectus*, gracilis, spinosissimus, spinis flavis, polygonus, lanugine alba pallefcente. Boerh. Ind. alt. Aufrechte, dünne, vieleckichte *Fackeldistel*, so voll gelber Dornen sitzt, und oben eine weisse, blasse Wolle führet.
- Cereus erectus*, gracilior, spinosissimus, spinis albis polygonus. Boerh. Ind. alt. Aufrechte, dünne, viereckichte *Fackeldistel*, so voll weisser Dornen sitzt.
- Cereus cristatus*, erectus, foliis triangularibus, profunde canaliculatis. Pluk. Phyt. Die dreieckichte *Fackeldistel*.
- Cereus scandens*, minor, trigonus, articulatus, fructu suavissimo. Par. Bat. Kleine, kriechende, dreieckichte *Fackeldistel*, insgemein die Stachelbirn.
- Cereus scandens*, minor, polygonus, articulatus. Par. Bat. Kleinere kriechende, viereckichte *Fackeldistel* mit Gelenken.
- Cereus minimus*, articulatus, polygonus, spinosus. Boerh. Ind. alt. Kleinste, stachelichte *Fackeldistel*, mit Gelenken und vielen Ecken.

Cereus

- Cereus scolopendriae folio brachiato.* Hort. Elth. Fackeldistel mit Hirschjungenblättern, so insgesam die indianische Feige heisset.
- Conyza fruticosa*, Cisti odore, floribus pallide purpureis, summitatibus ramulorum insidentibus, capitulis & semine minoribus. Sloan. Cat. Staudiges, americanisches Flöhkraut mit Eistusröslein geruch, bleichen purpurfarben Blumen, die an den Gipfeln der Stengel sitzen, mit kleinen Knöpflein und Saamen.
- Conyza fruticosa*, Cisti odore, floribus pallide purpureis, summitatibus ramulorum insidentibus, capitulis & semine majoribus. Sloan. Cat. Jam. Staudiges Flöhkraut, so wie Eistusröslein riecht, mit bleichen purpurfarben Blumen, die an den Gipfeln der Stengel sitzen, mit grossen Knöpflein und Saamen.
- Conyza arborescens*, tomentosa, foliis oblongis, floribus in summitatibus ramulorum racemosis sparsis albicantibus. Houst. Bolllichtes, baumgleiches Flöhkraut, mit länglichten Blättern, und weissen, büschelweis oben an den Stengeln wachsenden Blumen.
- Conyza frutescens*, flore luteo, umbellato. Houst. Staudiges Flöhkraut, mit gelber Blume, so dolenweis wächst.
- Conyza arborescens*, foliis oblongis, floribus singulis tribus flosculis constantibus. Houst. Baumartiges Flöhkraut, mit länglichten Blättern, dessen Blumen aus drey Blümlein bestehen.
- Conyza scandens*, Lauri foliis asperis, capitulis spicatis rotundis, floribus albis. Houst. Das in die Höhe kriechende Flöhkraut, mit rauen Lorbeerblättern und weissen Blumen, so in runden weissen Aehren wachsen.
- Conyza fruticosa*, flore pallide purpureo, capitulis & lateribus ramulorum spicatis exeuntibus. Sloan. Cat. Das staudige, americanische Flöhkraut, mit bleichen purpurfarben Blumen, so ährenweis oben und an den Seiten der Stengel heraus wachsen.
- Copaiba folio subrotundo*, flore rubro. Copaiba balsam.
- Corallodendron triphyllum*, Americanum, spinosum, flore ruberrimo. Inst. R. H. Stachelichter, dreyblättriger, americanischer Corallenbaum, mit sehr rother Blume.
- Corallodendron triphyllum*, Americanum, minus, spinis & semine nigris. Inst. R. H. Kleiner americanischer dreyblättriger Corallenbaum, so einen schwarzen, stachelichten Saamen hat.
- Corallodendron triphyllum*, Americanum, non spinosum. Inst. R. H. Dreyblättriger, americanischer Corallenbaum, ohne Dornen.
- Corallodendron Americanum*, minus, foliis acutioribus. Houst. Kleiner, americanischer Corallenbaum, mit spizigen Blättern.
- Corallodendron triphyllum*, Americanum, non spinosum, foliis acutioribus flore rubente. Dreyblättriger, americanischer Corallenbaum, ohne Stacheln, mit spizigen Blättern und rother Blume.
- Corallodendron triphyllum*, Americanum, caudice & nervis foliorum spinis armatis. Dreyblättriger, americanischer Corallenbaum, an welchem der Stamm und die Rippen der Blätter Stacheln haben.
- Cornus racemosa*, trifolia & quinquifolia, foliis foraminulatis. Plum Cat. Nestiger drey- und fünfblättriger Cornesfirchenbaum, mit durchlöchernten Blättern.

- Cornutia flore pyramidato caeruleo*, foliis incanis. Plum. Nov. Gen. Cornutia mit pyramidenförmiger, blauer Blume, und grünen Blättern.
- Coronilla scandens pentaphylla*. Plum. Manuf. Fünfblättrig, americanisch Beilkraut mit kriechenden Rancken.
- Cytisus Americanus*, spinosus, floribus luteis ad alas nascentibus. Plum. Cat. Stachelichter, americanischer Weisklee, mit gelben aus den Winkeln der Blätter wachsenden Blumen.
- Cytisus Americanus*, frutescens, sericeus. Plum. Bat. Staudiger americanischer Seidenweisklee.
- Cytisus Americanus*, arborecens, fructu eduli albo. Plum. Cat. Americanischer, baumartiger Weisklee, mit weisser essbarer Frucht.
- Dalechampia scandens*, Lupuli foliis, fructu hispido tricoco. Plum. Nov. Gen. In die Höhe steigende Dalechampia mit Hopfenblättern, und glatter dreyfacher Frucht.
- Dioscorea scandens*, foliis Tamni, fructu racemoso. Plum. Nov. Gen. In die Höhe kriechende Dioscorea, mit schwarzen Stielwurzelblättern, und traubenweis wachsender Frucht.
- Dioscorea scandens*, folio hastato, fructu racemoso. Houst. In die Höhe kriechende Dioscorea, mit dem spersförmigen Blat, und traubenweis wachsender Frucht.
- Dioscorea scandens*, folio subrotundo acuminato, fructu racemoso. Houst. In die Höhe kriechende Dioscorea, mit dem rundlichten, spizigen Blat, mit traubensförmiger Frucht.
- Dorstenia dentariae radice*, Sphondilii folio, placenta ovali. Houst. Contrayerva mit Zahnkrautwurzeln, Bärenklaublättern, und eyförmiger Placenta.
- Dorstenia dentariae radice*, folio minus laciniato, placenta quadrangulati & undulato. Houst. Contrayerva mit Zahnkrautwurzeln, wenig geschweiften Blättern, und viereckichter, wellenförmiger Placenta.
- Douglasia frutescens & spinosa*, ligustri folio, flore albo. Houst. Staudige, dornichte Douglasia, mit Hartriegelblättern, und weisser Blume.
- Dracunculus Indicus*, trifido folio. Inst. R. H. Indianische Drachenwurz, mit dem drey-spaltigen Blat.
- Dracunculus Indicus*, folio quinquifido. Inst. R. H. Indianische Drachenwurz, mit dem fünf-spaltigen Blat.
- Dracunculus Americanus*, Colocasiae foliis laciniatis. Inst. R. H. Americanische Drachenwurz, mit dem ausgeschweiften Colocasienslat.
- Dracunculus Americanus*, scandens, triphyllus & auritus. Inst. R. H. Americanische in die Höhe kriechende Drachenwurz, mit dreyfachen gehörnten Blättern.
- Eupatorium Americanum*, scandens, foliis subrotundis, lucidis, floribus spicatis albis. Houst. Die in die Höhe steigende Hanfodermennig, mit rundlichten glänzenden Blättern, und weissen Blumenähren.
- Eupatorium Americanum*, arborecens, Mori folio, floribus albicantibus. Houst. Americanische, baumartige Wasserdoften, mit dem Maulbeerblat, und weislichten Blumen.
- Eupatorium Americanum*, frutescens, Balsaminae luteae foliis nigris maculis notatis. Houst. Americanische, staudige Wasserdoften mit Blättern des gelben Balsamkrautes, so schwarz gefleckt sind.

- Eupatorium Peruvianum*, folio subrotundo triner-
vi utrinque acuto flore cœruleo. Vaill. Mem.
Peruvianische Wasserdosten, mit rundlichten
Blättern, so sich in eine scharffe Spitze endigen,
und blauer Blume.
- Euphorbium Cerei effigie*. Hort. Amst. Fackel-
stielähnliches Euphorbium.
- Euphorbium Cerei effigie*, caulibus gracilioribus.
Boerh. Ind. alt. Dünnstenglichtes, fackelstielähn-
liches Euphorbium.
- Euphorbium verum Antiquorum*, Scadida Calli.
Hort. Mal. Hort. Amst. Das wahre Euphor-
bium der Alten.
- Euphorbium trigonum & tetragonum*, spinosum,
ramis compressis. Disnard. Das drey und vier-
eckichte Euphorbium.
- Euphorbium angulosum*, foliis Nerii latioribus.
Boerh. Ind. alt. Das eckichte Euphorbium, mit
breiten Oleanderblättern.
- Ficus Malabarensis*, folio cuspidato, fructu rotun-
do, parvo, gemino. Pluk. Phyt. Die malaba-
rische Feige.
- Fuchsia triphylla*, flore coccineo. Plum. Nov. Gen.
Die dreyblättrige Fuchsia, mit scharlachfarber
Blume.
- Granadilla folio tricuspidi*, flore parvo flavescente.
Inst. R. H. Pafionsblume mit dem dreyspizigen
Blat, und kleiner gelblicher Blume.
- Granadilla fructu Citrifolmi*, foliis oblongis. Inst.
R. H. Insgemein die Wasserlimonie.
- Granadilla latifolia*, fructu Maliformi. Inst. R. H.
Die Pafionsblume mit breiten Blättern, und
apfelförmiger Frucht.
- Granadilla quæ Coanenepilli*, seu Contrayerva Her-
man. Houst. Die Pafionsblume, so Hernandez
Contrayerva nennet.
- Granadilla folio hastato*, holoserico, petalis candi-
cantibus, fimbriis ex purpureo & luteo variis.
Martyn. Cent. 1. Die Pafionsblume mit dem
sammtartigen lanzenförmigen Blat, und weissen
Blumenblätlein und purpurfarbigen Franzen.
- Granadilla folio oblongo serrato*, flore purpureo.
Houst. Pafionsblume mit dem länglichten, za-
ckichten Blat, und purpurfarber Blume.
- Granadilla folio glabro*, tricuspidi & angusto, flo-
re virecente minimo. Inst. R. H. Pafionsblu-
me mit glatten, schmalen, dreyspizigen Blat, und
sehr kleiner grünlicher Blume.
- Granadilla folio tricuspidi*, flore ex purpura nigri-
cante. Inst. R. H. Pafionsblume mit dreyspizig-
gen Blat, und dunkelpurpurfarber Blume.
- Granadilla folio tricuspidi*, flore magno flavescen-
te. Inst. R. H. Pafionsblume mit dem dreyspi-
zigen Blat, und grosser gelber Blume.
- Granadilla flore suaverubente*, folio bicorni. Inst.
R. H. Pafionsblume mit lieblichrother Blume,
mit dem gehörnten Blat.
- Granadilla Androsami folio*, fructu jujubino. Inst.
R. H. Pafionsblume mit Mannsblutblättern,
und einer Frucht, so den Brustbeerlein gleichet.
- Guajava alba*, dulcis. H. L. Die weisse Gujava.
- Guajava rubra*, acida, fructu rotundiori. H. L.
Rothe runde Gujava.
- Guidonia Aurantii foliis*, aculeata. Plum. Nov. Gen.
Stachelichte Guidonia, mit Pomeranienblättern.
- Guidonia Nucis juglandis foliis*, major. Plum. Nov.
Gen. Grosse Guidonia mit Wallnusblättern.
- Guidonia Nucis juglandis foliis*, minor. Plum. Nov.
Gen. Kleine Guidonia mit Wallnusblättern.

- Hedysarum arborecens*, foliis Mimosa. Plum. Cat.
Staubiger, spanischer Klee, mit Fühlkrautblät-
tern.
- Hedysarum tryphyllum frutescens*, foliis subrotun-
dis sericeis, flore purpureo. Houst. Dreyblät-
teriger staubiger, spanischer Klee, mit rundlichten
seidenen Blättern, und purpurfarber Blume.
- Helianthemum frutescens*, portulaca folio. Plum.
Cat. Staudige Sonnenrose, mit dem Portu-
lachlat.
- Helleborine purpurea*, tuberosa radice. Plum. Nov.
Gen. Purpurfarbes Helleborinkraut mit knollig-
ter Wurzel.
- Helleborine foliis Liliaceis*, Asphodeli radice. Plum.
Cat. Helleborinkraut mit Lilienblättern, und einer
Asphodillwurzel.
- Hernandia amplo hederæ folio*, umbilicato. Plum.
Nov. Gen. Hernandia mit dem breiten Epheu-
blat, so einen Nabel hat.
- Jasminoides Laureolæ folio*, flore candido, inter-
diu odorato. Horth. Elth. Bastartjasmin, mit
dem Seidelbastblat.
- Jasminoides folio Vishaminis*, flore virecente,
noctu odoratissimo. Hort. Elth. Bastartjasmin
mit dem Vishaminblat, und grünlicher Blume,
so bey Nacht sehr wohl riechet.
- Jasminum*, sive Sambach Arabum, Albin. J. B.
Der einfache arabische Jasmin.
- Jasminum*, sive Sambach Arabum, flore duplici.
Gefüllter, arabischer Jasmin.
- Jasminum arborecens*, foliis laurinis, flore um-
bellato. Houst. Baumartiger Jasmin, mit Lor-
beerblättern, und doldenförmiger Blume.
- Jasminum Americanum*, foliis conjugatis, flori-
bus spicatis albis. Houst. Amerikanischer Jas-
min, mit Blättern, so gegen einander über wach-
sen, und weissen Blumenähren.
- Jasminum Malabaricum*, foliis Mali Aurantii, flo-
re niveo odoratissimo. Com. Malabarischer
Jasmin, mit Pomeranzenblättern, und weisser,
wohlriechender Frucht.
- Jlora Altheæ foliis*, fructu breviori & crassiori.
Plum. Nov. Gen. Der Schraubenbaum mit
Eibischblättern, und kurzer dicker Frucht.
- Jlora Altheæ foliis*, fructu longiori & angustiori.
Plum. Nov. Gen. Schraubenbaum mit Eibisch-
blättern, und langer schmaler Frucht.
- Jlora Altheæ folio amplissimo*, fructu crassissimo
& villoso. Houst. Schraubenbaum mit dem gros-
sen Eibischblat, und sehr dicker haariger Frucht.
- Justicia frutescens*, floribus spicatis majoribus,
uno versu dispositis. Houst. Staudige Justicia
mit grossen Blumenähren, so an einer Seite
wachsen.
- Laurus Americana*, mas, foliis subrotundis flori-
bus in capitulum collectis. Houst. Amerikanisch
Lorbeer männlein, mit rundlichten Blättern, und
Blumen die auf einem Hauptlein beysammen
sitzten.
- Laurus Americana foemina*, foliis subrotundis fru-
ctu albo umbellato. Houst. Amerikanisch Lor-
beer weiblein, mit rundlichten Blättern, und weiss-
ser Frucht, die einen Nabel hat.
- Leucanthemum Americanum*, frutescens, foliis la-
tis conjugatis, & asperis, flore albo capitulis
squamosis. Houst. Staudige, amerikanische
Rindsaugmaslieben, mit rauhen gegen einander
über wachsenden Blättern, weisser Blume, und
schuppichten Hauptlein.

Lilio-

- Lilio - Asphodelus Americanus*, sempervirens, maximus, polyanthos albus. Houst. Die größte, immergrüne, americanische Affodillie, mit vielen, weissen Blumen.
- Lilio - Asphodelus Americanus*, flore umbellato albo, costa purpurea notato. Plum. Cat. Americanische Affodillie mit weisser Doldenblume, und purpurfarben gefleckten Stengel.
- Lilio - Asphodelus Americanus*, foliis Scillæ, flore umbellato maximo purpureo. Plum. Cat. Americanische Affodillie, mit Merzwiebelblättern, mit grosser doldenförmiger purpurfarber Blume.
- Lilio - Asphodelus Americanus*, bifolius, flore singulari purpureo. Plum. Cat. Americanische Affodillie mit zwey Blättern, und einzelner purpurfarber Blume.
- Lilio - Narcissus Indicus*, saturato colore purpureo. Mor. Hist. Indianische, dunkelpurpurfarbe Narcissilie.
- Lilio Narcissus Jacobæus*, latifolius, Indicus, rubro flore. Mor. Hist. Breitblättriger indianischer Jacobsstab mit rother Blume.
- Lilio Narcissus Indicus*, maximus, sphaericus, floribus plurimis rubris liliaceis. Mor. Hist. Die größte runde, indianische Narcissilie, mit vielen rothen lilienförmigen Blumen.
- Lilio - Narcissus Indicus*, pumilus, polyanthos. Mor. Hist. Kleine indianische Narcissilie, mit vielen Blumen.
- Lilio Narcissus Indicus*, pumilus, monanthos albus. Mor. Hist. Kleine indianische Narcissilie, mit einzelner, weisser Blume.
- Lilio - Narcissus Zeylanicus*, latifolius, flore niveo externa linea purpurea striato. Kerm. Breitblättrige Narcissilie aus Ceylon, mit schneeweisser Blume, so aussen einen purpurfarben Streif hat.
- Lippia arborescens*, foliis conjugatis, oblongis, capitulis squamosis & rotundis. Houst. Der Lippenbaum mit länglichten, paarweis wachsenden Blättern, und runden, schuppichten Häuptlein.
- Lobelia frutescens*, portulacæ folio. Plum. Nov. Gen. Staudige Lobelia mit dem Portulackblat.
- Malpighia angustifolia*, folio subtus spinoso. Plum. Nov. Gen. Schmalblättrige Malpighia, deren Blat unten stachlicht ist.
- Malpighia folio rotundo*, fructu majore. Die Malpighia mit dem runden Blat, und grosser Frucht.
- Malpighia humilis Illicis Cocci* - glandiferæ foliis. Plum. Nov. Gen. Niedrige Malpighia mit Blättern, wie der Kermesbeerenstrauch hat.
- Manihot Theveti*, Juca & Cassavi. L. B. Inst. R. H. Gemeine Cassada.
- Manihot Americana*, spinosissima, folio vitigineo. Plum. Cat. Americanische mit vielen Dornen besetzte Cassada, mit Reuschbaumblättern.
- Manihot arborescens*, minus spinosa, floribus albis umbellatis, foliis aconiti urentibus. Houst. Baumartige, mit wenigern Dornen besetzte Cassada, mit weissen Doldenblumen, und dem brennenden Wolfswurzelblat.
- Manihot frutescens*, non spinosa, foliis glabris & minus laciniatis. Houst. Staudige Cassada ohne Dornen, mit glatten und weniger zertheilten Blättern.
- Maranta arundinacea*, Cannacori folio. Plum. Nov. Gen. Rohrartige, indianische Pfeilwurz, mit dem Blat des indianischen Blumenrohrs.
- Maranta Cannacori folio*, flore albo minimo. Houst. Indianische Pfeilwurz mit Blumenrohrblättern, und kleiner weisser Blume.
- Melocactus Americanus*, minor. Boerh. Ind. alt. Kleinere Melonendistel.
- Methonica Malabarorum*. H. L. Prachtlilie.
- Montia arborescens*, Abutili folio serrato, fructu racemoso. Houst. Baumartige Montia, mit dem gezackten Sammtpapelblat, und traubichter Frucht.
- Muntingia folio sericeo*, molli, fructu majore. Plum. Nov. Gen. Muntingia mit dem seidenglattem weichen Blat, und grosser Frucht.
- Muntingia folio Ulmi aspero*, fructu minimo glomerato. Plum. Nov. Gen. Muntingia mit dem rauhen Ulmenblat, und kleiner Traubenfrucht.
- Murucua folio lunato*. Inst. R. H. Murucua mit dem mondformigen Blat.
- Musa fructu cucumerino breviori*. Plum. Nov. Gen. Der Pisang mit kurzem Blat.
- Musa fructu Cucumerino longiori*. Plum. Nov. Gen. Pisang mit langem Blat.
- Myrtus arborea*, aromatica, foliis laurinis. Sloan. Cat. Pfeffer aus Jamaica.
- Opuntia Curassavica*, minima. Hort. Beaum. Die kleinste indianische Feige, aus Curassaw.
- Opuntia maxima*, folio oblongo rotundo, majore, spinulis obtusis mollibus & innocentibus obfeto, flore striis rubris variegato. Sloan. Cat. Jam. Grosse indianische Feige, mit dem länglicht runden, grossen mit stumpfen Dornen besetzten Blat, und rothstreifiger Blume.
- Opuntia major spinosa*, caulescens, flore minore rubro clauso, fructu parvo coccineo. Houst. Die grosse, stachlichte, einen Stengel treibende indianische Feige, mit kleiner rother, geschlossener Blume, und scharlachfarber kleiner Frucht.
- Opuntia caulescens*, foliis amplissimis tenuibus compressis, spinis longissimis confertissimis, gracilibus & albicantibus armatis. Houst. Die indianische Feige, so einen Stengel treibet, und grosse, schmale, gleichsam zusammengedruckte Blätter hat, die mit langen, dünnen, weissen Stacheln besetzt sind.
- Orobis Americanus*, latifolius, argenteus, flore purpureo. Houst. Breitblättrige, silberne, americanische Walderven, mit purpurfarber Blume.
- Orobis Americanus*, erectus, foliorum pinnis angustis & subtus incanis, siliquis glabris. Houst. Aufrechte, americanische Walderven, mit schmalen Blättern, die unten grau sind, und glatten Schoten.
- Orobis Americanus*, procumbens & hirsutus, flore purpureo. Houst. Kriechende, raue, americanische Walderven, mit purpurfarber Blume.
- Palma Brasiliensis*, Prunifera, folio plicatili, seu flabelliformi, caudice squamato. Raii Hist. Der Palmettobaum.
- Palma foliorum pediculis spinosis*, fructu pruniformi luteo oleoso. Sloan. Cat. Der öhlichte Palmaum.
- Palma Prunifera*, foliis Yuccæ, fructu in racemis congestis cerasi formi duro cinereo, Pisi magnitudine, cujus lachryma sanguis Draconis est dicta. Com. Hort. Amst. Der Drachenblutbaum.
- Palma Japonica*, spinosis pediculis, Polypodii folio. Par. Bat. Der japonische Palmaum, mit stachlichten Stielen, und Engelsfußblättern.

Dooo ooo

Palma

- Palma Dactylifera*, aculeata, minima. Plum. Nov. Gen. Der breitblättrige, dattelntragende Palm-
baum.
- Palma Dactylifera*, aculeata, minima. Plum. Nov. Gen. Der kleinste, stachlichte, dattelntragende
Palmbaum.
- Palma Coccifera costarum lateribus aculeatis*. Plum. Nov. Gen. Rustragender Palmbaum, mit stach-
lichten Stengeln.
- Palma Prunifera*, Japonensis. H. L. Pflaumentra-
gender japanischer Palmbaum.
- Palma montana*, Malabarica, folio magno compli-
cato, acuto, flore albo racemoso, fructu rotun-
do. Plum. Nov. Gen. Der malabarische Berg-
palmbaum, mit grossen, gefalteten spitzigen Blät-
tern, weisser Traubenblume, und runder Frucht.
- Palma altissima*, non spinosa, fructu Pruniformi
minore, racemoso sparso Sloan. Cat. Der höch-
ste Palmbaum ohne Dornen, und kleiner hin und
wieder wachsender pflaumenförmiger Frucht.
- Palma tota spinosa*, major, fructu Pruniformi.
Sloan. Cat. Der über und über dornichte grosse
Palmbaum, mit pflaumenförmiger Frucht.
- Palma altissima*, non spinosa, fructu oblongo.
Houst. Der höchste Palmbaum ohne Dornen,
mit länglichter Frucht.
- Palma Dactylifera & Vinifera*. Plum. Nov. Gen.
Datteln und weintragender Palmbaum.
- Palma Malabarica*, flosculis stellatis, fructu longo
squamato. Plum. Nov. Gen. Malabarischer
Palmbaum, mit sternförmigen Blümlein, und
langer schuppichter Frucht.
- Palma Dactylifera*, fructu acerrimo. Plum. Nov.
Gen. Datteln tragender Palmbaum, mit sehr
herber Frucht.
- Palma minor*. C. B. P. Kleiner Palmbaum.
- Palma Indica*, Coccifera, angulosa. C. B. P. Der
Eccosnusbaum.
- Palma Americana*, acaulos, fructu clavato poly-
pyreno. Houst. Americanischer Palmbaum ohne
Stengel, der viele knittelförmige Früchte trägt.
- Pancratium Americanum*, floribus albis, odore
Balsami Gileadensis. Americanische Meerlilie, mit
weissen Blumen, so wie Balsam von Gilead rie-
chen.
- Pancratium Americanum*, foliis latissimis, floribus
niveis majoribus, odore Balsamini Peruviani.
Americanische Meerlilie, mit sehr breiten Blät-
tern, und grossen, schneeweissen Blumen, die wie
peruvianischer Balsam riechen.
- Pancratium Zeylanicum*, flore albo odorato. Cey-
lanische Meerlilie, mit weisser, wohlriechender
Blume.
- Papaya fructu Melopeponis effigie*. Plum. Cat.
Papayabaum, dessen Frucht dem Melonenkürbis
gleichet.
- Papaya mas*. Boerh. Ind. alt. Papayabaum das
Männlein.
- Papaya fructu maximo*, Peponis effigie. Plum. Cat.
Papayabaum mit der grössten Frucht, die der
Pfebe gleichet.
- Pereskia aculeata* flore albo, fructu flavescente.
Plum. Nov. Gen. Stachlichte Pereskia, mit weis-
ser Blume, und gelblicher Frucht.
- Periploca Americana*, latifolia, siliqua dura, ob-
longa, tumida & glabra. Inst. R. H. Breitblät-
terige, americanische Rebe, mit länglichter, auf-
geblasener, harter Schote.
- Periploca Americana*, fructu molliter echinato.
Inst. R. H. Americanische Rebe mit stachlichter
Frucht.

- Periploca Americana*, scandens, folio Convolvuli,
fructu alato. Plum. Americanische Windrebe,
mit dem Windenblatt, und geflügelter Frucht.
- Petiveria Solani foliis*, loculis spinosis. Plum. Nov.
Gen. Petiveria mit Nachtschattenblättern, und
stachlichten Saamenbehältnissen.
- Plumbago Americana*, betæ folio am liori. Plum.
Cat. Americanische Bleiwurz, mit dem breiten
Manggoldblatt.
- Randia frutescens*, spinis bijugis, foliis subrotun-
dis, floribus albis. Houst. Staudige Randia, mit
paarweis wachsenden Dornen, runden Blättern
und weissen Blumen.
- Ricinoides Americana*, Gossypii folio. Inst. R. H.
Americanische Purgiernus mit dem Baumwol-
lenblatt.
- Ricinoides arbor*, Americana, folio multifido. Inst.
R. H. Americanischer Purgiernusbaum, mit dem
vielspaltigen Blatt.
- Ricinoides Americana* staphisagria folio. Inst. R.
H. Americanische Purgiernus mit dem Läusekraut-
blatt.
- Ricinoides frutescens*, Althææ folio. Plum. Cat.
Staudige Purgiernus mit dem Altheenblatt.
- Ricinoides frutescens*, Linaria foliis obtusis. Plum.
Cat. Staudige Purgiernus mit stumpfen Lein-
krautblättern.
- Ricinoides frutescens*, Lauri folio, calyce amplis-
simo viridi. Houst. Staudige Purgiernus, mit
Lorbeerblättern, und grossen, grünen Kelch.
- Rondeletia arborescens* Tini facie. Plum. Nov. Gen.
Baumartige Rondeletia, so dem Zinuslorbeer
gleichet.
- Ruellia Americana*, humilis, parvo flore cœruleo,
capsulis teretibus. Houst. Die kleine americanis-
che Ruellia, mit kleiner blauer Blume, und läng-
lichter Schote.
- Ruellia Americana* humilis. Asphodeli radice. Plum.
Nov. Gen. Kleine americanische Ruellia mit der
Asphodillwurzel.
- Saururus alius humilis*, folio carnosio, subrotun-
do. Plum. Nov. Gen. Niedriger Eiderenschwanz,
mit rundlichem, fleischichten Blatt.
- Saururus racemosus* seu botryoites major. Plum.
Nov. Gen. Grosser ästiger Eiderenschwanz.
- Saururus racemosus*, seu botryoites minor. Plum.
Nov. Gen. Kleiner ästiger Eiderenschwanz.
- Saururus cauda adunca*. Plum. Nov. Gen. Krum-
mer Eiderenschwanz.
- Saururus foliis Plantagineis*, cauda breviori. Plum.
Nov. Gen. Eiderenschwanz mit Wegerichblät-
tern, und kurzem Schwanz.
- Saururus foliis amplis rotundis & umbilicatis*. Plum.
Nov. Gen. Eiderenschwanz mit grossen, runden
Blättern, so einen Nabel haben.
- Saururus foliis amplis cordatis*, non umbilicatis.
Plum. Nov. Gen. Der Eiderenschwanz, mit gross-
sen, herzförmigen Blättern, ohne Nabel.
- Saururus frutescens*, Lauro - Cerasi folio, fructu
breviori & crassiore. Houst. Staudiger Eide-
renschwanz, mit dem Kirschlorbeerblatt, und kur-
zer, dicker Frucht.
- Saururus arborescens*, latifolia, villosa, fructu gra-
cili. Houst. Baumartiger Eiderenschwanz, mit
dem breiten haarigen Blatt und dünner Frucht.
- Saururus repens*, folio orbiculari, nummularia fa-
cie. Plum. Nov. Gen. Kriechender Eiderenschwanz,
mit dem runden Blatt, so dem Pfennigkraut glei-
chet.

Senna spuria arborea, villosa, foliis latis mucronatis, siliquis articulatis. Houst. Baumartig, haarig, Bastartfenna, mit breiten, spitzigen Blättern, und knotigen Schoten.

Senna spuria Americana, arborea, siliquis compressis angustis, longissimis pendulis. Houst. Americanische, baumartige Bastartfenna, mit schmalen, platten Schoten, so sehr lang sind, und unter sich hängen.

Senna spuria Americana, frutescens, Mimosa foliis, flore parvo, siliquis hirsutis, brevissimis, pediculis infidentibus. Houst. Staudige, americanische Bastartfenna, mit Fühlkrautblättern, kleiner Blume, und haarigen Schoten, so an kurzen Stielen wachsen.

Senna spuria Americana, frutescens, & procumbens, flore maximo, siliquis glabris. Houst. Staudige, kriechende, americanische Bastartfenna, mit grosser Blume und glatten Schoten.

Senna spuria frutescens, foliorum pinnis latioribus, caulibus pilosis, siliquis longissimis pediculis infidentibus. Houst. Staudige Bastartfenna, mit breiten Blättern, haarigen Stengeln, und Schoten so an langen Stielen wachsen.

Serjania scandens, polyphylla & racemosa. Plum. Nov. Gen. Die in die Höhe kriechende, ästige Serjania, mit vielen Blättern.

Serjania scandens enneaphylla & racemosa. Plum. Nov. Gen. Die in die Höhe kriechende, ästige Serjania, mit neun Blättern.

Serjania scandens triphylla & racemosa. Plum. Nov. Gen. In die Höhe kriechende, ästige Serjania, mit drei Blättern.

Sherardia frutescens, nodiflora. Houst. Die Staudige Sherardia, mit Blumen so auf einem Knoten beisammen stehen.

Silyrinchium Africanum, flore albo, radice venenata. Africanische Feldzwiebel, mit weisser Blume und vergifteter Wurzel.

Spartium Americanum, Portulacae foliis aculeatum. Ebeni Materie. Plum. Americanisch Bastarteichenholz.

Spartium Americanum, scandens, Citrii foliis, floribus albis, confertim nascentibus. Plum. Cat. In die Höhe kriechender, americanischer Pfrieme, mit Citronenblättern, und weissen, dicht beisammen stehenden Blumen.

Suriana foliis Portulacae angustis. Plum. Nov. Gen. Suriana mit schmalen Portulacablättern.

Tichymalus Indicus, frutescens. Raii Hist. Staudige, indianische Wollfsmilch.

Tichymalus Indicus, vimineus, penitus aphyllus. Boerh. Ind. alt. Indianische Wollfsmilch mit dünnen Stengeln ohne Blätter.

Tichymalus Curassavicus, Salicis & Atriplicis foliis glabris, caulibus viridantibus. Par. Bat. Prod. Wollfsmilch aus Curassaw, mit glatten Weiden, und Melidenblättern, und grünlichten Stengeln.

Tragia alia scandens, Urticae folio. Plum. Nov. Gen. Die kriechende Tragia, mit Nesselblättern.

Tragia scandens, longo Betonicae folio. Plum. Nov. Gen. Kriechende Tragia, mit dem langen Betonienblatt.

Triumfetta fructu echinnato, racemoso. Plum. Nov. Gen. Triumfetta mit rauer ästiger Frucht.

Triumfetta fructu echinato, racemoso, minor. Millar. Triumfetta, mit kleiner, rauer, ästiger Frucht.

Turnera frutescens, Ulmi - folia. Plum. Nov. Gen. Staudige Turnera, mit dem Ulmenblatt.

Turnera frutescens, folio longiore & mucranato. Staudige Turnera, mit dem langen spitzigen Blatt.

Viburnum Americanum, latifolium, floribus albis, ramulis tomentosis. Breitblättriger, americanischer Mehlsbaum, mit weissen Blumen, und wollichten Aestlein.

Arbor baccifera, laurifolia, aromatica, fructu viridicalyculato, racemoso. Sloan. Wintergrinde.

Arbor Laurifolia, venenata, folio leviter serrato, oblongo, obtuso, copiosum lac praebens. Sloan. Cat. Der Giffbaum.

Cedrus Barbadiensium, alatis Fraxini foliis, &c. Pluk. Phyt. Die Ceder aus Barbados.

Baobab Alp. Egypt. Der aethiopische saure Kürbis.

Frutex Laurifolio, pendulo, fructu tricocco, semine nigro splendente Catesb. Hist. Nat. Das Rothholz.

Katsjula Kalenga. Hort. Mal.

Verzeichnis der zärtesten, ausländischen Pflanzen, welche im Winter denjenigen Grad von Wärme haben wollen, der nach Herrn Sowers botanischen Thermometer für die dritte Classe von Pflanzen bestimmt ist.

ACAJOU. Thevet, Franc. Antarct. Cajanua.

Ahouvai Nerii folio flore luteo. Plum. Nov. Gen.

Ahouai mit dem Oleanderblatt, und gelber Blume.

Ananas. Plum. Alle Sorten des Ananas.

Barleria Solani folio, flore coccineo. Plum. Nov. Gen. Barleria mit dem Nachtschattenblatt, und scharlachfarber Blume.

Barleria aculeata, solani folio angustiore, flore caeruleo. Plum. Nov. Gen. Stachlichte Barleria, mit dem schmalen Nachtschattenblatt, und blauer Blume.

Bauhinia aculeata, folio rotundo emarginato. Plum. Nov. Gen. Der indianische Sevenbaum.

Bauhinia aculeata, folio rotundo emarginato, flore magno albo. Houst. Stachlichte Bauhinia,

mit dem runden zackichten Blatt, und grosser, weisser Blume.

Bauhinia, flore luteo, spicato, folio subrotundo bicorni. Houst. Bauhinia mit gelber Blumenähre, und dem runden getheilten Blatt.

Bellonia frutescens, folio Melissa, aspero. Plum. Nov. Gen. Staudige Bellonia, mit dem rauhen Melissenblatt.

Bignonia Americana, arbor, flore luteo, folio Fraxini. Plum. Cat. Americanische Baumbignonia, mit gelber Blume, und Eschenblättern.

Bihai amplissimis foliis, florum vasculis coccineis. Plum. Nov. Gen. Bihai mit sehr grossen Blättern, und scharlachfarber Blumendecke.

Bihai amplissimis foliis, florum vasculis subnigris. Plum. Nov. Gen. Bihai mit sehr grossen Blättern, und schwärzlichter Blumendecke.

0000 000 2

Bocco.

- Bocconia racemosa*, sphondilii folio tomentosa. Plum. Nov. Gen. Nestige *Bocconia*, mit dem wollichten Bärenklaublat.
- Bonduc vulgare*, majus, polyphyllum. Plum. Nov. Gen. Der gelbe Schusserbaum.
- Bonduc vulgare*, minus polyphyllum. Plum. Nov. Gen. Der aschfarbe Schusserbaum.
- Breynia Amygdali foliis latioribus*. Plum. Nov. Gen. Die *Breynia*, mit breiten Mandelblättern.
- Breynia Elaeagni foliis*. Plum. Nov. Gen. *Breynia* mit wilden Olivenblättern.
- Cacao**. Clus. Exot. Die *Cacaonua*.
- Coa scandens* fructu trigemino subrotundo. Plum. Nov. Gen. In die Höhe kriechende *Coa*, mit rundlichter Frucht, so sich an drey Orten öffnet.
- Courbaril bifolia*, flore pyramidato. Plum. Nov. Gen. Der Hülsenbaum.
- Cuiete foliis oblongis*, angustis, magno fructu ovato. Plum. Nov. Gen. Der Calabassenbaum, mit länglichten, schmalen Blättern, und grosser eysförmiger Frucht.
- Cuiete latifolia*, fructu putamine fragili. Plum. Nov. Gen. Breitblättriger Calabassenbaum, dessen Frucht eine zarte Schale hat.
- Cuiete minima*, fructu duro. Plum. Nov. Gen. Kleinster Calabassenbaum, mit harter Frucht.
- Cuiete angustifolia*, fructu minori, globoso. Plum. Nov. Gen. Schmalblättriger Calabassenbaum, mit kleiner runder Frucht.
- Cuiete angustifolia*, fructu minori ovato. Plum. Nov. Gen. Schmalblättriger Calabassenbaum, mit kleiner eysförmiger Frucht.
- Gesnera arborescens*, amplo flore fimbriato & maculoso. Plum. Nov. Gen. Baumartige *Gesnera*, mit grosser, gefranzter fleckichter Frucht.
- Gesnera amplo Digitalis folio*, tomentoso. Plum. Nov. Gen. *Gesnera* mit dem breiten, wollichten Fingerhutblat.
- Guaiabara alia racemosa*, foliis oblongis. Plum. See Traube mit länglichten Blättern.
- Guaiabara alia racemosa*, foliis latissimis. Houst. See Traube mit sehr breiten Blättern.
- Guaiabara foliis minoribus & longioribus*, fructu racemoso minimo atro-purpureo. Houst. See Traube mit kleinen, langen Blättern, mit sehr kleiner, dunkelpurpurfarber traubichter Frucht.
- Guajacum* flore caeruleo, fructu subrotundo. Plum. Nov. Gen. Heilig Holz mit blauer Blume, und rundlichter Frucht.
- Guajacum* flore caeruleo fimbriato, fructu tetragono. Plum. Nov. Gen. Heilig Holz mit blauer gefranzter Blume, und viereckichter Frucht.
- Guanabanus folio amplissimo*, flore roseo, fructu purpureo squamato. Cherimonias mit dem grossen Blat, rosenfarber Blume, und schuppichter, purpurfarber Frucht.
- Guanabanus* fructu e viridi lutescente, molliter aculeato. Plum. Nov. Gen. Guanabaum mit grünlichtgelber Frucht.
- Guanabanus* fructu aureo & molliter aculeato. Plum. Nov. Gen. Guanabaum mit goldfarber Frucht.
- Guanabanus* fructu subcaeruleo. Plum. Nov. Gen. Guanabaum mit blaulichter Frucht.
- Guanabanus Perseae folio*, flore intus albo, exterius virescente, fructu nigricante squamato vulgo cherimolia. Fueill. Obs. Cherimonias oder Cherimonias.

- Guazuma arbor ulmi-folia*, fructu ex purpureo nigro. Plum. Nov. Gen. Bastartcederbaum.
- Hura Americana*, Abutili Indici folio. Hort. Amst. Sandbüchsenbaum.
- Jasminum Arabicum*, Castaneae folio, flore albo odoratissimo, cujus fructu Coff. in officinis dicuntur nobis. Com. Cat. Der Caffeebaum.
- Icaco fructu ex albo rubescente*. Plum. Nov. Gen. Frauenpflaumenbaum.
- Icaco fructu nigro*. Plum. Nov. Gen. Pflaumenbaum aus Jamaica.
- Icaco fructu purpureo*. Plum. Nov. Gen. Purpurfarbe Pflaumen.
- Icaco fructu lateo*. Plum. Nov. Gen. Gelber Pflaumenbaum.
- Inga* flore albo fimbriato, fructu dulci. Plum. Nov. Gen. Inga mit weisser gefranzter Blume, und süsser Frucht.
- Karatas foliis altissimis & aculeatis*. Plum. Nov. Gen. Der wilde Ananas.
- Mamei magno fructu Persicæ sapore*. Plum. Nov. Gen. Mamei mit grosser Frucht.
- Manzanilla Pyri facie*. Plum. Nov. Gen. Der Manchineelenbaum.
- Manzanilla Aquifolii foliis*. Plum. Nov. Gen. Manchineelenbaum mit Stechpalmenblättern.
- Manzanilla lauri foliis oblongis*. Plum. Nov. Gen. Manchineelenbaum mit länglichten Lorbeerblättern.
- Melocactus Americanus*, major, spinis albis longissimis recurvis. Die grosse Melonendistel, mit weissen, langen, krummen Dornen.
- Melocactus Americanus*, major, striis in spiram intortis, spinis brevibus aduncis. Americanische grosse Melonendistel, mit gewundenen Ribben, und kurzen, stumpfen Stacheln.
- Melocactus Americanus*, major, spinis tenuibus flavescens. Grosse, americanische, Melonendistel, mit zarten gelblichten Stacheln.
- Melocactus Mexicanus*, spinis creberrimis corallinis latis & recurvis. Houst. Grosse Melonendistel aus Mexico, mit vielen corallenrothen, breiten und krummen Stacheln.
- Mimosa sive frutex sensibilis*. Inst. R. H. Das Fühlkraut.
- Mimosa humilis & frutescens*, & spinosa, siliquis conglobatis. Plum. Cat. Niedriges, staudiges stachelichtes Fühlkraut, dessen Schoten besamen wachsen.
- Mimosa folio lato sennae spinoso*. Boerh. Ind. alt. Das Fühlkraut mit breiten Blättern.
- Mimosa frutescens & spinosa*, tenui Acaciae folio, flosculis plurimis villosis in capitulum congestis. Houst. Staudiges, stachelichtes Fühlkraut, mit dem schmalen Acacienblat, und vielen kleinen, haarigen, besamten stehenden Blümlein.
- Mimosa herbacea*, procumbens & spinosa, caule anguloso, siliquis quadrivalvibus. Houst. Cat. Kriechendes, grasartiges, stachelichtes Fühlkraut, mit eckichtem Stengel und viereckichter Frucht.
- Mimosa latifolia*, siliquis latis articulatis. Houst. Breitblättriges Fühlkraut, mit breiten, knotigen Schoten.
- Mimosa frutescens spinosa & hirsuta*, tenui Acaciae folio, siliquis articulatis. Staudiges, stachelichtes und raues Fühlkraut, mit dem schmalen Acacienblat, und knotigen Schoten.

Mitella Americana, maxima, tinctoria. Inst. R. H. Arnotto oder Anotto.

Monbin arbor, foliis Fraxini, fructu luteo racemoso. Plum. Nov. Gen. Schweinpflaumen.

Parkinsonia aculeata, foliis minutis, uni costæ adnexus. Plum. Nov. Gen. Stachelichte Parkinsonia mit kleinen, an einer Seite wachsenden Blättern.

Persea. Clus. Hist. Avogatebirn.

Pisonia aculeata, mas. Hoult. Pisonia, das Männlein.

Pisonia aculeata, fructu glutinoso & racemoso. Plum. Nov. Gen. Stachelichte Pisonia, mit flebrichter und traubichter Frucht.

Pittonia arborescens, Chamædryfolia, major. Plum. Nov. Gen. Grosse Baumpittonia mit dem Gamanderleinblat.

Pittonia arborescens Chamædryfolia, minor. Plum. Nov. Gen. Kleine Baumpittonia, mit dem Gamanderleinblat.

Pittonia frutescens, folio carnosio, hirsuto & obtuso. Plum. Nov. Gen. Staudige Pittonia, mit dem fleischigen, rauhen und stumpfen Blat.

Pittonia racemosa, Nicotianæ foliis foetidissimis. Plum. Nov. Gen. Nektige Pittonia, mit stinckenden Tobackblättern.

Plumeria flore roseo odoratissimo. Inst. R. H. Der rothe Jasminbaum.

Plumeria flore majore odorato & incarnato. Der japanische Baum.

Plumeria flore niveo, foliis longis, angustis & acuminatis. Inst. R. Plumeria mit schneeweißer Blume, und langen, schmalen, spitzigen Blättern.

Plumeria foliis longissimis, & minus succulentis, flore pallido. Hoult. Plumeria mit sehr langen, nicht saftigen Blättern, und blasser Blume.

Plumeria folio latiore obtuso, flore luteo minore. Plumeria mit breitem, stumpfen Blat, und kleiner, gelber Blume.

Poinciana flore pulcherrimo. Inst. R. H. Pfauenschwanz mit schöner Blume.

Poinciana flore luteo. Hoult. Pfauenschwanz mit gelber Blume.

Poinciana flore rubente. Hoult. Pfauenschwanz mit rother Blume.

Poinciana spinosa, vulgo *Tara*. Feuill. Obs. Stachelichter Pfauenschwanz.

Pseudoacacia Americana, flore pyramidato coccineo. Plum. Cat. Gen. Amerikanischer unächter Schotendorn, mit pyramidenförmiger, scharlachfarber Blume.

Pseudoacacia Americana, siliquis alatis. Plum. Cat. Unächter, amerikanischer Schotendorn, mit geflügelter Schote.

Pseudoacacia Americana, latifolia, floribus purpureis. Plum. Cat. Unächter, amerikanischer Schotendorn, mit breiten Blättern und purpurfarbenen Blumen.

Pseudoacacia Americana, ingens, fructu coccineo, nigra macula notato. Plum. Cat. Großer unächter, amerikanischer Schotendorn, mit scharlachfarber Frucht, so einen schwarzen Flecken hat.

Pseudoacacia Americana, Fraxini folio, floribus violaceis. Plum. Cat. Unächter, amerikanischer Schotendorn, mit dem Eschenblat, und violetter Blume.

Rauvolfia tetraphylla, latifolia. Plum. Nov. Gen. Vierblättrige Rauwolfia, mit breiten Blättern.

Rauvolfia tetraphylla, angustifolia. Plum. Nov. Gen. Vierblättrige Rauwolfia, mit schmalen Blättern.

Sapindus foliis costæ innascentibus. Inst. R. H. Der Seifenbeerenbaum.

Sapota fructu turbinato minori. Plum. Nov. Gen. Sapota mit kleiner, freisetförmiger Frucht.

Sapota fructu ovato, majori. Plum. Nov. Gen. Sapota mit grosser, eiförmiger Frucht.

Tabernemontana lactescens, citrii foliis undulatis. Plum. Nov. Gen. Milchichte Tabernemontana, mit dem wellenweisförmigten Citronenblat.

Tabernemontana lactescens, Lauri folio, flore albo, siliquis rotundioribus. Hoult. Milchichte Tabernemontana, mit dem Lorbeerblat, weißer Blume, und runden Schoten.

Tamarindus. Raii ist. Der Tamarindenbaum.

Tapia arborea, triphylla. Plum. Nov. Gen. Knoblauchbirn.

Telephoides Americanum, arborescens, fructu parvo, foliis acuminatis. Hoult. Baumartiges, amerikanisches, unächtes Telephkraut, mit kleiner Frucht und spitzigen Blättern.

Telephoides Americanum, arborescens, foliis latis subrotundis & subtus incanis, fructu maximo. Hoult. Baumartiges, amerikanisches, unächtes Telephkraut, mit breiten, rundlichten und unten grauen Blättern.

Telephoides Americanum, arborescens, foliis latioribus subrotundis, fructu majore ex longo pediculo pendulo. Hoult. Amerikanisches, baumartiges unächtes Telephkraut, mit breiten, rundlichten Blättern, und grosser an einem langen Stiel hangender Frucht.

Terebinthus major, Betulae cordice, fructu triangulari. Sloan. Cat. Der grosse Terpentibaum, mit der Birkenrinde, und dreieckichter Frucht.

Tithymaloides Lauro-Cerasi folio, non serrato. Hort. Elth. Unächte Wolfsmilch, mit dem Kirschorbeerblat, so nicht zackig ist.

Tithymaloides frutescens, folio Anacampserotis. Plum. Cat. Staudige unächte Wolfsmilch, mit Rosenwurzblättern.

Vanilla flore viridi & albo, fructu nigrescente. Plum. Nov. Gen. Vanillen mit grüner und weißer Blume und schwärzlicher Frucht.

Vanilla flore violaceo, fructu breviori rubro. Plum. Nov. Gen. Vanillen mit violetter Blume, mit kurzer, rother Frucht.

Vanilla flore albo, fructu breviori corallino. Plum. Nov. Gen. Vanillen mit weißer Blume, und kurzer corallenfarber Frucht.

Xylon arboreum. I. B. Baumwolle.

Xylon Americanum, fructu oblongo acuminato. Lign. Inst. R. H. Amerikanischer Baumwollensrauch, mit länglichter, spitziger Frucht.

Zinziber. C. B. P. Ingwer.

Zinziber latifolium, sylvestre. H. L. Breitblättriger, wilder Ingwer.

Ziziphus quæ jujuba Americana, spinosa, Loti arboris foliis & facie, fructu rotundo parvo, dulci. Cat. H. Beaum. Amerikanischer Brustbeerleinsrauch.

Arbor Americana, fraxini foliis, fructu conoide. Der Mahogonybaum.

Arbor excelsa, Coryli folio ampliore. Houst. Unächter Mahogonybaum.

Buddleja frutescens, foliis conjugatis & serratis, floribus spicatis luteis. Houst. Staudige Buddleja, mit zackigen, paarweis wachsenden Blättern, und gelben Blumenähren.

Buddleja frutescens, foliis oblongis, mucronatis, subtus tomentosis, floribus spicatis albis. Houst. Staudige Buddleja, mit länglichten Blättern, und weissen Blumenähren.

Campechia. Campechenholz.

Conocarpus. Hort. Clif. Der Knopfsbaum.

Conocarpus procumbens, foliis subrotundis. Houst. Niedriger Knopfsbaum, mit rundlichten Blättern.

Arbor Americana, pinnatis Fraxini foliis, fructu reniformi Phaseolum exprimente. Pluk. Phyt. Die spanische Esche.

Lauro affinis jasmini folio alato, costa media membranulis utrinque extantibus alata, ligni duritie ferro vix cedens. Sloan. Cat. Jam. Eisenholzbaum.

Lauro affinis Terebinthini folio alato, ligno odorato, candido, flore albo. Sloan. Cat. Rodiserholz.

Morus fructu viridi, ligno sulphureo tinctorio. Sloan. Cat. Jam. Färberholz.

Pseudo-santalum croceum. Sloan. Cat. Jam. Brasilienholz.

Verzeichnis derjenigen, in den Apotheken gebräuchlichen Pflanzen, die sich in den englischen Gärten ziehen lassen, weil sie dauerhaft genug sind, die Kälte in freyer Luft zu vertragen. Diejenigen, so in Feldern wachsen, und insgemein nur Unkraut genennet werden, sind auch unterschieden, so, daß jeder, der sie ziehen will, ersehen kan, wo sie zu bekommen seyn.

ABROTANUM mas, angustifolium, majus. C. B. P. Stabwurzmännlein.

Abinthium vulgare, majus. I. B. Gemeiner Wermuth.

Abinthium Pontium, tenuifolium, incanum. C. B. P. Römischer Wermuth.

Abinthium marinum, album. Ger. Seewermuth. Wächst in Engelland an den Seeküsten.

Acanthus fativus vel mollis. Virgilii. C. B. P. Beerenflau.

Acetosa pratensis. C. B. P. Gemeiner Sauerampfer, wächst in Engelland auf den Wiesen und Matten.

Acetosa arvensis lanceolata. C. B. P. Schaafampfer, wächst in Engelland in trockenem, sandigen Boden.

Acetosa rotundifolia, hortensis. C. B. P. Französischer Sauerampfer.

Acorus verus sive Calamus Aromaticus officinarum. C. B. P. Der wahre Calmus; in Engelland, in tiefen, stehendem Wasser, jedoch sehr selten.

Adiantum foliis longioribus pulverulentis pediculo nigro. C. B. P. Schwarz Frauenhaar; in Engelland, in den Fugen alter Mauren, und an den Seiten, schattiger Hügel.

Adiantum foliis coriandri. C. B. P. Das wahre Frauenhaar.

Ageratum foliis serratis. C. B. P. Leberbalsam.

Agrimonia officinarum. Inst. R. H. Ottermennig; in Engelland in Wäldern und schattigen Wegen.

Alcea vulgaris, major. C. B. P. Sigmarskraut; in Engelland, auf Wiesen.

Alchimilla vulgaris. C. B. P. Sinnau; in Engelland, auf nassen Wiesen.

Alkekengi officinarum. Inst. R. H. Judenkirschen.

Allium sativum. C. B. P. Knoblauch.

Alfene media. C. B. P. Hünerdarm; in Engelland, auf jedem Misthauffen, wie auch in jedem Garten.

Althæa Dioscoridis & Plinii. C. B. P. Althee; in Engelland an nassen Wegen.

Amaranthus maximus. C. B. P. Amarantenbaum.

Ammi majus. C. B. P. Amme.

Anagallis phœnicio flore. C. B. P. Gauchheil; in Engelland, auf Aeckern.

Anagallis cœruleo flore. C. B. P. Gauchheil mit blauer Blume; in Engelland, auf Aeckern, aber sehr selten.

Anchusa puniceis floribus. C. B. P. Rothe Ochsenzunge.

Anethum hortense. C. B. P. Dill.

Angelica fativa. C. B. P. Angelica.

Anonis spinosa, flore purpureo. C. B. P. Hauchschel; in Engelland, auf Heiden und andern unbebauten Plätzen.

Anthora seu Aconitum salutiferum. C. B. P. Giftheil.

Aparine vulgaris. C. B. P. Klebkraut; in Engelland, an Hecken etc.

Apium palustre & apium officinarum. C. B. P. Wasserpeterlein; in stehenden Wassern.

Apium hortense. Ger. Gartenpeterlein.

Apium Macedonicum. C. B. P. Macedonischer Peterlein.

Aquilegia sylvestris. C. B. P. Wilde Aglei; in Wäldern, aber selten.

Aristolochia clematidis recta. C. B. P. Kriechende Osterlucey.

Aristolochia longa, vera. C. B. P. Lange Osterlucey.

Aristolochia rotunda, flore ex purpura nigro. C. B. P. Runde Osterlucey.

Artemisia vulgaris, major. C. B. P. Beyfus; an den Seiten der Felder.

Arum vulgare. Ger. Maronwurzel.

Arundo vulgaris, sive Phragmites Dioscoridis. C. B. P. Rohr; in tiefen Wassern.

Asarum vulgare. Park. Haselwurz; in feuchten, schattigen Orten, aber selten.

Asclepias flore albo. C. B. P. Schwalbenwurz.

Asparagus sativus. C. B. P. Spargel.

Asperula sive Rubeola montana odora. C. B. P. Waldmeister; in Wäldern und schattigen Plätzen.

Asphodelus albus, ramosus mas. C. B. P. Goldwurz.

Asphodelus luteus, & flore, & radice. C. B. P. Gelbe Goldwurz.

Asplenium sive Ceterach. I. B. Milzwurz, an alten Mauern.

Aster Atticus cœruleus, vulgaris. C. B. P. Blaues Sternkraut.

Atractylis lutea. C. B. P. Gelbe Distel.

Atriplex hortensis, alba, sive pallide virens. C. B. P. Gartenmelde.

Atriplex

Atriplex foetida. C. B. P. Stinkende Melde; auf Misthaufen, und an unbebauten Orten.
Balsamita major. Dod. p. Balsamkraut.
Bardana vulgaris major. Park. Klette; an den Seiten der Landstrassen.
Behen album, officinarum, I. B. Beenvurz; in Aekern.
Bellis sylvestris, caule folioso, major. C. B. P. Grosse Margarethenblümlein; in Kornfeldern und Wiesen.
Bellis sylvestris, minor. C. B. P. Kleine Margarethenblümlein; in Grassfeldern.
Berberis dumetorum. C. B. P. Berberisbeere; in einigen Hecken.
Beta alba vel pallescens, quæ Cicla officinarum. C. B. P. Weisser Manggold.
Beta rubra, vulgaris. C. B. P. Rother Manggold.
Betonica purpurea. C. B. P. Wilde Betonie.
Bistorta radice minus intorta. C. B. P. Mitterwurz; in nassen Matten.
Blitum album, majus. C. B. P. Weisser Hahnenkamm.
Blitum rubrum, majus. C. B. P. Rother Hahnenkamm.
Borrago floribus cæruleis. I. B. Boretsch; in Aekern.
Botrys Ambrosioides vulgaris. C. B. P. Melde mit ausgeschweiften Blättern.
Brassica capitata, alba. C. B. P. Krauthaupt.
Bryonia aspera, sive alba, baccis rubris. C. B. P. Zaunrübe; an Hecken und Hügeln.
Bryonia lævis, sive nigra, ramosa. C. B. P. Schwarze Zaunrübe; in Wäldern und an Hecken.
Buglossum angustifolium, majus. C. B. P. Grosse Ochsenzunge.
Buglossum sylvestre, minus. C. B. P. Wilde Ochsenzunge; auf Aekern.
Bugula vulgaris. Park. Golden Günsel; in nassen Wiesen und Wäldern.
Bupthalmum cotula folio. C. B. P. Rindsaug.
Bursa pastoris, minor, folio sinuato. C. B. P. Eäschelkraut; überall an den Seiten der Wege.
Buxus arborecens. C. B. P. Buchsbaum; bey Darkin, in Surry.
Calamintha vulgaris, vel officinarum Germaniæ. C. B. P. Bergmünze in unbebautem Land.
Calamintha pulegii odore, sive Nepeta. C. B. P. Kagenmünze, an den Seiten der Landstrassen, und in andern unbebauten Gegenden.
Calamintha arvensis verticillata. C. B. P. Wassermünze, an den Seiten der Teiche, und in feuchten Aekern.
Calcitrapa flore purpureo. Vaill. Sterndistel, an Hügeln.
Caltha vulgaris. C. B. P. Dotterblume.
Cannabis sativa. C. B. P. Hanf; an Misthaufen.
Capparis spinosa, fructu minore, folio rotundo. C. B. P. Caperstaude.
Cardamine magno flore purpurascens. Inst. R. H. Wiesenkreffe, in Wiesen.
Cardiaca. Inst. R. H. Hergespänn, an den Seiten der Fusssteige.
Carduus albis maculis notatus, vulgaris. C. B. P. Frauentistel, an unbebauten Orten.
Carline acaulos, magno flore. C. B. P. Eberwurz.
Carthamus officinarum, flore croceo. Inst. R. H. Saffler.
Carui Cæsalp. Wiesenkümmel; an Misthaufen, aber selten.

Caryophyllata vulgaris. C. B. P. Benediktenkraut, Garaffel, in Wäldern und an Hecken.
Caryophyllus altissimus major. C. B. P. Gartennägel.
Centaurium majus, folio in lacinias plures diviso. C. B. P. Gros Tausendguldenkraut.
Centaurium minus. C. B. P. Klein Tausendguldenkraut, in angebautem Feld, und in Wäldern.
Cepa vulgaris. C. B. P. Die Zwiebel.
Chærophylum sativum. C. B. P. Kerbel.
Chamædrys vulgo vera existimata. I. B. Gamanderlein, in freidigen Boden.
Chamæmelum nobile sive Leucanthemum odoratum. C. B. P. Camillen.
Chamæmelum vulgare. Leucanthemum Dioscoridis. C. B. P. Gemeine Camillen, in Aekern und an Misthaufen.
Chamæpitis lutea, vulgaris, sive folio trifido. C. B. P. Schlafkräutlein, in Aekern.
Chelidonium majus, vulgare. Schellkraut; in Wäldern und an Hecken.
Chelidonia rotundifolia, minor. C. B. P. Klein Schellkraut; an den Seiten der Teiche, und in andern nassen Orten.
Chenopodium folio triangulo. Inst. R. H. Gänsefuß, in engen Steigen, und öden Plätzen.
Cicer sativum. C. B. P. Kichern.
Cichorium sylvestre sive officinarum. C. B. P. Wilde Wegwarten, in engen Steigen und Heiden.
Cicuta major. C. B. P. Großer Schierling, an den Hügeln.
Cinaria hortenensis, foliis aculeatis & non aculeatis. C. B. P. Artischocken.
Cistus mas, folio oblongo, incano. C. B. P. Eisenröslein.
Cistus Ladanifera, Cretica, flore purpureo. Toarn. Cor. Ladanum.
Cnicus sylvestris, hirsutior, sive Carduus Benedictus. C. B. P. Wilder Safran.
Cochlearia folio subrotundo. C. B. P. Löffelkraut.
Cochlearia folio sinuato. C. B. P. Seescharbockskraut, in Salzlachen.
Conyza minor, flore globosa. C. B. P. Das kleinere Löffelkraut.
Coriandrum majus. C. B. P. Coriander.
Coronopus sylvestris, hirsutior. C. B. P. Wilder Krähenfuß; auf Heiden und unbebauten Plätzen.
Coronopus Ruellii. I. B. Gartenkrähenfuß.
Corylus sylvestris. C. B. P. Wilde Haselstaude; in Wäldern.
Cotula foetida. Dod. Hundschamillen; an Aekern.
Cotyledon major. C. B. P. Nabelkraut; an den Seiten der Hügel aber selten.
Critimum sive Foeniculum maritimum, minus. C. B. P. Meerfenchel; auf Felsen an der See-seite.
Crocus sativus. C. B. P. Safran.
Cruciata hirsuta. C. B. P. Kreuzkraut, an den Seiten der Hecken.
Cucumis sylvestris asininus dictus. C. B. P. Eselskürbis.
Cucumis sativus, vulgaris. C. B. P. Gurken.
Cupressus meta in fastigium convoluta, quæ scemina Plinii. C. B. P. Gemeine Cypresse.
Cyanus montanus, latifolius vel Verbasculum Cyanoides. C. B. P. Breitblättrige Kornblume.
Cyanus minor sive segetum. C. B. P. Gemeine Kornblume; unterm Korn.
Cyclamen Hedera folio. C. B. P. Säubrod.

- Cynoglossum majus*, vulgare. C. B. P. Hundszunge, an den Seiten der Hecken und andern unbebauten Orten.
- Cyperus odoratus*, radice longa, sive *Cyperus officinarum*. C. B. P. Wilder Galgant.
- Daucus foliis Foeniculitenuissimis*. C. B. P. Eretischer Möhrenkümmel.
- Daucus vulgaris* Claf. Hist. Gemeiner Möhrenkümmel, an den Seiten der Fußsteige, und in andern unbebauten Orten.
- Delphinium majus*, sive vulgare. Park. Großer Rittersporn.
- Dens leonis latiore folio*. C. B. P. Löwenzahn, auf Mauern und überall in Grasfeldern.
- Digitalis purpurea*, folio aspero. C. B. P. Fingerhut, an den Seiten der Hügel, und in andern unbebauten Orten.
- Dipsacus fativus*. C. B. P. Zahme Kardendistel.
- Dipsacus sylvestris* aut *Virga pastoris major*. C. B. P. Große, wilde, Kardendistel, an trockenen Hügeln.
- Doronicum radice scorpii*. C. B. P. Gernswurz.
- Dracunculus polyphyllus*. C. B. P. Vielblättriger Dragen.
- Echium vulgare*. C. B. P. Ochsenzunge, auf Brachäckern und unter dem Korn.
- Elatine folio subrotundo*. C. B. P. Leinfraut, auf Aekern.
- Endivia latifolia sativa*. C. B. P. Endivien.
- Equisetum palustre*, longioribus setis. C. B. P. Ginnsfraut, an den Seiten der Gräben und in andern nassen Boden.
- Eruca latifolia*, alba, sativa *Dioscoridis*. C. B. P. Wilder Senff.
- Eryngium maritimum*. C. B. P. Manstreu, an den Seefüsten.
- Erysimum vulgare*. C. B. P. Gemeiner Wegsenff, an Mauern und den Seiten der Wege, gar häufig.
- Eupatorium cannabinum*. C. B. P. Wasserdosten, an den Seiten der Gräben und stehenden Wasser.
- Euphrasia officinarum*. C. B. P. Augentrost, auf Heiden und unbebauten Feldern.
- Faba*. C. B. P. Bohnen.
- Faba minor*, sive *Equina*. C. B. P. Rossbohnen.
- Filipendula vulgaris*, an molon. Plinii. C. B. P. Steinbrech, auf Heiden. 2c.
- Filix ramosa*, major, pinnulis obtusis non dentatis. C. B. P. Nestiges Farenkraut, auf Heiden und Triften.
- Filix non ramosa*, dentata. C. B. P. Farenkraut, an den Seiten der Hügel und in Wäldern.
- Foeniculum vulgare*, Germanicum. C. B. P. Fenchel, auf unbebauten Plätzen.
- Foeniculum dulce*. C. B. P. Süßer Fenchel.
- Foenum Græcum sativum*. C. B. P. Fönugrec.
- Fragaria vulgaris*. C. B. P. Erdbeerkraut, in Wäldern.
- Frangula* seu *Alnus nigra*, baccifera. Park. Der Faulbaum, in nassen Wäldern.
- Fraxinella*. Claf. Hist. Weißer Diptam.
- Fumaria officinarum* & *Dioscoridis*. C. B. P. Erdrauch, auf Aekern.
- Galega vulgaris*. C. B. P. Die Geisraute.
- Gallium luteum*. C. B. P. Wegkraut, an den Seiten der Hügel, und in Matten.
- Genista angulosa* & *scoparia*. C. B. P. Genster, in Triften.
- Gentiana major*, lutea. C. B. P. Großer Enzian.
- Geranium folio malvæ rotundo*. C. B. P. Storchschnabel, mit dem runden Pappelblatt, an den Seiten der Hügel.
- Geranium moschatum*. C. B. P. Bisamstorchenschnabel, an ungangbaren Wegen, aber selten.
- Geranium Robertianum*, primum. C. B. P. Ruprechtskraut, an Hecken.
- Glycyrrhiza siliquosa*, vel *Germanica*. C. B. P. Süßholz.
- Gnaphalium vulgare*, majus. C. B. P. Großes Ruhrkraut, auf Triften 2c.
- Gramen Canium arvense* sive *Gramen Dioscoridis*. C. B. P. Hundsgras, überall auf Aekern.
- Gratiola Centaurioides*. C. B. P. Wilder Nurin.
- Grossularia spinosa*, sativa. C. B. P. Stachelbeeren.
- Harmala*. Dod. p. Wilde Raute.
- Hedera arborea*. C. B. P. Baumepheu, an Bäumen.
- Hedera terrestris vulgaris*. C. B. P. Sundermann, an Hecken und Hügeln.
- Helenium vulgare*. C. B. P. Mant.
- Helleborus albus*, flore subviridi. C. B. P. Weiße Niesewurz.
- Helleborus niger*, flore roseo. C. B. P. Schwarze Niesewurz.
- Hepatica flore simplici cœruleo*. Claf. Hist. Edel Leberkraut.
- Herba Paris*. Ger. Einbeer, in schattigen Wäldern.
- Herniaria glabra*. I. B. Bruchkraut.
- Hieracium majus*, folio *Sonchi*. I. B. P. Habichtsfraut, an den Seiten der Wege gar häufig.
- Hordeum distichum*. C. B. P. Gerste.
- Horminum Sclarea dictum*. C. B. P. Scharley.
- Horminum sylvestre* *Lavendulæ flore*. C. B. P. Wilder Scharley, auf unbebauten Feldern.
- Hyacinthus oblongo flore cœruleus major*. C. B. P. Blauer Hyacinth, in Wäldern und an Hecken.
- Hyoscyamus albus*, major. C. B. P. Weiß Bilsenskraut.
- Hyoscyamus vulgaris niger*. C. B. P. Schwarz Bilsenskraut, auf Triften und unbebauten Plätzen.
- Hypericum vulgare*. C. B. P. Johanniskraut, an Hecken und den Seiten der Wege.
- Hysopus officinarum*, cœrulea seu spicata. C. B. P. Ysop.
- Jasminum vulgatius*, flore albo. C. B. P. Jasmin.
- Iberis latiore folio*. C. B. P. Wilde Kresse.
- Imperatoria major*. C. B. P. Meisterwurz.
- Iris alba*, Florentina. C. B. P. Beilwurz.
- Iris vulgaris*, Germanica, sive *sylvestris*. C. B. P. Wilde Schwertlilie.
- Iris sylvestris foetida*. Inst. R. H. Stinkende Schwertlilie, in Wäldern und nassen unbebauten Orten.
- Iris palustris lutea*. Ger. Gelbe Schwertlilie.
- Isatis sativa* vel *latifolia*. C. B. P. Waid.
- Juniperus vulgaris*, fruticosa. C. B. P. Wachholder, auf Heiden.
- Kali majus*, cochleato semine. C. B. P. Glaskraut.
- Lactuca sativa*. C. B. P. Lattich.
- Lamium album*, non foetens, folio oblongo. C. B. P. Taube Nessel mit weißen Blumen, an Hecken.

Lamium

Lamium purpureum, foetidum, folio subrotundo, sive *Galeopsis* *Dioscoridis*. C. B. P. Rothe tau-
be Nessel, an den Seiten der Hügel.
Lapathum folio acuto, plano. C. B. P. Spitzige
Grindwurz, auf Feldern und unbebauten Plätzen.
Lapathum aquaticum, folio cubitali. C. B. P. Groß-
er Wasserampfer, in stehenden Wassern.
Lapathum hortenfe, rotundifolium, sive *Monta-
num*. C. B. P. Unächte Münchshabarber.
Lapathum folio acuto, rubente. C. B. P. Rothe
Mengelwurz, an den Seiten der Wege.
Lapathum hortenfe, folio oblongo, sive secundum
Dioscoridis. C. B. P. Gartenampfer, Patenskraut.
Lapathum hortenfe, latifolium. C. B. P. Wahre
Münchshabarber.
Lapathum praestantissimum, *Rhabarbarum* offici-
narum dictum. Morif. Wahre Rhabarbar.
Lavendula angustifolia. C. B. P. Lavendel.
Lavendula latifolia. C. B. P. Breitblättriger Lavendel.
Laureola semper-virens flore viridi, quibusdam
Laureola mas I. B. Kellerhals, in Wäldern.
Laureola folio deciduo, flore purpureo, officinis
Laureola foemina. C. B. P. Kellerhalsweiblein.
Laurus vulgaris. C. B. P. Lorbeeren.
Lens vulgaris. C. B. P. Linsen.
Lenticula palustris vulgaris. C. B. P. Meerlinse,
überall auf stehenden Wassern.
Lepidium latifolium. C. B. P. Breitblättrig Pfeffer-
kraut, in unbebauten Gegenden, jedoch nicht
häufig.
Leucoium incanum, majus. C. B. P. Leucoi.
Leucoium luteum, vulgare. C. B. P. Gelber Weil.
Levisticum vulgare. C. B. P. Liebstöckel.
Lichen terrestris cinereus. Raii Syn. Erdleberkraut,
auf Heiden und Triften.
Ligustrum Germanicum. C. B. P. Deutscher Hart-
riegel, in Hecken.
Lilium album, flore erecto & vulgare. C. B. P.
Weiße Lilien.
Lilium Convallium, album. C. B. P. Mayenblümlein.
Limonium maritimum, majus. C. B. P. Großer
Seelavendel, in Salzlachen.
Linaria vulgaris, lutea, flore majore. C. B. P. Leins-
kraut.
Lingua Cervina, officinarum. C. B. P. Hirschzün-
ge, an den Mauern der Brunnen, und in andern
nassen Orten.
Linum sativum. C. B. P. Flachs.
Linum pratense, flosculis exiguis. C. B. P. Wies-
senflachs mit kleinen Blumen, auf Wiesen und
Triften.
Lithospermum majus, erectum. C. B. P. Perlenshir-
se in unbebauten Gegenden.
Lotus hortenfe, odora. C. B. P. Siebengezeit.
Lunaria racemosa, minor. C. B. P. Mondraute, in
Triften und Heiden.
Lupinus sativus, flore albo. C. B. P. Feigbohne.
Lupulus mas & foemina. C. B. P. Hopfe.
Lycopersicon fructu cerasi. Inst. R. H. Liebsapfel
mit Kirschfrüchten.
Lysimachia lutea, major. C. B. P. Gelber Weide-
rich, an den Seiten der Gräben.
Majorana vulgaris. C. B. P. Majoran.
Malva sylvestris, folio sinuato. C. B. P. Pappel, an
Hügeln und in unbebauten Plätzen.
Malva rosea, folio subrotundo. C. B. P. Gartenpappel.
Mandragora fructu rotundo. C. B. P. Ullraun.
Marrubium album, vulgare. C. B. P. Weißer An-
dorn, in trockenen freidigen Boden.

Marrubium nigrum, foetidum, *Ballote* *Dioscoridis*.
C. B. P. Schwarzer Andorn, an Hügeln und Wegen.
Marum vulgare. Ger. Mastkraut.
Marum Syriacum vel Creticum. H. L. Amberkraut.
Matricaria vulgaris vel sativa. C. B. P. Mutterkraut,
auf Misthaufen, und öden Plätzen.
Melilotus officinarum *Germania*. C. B. P. Steins-
flee, an den Seiten bebauter Felder.
Melissa hortenfe. C. B. P. Melissen.
Mentha angustifolia, spicata. C. B. P. Münze.
Mentha rotundifolia, palustris, seu *aquatica major*.
C. B. P. Wassermünze, in Gräben und seichten
Wassern.
Mentha spicis brevioribus & habitioribus, foliis
Mentha fusca sapore fervido *Piperis*. Raii Syn.
Pfeffermünze, in nassen Plätzen.
Mentha sylvestris longiore folio C. B. P. Rosmün-
ze, an unbebauten Orten.
Mercurialis testiculata sive mas, & spicata sive *foe-
mina* *Dioscoridis & Plinii*. C. B. P. Bingelkraut,
an den Wegen.
Mespilus Apii folio sylvestris, spinosa sive *oxya-
cantha*. C. B. P. Weisder in Hecken.
Mespilus vulgaris. I. B. Mispelbaum.
Meum foliis Anethi. C. B. P. Wärmurz.
Milium semine luteo vel albo. C. B. P. Hirse.
Millefolium vulgare, album. C. B. P. Schafgarben,
an den Wegen überall.
Myrrhis magno semine, longo, sulcato. I. B. Myr-
renkörbel.
Napus sativus. C. B. P. Steckrübe.
Napus sylvestris. C. B. P. Wilde Steckrübe, an
Hügeln.
Nasturtium aquaticum, supinum. C. B. P. Wasser-
kresse, in Gräben und stehendem Wasser.
Nasturtium hortenfe, vulgatum. C. B. P. Gartenkresse.
Nepeta major, vulgare. Park. Katzenmünze, auf
freidigen, trockenen Feldern.
Nicotiana major, latifolia. C. B. P. Der Taback.
Nigella flore minore, simplici candido. C. B. P.
Schwarzkümmel.
Ocimum vulgare. C. B. P. Basilienkraut.
Olea sativa. C. B. P. Oehlbaum.
Ophyoglossum vulgatum. C. B. P. Matteredungelins-
kraut, in nassen Matten.
Origanum sylvestre, *Cunila bubula* *Plinii*. C. B. P.
Wilder Majoran, in trockenen unbebauten Orten.
Origanum onites. C. B. P. Der Wohlgemuth.
Orchis morio mas, foliis maculatis. C. B. P. Das Knab-
enkrautmännlein, in Wäldern und nassen Matten.
Orchis morio foemina. C. B. P. Das Knabenkraut-
weiblein, in Matten.
Orobis siliquis articulatis, semine majore. C. B. P.
Wilde Erben.
Osmunda Regalis. Ger. Blühend Farrenkraut.
Oxys. Inst. R. H. Sauerklee, in nassen Wäldern.
Paeonia foemina, flore rubro, majore. C. B. P. Paeonie.
Paeonia folio nigricante splendido, quæ mas. C. B.
P. Paeonia das Männlein.
Panax Coloni & Marrubium aquaticum, acutum.
Ger. Gliedkraut, an den Seiten der Gräben und
andere wässerige Orte.
Panax Pastinacæ folio. C. B. P. Panawurzel, Heil-
kraut.
Panicum Germanicum, sive *Panicula minor*. C. B.
P. Pfennigkraut.
Papaver hortenfe, semine, albo. C. B. P. Weißer
Mohn.
Papaver hortenfe, semine, nigro. C. B. P. Schwar-
zer Mohn.

Q q q q q q

Papa-

Papaver erraticum Rhoia's Dioscoridi. Theophrasti. Plinio. C. B. P. Klapperosen, in Aeffern.
Parietaria officinarum. C. B. P. St. Peterskraut, an Mauern.
Paronychia rutaceo folio. Ger. Nägeleinkraut, an Mauern und Gebäuden.
Pastinaca sativa, latifolia. C. B. P. Pastinac.
Pastinaca sylvestris latifolia. C. B. P. Wilde Pastinac, an unbebauten Orten.
Pentaphylloides Argentina dicta. Raii Syn. Wilder Rainsarn, in nassen Triften und an den Seiten der Gräben.
Perfoliata vulgarissima, sive arvensis. C. B. P. Durchwachs, Bruchwurz, auf Aeffern.
Periclymenum non perfoliatum Germanicum. C. B. P. Specklilie, in Hecken.
Persicaria mitis maculosa. C. B. P. Fleckiger Wasserpfeffer, auf Misthaufen.
Persicaria urens seu *Hydropiper*. C. B. P. Wasserpfeffer, an den Seiten der Gräben, und in andern wässerigen Orten.
Petasites major & vulgaris. C. B. P. Pestilenzwurz, an den Seiten der Gräben.
Peucedanum Germanicum. C. B. P. Saufenchel, ist in Engeland etwas seltenes.
Phellandrium vel Cicutaria aquatica quorundam. I. B. Wasserschieferling, in stehenden Wassern.
Pilosella minor, repens, hirsuta. C. B. P. Mäusohrlein, an Mauern, und auf trockenen sandigen Triften.
Pimpinella sanguisorba, minor. C. B. P. Kleine welsche Pimpinelle, in freidigen Boden.
Pimpinella saxifraga, major, umbella candida. C. B. P. Grosse Pimpinelle, an Hecken und den Seiten der Felder.
Pimpinella Saxifraga major, altera. C. B. P. Klein Pimpinelle, auf Triften.
Pisum arvense, flore candido, fructu rotundo albo. C. B. P. Erbsen.
Plantago latifolia, sinuata. C. B. P. Breiter Wegrich, in feuchten Orten.
Plantago angustifolia, major. C. B. P. Spitziger Wegrich, an Misthaufen und überall an den Wegen.
Plumbago quorundam. (Luf. H. Zahnrurz.
Polium maritimum, erectum, Monspeliacum. C. B. P. Poley.
Polium angustifolium, Creticum. C. B. P. Cretischer Poley.
Polygonatum latifolium, vulgare. C. B. P. Gemeine, breitblättrige Schminckwurz, in einigen Wäldern, doch selten.
Polygonum latifolium. C. B. P. Wegtritt, in unbebauten Orten.
Polypodium vulgare. C. B. P. Engelsfuß, an schattigen Hügeln und Mauern.
Porrum commune, capitum. C. B. P. Der Lauch.
Portulaca latifolia, seu sativa. C. B. P. Portulac.
Primula veris. Inst. R. H. Schlüsselblume, in Wäldern und Hecken.
Primula veris, major. Ger. Grosse Schlüsselblumen, in Matten.
Prunella major folio non dissecto. C. B. P. Brunelle, in Matten und auf Weiden.
Prunus sylvestris. C. B. P. Schleendorn, in Hecken.
Psyllium majus, erectum. C. B. P. Flöhkraut.
Pteris vulgaris, folio longo serrato, flore albo. I. B. Nieskraut.
Pulegium latifolium. C. B. P. Breitblättriger Poley, in nassen Triften.
Pulegium angustifolium. C. B. P. Schmalblättriger Poley.

Fulmonaria maculosa, latifolia. Park. Lungenkraut.
Punica sativa. Inst. R. H. Granaten.
Punica sylvestris flore pleno majore. Inst. R. H. Wilde Granaten.
Pyrethrum Hispanicum. C. B. P. Pertram.
Pyrola rotundifolia, major. C. B. P. Waldmangold, Wintergrün mit runden Blättern, in schattigen Wäldern gegen Norden.
Quinquefolium majus, repens. C. B. P. Fünffingerkraut, in Wäldern.
Ranunculus pratensis, radice verticilli modo rotundo. C. B. P. Gemeiner Hahnenfuß, in Weiden.
Ranunculus Apii folio, laevis. C. B. P. Wasserhahnenfuß, in stehenden Wassern.
Raphanus minor oblongus. C. B. P. Radis.
Raphanus rusticus. C. B. P. Meerrettich, an Misthaufen und den Seiten der Felder.
Rapa rotunda sativa. C. B. P. Rüben.
Rhamnus Catharticus. C. B. P. Purgierender Stechdorn, in Hecken.
Rhus folio Ulmi. C. B. P. Färberbaum.
Ribes vulgare, fructu rubro. H. L. Johannisbeeren.
Ros folis folio rotundo. C. B. P. Sennenthau, in Triften, wo Sümpfe sind.
Rosa alba, vulgaris, major. C. B. P. Weiße Rosen.
Rosa Damascena, flore pleno. Hort. Eyst. Damascenerrosen.
Rosa rubra, multiplex. C. B. P. Rother Rosen.
Rosa sylvestris, vulgaris, flore odorato, incarnato. C. B. P. Wilde Rosen, in Hecken.
Rosmarinus hortensis, angustiore folio. C. B. P. Rosmarin.
Rubia tinctorum, sativa. C. B. P. Färberröthe.
Rubus vulgaris, sive *Rubus fructu nigro*. C. B. P. Der Brombeerstrauch, ist in den Hecken sehr gemein.
Rubus Idæus spinosus, fructu rubro. I. B. Himbeerstrauch, in einigen Wäldern.
Ruscus Myrtifolius, aculeatus. Inst. R. H. Gemeiner Mäusdorn, in Wäldern und Triften.
Ruscus latifolius, fructu folio innascente. Inst. R. H. Breitblättriger Mäusdorn.
Ruscus latifolius, fructu folio insidente. Inst. R. H. Alexandrische Lorbeeren.
Ruta hortensis, latifolia. C. B. P. Raute.
Ruta Muraria. C. B. P. Mauerraute, an Mauern und andern Gebäuden in nassen Orten.
Sabina folio Tamarisci Dioscoridis. C. B. P. Sevensbaum.
Salvia nigra. C. B. P. Rother Salbey.
Salvia minor, aurita & non aurita. C. B. P. Edler Salbey.
Sambucus fructu in umbella nigro. C. B. P. Holunder, mit schwarzen Beeren, in Hecken.
Sambucus racemosa, rubra. C. B. P. Bergholder.
Sambucus humilis, sive *Ebulus*. C. B. P. Atzig, etwas selten.
Sanicula officinarum. C. B. P. Sanickel, in Wäldern und schattigen Plätzen.
Santolina foliis teretibus. R. H. Cypressenkraut.
Saponaria major, laevis. C. B. P. Seifenkraut, an den Seiten der Hügel.
Satureia hortensis, sive *cunila sativa*. Plinii. C. B. P. Saturey.
Satureia montana, durior. C. B. P. Bergsaturey.
Saxifraga rotundifolia, alba. C. B. P. Weißer Steinschreck, in Matten.
Scabiosa pratensis, hirsuta, quæ officinarum. C. B. P. Scabiose, in Aeffern.

Scabiosa

Scabiosa radice succisa, flore globofo. Rati Syn. Teufelsabbis, in Wäldern und an Hecken.
 Scordium legitimum. Park. Scordienkraut, in wässerigen Orten, aber etwas selten.
 Scordium alterum, sive salvia agrestis. C. B. P. Wilder Salbey, in Wäldern, und auf Heiden.
 Scorzonera latifolia, sinuata. C. B. P. Scorzonere.
 Scrophularia nodosa, foetida. C. B. P. Stinckend, knotiges Feigwarzenkraut, in Wäldern und schattigen Orten.
 Scrophularia aquatica, major. C. B. P. Wasserfeigwarzenkraut, an den Seiten der Gräben.
 Secale hybernum vel majus. C. B. P. Roggen.
 Sedum majus, vulgare. C. B. P. Hauswurz, auf Häusern und Mauern.
 Sedum minus teretifolium, album. C. B. P. Kleine Hauswurz, auf Mauern.
 Sedum minus, vermiculatum, acre. C. B. P. Mauerpfeffer, auf Mauern und Gebäuden.
 Senecio minor, vulgaris. C. B. P. Gemein Kreuzkraut; auf Mauern, in Aekern, und Wegen überall.
 Serpyllum vulgare, minus. C. B. P. Gemeiner, kleiner Quendel, in Heiden und Triften.
 Seseli pratense, Silaus forte Plinio. C. B. P. Sesel, in nassen Triften.
 Siler montanum, majus. Mor. Umb. Grosser Bergsesel.
 Sinapi Rapi folio. C. B. P. Senff, auf Misthauffen.
 Sinapi hortense, semine albo. C. B. P. Weisser Senff.
 Silarum Germanorum. C. B. P. Zuckerrurz.
 Sium latifolium. C. B. P. Wassermereck.
 Sium aromaticum, sison officinarum. Inst. R. H. Steinpeterlein, in Hecken und schattigen Wegen.
 Smyrnium Math. Smyrnenkraut, an den Seiten der Felder, jedoch selten.
 Solanum hortense. Gen. Nachtschatten, auf Misthauffen.
 Solanum scandens seu Dulcamara. C. B. P. Bittersüß.
 Soldanella maritima, minor. C. B. P. Meerwinde, an den Seeküsten.
 Sonchus asper, laciniatus. C. B. P. Saubistel, in Aekern.
 Sonchus laevis laciniatus, latifolius. C. B. P. Hasenfohl, bey der vorigen.
 Sophia Chirurgorum. Ger. Sophienkraut, in Aekern.
 Sorbus fativa. C. B. P. Sperberbaum.
 Sorbus torminalis. Ger. Wilder Sperberbaum, in Hecken.
 Spinachia vulgaris, capsula seminis aculeata. Inst. Spinat.
 Staphisagria. Math. Läusekraut.
 Stoechas purpurea C. B. P. Arabisch Stoechaskraut.
 Stoechas Citrina, tenuifolia, Narbonensis. L. B. Stoechaskraut.
 Stramonium fructu spinoso, oblongo flore albo. Inst. R. H. Tollkraut, auf Misthauffen.
 Symphytum consolida major, cœmina, flore albo vel pallide luteo. C. B. P. Wallwurz, in unbauten Orten.
 Tamariscus Narbonensis. Lob. Tamarisfen.
 Tanacetum vulgare, luteum. C. B. P. Rainfarn, in öden Wegen.
 Thelephium vulgare. C. B. P. Wundkraut, Telesphkraut, in Wäldern und nassem Boden.
 Thapsia Carotæ folio. C. B. P. Turbithskraut.
 Thlaspi arvense, siliquis latis. C. B. P. Bauernsenf, in Aekern, aber selten.
 Thlaspi arvense, Vaccariæ incano folio, majus. C.

B. P. Kleiner Bauernsenf, in Aekern und an Hecken.
 Thuya Theophrasti. C. B. P. Der Lebensbaum.
 Thymelæa foliis Lini. C. B. P. Kellershals mit Glachsblättern.
 Thymus vulgaris, folio tenuiore. C. B. P. Thymian.
 Tithymalus latifolius, Cataputia dictus. H. L. Cataputia.
 Tithymalus palustris, fruticosus. C. B. P. Graudige Wolfsmilch.
 Tithymalus foliis Pini, forte Dioscoridis Pytyusa. C. B. P. Kleine Wolfsmilch.
 Tragacantha. C. B. P. Bocksdorn.
 Tormentilla sylvestris. C. B. P. Tormentille, in Heiden.
 Trichomanes sive polytrichum officinarum. C. B. P. Biedertod, auf Mauern und an den Seiten schattiger Hügel.
 Trifolium pratense, purpureum, majus. C. B. P. Klee, auf Weiden.
 Trifolium arvense, humile spicatum, sive Lagopus. C. B. P. Haasenflee, in Aekern.
 Trifolium palustre. C. B. P. Biberklee, in Sümpfen.
 Triticum hybernum, aristis carens. C. B. P. Weizen.
 Tussilago vulgaris. C. B. P. Huflattig, in unfruchtbarem Land.
 Valeriana hortensis, Phu folio olusatri. Dioscoridis. C. B. P. Baldrian.
 Valeriana palustris, minor. C. B. P. Kleiner Baldrian, in nassen Matten und Wäldern.
 Valeriana sylvestris, major, foliis angustioribus. Rand. Wilder Baldrian, in freidigen Gegenden.
 Verbascum mas latifolium, luteum. C. B. P. Wollkraut, auf trockenen Hügeln und in sandigem Boden.
 Verbena communis, cœruleo flore. C. B. P. Eisenkraut, an Meyerhöfen.
 Veronica mas lupina & vulgatissima. C. B. P. Ehrenpreis, in waldigen Gegenden.
 Veronica aquatica, major, folio subrotundo. Mor. Hift Nachbungen, in stehenden Wasser.
 Vicia fativa, vulgaris, semine nigro. C. B. P. Wicken.
 Viola martia, purpurea, flore simplici odore. C. B. P. Veilchen, in Wäldern und an Hecken.
 Viola tricolor, hortensis, repens. C. B. P. Dreifaltigkeitsblumen.
 Vinca pervinca, vulgaris. Ger. Inngrün, in Hecken und Wäldern.
 Virga aurea angustifolia, minus ferrata. C. B. P. Goldruthen.
 Vitex foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis. C. B. P. Reuschbaum.
 Vitis Idæa foliis oblongis crenatis, fructu nigricante. C. B. P. Schwarzbeeren, in sumpfigen Heiden.
 Vitis Vinifera. C. B. P. Weinrebe.
 Ulmaria. Clus. Geisbart, in nassen Matten und an den Seiten der Gräben.
 Urtica urens, maxima. C. B. P. Brennessel, an Hecken und Hügeln.
 Urtica urens, pilulas ferens sanctissima Dioscoridis, semine lini. C. B. P. Römische Nessel.
 Xanthium. Dod. Bettlersläuse.
 Zea Briza dicta, vel monococco Germanica. C. B. P. Spelz.

D q q q q q q 2

Verzeich

Verzeichnus derjenigen grossen Bäume, so im Londner Dispensatorio, unter den gebräuchlichen Arzeneien stehen, aber insgemein größer werden, als daß sie in kleinen Gärten einen Platz haben könnten.

ABIES mas, tonis sursum spectantibus. C. B. P. Die Tanne.

Abies tenuiore folio, fructu deorsum inflexo. C. B. P. Die Pechtanne.

Amygdalus sativa. C. B. P. Der Mandelbaum.

Armeniaca fructu majore. Inst. R. H. Apricosen.

Betula. C. B. P. Bircke, in Wäldern.

Castanea sativa. C. B. P. Castanienbaum.

Cerasus major ac sylvestris, fructu subdolei nigro colore inficiente. C. B. P. Schwarze wilde Kirschen, in Hecken und einigen Wäldern.

Cerasus sativa, rotunda, rubra & acida. C. B. P. Rothe Kirschen, Weichseln.

Cydonia fructu oblongo, laeviori. Inst. R. H. Quitzen.

Ficus communis. C. B. P. Feigenbaum.

Fraxinus excelsior. C. B. P. Die Esche, in Hecken.

Fraxinus rotundior folio. C. B. P. Mannaesche.

Ilex aculeata Cocciglandifera. C. B. P. Kermeseiche.

Larix folio deciduo, conifera. L. B. Der Lerchenbaum.

Malus sylvestris, acido fructu albo. Inst. R. H. Holzapfel, in Hecken.

Malus sativa. Raii Syn. Apfelbaum.

Morus fructu nigro. C. B. P. Maulbeerbaum.

Nux juglans sive Regia vulgaris. C. B. P. Wallnus.

Persica molli carne, & vulgaris, viridis & alba. C. B. P. Der Pfirsichbaum.

Pinus sativa. C. B. P. Der Pinienbaum.

Pinus sylvestris. C. B. P. Die Fichte.

Populus nigra. C. B. P. Pappelbaum.

Pyrus sativa. C. B. P. Birnbaum.

Quercus latifolia, foemina. C. B. P. Eiche.

Salix vulgaris alba, arborecens. C. B. P. Weide.

Suber latifolium, perpetuo virens. C. B. P. Worchbaum.

Tilia foemina, folio majore. C. B. P. Linde.

Ulmus Campestris & Theophrasti. C. B. P. Ulmenbaum, Rüster.

Kurze Erklärung derjenigen Kunstwörter, so in diesem Werk gebraucht worden, davon einige in dem Werk selbst schon vorgekommen, die man aber deswegen hier zusammen setzen wollen, damit man sie um so viel leichter finden könne.

ACAULIS und acaulos, ohne Stengel, das ist, wann die Blume der Pflanze dicht am Boden wächst, und keinen sichtbarn Stengel hat, wie an der Eberwurz 2c.

Acinus und acini, sind die Beeren oder Früchte des Hollunder, der Weinweide, des Epheu 2c.

Ala ist die Höle am Stengel, welche das Blat oder der Stiel mit dem Stengel und Aesten macht, und aus welcher eine neue Knospe zu treiben pflegt.

Amentaceus Flos, bestehet aus vielen beysammsigen Spizlein, die wie ein Strick oder Razenschwanz aussehen: dergleichen sind die männlichen Blumen am Maulbeerbaum, an der Haselstrauch, dem Nusbaum und an der Eiche. Sie heisset auch Julius, und Rätzlein.

Apetalus flos, siehe Flos.

Apices, Zünglein, Pünctlein, Knöpflein, Kölbchen, sind diejenigen Körper, so an Fäden und Dräthen, die den Stempel der Blume insgemein umgeben, obenher hangen, und das befruchtende Pulver enthalten, so mit dem männlichen Saamen der Thiere eine Aehnlichkeit hat, siehe Tab. III. Fig. 32 b.

Arbor, ein Baum, ist eine holzige Pflanze, so am höchsten wächst, einen beständigen, einzeln Stamm hat, und sich in viele grosse Aeste theilet, die sich wieder in kleinere Zweige theilen, an welchen die Blätter, Blumen und Früchte wachsen.

Arista, ist die spizige Nadel, so an der Hülse dem Balg der Decke der Körner, am Korn, Gras, 2c. steht.

Articulatio, ist der Zusammenhang solcher Theile, so aus Knoten bestehen, wie die Schalen am Vogelsustraut, am Schüdkraut, oder spanischem

Klee, die, wann sie reif sind, sich in so viele Theile theilen, als Knoten daran sind.

Axis, ist eine spizige Säule, so in der Mitte einiger Blumen oder Rätzlein steht, um welche die übrigen Theile herum sitzen.

Bacca, eine Beere, ist eine rundlichte Frucht, so insgemein weich ist, und einen oder mehr Kerne in einem weichem Fleisch enthält.

Balaustium, ist der Kelch der Blume am wilden Granatenbaum.

Barbulae, sind die halben Blümlein zusammengesetzter Blumen.

Bivalvis, die Schoten oder Hülsen der Früchte, welche sich der Länge nach in zwey Theile theilen, wie die Schalen einer Muschel, und werden bivalves genannt.

Brachia, sind die Theilungen der grossen Aeste eines Baumes am Stamm.

Bulbus, Bollenwurzeln, Zwiebelgewächse, bestehen entweder aus verschiedenen Häuten, da eine die andere einschließt, oder aus verschiedenen übereinander liegenden Schuppen. Die erste Sorte heisset auch Radix tunicata, und dergleichen sind die Zwiebel, die Tulpe; die zweite aber Radix squamosa, wie die Lilie, der türkische Bund haben.

Calix, oder der Kelch, worunter man insgemein die stärkeren Blätter versteht, so die übrigen Theile der Blume bedecken.

Calypha, ist die dünne Hülle, oder Decke einiger Saamen.

Capillamenta, hierunter werden insgemein in Blumen diejenigen Fäden verstanden, worauf die Spizlein (apices) stehen.

Capitulum, ist der Kopf, oder obere Theil einiger Pflanzen.

Capula

Capfula, ist die kurze Schote oder Hülse einer Pflanze, die den Saamen enthält.

Carina, ist das hohle Blättlein an einer Papilionenblume, so dem Kiel oder unterem Theil eines Bootes gleicht.

Caudex, ist der Stamm eines Baumes.

Caulis, ist der Theil einer Pflanze, so die Nahrung aus der Wurzel empfängt, und in die andere Theile führet, die er um sich hat, und an welchem keine Seite von der andern zu unterscheiden ist. Der Stengel eines Baumes wird Stamm genennet, und am Korn und Gras, der Stalm.

Caulis volubilis, ein sich windender Stengel, der sich um einen Pfahl ohne Beyhülfe von Gabeln windet, wie der Hopfe, die Jaspeoln.

Caulis scandens, ein in die Höhe steigender Stengel, der durch Hülfe der Gabeln in die Höhe kriechet, wie die Rebe, die Zaunrube.

Caulis repens, ein kriechender Stengel, so auf dem Boden liegt, und sich durch Freibung neuer Wurzeln vermehret, wie der Gundermann, die Erdbeeren &c.

Caulis procumbens, ein liegender Stengel, der auf dem Boden liegt ohne Wurzeln zu treiben.

Cirri, sind die kleinen Fasern der Wurzeln an den Pflanzen.

Clavicula, oder **Capreolus**, ist ein Theil eines Stengels, der sich kräuselt, und an dem nahe stehenden Körper anhängt, auch allezeit an einem Knoten heraus wächst. Man nennet sie auch Gabeln.

Coma, ist der obere Theil eines Astes oder einer Blume; die Spizen; das Haar.

Conus, ein Zapfen, als die Früchte an den Tannen, Fichten, Cedern &c.

Corymbus, bedeutet einen Büschel von Blumen, oder Früchten, so auf solche Weise an Stielen stehen, daß sie eine Kugel formiren, als am großen Epheu &c.

Crena, **crenata folia**, sind Blätter, so am Rand herum ausgezackt sind, und verschiedene stumpfe Theile haben, als Tab. I. fig. 2.

Cubitus, das ist, anderthalb Schuh; so sagt man, daß der Stengel einer Pflanze cubitalis, bicubitalis &c. sey, nachdem er hoch ist.

Culmus, ist der Halm am Korn.

Cylindrus, Cylinder, so sagt man, die Früchte der Pflanzen sind cylindrisch, walzenförmig, wann sie einer Säule, einer Walse gleichen.

Cytinus, bedeutet überhaupt die Blumen des Granatenbaumes; aber einige Scribenten nennen auch die Kelche der Blumen, so sich auf gleiche Weise ausbreiten, *cytiniformes*.

Denticulatus, ausgezackt wie die Zähne an einer Säge, wird von solchen Blättern gesagt, die am Rand herum verschiedene scharffe Zacken haben, als *folium crenatum*, wie Fig. 1. Tab. I.

Digitatum folium, ist ein zusammengesetztes Blatt, so in verschiedene Theile zertheilt ist, die alle hinten zusammen laufen, und gleichsam eine Hand formiren, als Tab. II. Fig. 14.

Discus, das ist, eine Scheibe, ist eine Menge kleiner Blümlein, die gleichsam eine ebene Fläche machen, als Tab. III. Fig. 10.

Dissepimentum ist eine dünne Scheidewand, wodurch in den Früchten der Pflanzen verschiedene Fächer abgetheilt werden.

Echinus, sind solche Pflanzen, oder Theile derselben, die dicke mit Stacheln besetzt sind, wie ein Igel, und daher igelförmig genennet werden.

II. Theil.

Emarginatus, wird von solchen Blättern gesagt, die am Ende so ausgeschnitten sind, daß sie ein Herz formiren, wie Tab. I. Fig. 7.

Embryo, ist die zarte Frucht der Pflanze.

Fimbria, Franze, diese Theile der Pflanzen oder Blumen, deren Rand sich in schmale Fäden endiget, so, daß sie einer gefranzten Leinwand gleichen, werden gefranzt genennet.

Fistulosus, wird von Pflanzen gesagt, deren Stengel gleich einer Röhre hol sind.

Flos, das ist, eine Blume, bestehet aus den Zeugungsgliedern von beyderley Geschlecht, so an einem gemeinen Mutterkuchen, nebst ihrer Decke hangen; oder es sind die Zeugungstheile eines jeden Geschlechtes besonders, mit ihrer Decke, wann sie eine haben.

Die Blumen der Pflanzen werden von den Botanisten folgendermassen unterschieden.

Flos amentaceus, ist eine solche Blume, so man Rählein nennet.

Flos apetalus, ist eine Blume ohne Blättlein; diese haben für die Zeugungstheile keine andere Decke, als den Kelch.

Flos campaniformis, ist eine glockenförmige Blume, als Tab. III. Fig. 19. 20. Diejenigen, so sich gleich der 19. Figur ausbreiten, werden offene Glockenblumen; die aber Fig. 20. röhrichte Glockenblumen genennet.

Flos caryophyllus, ist eine nelkenförmige Blume.

Flos compositus, ist eine zusammengesetzte Blume, die entweder aus Blümlein, wie Tab. III. Fig. 17. a und b, oder halben Blümlein, als Tab. III. Fig. 17. c, oder aus beeden zusammen bestehet, als Tab. III. Fig. 17. Dergleichen ist die Kornblume, die Stockenblume &c.

Flos cruciformis, das ist, eine kreuzförmige Blume, so aus vier Blättlein bestehet, die ins Kreuz wachsen, wie Tab. III. Fig. 5 und 32. Dergleichen sind der Kobl, Senff, und der gelbe Veil &c.

Flos flosculosus, ist eine Blume, so aus verschiedenen Blümlein bestehet, S. Tab. III. Fig. 1 a und b, so in einen gemeinen Kelch eingeschlossen sind.

Flos infundibuliformis, d. i. eine trichterförmige Blume, die nemlich wie ein Trichter gestalt ist, wie Tab. III. Fig. 21. Dergleichen sind die Schlüsselblume, klein Taufenguldenkraut &c.

Flos labiatus, d. i. eine Lippenblume: ist eine irreguläre einblättrige Blume, so insgemein in zwey Lippen getheilt ist; die obere Lippe wird der Kamm, die untere der Bart genannt. Manchmal mangelt der Kamm, und alsdenn ersetzt der Griffel und die Fäden desselben Stelle; einige nennen dieses *florem non labiatum*. S. Tab. III. Fig. 36. a b c und d.

Flos liliaceus, d. i. eine lilienförmige Blume, bestehet insgemein aus sechs Blättlein, so den Lilienblättlein gleichen, wie Tab. III. Fig. 35. Dergleichen sind die Tulpe, Asphodillwurz &c.

Flos monopetalus, d. i. eine Blume, so aus einem Blättlein bestehet. Alle Blumen deren Blättlein unten vereinigt sind, so, daß sie ganz miteinander abfallen, heißen einblättrige Blumen, als Tab. III. Fig. 18.

Flos monopetalus anomalus, d. i. eine irreguläre einblättrige Blume, als Tab. III. Fig. 30. und 31.

Flos papilionaceus, eine Papilionenblume, ist eine Blume, so einigermaßen einem Papilion mit ausgebreiteten Flügeln gleicht. Sie bestehet allezeit aus diesen vier Theilen, der Fahne (*Vexillum*),

Rrrr rrr

so ein

so ein grosses aufrecht stehendes Blättlein ist, den zwey Flügeln (ala), so die Seiten ausmachen, und dem Kiel (Carina), welches ein hohes Blättlein ist, so dem Kiel eines Vortes gleichet. Dieses ist manchmalen ganz, und bestehet manchmalen aus zwey Blättlein, die dichte aneinander hangen, S. Tab. III. Fig. 6 und 37. Dergleichen haben die Bohnen, Erbsen, Wicken &c.

Flos personatus, eine Larvenblume, ist eine irreguläre einblättrige Blume, deren oberer Theil einem Vogelschnabel gleichet, wie Tab. III. Fig. 7 und 27. Dergleichen sind, am Leintraut, am Orant &c.

Flos urceolatus, oder eine frugförmige Blume, dergleichen ist am Erdbeerbaum, an der Seidelbeere &c. S. Tab. III. Fig. 24.

Flos petalodes, das ist, eine Blättleinsblume, oder eine Blume, deren Zeugungsheile mit Blättlein umgeben sind, wie Tab. III. Fig. 13.

Flos polypetalus, d. i. eine vielblättrige Blume, oder eine Blume, so aus vielen Blättlein bestehet. Wann diese in Ansehung der Gestalt und Lage mit einander übereinkommen, so ist die Blume regulär vielblättrig; wann sie aber nicht mit einander übereinkommen, so ist es eine irreguläre vielblättrige Blume.

Flos radiatus, d. i. eine Strahlenblume: sie bestehet aus zwey Theilen, der Scheibe, siehe Tab. III. Fig. 10. welches eine Menge von Blümlein ist, so eine ebene Fläche machen; und den Strahlen (S. Tab. III. Fig. 9.), welches halbe Blümlein sind, so um die Scheibe herum stehen, und einen Stern machen; die aber keine solche Strahlen haben, werden nackende Scheibenblumen genennet.

Flos rosaceus, d. i. eine rosenförmige Blume, oder eine Blume, die aus vier und mehr Blättlein bestehet, die rosenförmig im Kreis wachsen, wie Tab. III. Fig. 14.

Flos scorpioides, das ist, wann die Blumen an einer Seite des Stieles stehen, der sich oben gleich einem Scorpionenschwanz krümmet, dergleichen zeigt sich am Sonnenwirbel &c.

Flos semiflosculosus, das ist, eine halbblumige Blume, sie bestehet aus verschiedenen halben Blümlein, so einen gemeinen Kelch haben.

Flos spicatus, d. i. eine Aehrenblume, oder eine solche, deren Blumen dicht am Stiel stehen, so, daß sie einen spitzigen Kelch formiren.

Flos stamineus, das ist, eine Fadenblume, oder die aus vielen Fäden bestehet, die in einem Kelch eingeschlossen sind, ohne Blättlein, dergleichen sind, an der Natterwurz, am Wasservirbelkraut &c.

Flos sterilis, unfruchtbare Blume, sie hat keinen Embryon, und wird also eine männliche Blume, taube Blume genennet, dergleichen sind, an der Melone, dem Kürbis &c.

Flos verticillatus, d. i. eine wirtelförmige Blume. Diese Blumen wachsen dichte an einander, und umgeben den Stengel bey jedem Knoten.

Flos umbellatus, eine Doldenblume, da das Ende des Stengels oder Zweiges sich in verschiedene Stiele oder Strahlen theilet, die aus einem Punct kommen, und sich so ausbreiten, daß sie einen umgewandten Kelch formiren, gleich einem Sonnenschirm. Wann sich die Stiele, in welche der Stengel zertheilet ist, in andere von gleicher Form theilen, auf welchen die Blumen sitzen, so nennet man die erste Ordnung Strahlen, die zweyte Stiele. Diejenige Dolden, so nur allein aus Stielen bestehet, heist eine einfache, die, so aus Strahlen und Stielen bestehet, eine zusammengesetzte Dolden.

Folium, ein Blat, ist ein Theil einer Pflanze, so sich in die Länge und Breite erstrecket, so, daß die eine Seite von der andern unterschieden ist. Lateinisch wird es Folium genennet, um solches von dem Blumenblättlein zu unterscheiden, so Petalum heist.

Folium simplex, ein einfaches Blat, ist ein solches, so nicht bis in die Mitte zertheilet ist, als Tab. I. Fig. 1, 2, 3, 4 und 5.

Folium compositum, ein zusammengesetztes Blat, ist in verschiedene Theile zertheilet, deren jeder einem einfachen Blat gleichet, S. Tab. II. Fig. 20 und 21.

Folium digitatum, ein gefingertes Blat, ist ein zusammengesetztes, in verschiedene Theile zertheiltes Blat, welche alle am Stiel zusammentreffen, und einer Hand gleichen, S. Tab. II. Fig. 14. und 15.

Folium trifoliatum, ein dreyblättriges Blat, ist ein gefingertes Blat, so aus drey Fingern bestehet, wie Tab. II. Fig. 18.

Folium trilobatum, ein dreylappichtes Blat, bestehet aus drey stumpfen Lappen, die nicht bis unten getheilet sind, S. Tab. II. Fig. 17.

Folium heptafoliatum, ist ein gefingertes Blat mit sieben Fingern, S. Tab. I. Fig. 10.

Folium quinquifoliatum, ist ein gefingertes Blat mit fünf Fingern, S. Tab. II. Fig. 15.

Folium pennatum, ein gefiedertes, federförmiges Blat, ist ein zusammengesetztes Blat, so in verschiedene Theile getheilet ist, wovon jeder ein Lappe genennet wird, die längst der Mittelribbe stehen, entweder wechselsweis, als Tab. II. Fig. 22, oder paarweis, als Tab. II. Fig. 21. Wann sich die Mittelribbe mit einem Lappen oder Blat endiget, wie Fig. 21. so ist es ein ungleich gefiedertes Blat; wann es sich nicht so endiget, als Fig. 20. so ist es ein gleichförmiges, gefiedertes Blat. Wann die Lappen alle gleicher Form und Größe sind, ist es ein gleichförmiges gefiedertes Blat; sind sie nicht so, ist es ungleichförmig.

Folium alatum, ein geflügeltes Blat, bestehet aus verschiedenen gefiederten.

Folium ramosum, ein ästiges Blat, ist immer mehr zertheilet, als ein geflügeltes, wie am gemeinen Farn, oder Farnkrautweiblein.

Folii cauda, der Schwanz eines Blates, ist eine Verlängerung der Mittelribbe, und vereinigt das Blat mit dem Stengel, als mit einem Stiel. Hat die Mittelribbe einen Anhang vom Blat, so längst derselben hinlauffet, so wird es öfters ein geflügeltes Blat genennet, S. Tab. I. Fig. 12.

Folium integrum, ein ganzes Blat, so am Rand nicht zertheilet ist, als Tab. I. Fig. 5.

Folium angulatum, ein eckichtes Blat, so am Rand verschiedene Ecken hat, als Tab. I. Fig. 4.

Folium auriculatum, ein gedörtes Blat, so am Grund nahe am Stiel so eingeschnitten, daß es wie Ohren hat, als Tab. I. Fig. 8.

Folium sagittatum, ein lanzen-, pfeilförmiges Blat, welches drey scharffe Ecken hat, wie ein Pfeil, Tab. II. Fig. 19.

Folium sinuatum, ein ausgeschweiftes Blat, so am Rand verschiedene lange und breite Theile hat, Tab. I. Fig. 11.

Folium serratum, ein zackichtes, sägenförmiges Blat, so am Rand viele Theile, wie Zähne an einer Säge hat, als Tab. I. Fig. 6.

Folium crenatum, ein ausgezacktes Blat, so am Rand verschiedene stumpfe Theile hat, Tab. I. Fig. 2.

Folium laciniatum, ein zerschnittenes Blat, so am Rand verschiedene irreguläre Einschnitte hat, Tab. I. Fig. 13.

Folium

Folium umbilicatum, ist ein Blat an welchem der Stiel an der hintern Seite fest sitzt, so, daß auf der obern Fläche eine kleine Höhlung gleich einem Nabel ist, wie Tab. II. Fig. 16.

Folliculus, ist eine blätterige, häutige Scheide, oder Decke, welche die Frucht oder den Saamen umgiebt, wie an der Judenkirsche.

Fornicatus, gewölbte Blumenblättlein, sind solche die wie der Helm oder Kamm am Scharlachkraut, am Salbey u. gewölbt sind, wie Tab. III. Fig. 36.

Fructus, die Frucht: unter dem Wort Frucht, werden alle Saamen der Pflanzen mit ihrer Bedeckung verstanden.

Fructus umbilicatus, ist eine solche, an welcher, als sie noch der Ewerstock war, die andern Theile der Blume oben herab gewachsen; sie haben insgemein eine Höhle, welche unter dem Namen Umbilicus, der Nabel bekannt ist, wie an den Nispeln, den Granatäpfeln u.

Frutex, eine Staude, ein Strauch, mit vielen holzigen beständigen Stengeln, als der Rosenstrauch, Syringenstrauch, spanische Gensier u. welche sich am Boden in viele Stengel oder Stämme theilen. Die Gärtner aber bedienen sich dieses Wortes viel, von allen holzigen Pflanzen, so niedrig wachsen.

Geniculum, ein Knoten, solche Wurzeln und Sprossen von Pflanzen, die viele Knoten haben, werden geniculatae genennet.

Gluma, ist die Hülse, oder das Hälglein am Korn.

Habitus plantæ, ist das äußerliche Ansehen, der Pflanze.

Herba, ein Kraut: unter dem Wort Kraut werden lauter solche Pflanzen verstanden, deren Stengel jährlich bis an den Boden absterben. Diejenigen, deren Wurzeln nur ein Jahr dauern, heißen jährliche, die zwey Jahr dauern, zweysährige, die etliche Jahre bleiben, beständige.

Imbricatus, dieses Wort wird von denjenigen Blättern oder Schuppen der Pflanzen gebraucht, die mit ihrem Rand an einander liegen, wie die Holzziegel auf den Häusern.

Internodium, ist der zwischen den Knoten befindliche Theil der Stengel der Pflanzen.

Julus, ist ein Käglein.

Lanugo, Wolle: die Saamen der Pflanzen, an welchen ein wollichtes Wesen hängt, welches denselben als Flügel dienet, werden semina lanuginosa genennet, wie an der Distel u.

Loculamenta, sind die Zellen in der Frucht der Pflanzen, in welchen die Saamen stecken, so durch dünne Abtheilungen von einander abgesondert sind.

Locusta, ist die äußere Decke der Blumen und Körner am Korn, in welcher die Spreu steckt.

Malleolus, Nebenschöß, Gehling, sind solche Theile der Reben, die man zusamt den Knoten des alten Holzes bis am Boden nimmt; und weil sie einem kleinen Hammer gleichen, also nennet; welche Nebenschossen gewisser, als andere, Wurzeln schlagen, und bessere Stöcke geben.

Marginatus, eingefasset, die Saamen der Pflanzen, so eine dünne blätterförmige Einfassung haben, werden semina marginata genennet, wie an der Leucoi, an der Mondraute.

Mucro, ein scharffe Spitze, diese Blätter oder Früchte der Pflanzen, so sich in eine scharffe Spitze endigen, werden mucronatae genennet.

Multicapularis, wird von solchen Pflanzen gesagt,

die viele Saamenhüllen haben, so auf jede Blume folgen, wie am Schellkraut, am Agley u.

Nucleus, ein Kern, ist derjenige Theil der Frucht, so in einer harten Schale steckt, wie die Mandeln, Apricosenkerne.

Officulum, eine Schale, ist die harte, steinige Decke der Saamen.

Panicula, eine Kolbe, Aehre, ist ein Stengel, der sich in viele Stiele theilet, auf denen die Blumen oder Früchte stehen, dergleichen siehet man am Haber, am Suseu.

Pappus, Wolle, siehe Lanugo.

Pediculus ist derjenige Theil eines Stengels, auf welchem ein Blat, eine Blume, oder Frucht steht.

Petala, sind die zarten schöngefärbten Blättlein, welche insgemein den schönsten Theil der Blumen ausmachen. So werden diese Blumen, so aus einem Blat bestehen, Blumen mit einem Blättlein (monopetalus) genennet, die mit zwey Blättlein heißen Zweyblättrig (bipetalus) mit drey Blättlein, dreyblättrig (tripetalus), mit viereu, vierblättrig (tetrapetalus), mit fünffen, fünfblättrig, (pentapetalus), mit sechsen, sechsblättrig, (hexapetalus), die aber noch mehr Blätter haben, sind vielblättrig (polypetalus).

Pistillum, der Stempel oder Griffel, ist diejenige Säule, so in der Mitte der Blume steht, und oben aus dem Embryon herfürkommet, auch insgemein mit den Fäden umgeben ist, S. Tab. III. Fig. 3. Sie sind der Form nach gar unterschieden: denn an einigen Blumen sind sie rundlicht, an andern dreyeckicht, eiförmig oder viereckicht.

Placenta, ist derjenige Theil einer Schote oder Hülse an einer Pflanze, an welchem die Saamen sitzen, und durch welche sie ihre Nahrung erhalten, bis sie reif sind.

Planta, eine Pflanze, ist ein organischer Körper, so keine Empfindung und eigene Bewegung hat, und auf solche Weise an einem andern Körper hängt, daß er aus selbigem seine Nahrung ziehet, sich auch selbst durch den Saamen fortpflanzt. Unter diesem Geschlechtnamen, sind enthalten die Bäume, Stauden, Sträucher, und Kräuter.

Polypetalus, vielblättrig. Diejenigen Pflanzen sind vielblättrig, deren Blumen aus vielen Blättlein bestehen.

Pomum, ein Apfel: hierunter wird insgemein ein Gefäß verstanden, so mehr als einen Saamen enthält, so daß alle Pflanzen, die solche Früchte tragen, pomiferae, das ist, apfeltragend genennet werden.

Prunum, eine Pflaume, ist ein fleischichtes Gefäß, so einen harten zerbrechlichen Stein enthält, in welchen ein oder zwey Kern stecken, so, daß alle Pflanzen so solche Früchte tragen, pruniferae, pflaumentragend genennet werden.

Pulpa, ist der weiche Theil der Früchte, welcher den Saamen umgiebt, als am Tamarinden, an der Köhrleincassia.

Pyramidatus, pyramidenförmig, sind solche Blumen oder Früchte, so in Form einer Pyramide wachsen.

Racemus, eine Traube, ist ein Stiel, der sich in viele kleinere Stiele theilet, auf welchen die Blüthen oder Früchte stehen, als an den Weintrauben, Johannisbeeren, u. durch das erstere unterscheidet sich die Traube von einer Aehre, und durch das letztere von einer Kolbe.

Rrrr rrr 2

Radix,

Radix, eine Wurzel, ist derjenige Theil einer Pflanze, durch welche sie, der Natur gemäß, ihre Nahrung bekommt. Sie sind von verschiedener Form und Textur, indem einige faserig, andere fleischig, und hölzig sind.

Radix fibrosa, eine faserige, zäherige Wurzel, bestehet blos aus kleinen, haarförmigen Fasern, dergleichen haben das Gras, Korn &c.

Radix tuberosa, eine knollichte Wurzel, bestehet aus einer gleichförmigen, fleischigen Substanz, und ist insgemein runder Figur, eine solche Wurzel hat das Säubrot &c.

Radix bulbosa, eine Kollenwurzel, Zwiebelwurzel, bestehet aus verschiedenen Häuten, von welchen eine die andere einschlieset, oder aus verschiedenen über einander liegenden Schuppen. Die erste derselben wird *radix tunicata* genennet, dergleichen sind die Zwiebeln, die Tulpen, und *Hyacinthi* Zwiebeln &c. und daher nennen die Franzosen alle dergleichen Wurzeln *Oignons*; die letzere Art wird *radix squamosa* genennet, dergleichen haben die Lilie, der türkische Bund &c.

Radix testiculata, eine Hodenwurzel, ist eine doppelte knotige Wurzel: dann sie bestehet aus zwey Knoten, die einem Paar Hoden gleichen, von dieser Art sind die Wurzeln einiger Sorten des *Knabenkrautes*.

Radix palmata, eine handförmige Wurzel, ist eine knotige Wurzel, die gleichsam in verschiedene Finger getheilet ist, und fast einer Hand gleichet, von dieser Art ist die Wurzel am fünffingerförmigen *Knabenkraut*.

Radix asphodeli, eine Affodillwurzel, bestehet aus verschiedenen fleischichten Knoten, dahin gehöret die Wurzel der Affodilllilie und der Goldwurz.

Radix granulosa, eine körnichte Wurzel, ist eine Art einer klümperichten Wurzel, so aus vielen kleinen fleischichten Knoten bestehet, so Getreidekörnern gleichen, dahin gehöret die Wurzel des weissen *Steinbrechs*.

Radix grumosa, eine klümperichte Wurzel, bestehet aus verschiedenen länglichten, fleischichten Knoten, so oben in einen Mittelpunkt zusammen lauffen, dahin gehöret die Wurzel der Ranunkel.

Ramus, ein Zweig, ist die Theilung eines Stengels; an Bäumen wird er auch öfters ein Ast genennet.

Semen, ein Saame, ist derjenige Theile einer Pflanze, so der Erde anvertrauet wird, um eine Pflanze von gleicher Art zu erhalten, als diejenige war, von welcher der Saame genommen worden, und kan also eigentlich mit dem Ey, eines eierlegenden Thieres verglichen werden.

Semen nudum, ein nackender Saame, ist ein solcher, der keine andere Bedeckung hat, ausser dem Kelch, der daran bleibet, bis er aufgehet.

Semen papposum, ein flockichter, haariger Saamen, an welchem wie Wolle hängt, durch welche er von der Mutterpflanze weit weggeführt wird.

Siliqua, eine Schote, Hülse, ist ein langes, plattes oder rundes Gehäuse, in welchem eine oder zwey Reihen Saamen enthalten sind.

Spica, eine Aehre, ist ein Theil des Stengels, der dick mit Blumen oder Früchten besetzt ist, so, daß er einen spitzigen Keil formiret.

Stamina, die Fäden, sind diejenigen zarten Fasern, so den in der Mitte der Blumen, stehenden Griffel, oder Steimpfel umgeben, und auf welchen die Kölbchen oder Knöpflein stehen, die den männlichen Saamen enthalten.

Strobilus, ist ein Zapfen der Fichte.

Stria, Streifen; diejenigen Theile der Pflanzen, welche kleine länglichte Furchen haben, werden *striata* genennet.

Stolones, Schossen, Sprossen, Keimen, sind aus den Wurzeln der Pflanzen herfürtreibende Schossen, welche mit den daran hangenden Fasern abgenommen werden können, um dadurch die Sorten fortzupflanzen, dergleichen sind am *Feigensock* &c.

Suffrutex, ein Sträuchlein, ist eine hölzige Pflanze, so keine Augen treibt, dergleichen sind der *Thymian*, *Salbey*, *Lavendel* &c.

Talea, ein Schnittling, ist ein solcher Theil eines Zweiges, der, wann er am Baum abgeschnitten, und in die Erde gepflanzt wird, Wurzeln schläget.

Thyrus, ein Stengel, ist von der Aehre darinnen unterschieden, daß die Blumen oder Früchte lockerer daran stehen, so, daß zwischen ihnen ein merklicher Raum ist.

Tomentum, Wolle, womit die Stengel und Blätter der Pflanzen bedeckt sind, als *Wollkraut* &c.

Tracheæ, sind die Luftgefäße der Pflanzen.

Turiones, Schößlinge, sind künftige Schossen der Pflanzen, welche wann sie in einen rechten Stamm oculiret werden, einen Baum der nämlichen Art treiben, als die Mutterpflanze, von welcher sie genommen worden.

Vagina oder **Theca**, ist die Scheide und Bedeckung eines Knospen.

Valvæ, sind die Seitentheile einer Schote oder eines Saamengehäuses, die, wann sie sich nach der Länge in zwey Theile, wie an einer Muschel und andern Schalenfischen öffnen, *bivalves* genennet werden, wie am *Veil*.

Verticillum, siehe *Flos verticillatus*.

Vexillum, oder die Fahne, siehe *Flos papilionaceus*.

Vimen, ist ein biegsamer Schosse eines Baumes.

Viticulæ, sind zarte Schossen der Pflanzen, die auf dem Boden lauffen, und an den Knoten Wurzeln treiben, und sich so vermehren, wie an den *Erdbeeren*, am *Fünfingerkraut* &c.

Umbella, siehe *flos umbellatus*.

Umbilicus, siehe *fructus umbilicatus*.

