Quare hō inter omnia aīalia hꝫ latiſſimuꝫ pectus. vt dicit Areſto. Rn̄detur ꝙ ſpūs in homie ſunt debiliores ⁊ ſubtiliores. ergo requirūt regioneꝫ ampliorem in qua poſſunt ꝯtineri. vt eſt pectus

Quare pectora auicularū ſunt rotūda ⁊ acuta. Rn̄det qꝛ ſunt in cōtinuo motu. mō figura acuta ⁊ orbicularis motui eſt apta. vt pꝫ q̄rto phiſicoꝝ

Quare ea que diligimꝰ ad pectꝰ trahimꝰ. Rn̄r ꝙ ꝓpior locꝰ cordis ē ſub pectore. g̊ illa q̄ cor amat ad pectꝰ trahit. ꝓpter vicinitatē cordis applicādo amatū amanti

Quare mulieres ſtꝫ breuioris pectoris q̄ꝫ viri. Rn̄r qꝛ in viris eſt caliditas q̄ naturalit̄ ſurſum mouet̄. ſuꝑiora viri ingroſſando ⁊ ea ampliādo. g̊ magnū pectꝰ eſt ſignū aīoſitatis. vt ptꝫ ꝑ Areſto. in phiſionomia. vbi declarat h̄ de leone ⁊ tauro. ſed in mulieribꝰ frigiditas dn̄at̄. q̄ naturalit̄ mouet̄ deorſuꝫ: ⁊ ergo dt̄ Areſto. ꝙ mulieres frequēter cadent ſupra culū. qꝛ culiſterea eaꝝ ingroſſant̄ ex frigiditate deſcēdēte. ſed vir frequenter cadit ſuper pectꝰ ꝓpter eius groſſitiem.

De mamillis

Quare mamille ſunt poſite ſuꝑ̄ pectꝰ. Rn̄det̄ ꝙ pectꝰ eſt ſeries cordis calidiſſimi. ergo ibi mamille generātur vt menſtruū ad eas miſſum calori cordis vicinū citiꝰ decoqueret̄ ⁊ in materiā lactis ꝯuerteretur.

Quare in aliȷ̄s animalibꝰ mamille ſunt infra pectus. ſed in muliere ſunt ſupra pectꝰ. Rn̄r. qꝛ mulier eſt bipes ergo mamille exiſtētes infra pectꝰ īpedirent eius trāſitū: ſed alia aīalia q̄tuor habēt pedes. ergo ipſa nō impediūtur in eoꝝ tranſitu vel motu ꝓgreſſiuo

Quare viri nō hn̄t tā magnas mamillas ſicuti mulieres. Rn̄r qꝛ viris nō generant̄ menſtrua. nec ibi eſt vas menſtruo deputatū. Tn̄ dicit Areſto. ꝙ viri hn̄t paruas mamillas ⁊ mulieres paruos teſticulos

Querit̄ q̄ mamille ſunt magis valentes pueris lactātibꝰ. an parue vel magne. ſeu mediocres. Rn̄r ꝙ in magnis calor eſt diffuſus ⁊ diſꝑſus. g̊ ibi nō ē bona digeſtio lactis: ſed in paruis eſt vnitus ⁊ fortis. cuꝫ oīs virtus

vnita eſt fortioꝛ ſeipſa diſperſa. ⁊ per ꝯñs ibi eſt bona di
geſtio lactis. ġ ſunt melioꝛes ꝙ̃ magne. ſ; mediocres ſt;
optime. ex quo omne medium eſt optimũ

Quare in tredecimo ⁊ in decimoq̃rto anno mammille
iuuencularꝫ incipiũt creſcere ⁊ ingroſſari. vt dᷓt Albert⁹
Rñdetur ꝑ Areſto. in de generatiõe animaliũ ꝙ ideo. qꝛ
tũc puella efficiť pubes. ⁊ menſtrua incipiũt augeri in ea
et fluere. vt dicit Areſto. qꝛ in eadẽ etate puellarꝫ creſcũt
mammille et virorꝫ ſpermata

Quare mãmille mulierꝫ generantiũ aboꝛtũ. i. puerum
qui egrediť moꝛtuus ex vtero matris (vt dᷓt Ipocras in
ſcđa ꝑticula amphoꝛiſmorꝫ) molleſcũt. Rñdetur ſm glo/
ſam ibidẽ. qꝛ tũc menſtruũ non fluit ad mãmillas a quo
fetus deberet nutriri: ġ tunc molleſcũt

Quare mulier impꝛegnata ꝯcipiens maſculũ in vtero
dexterã mammillã h; duriorẽ ꝙ̃ ſiniſtram Rñr ſm Ipo
cratẽ. qꝛ maſculi concipiunť in dextro latere matricis. ġ
tũc menſtruũ fluit ad dexterã mãmillã ipſa; indurãdo

Quare mulierib⁹ imp̃gnatis lac fluẽs de mãmillis ſig
nificat debilitatẽ fetus Rñr ſm Areſto. qꝛ lac eſt ꝓpꝛiu;
nutrimentũ fetus in vtero. ⁊ ergo qñ lac fluit ſignũ eſt ꝙ
fetus nõ nutriť. ⁊ ex hoc vtiq; debilitať

Quare durq mãmilla dicit ſanitatẽ in puero exiſtente
in vtero. Rñdetur q̃a menſtruũ ꝯuertiť in lac. et tale lac
ſufficiẽter nutrit fetum. et ex hoc arguiť eorꝫ foꝛtitudo

Quare mulier h; tm̃ duas mãmillas. ⁊ aliq̃ bꝛuta vt
poꝛca ⁊ canicula hñt decem vel plˀes Rñr qꝛ freq̃nter mu
lier ꝯcipit maſculũ vnum vel femellã. ⁊ huic ſufficit vna
mãmilla vel due. S; aĩalia bꝛuta hñt multas ſciſſuras
ꝓcreãtes multos fetus. ġ hñt multas mãmillas. ꝑmo fe
tui pꝛimã. ſecũdo ſcđam. ⁊ ſic de alijs per oꝛdinem

Quare tp̃e impꝛegnatiõis mammille ſunt dure. ⁊ alio
tp̃e ſunt molles. Rñr qꝛ tũc inflanť et tumeſcũt ſicut vte/
rus. qꝛ multa humiditas menſtrualis fluit ad eas q̃ alio
tp̃e manet in matrice. ⁊ expelliť per locum deputatũ

Queriť. per quẽ modũ lac mãmillarꝫ venit ad matricẽ

Rñr ſm Ipocratẽ vbi ſup̄ ꝙ mãmilla hꝫ colligantiã cuꝫ matrice. ⁊ quaſdã venas q̄s abſcindũt obſtetrices tp̄e p̱tus: ⁊ p̱ illas lac fluit ad vmbilicũ pueroꝝ. ⁊ capiũt nutrimentũ p̱ vmbilicũ. Vñ aliq̄ dicunt ꝙ puer exiſtẽs in vtero nutrit̄ p̱ os. ſꝫ h̄ eſt fl̄m. qꝛ ſi ſic tũc ſtercorizarẽt etiã: ſꝫ hoc eſt fl̄m. qꝛ nõ videt̄ vbi dimittant̄ illa ſtercora

Quare lac egrediẽs de mãmillis ſpiſſum ⁊ groſſum et nõ multũ fluidũ eſt ſignũ maſculi in vtero. ſed lac tenue eſt ſignũ femelle. Rñr qꝛ mulier geſtãs maſculũ eſt fortioris caloris q̄ digerit ip̄m lac inſpiſſando. Sed in mulieribꝫ hñtibꝫ femellã nõ eſt tãtus calor. g̊ manet indigeſtũ et aq̄ſum ⁊ fluidũ ſup̱natãs ſi ponat̄ in aqua

Quare lac ſit albũ. cum tñ menſtruũ ſit rubeũ ex q̄ generat̄. Rñr p̄mo q̄a ſanguis nõ bene decoctꝰ recipit formã albam: vt p̱tꝫ de carne. cuiꝰ ꝓprius color ẽ albus Aliter rñdetur. q̄a quilibꝫ humor (q̄ generat̄ in aliq̄ mẽbro) aſſil'atur tali mẽbro in colore inquãtũ põt: ſꝫ qꝛ caro mãmillaꝝ eſt alba. ergo ⁊ humor lactis eſt albus.

Quare vacca dat copioſe lac pre aliis aĩalibꝫ. Rñdet̄ qꝛ vacca eſt aĩal multũ vorax: et vbi multũ recipit̄ de nutrimento ibi multũ generatur de menſtruo. et q̄a lac non eſt aliud niſi menſtruũ decoctũ et dealbatũ. ergo etiã in ea multum generat̄ de lacte

Quare lac nõ ſit ſanũ. vt dicit Ipocras ſc̄da p̱ticula amphoriſmoꝝ. Rñr ſm gloſam ibidẽ ꝙ ꝓpter multas cãs ẽ inſanũ. Pria qꝛ qñqꝫ coagulat̄ in ſtomacho ex q̄ vlteriꝰ malꝰ anhelitꝰ generat̄. Sꝫ Ypocras ponit remediũ in loco allegato. dicẽs ſi tercia p̱s aq̄ admiſceat̄ lacti tũc nõ eſt nociuũ. ⁊ hoc intelligit̄ de aqua fluuiali Alia cã eſt qꝛ lac aliq̄ñ in ſtomacho aceteſcit et excoquit̄: et iterũ ex eo generant̄ mali humores inficiẽtes anhelitũ

Quare lac p̄ſertim dolentibꝫ caput nõ valet: Rñr ſm Ipocratẽ vbi ſupra ⁊ ſm gloſam ibidẽ. quia lac cito tranſit in multã fumoſitatẽ. ⁊ multũ habꝫ de materia terreſtri que fumoſitas aſcendẽs ipſum facit dolere

Quare lac eſt ꝯueniens nutrimentũ infantibꝫ ⁊ pueris

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Rñdetur q2 eſt naturalis eoꝝ cibus et ꝯſuetus. q2 etiã in
vtero nutriebant tali cibo. ergo eſt eis ꝯueniens

Quare lacticiniũ tp̄e ptus vaccaꝝ ſit bonũ Rñr q2 tũc
lac eſt multum ſpõgioſum. ḡ tp̄e illo multas fumoſitates
expellit. ⁊ quodãmodo eſt vna purgatio tali tp̄e

Quare lac in mulieribꝫ coeũtibꝫ deſtruit puerũ lacten
tē. Rñr ſm Areſto. in libro de aĩalibꝫ. q2 tp̄e coit⁹ ſubti-
lior ⁊ melior ps lactis vadit ad vaſa ſeminalia ⁊ ad matri
cem: ⁊ peior ps manet in mãmillis q̄ deſtruit puerũ

Quare lac mulieꝝ fuſcaꝝ ſit melius q̄ȝ albaꝝ Rñdetur
q2 fuſce mulieres ſunt calidiores alijs. ⁊ q2 calor digerit
nutrimentũ ſufficiẽter. et ſic lac melioratr̄

Quare in eadē menſa ſil' comedere lac et piſces ſit ꝓ-
hibitũ a medicis. Rñr quia maxime diſponũt ad lep̄ã.
quia ambe ſunt flegmatice nature tam lac q̄ȝ piſces.

Quare auicule nõ hñt lac neqȝ mãmillas. Rñr q2 mã-
mille impedirēt eis volatũ. Etiã piſces non hñt mãmil-
las vel lac. q2a ipſi emittunt lactes. vt dr̄ Areſto. in libro
de generatiõe animaliũ: quia femella emittit poligranũ.
et maſculus ſupaddit lactes. ſic ꝙ eoꝝ ſpecies eternant̄
per ſucceſſionē indiuiduoꝝ

Quare aĩalia hñt dorſa Rñdetur ſm Areſto. ꝓpter tres
cãs: Prima vt dorſum eſſet via neruoꝝ a ſpina dorſi extē
ſoꝝ p totum corpus. vt pꝫ ſufficiẽter in ſuſpēſis. q2a qñ
ſunt lacerati tũc adhuc nerui depēdēt in ſpina dorſi. Se
cunda cã eſt. vt eſſet cuſtodia membroꝝ molliũ in corpo
re exiſtentiũ. vt ſtomachi epatis pulmonis. et ſic de alijs
Tercia cã eſt. vt eſſet fundamentũ omniũ oſſium. q2 vide
mus ꝙ alia oſſa vt coſte figunt̄ in ſpina dorſi.

Quare hõ inter oĩa aĩalia hꝫ dorſum latum. ita ꝙ nul-
lum aĩal p̄ter hoiem põt ꝯueniēter iacere in dorſo Rñdet̄
quia pectori lato correſpõdet dorſum latum. ſi ergo hõ ha
beret dorſuȝ acutũ ſicut alia aĩalia. illa eſſet indecēs ⁊ in-
epta diſpoſitio. ḡ reqritur ꝙ habeat dorſum latum

Quare hõ iacens in dorſo habet horribiles viſiones.
Rñr quia tũc meat⁹ ſeu neru⁹ fantaſie eſt aptus. qui eſt in

anteriori pte cerebri. ꝛ ergo tũc fantaſiat. Uel alia rõ eſt qꝛ hõ iacens in dorſo hꝫ ſe ita ꝙ humores pturbãtur. et mouent ſurſum vbi ẽ fantaſia. ꝛ ḡ fantaſia pturbatur

Quare malũ eſt iacere in dorſo. Rñr ſm medicos. qꝛ hoc diſponit ad leprã. elepſiã. maniã. ꝛ ad incubũ. Ubi nota ꝙ mania ẽ infectio anterioris ptis cerebri cum ꝑuatiõe hymaginatõis. Sꝫ incub⁹ in ꝓpoſito eſt paſſio cordis. cum aliq̇s ſe in ſomno ſuffocari putet. et putet aliq̇d iacere ſup ipm quod libenter remoueret

Quare ſpina dorſi hꝫ multos articulos ꝛ multa membra. que apud medicos ſpõdilia dicunt. Rñr ꝙ ꝓpter flexibilitatẽ ipſi⁹ dorſi. qꝛ ſine illis articulis flexiones fieri nõ pñt neqꝫ motus. vt patet p Areſto: in libro de motibꝫ animaliũ. Et ergo dicẽtes ꝙ elephas nõ habet membra dicunt male. qꝛ tunc nõ poſſet ſe mouere.

Quare ſpina dorſi in piſcibꝫ fracta piſces cito moriũtur. Rñdetur qꝛ ſpina dorſi in piſcibꝫ eſt loco cordis. mõ cor eſt primũ viuens ꝛ vltimũ moriens. vt ptꝫ in libro de longitudine ꝛ breuitate vite. ergo leſa ſpina dorſi piſces diutius viuere nõ poſſunt

Quare leſa medulla hõ faciliter moritur. Rñdetur q̇a medulla venit a cerebro qđ eſt vnũ membrũ pꝛĩcipale vt ptꝫ in duobꝫ. Primo q̇a medulla ſeu nucha ẽ alba ſicut cerebrũ. Scđo qꝛ alie medulle nõ hñt cutẽ neqꝫ pelliculã. ſed nucha hꝫ duplicem pelliculã ſicut cerebrũ. ſ. piam matrem et duram matrẽ. Et etiã circa ſpinã dorſi ſunt q̇nqꝫ vene. q̄ ſm medicos dicunt emoroides. ab emorois grece quod eſt ſanguis latine. ideo modicum videndũ eſt de venis emoroidaꝝ

De fluxu emoroidũ

Quare aliq̇ viri patiunt fluxum emoroidũ. Rñdetur qꝛ ſunt melancolici. ergo multũ generat in eis de melancolia. qꝛ frigidi ſunt. q̄ primo mittit ad ſplenẽ. ſ. ad ꝓpriã ſedẽ melãcolie. ꝛ ibi ꝓpter ſanguinis multitudinẽ retineri non põt: ḡ mittit ad ſpinã dorſi vbi ſunt aliq̄ vene q̄ terminant in dorſo ꝛ in collo. et qñ ille vene valde replẽtur ſanguine melancolico. tunc apiuntur vie nature. et exit